Linnaea
QK91
.C512
1797-1830
v. 2, pt. 1
c. 2

# SPECIES PLANTARUM.

---

*Tomus II. Pars I.*

Mo. Bot. Garden,
1893

*Classis VI.*

# HEXANDRIA.

## *MONOGYNIA.*

* *Fl. Calyculati calyce corallaque instructi, absque spathis.*

602. BROMELIA. *Cor.* 3-partita. *Cal.* 3-partitus, superus. *Bacca.*

603. PITCAIRNIA. *Cor.* 3-partita. *Cal.* 3-partitus, semisuperus. *Capsula.*

604. TILLANDSIA. *Cor.* 3-petala. *Cal.* 3-partitus, inferus. *Sem.* comosa.

606. BURMANNIA. *Cor.* 3-petala. *Cal.* 1-phyllus, inferus, triquetro-alatus, coloratus.

607. TRADESCANTIA. *Cor.* 3-petala. *Cal.* 3-phyllus, inferus. *Filamenta* barbata.

686. STEPHANIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 2-lobus. *Germ.* pedicellatum.

690. FRANKENIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 1-phyllus, inferus. *Capsf.* 1-locularis, polysperma.

675. COSSIGNEA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-partitus. *Capsf.* 3-locularis.

684. LORANTHUS. *Cor.* 6-partita. *Cal.* margo superus. *Bacca* 1-sperma.

687. HILLIA. *Cor.* 6-fida. *Cal.* 6-phyllus, superus. *Fructus* 2-locularis, polyspermus.

685. SCHRADERA. *Cor.* 6-fida. *Cal.* truncatus. *Bacca* polysperma.

672. DUROIA. *Cor.* 6-partita. *Cal.* truncatus. *Pomum.*

671. RICHARDIA. *Cor.* 6-fida. *Cal.* 6-fidus, superus. *Sem.* 3, nuda.

665. TACCA. *Cor.* 6-petala. *Cal.* 6-partitus. *Bacca* infera.

676. BARBACENIA. *Cor.* 6-petala. *Cal.* 6-dentatus. *Filamenta* dentata. *Capsula.*

677. BERBERIS. *Cor.* 6-petala. *Cal.* 6-phyllus, inferus. *Bacca* 2-sperma.

644. LEONTICE. *Cor.* 6-petala. *Cal.* 6-phyllus, inferus. *Bacca* inflata, supera.

679. NANDINA. *Cor.* 6-petala. *Cal.* polyphyllus, imbricatus. *Bacca* 2-ſperma.
674. PRINOS. *Cor.* 6-fida. *Cal.* 6-fidus, inferus. *Bacca* 6-ſperma.
678. PSATHURA. *Cor.* 6-fida. *Cal.* 6-dentatus. *Drupa* ſicca infera.
688. ISERTIA. *Cor.* 6-fida. *Cal.* 6-dentatus. *Pomum* 6-loculare.
689. CANARINA. *Cor.* 6-fida. *Cal.* 6-phyllus ſuperus. *Capſ.* 6-locularis.
673. ACHRAS. *Cor.* 12-fida. *Cal.* 6-phyllus, inferus. *Bacca* 12-ſperma.
683. CAPURA. *Cor.* 6-fida. *Cal.* nullus. *Germ.* ſuperum. *Bacca.*

† *Chlora imperfoliata, Portlandia hexandra, Lythra aliquot, Fumaria Cucullaria.*

* * *Fl. calyculati, calyco, corolla, ſpathisque inſtructi.*

666. CORYPHA. *Cor.* 3-partita. *Cal.* 3-phyllus. *Drupa.*
667. LICUALA. *Cor.* 3-partita. *Cal.* 3-partitus. *Nectar.* fertiforme. *Drupa.*
608. MNASIUM. *Cor.* 3-dentata. *Cal.* 3-partit. *Spatha* 2-valvis. *Antherae* foliaceae.

* * * *Fl. Spathacei ſ. Glumacei.*

601. URANIA. *Cor.* ſupera 3-petala. *Spathae* alternae.
610. HAEMANTHUS. *Cor.* ſupera, 6-partita. *Involucrum* polyphyllum, maximum.
613. LEUCOJUM. *Cor.* ſupera, 6-petala, campanulata. *Stamina* aequalia.
614. STRUMARIA. *Cor.* 6-petala, plana. *Stylus* ſtrumoſus!
612. GALANTHUS. *Cor.* ſupera, 6-petala: *Petalis* 3 interioribus brevioribus, emarginatis.
616. NARCISSUS. *Cor.* ſupera, 6-petala. *Nectarium* campanulatum, extra ſtamina.
617. PANCRATIUM. *Cor.* ſupera, 6-petala. *Nectarium* campanulatum, ſtaminibus terminatum.
622. AMARYLLIS. *Cor.* ſupera, 6-petala, irregularis. *Stam.* inaequalia, declinata.
618. CRINUM. *Cor.* ſupera, 6-fida, baſi tubuloſa. *Stam.* diſtantia, fauci inſerta.

621. CYRTANTHUS. *Cor.* ſupera 6-fida clavata. *Filamenta* ſimplicia.
620. EUSTEPHIA. *Cor.* ſupera 6-fida tubuloſa. *Filamenta* tricuſpidata.
619. AGAPANTHUS. *Cor.* infera 6-fida infundibuliformis regularis.
609. PONTEDERIA. *Cor.* infera, 6-fida, ringens.
624. BULBOCODIUM. *Cor.* infera, 6-petala: unguibus longiſſimis ſtaminiferis.
615. TULBAGIA. *Cor.* infera. 6-petala: tribus inferioribus. *Nectarium* cylindricum extus petaliferum.
626. ALLIUM. *Cor.* infera, 6-petala. *Petala* ovata, ſeſſilia.
636. CURCULIGO. *Cor.* infera, 6-petala. *Styl.* 3-partitus.
625. APHYLLANTHES. *Cor.* infera, 6-petala. *Spathae* dimidiatae, glumoſae.
611. MASSONIA. *Cor.* infera 6-partita. *Stam.* nectario inſerta.
637. HYPOXIS. *Cor.* ſupera, 6-petala. *Spathae* glumaceae.

* * * * *Flores nudi.*

605. XEROPHYTA. *Cor.* 6-partita ſupera. *Stigma* clavatum.
661. ALSTROEMERIA. *Cor.* ſupera, 6-petala, unguibus 2 tubuloſis.
655. LANARIA. *Cor.* ſupera 6-fida ſubcampanulata.
662. HEMEROCALLIS. *Cor.* infera, 6-partita. *Stam.* declinata.
660. AGAVE. *Cor.* ſupera, 6-fida, limbo erecto, Filamentis brevior.
635. GETHYLLIS. *Cor.* ſupera 6-partita. *Bacca* clavata polyſperma.
659. ALOE. *Cor.* infera, 6-fida. *Filam.* receptaculo inſerta.
657. ALETRIS. *Cor.* infera: 6-fida, rugoſa. *Stamina* fauci inſerta.
656. VELTHEIMIA. *Cor.* infera 6-fida. *Stamina* corollae baſi inſerta.
650. POLYANTHES. *Cor.* infera, 6-fida, tubo curvato.
649. CONVALLARIA. *Cor.* infera, 6-fida. *Bacca* triſperma.

648. SANSEVIERA. *Cor.* infera 6-partita. *Bacca* 1-sperma.

652. HYACINTHUS. *Cor.* infera, 6-fida subcampanulata. *Stamina* receptaculo inserta.

651. DRIMIA. *Cor.* infera 6-fida campanulata. *Stamina* tubo corollae inserta.

623. MILLEA. *Cor.* infera: 6-fida infundibulif. *Germen* pedicellatum!

642. ASPHODELUS. *Cor.* infera: 6-partita: nectarii valvulis 6 staminiferis.

629. EUCOMIS. *Cor.* infera. 6-partita, persistens. *Filamenta* nectario adnata.

643. ANTHERICUM. *Cor.* infera, 6-petala, plana.

681. ENARGEA. *Cor.* infera, 6-petala, petalis alterne basi biglandulosis.

653. PHORMIUM. *Cor.* infera, 6-petala inaequalis. *Capsf.* triquetra.

654. LACHENALIA. *Cor.* infera, 6-petala inaequalis. *Capsf.* trialata.

639. ORNITHOGALUM. *Cor.* infera, 6-petala. *Filam.* alternis basi dilatatis.

638. ERIOSPERMUM. *Cor.* infera, 6-petala. *Filam.* lanceolata. *Sem.* lanata.

640. SCILLA. *Cor.* infera, 6-petala, decidua. *Filam.* filiformia.

641. CYANELLA. *Cor.* infera, 6-petala: petalis exterioribus propendentibus.

682. PHILESIA. *Cor.* infera, 6-petala, tribus interioribus duplo longioribus.

680. LINDERA. *Cor.* infera, 6-petala. *Capsula* 2-locularis.

647. DRACAENA. *Cor.* infera, 6-petala. *Bacca* 3-sperma.

646. ASPARAGUS. *Cor.* infera, 6-petala. *Bacca* 6-sperma.

645. POLLIA. *Cor.* infera, 6-petala. *Bacca* polysperma.

631. GLORIOSA. *Cor.* infera, 6-petala, reflexa, caudata.

632. ERYTHRONIUM. *Cor.* infera, 6-petala, reflexa, petalis basi 2 callis.

630. UVULARIA. *Cor.* infera, 6-petala, basi fovea nectarifera; erecta.

628. FRITILLARIA. *Cor.* infera, 6-petala, basi fovea nectarifera; ovata.
627. LILIUM. *Cor.* infera, 6-petala: petalis basi canaliculato-tubulosis.
633. TULIPA. *Cor.* infera, 6-petala, campanulata. *Stylus* 0.
658. YUCCA. *Cor.* infera, 6-petala, patens. *Stylus* 0.
634. ALBUCA. *Cor.* infera, 6-petala, 3 exterioribus patulis, 3 interioribus conniventibus. *Stigma* cinctum cuspidibus 3.

* * * * * *Flores incompleti.*

664. ORONTIUM. *Spadix* multiflorus. *Follic.* 1-spermus.
663. ACORUS. *Spadix* multiflorus. *Capf.* 3-locularis.
669. CALAMUS. *Cal.* 6-phyllus. *Peric.* retrorsum imbricatum 1-spermum.
670. JUNCUS. *Cal.* 6-phyllus. *Capf.* 1-locularis.
668. THRINAX. *Cal* 6-dentatus. *Drupa.*
691. PEPLIS. *Cal.* 12-fidus. *Capf.* 2-locularis.

* * * * *Gramina.*

693. BAMBUSA. *Cal.* 0. *Cor.* 2 valvis.
692. GAHNIA. *Cal.* 1-valv. *Cor.* 2-valvis.
694. EHRHARTA. *Cal.* 2-valv. *Cor.* duplex.

## *DIGYNIA*

697. FALKIA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 1-petala. *Sem.* 4.
698. ATRAPHAXIS. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 2-petala. *Sem.* 1, compressum.
696. NECTRIS. *Cal.* 6-partit. *Cor.* 0. *Capf.* 2, polyspermae.
695. ORYZA. *Gluma* 1-flora. *Cor.* 2-glumis. *Sem.* 1, oblongum.

† *Leersia hexandra. Ehrhartae nonnullae.*

## *TRIGYNIA.*

* *Fl. inferi.*

703. WURMBEA. *Cor.* 6-fida tubulosa.
707. COLCHICUM. *Cal.* spatha. *Cor.* 6-petaloidea.
704. MELANTHIUM. *Cal.* 0. *Cor.* 6-petala: petalis staminiferis.

705. MEDEOLA. *Cal.* o. *Cor.* 6-petala. *Bacca* 3-cocca.
708. HELONIAS. *Cal.* o. *Cal.* 6-petala. *Capſ.* 3-locularis.
706. TRILLIUM. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Bacca* 3-locularis.
702. TRIGLOCHIN. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* tripetala. *Capſ.* baſi dehiſcens.
699. RUMEX. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Sem.* 1, triquetrum.
701 SCHEUCHZERIA. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* o. *Capſ.* 3, 1-ſpermae.

† *Xylophylla latifolia.*

* * *Fl. ſuperi.*

700. FLAGELLARIA. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* o. *Pericarpium* 1-ſpermum.

## *HEXAGYNIA.*

710. DAMOSONIUM. Spatha. *Cal.* 5-partit. *Cor.* 3-petala. *Bacca* 10-locularis.
709. WENDLANDIA. *Cal.* 6-phyl. *Cor.* 6 petala. *Capſ.* 6, monoſpermae.

## *POLYGYNIA.*

711. ALISMA. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Peric.* plura.

# *MONOGYNIA.*

## *601. URANIA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 539.

*Cal.* o. *Cor.* tripetala. *Nectar.* 2-phyll. foliolo altero bifido. *Capſ.* infera trilocularis polyſperma. *Semina* biſerialia arillo tecta.

*1. URANIA *ſpecioſa.* W.

Ravenalia madagaſcarienſis. *Sonner. it. ind. ed. germ.* 2. *p.* 175. *t.* 124. 125. 126.* *Juſſ. gen. ed. Uſt. p.* 69. *Jacq. hort. ſchoenb.* 1. *p.* 47. *t.* 93.*

Prächtige Uranie. W.

*Habitat in* Madagaſcariae *locis paduloſis.* ♄

Arbor *facie Muſae vel Heliconiae altiſſima.* Truncus *indiviſus.* Folia *diſticha Heliconiae longe petiolata.* Petioli *bipedales.* Spadix *axillaris erecta foliis brevior.* Spathae *diſtichae ovatae concavae ut in Heliconiis multiflorae.* W.

## 602. BROMELIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 540.

*Cal.* 3-fidus, ſuperus. *Petala* 3: Squama nectarifera ad baſin petali. *Bacca* trilocularis.

1. BROMELIA *Ananas.*

B. foliis ciliato-ſpinoſis mucronatis, ſpica comoſa. *Sp. pl.* 408.

B. foliis ſpinoſis, fructibus connatis caulem cingentibus. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upſ.* 73. *Roy. lugdb.* 24.

Carduus braſilianus, foliis aloës. *Bauh. pin.* 384.

Ananas acoſtae. *Comm. hort.* 1. *p.* 109. *t.* 57.

Ananas aculeatus, fructu ovato carne albida. T. *Trew. ehret. t.* 2. *Blackw. t.* 567. *Knorr. del. hort.* 2. *t. A.* 1. *et* 2. *Sabbat. hort.* 1. *t.* 72.

Ananas ovata. *Mill. dict. n.* 1.

Anaſſa. *Rumph. amb.* 5. *p.* 227. *t.* 81.

Kapa-Tſiakka. *Rheed. mal.* 11. *p.* 1. *t.* 1. 2.

β. Ananas aculeatus, fructu pyramidato: carne aurea. *Tournef. inſt.* 653. *Blackw. t.* 568.

Ananas aculeatus, fructu conico: carne aurea. *Phil. ſpec.* 20.

Ananas pyramidalis. *Mill. dict. n.* 2.
γ. Ananas lucide virens, folio vix ferrato. *Dill. elth.* 25. *t.* 21. *f.* 22.
Ananas lucida. *Mill. dict. n.* 4.
Ananas non aculeatus Pitta dictus. *Plum. spec.* 20.
δ. Ananas (*viridis*) aculeatus, fructu pyramidato ex viridi-flavescente. *Mill. dict. n.* 3.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 293.
Essbare Ananas. W.
*Habitat in nova* Hispania, Surinamo. ♄ (v. v)

2. BROMELIA *Pinguin.*
B. foliis ciliato-spinosis mucronatis, racemo terminali. *Jacq. amer.* 91. *Trew. ehr. t.* 51. *Swarz obs.* 120.*
B. foliis aculeatis, racemo laxo terminali. *Hort. cliff.* 129. *Roy. lugdb.* 25. *Brown. jam.* 193. *n.* 4.
Ananas americana sylvestris altera minor. *Pluk. mant.* 29. *t.* 258. *f.* 4.
Pinguin. *Dill. elth.* 320. *t.* 240. *f.* 311.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 296.
Zaun-Ananas. W.
*Habitat in* Jamaica, Barbados. ♄
*Pro sepibus vivis, ut possent fere inde moenia fieri. Jacq.*

3. BROMELIA *Karatas.*
B. foliis erectis, floribus acaulibus sessilibus aggregatis. *Jacq. amer.* 90. *hort.* 31. 32.
B. acaulis, floribus aggregatis sessilibus subradicalibus. *Sp. pl.* 2. *p.* 408.
Karatas foliis altissimis angustissimis et aculeatis. *Plum. gen.* 10?
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 297.
Wilde Ananas. W.
*Habitat in* America *meridionali.* ♄
*Miraculum naturae pro conservatione fructus in maturitatem Jacq.* Stolones *inter folia, peracto fructu, procumbentia subulato-filiformes, radicantes, propagantes plantam.*

4. BROMELIA *lingulata.*
B. foliis serrato-spinosis obtusis, spicis alternis. *Mill. dict. n.* 2.
B. ramosa et racemosa, foliis arundinaceis serratis. *Plum. gen.* 26. *ic.* 64. *f.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 299.
Zungenblättrige Ananas. W.

*Habitat in* America *meridionali.* ♄

*5. BROMELIA *bracteata.*

B. foliis ſerrato-ſpinoſis, bracteis ovato-lanceolatis, ſcapo elongato, racemo compoſito, racemulis ſubdiviſis, floribus ſeſſilibus. *Swartz. prod.* 56. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 583. *

Aloe americana arboribus innaſcens, foliis latis membranaceis ad margines ſpinoſis. *Houſt. reliq. p.* 7. *t.* 16.

Paraſitiſche Ananas. W:

*Habitat in rupeſtribus* Jamaicae *inque arboribus* Vera Cruce. ♄

Bracteae *membranaceae integerrimae coccineae.* W.

*6. BROMELIA *paniculigera.*

B. foliis ſerrato-ſpinoſis, bracteis lanceolatis, racemo compoſito, racemulis ſubdiviſis, floribus pedunculatis. *Swartz. prod.* 56. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 585. *

Riſpenblütige Ananas. W.

*Habitat in* India *occidentali.* ♄

Scapus *erectus elongatus pedalis et ultra, bracteatus.* Bracteae *lato-lanceolatae alternae membranaceae ſemipedales coccineae.* Racemus *compoſitus bipedalis erectus pruinoſus, racemulis ſubdiviſis patentibus.* Flores *pedunculati, pedunculis pollicaribus teretibus incanis tomentoſis.* Swartz. l. c.

*7. BROMELIA *chryſantha.*

B. foliis ſerrato-ſpinoſis, bracteis lanceolatis dentatis, racemo ſubcompoſito foliis breviore, floribus pedunculatis. W.

B. (*chryſantha*) foliis ciliato-ſpinoſis mucronatis, racemo compoſito terminali, baccis glabris. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 28. *t.* 55. *

Gelbblütige Ananas. W.

*Habitat ad* Caracas. ♄

Racemus *foliis brevior pedalis baſi compoſitus.* Flores *flavi pedunculati.* Pedunculi *glabri.* Bracteae *marceſcentes lanceolatae flaveſcentes dentatae.* W.

8. BROMELIA *nudicaulis.*

B. foliis radicalibus dentato-ſpinoſis, caulinis integerrimis. *Mill. dict. n.* 1.

B. pyramidata, aculeis nigris. *Plum. gen.* 46. *ic.* 62. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 300.

Nacktſtielige Ananas. W.

*Habitat in* America *meridionali.* ♄

9. BROMELIA *humilis.*

B. subacaulis, floribus aggregatis sessilibus, axillis stoloniferis. *Jacq. vind.* 306.* *Misc.* 2. *p.* 325. * *Ic. rar.* 1. *t.* 60.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 300.

Niedrige Ananas. W.

*Habitat* . . . . . ♄

10. BROMELIA *Acanga.*

B. panicula diffusa, foliis ciliato-spinosis mucronatis recurvatis. *Syst. Veg.* 259. *Sp. pl.* 1. *p* 285.

B. foliis spinolis oblique recurvis, fructibus dispersis racemosis. *Hort. upsf.* 73.

Caraguata. *Pis. bras.* 90. *t.* 91.

Mexocotl. s. Manguel. *Hern. mex.* 272. *Morif. hist.* 2. *s.* 4. *t.* 22. *f.* 7.

*Houttuyn Lin. Pfl.* Syst. 6. *p.* 301.

Sparrige Ananas. W.

*Habitat in* Brasilia. ♄

## *603. PITCAIRNIA.

*Hepetis. Gen. plant. edit. Schreb. n.* 1741.

*Cal.* 3-phyllus semisuperus. *Petala* 3. Squama nectarifera ad basin petalorum. *Stigmata* 3, contorta. *Caps.* 3 introrsum dehiscentes. *Sem.* alata.

*1. PITCAIRNIA *bromeliaefolia.*

P. foliis ciliato-spinosis, pedunculis germinibusque glaberrimis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 401. *Schneevoigt. ic. fasc.* 4. *t.* 11.

Pitcairnia bromeliaefolia. *l'Herit. sert. angl. p.* 7. *t.* 11. *Swartz. fl. ind. occid.* 1. *p.* 580.*

Hepetis anguftifolia. *Swartz. prod.* 56.

Ananasblättrige Pitcairnie. W.

*Habitat in* Jamaica, *ad latera et praecipitia rupium umbrosa.* ♄

*2. PITCAIRNIA *anguftifolia.*

P. foliis ciliato-spinosis, pedunculis germinibusque tomentosis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 401.

Schmalblättrige Pitcairnie. W.

*Habitat in insula* St. Crucis. ♄

*3. PITCAIRNIA *latifolia.*
P. foliis integerrimis basi subspinosis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 401.
Breitblättrige Pitcairnie. W.
*Habitat in* India *occidentali.* ♄ (v. v.)

## 604. TILLANDSIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 541.

*Cal.* 3-fidus, persistens. *Cor.* 3-fida, campanulata. *Capf.* 1-locularis. *Sem.* comosa.

1. TILLANDSIA *utriculata.*
T. culmo paniculato. *Sp. pl.* 409.
T. foliis basi conniventibus in utriculum. *Hort. cliff.* 129.
T. parasitica major, foliis amplioribus attenuatis basi ventricosis, spica assurgenti compressa brachiata, floribus fere sessilibus. *Brown. jam.* 194. *n.* 4.
Viscum caryophylloides maximum, flore tripetalo pallide luteo, semine filamentoso. *Sloan. jam.* 76. *hist.* 1. *p.* 88. *Raj. suppl.* 405.
Visci modo arboribus indicis adnascens. *Bauh. pin.* 423.
Caraguata multiplici spica, flore albo. *Plum. gen.* 10.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 302.
Schlauchartige Tillandsie. W.
*Habitat in* Americae *meridionalis arboribus.* 4

2. TILLANDSIA *serrata.*
T. foliis superne serrato-spinosis, spica comosa. *Sp. pl.* 409.
T. parasitica maxima, foliis amplioribus obtusis ciliato-subspinosis, racemo pyramidato. *Brown. jam.* 195.
Caraguata clavata et spicata, foliis serratis. *Plum. gen.* 10. *ic.* 75. *f.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 303.
Gesägte Tillandsie. W.
*Habitat in* America *meridionali.*

3. TILLANDSIA *lingulata.*
T. foliis lanceolato-lingulatis integerrimis: basi ventricosis. *Jacq. amer.* 92. *t.* 62.
T. media parasitica, foliis oblongis obtusis, floribus comosis terminalibus. *Brown. jam.* 194.
Caraguata latifolia et clavata. *Plum. gen.* 10. *ic.* 74.

Viſcum caryophylloides maximum, capitulis in ſummitate conglomeratis. *Sloan. jam.* 77. *hiſt.* 1. *p.* 189. *t.* 110. *Rai ſuppl.* 405.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 304.
Zungenblättrige Tillandſie. W.
*Habitat in* Americae *meridionalis arboribus vetuſtis, paraſitica. Colligit etiam aquam.*

4. TILLANDSIA *tenuifolia.*

T. ſpicis alternis imbricatis, floribus diſtichis, foliis linea-ri-filiformibus erectis, apice ſetaceis. *Swartz fl. ind. occ.* 1. *p* 592.*
T. foliis filiformibus integerrimis, ſpica ſimplici laxa. *Roy. lugdb.* 25.
T. paraſitica parva, foliis tenuiſſimis erectis, ſpica breviori ſimplici diſticha. *Brown. jam.* 194.
Renealmia ſpica multiplici anguſtifolia, flore caeruleo. *Plum. gen.* 37. *ic.* 238. *f.* 2.
Viſcum caryophylloides minus, foliorum imis viridibus apicibus ſubrubicundis, flore tripetalo purpureo, ſemine filamentoſo. *Sloan. jam.* 77. *hiſt.* 1. *p.* 190. *t.* 122. *f.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 305.
Schmalblättrige Tillandſie. W.
*Habitat in* Americae *meridionalis arboribus.* 4

*5. TILLANDSIA *flexuoſa.*

T. ſpicis laxis flexuoſis, floribus diſtichis remotinſculis, foliis lanceolato-linearibus reclinatis, caule apice ſubdiviſo. *Swartz. prod.* 57. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 590.*
T. (*tenuifolia*) foliis lineari-ſubulatis integerrimis imbricatis, ſpica ſimplici laxa. *Jacq. amer. p.* 92. *t.* 63.*
Schlaffblättrige Tillandſie. W.
*Habitat in arborum ramis* Jamaicae *et* Carthagenae. 4

*6. TILLANDSIA *ſetacea.*

T. ſpica ſimplici, ſpathis diſtichis imbricatis, foliis lineari-filiformibus reclinatis glabris. *Swartz. fl. ind. occid.* 1. *p.* 593.*
Borſtenblättrige Tillandſie. W.
*Habitat in* Jamaicae *arboribus.* 4

*Similis T. tenuifoliae, ſed omnino diſtinguenda:* foliis *reclinatis, nec erectis, et* ſpica *ſimplici nec ſpicis pluribus alternis.* Swartz. l. c.

7. TILLANDSIA *paniculata.*

T. foliis radicalibus breviſſimis, culmo ſubnudo, ramis ſubdiviſis adſcendentibus. *Sp. pl.* 410.

T. paraſitica major, foliis attenuatis baſi ventricoſis, racemo laxo ſpatioſo aſſurgenti. *Brown. jam.* 194.

Renealmia ramoſiſſima, foliis variegatis et circinatis. *Plum. gen.* 27. *ic.* 237.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 306.

Riſpenblütige Tillandſie. W.

*Habitat in* America *meridionali.*

*8. TILLANDSIA *faſciculata.*

T. ſpicis lateralibus diſtichis imbricatis, foliis lanceolato-ſubulatis erectis ſtrictis. *Swartz. prod.* 56. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 586. *

T. (*clavata* foliis radicalibus longis acutis integerrimis, caule ſimplici, ſpica ovata conica, ſquamis imbricatis et coarctatis compacta. *Lamarck. encyclop.* 1. *p.* 610? W.

Büſchlichte Tillandſie. W.

*Habitat in maritimis* Jamaicae, *arboribus adhaerens.* 4

*Diſtincta a T. polyſtachya, quae dignoſcitus*: ſpicis *ſparſis, nec diſtichis, anguſtioribus*, foliis *reclinatis.* Swartz, l. c.

*9. TILLANDSIA *nutans.*

T. ſpicis ſubdiviſis nutantibus, floribus diſtinctis ovatis, foliis ovato-lanceolatis membranaceis, caule ſubnudo. *Swartz. prod.* 56. *Fl ind. occid.* 1. *p.* 588.*

Hängende Tillandſie. W.

*Habitat in montoſis* Jamaicae *ad arborum ramos.* 4

10. TILLANDSIA *polyſtachya.*

T. culmo ſpicis imbricatis lateralibus. *Sp. pl.* 410.

Viſcum caryphylloides anguſtifolium, floribus caeruleis. *Catesb. car.* 2. *p.* 89. *t.* 89.?

Renealmia ſpica multiplici, flore albo. *Plum. gen* 37.

β. Renealmia, ſpica multiplici, alia anguſtifolia. *Plum. gen.* 37.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 306.

Vielährige Tillandſie. W.

*Habitat in* America *calidiore.*

11. TILLANDSIA *monoſtachya.*

T. foliis linearibus canaliculatis reclinatis, culmo ſimplici imbricato, ſpica ſimplici. *Sp. pl.* 410.

T. parasitica, foliis majoribus obtusis, spica assurgenti divisa squamosa. *Brown. jam.* 194.
Renealmia non ramosa squamata; et floribus niveis. *Plum. gen.* 37. *ic.* 238. *f.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 307.
Einfachährige Tilandsie. W.
*Habitat in* America *meridionali.*

*12. TILLANDSIA *pruinosa.*
T. spica simplici, spathis imbricatis, foliis lanceolato-linearibus reclinatis, spathisque squamuloso-tomentosis. *Swartz. fl. ind. occid.* 1. *p.* 594.*
Bereifte Tillandsie. W.
*Habitat in arborum ramis vetustis* Jamaicae. 4
*Non confundenda cum T. recurvata, quae* foliis *linear-subulatis,* pedunculis *radicalibus et* spathis *bifloris diversa.* Swartz. l. c.

*13. TILLANDSIA *canescens.*
T. spicis subternis, foliis linearibus erectis caulem aequantibus incanis. *Swartz. prod.* 57. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 595.*
Graue Tillandsie. W.
*Habitat ad maris littora* Jamaicae *in arboribus.* 4
*Diversa a T. polystachya, cui proxima, quae vero differt:* caule *altiore,* foliis *reclinatis flexuosis glabris,* spicis *pluribus lanceolatis sparsis.* Swartz. l. c.

*14. TILLANDSIA *angustifolia.*
T. spicis fasciculatis, foliis linear-lanceolatis suberectis glabris caulem superantibus. *Swartz. prod.* 57. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 596. *
Engblättrige Tillandsie. W.
*Habitat in* Jamaicae *et* Hispaniolae *truncis et ramis arborum.* 4
*Probe distinguenda a T. polystachya:* foliis *caule longioribus erectioribus,* spicis *vaginis foliaceis interstinctis.* Swartz. l. c.

*15. TILLANDSIA *recurvata.*
T. foliis subulatis scabris reclinatis, culmis unifloris, gluma biflora. *Roy. lugdb.* 25. *Swartz. obs.* 121.*
T. parasitica parva pruinosa, scapo tenui bifloro. *Brown. jam.* 194.
Viscum caryophylloides minus, foliis pruinae instar candicantibus, flore tripetalo purpureo, semine filamen-

toso. *Sloan. jam.* 77. *hist.* 1. *p.* 190. *t.* 121. *f.* 1. *Ray. suppl.* 406.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 307.
Krummblättrige Tillandsie. W.
*Habitat in* Jamaicae *arboribus semimortuis.*

16. TILLANDSIA *usneoides.*
T. filiformis ramosa intorta scabra. *Hort. cliff.* 129. *Gron. virg.* 36. *Barr. aequin.* 99. *Roy. lugdb.* 25.
Renealmia parasitica, caule filiformi ramoso geniculato longissimo, foliis subulatis. *Brown. jam.* 192.
Viscum caryophylloides tenuissimum e ramis arborum musci in modum dependens, foliis pruinae instar candicantibus, flore tripetalo, semine filamentoso. *Sloan. jam.* 77. *hist.* 1. *p.* 191. *t.* 122. *f.* 2. 3. *Raj. suppl.* 406.
Cuscuta, ramis arborum innascens, caroliniana, filamentis lanugine tectis. *Pluk. alm.* 126. *t.* 26. *f.* 5
Camanbaya. *Marcgr. bras.* 46. *Pet. gaz. t.* 62. *f.* 12.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 308.
Fadenförmige Tillandsie. W.
*Habitat in* Virginiae, Jamaicae, Brasiliae *arboribus.* (v. f.)
Renealmiae *Plumieri solo fructu, eoque minus diverso, differunt ab ejusdem Caraguatis, consultius visum haec dua genera combinare, quam difficile et tamen ambigue distinguere.*

## *605. XEROPHYTA.

*Jussieu. Gen. ed. Usteri. p.* 57.

*Cor.* 6-partita aequalis, tribus laciniis exterioribus angustioribus. *Stigm.* clavatum. *Caps.* infera 3-locularis polysperma.

*1. XEROPHYTA *pinifolia.*
Xerophyta. *Lamarck. encyclop. t.* 225.
Fichtenblättriger Dürrbusch. W.
*Habitat in* Madagascar. ♄
Fruticulus *ramis alternis, rudimentis foliorum praeteriti anni tectis.* Folia *alterna lineari-lanceolata acuminata sessilia.* Flores *in ramulis terminales.* Pedunculi *uni-bi-vel triflori.* W.

## 606. BURMANNIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 542.

*Cal.* prismaticus, coloratus, 3-fidus: angulis membranaceis. *Petala* 3. *Capf.* 3-locularis, recta. *Sem.* minuta.

1. BURMANNIA *disticha.*

B. spica gemina. *Burm. zeyl.* 50. *t.* 20. *f.* 1. *Fl. zeyl.* 128. *Mill. dict. n.* 1.

B. spica duplici. *Hort. cliff.* 128. *Roy. lugdb.* 125.

Planta zeylanica aquatica, lato et brevi gramineo folio. *Raj. suppl.* 559.

*Houttuyn Lin. Pfl.* Syst. 6. *p.* 309.

Gabelährige Burmannie. W.

*Habitat in* Zeylonae *paludosis.* 4 (v. s.)

2. BURMANNIA *biflora.*

B. flore gemino. *Mill. dict. n.* 2.

B. flore duplici. *Hort. cliff.* 128.

B. scapo bifloro. *Gron. virg.* 36.

*Houttuyn Lin. Pfl.* Syst. 6. *p.* 310.

Zweyblütige Burmannie. W.

*Habitat in* Virginiae *paludosis.*

## 607. TRADESCANTIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 543.

*Cal.* 3-phyllus. *Petala* 3. *Filamenta* villis articulatis. *Capf.* 3-locularis.

1. TRADESCANTIA *virginica.*

T. erecta, foliis lanceolatis glabris, floribus umbellato-congestis terminalibus. W.

T. erecta laevis, floribus congestis. *Mill. dict. Kniph. cent.* 6. *n.* 96.

Tradescantia. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upsal.* 73. *Gron. virg.* 36. *Roy. lugdb.* 37.

Ephemerum phalangoides tripetalum non repens virginianum gramineum. *Morif. hist.* 3. *p.* 606. *f.* 15. *t.* 2. *f.* 4.

Allium s. Moly virginianum. *Bauh. pin.* 506.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 311.

Virginische Tradescantie. W.

*Habitat in* Virginia. 4 (v. v.)

*2. TRADESCANTIA *crassifolia.*

T. erecta, foliis ovatis margine et subtus lanatis, floribus umbellato-congestis terminalibus. W.

T. (*crassifolia*) foliis ovato-acutis concavis crassis, limbo lanato. *Cavan. ic.* 1. *p.* 54. *t.* 75.*

Dickblättrige Tradescantie. W.

*Habitat in* Mexico. 4

Caulis *lanatus, ramosus.* Folia *crassa ovata acuta basi cucullata vel brevissime vaginantia nervosa, supernе glabra, subtus margineque lanata.* Flores *maximi hujus generis.* W.

*3. TRADESCANTIA *erecta.*

T. erecta, foliis ovatis basi angustatis glabris, pedunculo terminali nudo bifido racemoso. W.

T. (*erecta*) caule herbaceo erecto ramoso, floribus racemoso-umbellatis terminalibus. *Cavan. ic.* 1. *p.* 53. *t.* 74.*

T. (*erecta*) caule erecto, pedunculis terminalibus bifidis racemosis longis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 354. *Collect.* 4. *p.* 114.*

T. (*undulata*) erecta laevis, foliis ovatis undulatis, floribus subracemosis. *Vahl. Act. Soc. Hist. Nat. Haf.* 2. *P.* 2. *p.* 27. *t.* 3.*

Tradescantia bifida. *Rotb. catal. bot.* 1. *p.* 42.*

Aufrechte Tradescantie. W.

*Habitat in* Mexico. ⊙ (v. v.)

4. TRADESCANTIA *Zanonia.*

T. erecta, foliis lato-lanceolatis, pedunculis lateralibus solitariis medio geniculatis multifloris, bracteis geminis. *Swartz. prod.* 57. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 604.*

Commelina (*Zanonia*) corollis aequalibus, pedunculis incrassatis, foliis lanceolatis, vaginis laxis margine hirsutis, bracteis geminis. *Sp. pl.* 61.

Commelina erecta major simplex, floribus conglomeratis pedunculo longiori insidentibus. *Brown. jam.* 125. *n.* 1.

Zanonia graminea perfoliata. *Plum. gen.* 38.

Periclymenum rectum herbaceum gentianae folio, foliis pediculo caulem ambiente. *Sloan. jam.* 115. *hist.* 1. *p.* 243. *t.* 147. *f.* 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 123.

Scheidenblütige Tradescantie. W.

*Habitat in nemoribus montium* Jamaicae *australioris, inque* Gujana. 4 (v. s.)

Foliorum *vaginae latiſſimae et a caule diſtantes, margine hirſutae.* Bracteae *duae lanceolatae oppoſitae.*

*5. TRADESCANTIA *diſcolor.*

T. acaulis laevis, bracteis equitantibus compreſſis, foliis lanceolatis ſubtus coloratis. *Smith. icon. pict. p.* 10. *t.* 10.* *Swartz fl. ind. occid.* 1. *p.* 607 *

T. (*diſcolor*) ſpatha triphylla compreſſa, floribus ſubexſertis, foliis lanceolatis ſubtus violaceis. *l'Herit. ſert. angl. p.* 8. *t.* 12.

T. (*diſcolor*) acaulis laevis, foliis oblongo-lanceolatis canaliculatis carnoſis diſcoloribus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 403.

T. (*ſpathacea*) acaulis foliis ſeſſilibus, ſcapis radicalibus. *Swartz. prod.* 57.

Violettblättrige Tradeſcantie. W.

*Habitat in* America *meridionali, in regionibus ſinu* Mexicano *proximis.* 4 (v. v.)

6. TRADESCANTIA *malabarica.*

T. erecta laevis, pedunculis ſolitariis longiſſimis. *Sp. pl.* 412.

Ephemerum tripetalum non repens malabaricum, porraceis foliis, purpureo-coeruleum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 606?

Ephemeri ſ. Phalangii virginiani ſpecies, floribus ſparſis. *Rai. ſuppl.* 564?

Tali-pulli *Rheed. mal.* 9. *p.* 123. *t.* 63.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 312.

Malabariſche Tradeſcantie. W.

*Habitat in* Malabaria. 4 (v. ſ.)

7. TRADESCANTIA *nervoſa.*

T. ſcapo unifloro. *Mant.* 223.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 312.

Nervenblättrige Tradeſcantie. W.

*Habitat in* Suratte? *D Mutis.* 4

Caules *palmares, diffuſi.* Folia *lanceolata, vaginantia, brevia ſ. pollicaria, conferta.* Pedunculus *terminalis, filiformis, longus, ſubumbiflorus.* Bractea *obſoleta, a flore remota.* Flos *magnus.* Calyx 3-*phyllus, lanceolatus, ſcarioſus,* 5-*nervis, corolla brevior.* Petala 3, *ovata, lata, multinervia.* Stamina 6, *pilis violaceis.* Stylus *apice hamoſus.*

*8. TRADESCANTIA *divaricata.*

T. caule dichotomo, foliis ovato-lanceolatis glabris, va-

ginis villosis, floribus paniculatis, filamentis glabris. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 34.*
Commelina (*hexandra*) floribus racemosis coeruleis. *Aubl. gujan.* 1. *p.* 35. *t.* 12.*
Sparrige Tradescantie. W.
*Habitat ad fluviorum ripas* Gujanae, Cajennae, *inque insula* Trinitatis.
*In hac et in speciebus* 10. 11. 12. Filamenta *sunt glabra.* W.

9. TRADESCANTIA *geniculata.*
T. procumbens hirsuta. *Sp. pl.* 412.
T. caule paniculato, basi repente. *Iacq. amer.* 94. *t.* 64.
Ranunculus s. Damasonium repens, parnassiae foliis villosis. *Plum. ic.* 116. *f.* 2.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 312.
Gegliederte Tradescantie. W.
*Habitat in* America *meridionali.* 4

*10. TRADESCANTIA *monandra.*
T. diffusa, foliis ovatis acuminatis, pedunculis axillaribus multifloris, floribus monandris. *Swartz. prod.* 57. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 597.*
Einfädige Tradescantie. W.
*Habitat in nemoribus montium* Hispaniolae *occidentalis.* ⊙ (v. s.)

*11. TRADESCANTIA *multiflora.*
T. erecta ramosa, foliis cordatis margine vaginisque ciliatis, pedunculis confertis axillaribus, floribus triandris. *Swartz. prod.* 57. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 599.*
Vielblütige Tradescantie. W.
*Habitat in umbrosis sylvaticis montium* Jamaicae.

*12. TRADESCANTIA *cordifolia.*
T. repens filiformis, foliis cordatis, pedunculis terminalibus solitariis multifloris. *Swartz. prod.* 57. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 601.*
Herzblättrige Tradescantie. W.
*Habitat in montibus altis* Jamaicae, *locis umbrosis graminosis humidis.* ⊙

*13. TRADESCANTIA *procumbens.*
T. caule procumbente radicante, foliis ovatis basi ciliatis vaginatis, pedunculis cymosis axillaribus, staminibus inaequalibus. W.
T. (*multiflora*) caule repente glabro, ramis erectis, foliis glabris ad oras ciliatis, pedunculis congestis, floribus

umbellatis. *Iacq. ic. 2. t. 355. Collect. 3. p. 226.** (*excluso ſynonymo.*)
Liegende Tradeſcantie. W.
*Habitat ad* Caracas. 4 (v. ſ.)

*Videtur a T. multiflora diſtincta*: caule *procumbente*, floribus *hexandris*, ſtaminibus *inaequalibus, tribus longioribus barbatis*. W.

14. TRADESCANTIA *axillaris.*
T. caule ramoſo, floribus ſeſſilibus lateralibus. *Syſt. Veg.* 260.
Commelina (*axillaris*) corollis aequalibus, floribus ſeſſilibus, foliis linearibus. *Sp. pl. 2. p. 62.*
Ephemerum phalangoides maderaſpatanum minimum, ſecundum caulem quaſi ex utriculis floridum. *Pluk. alm.* 135. *t.* 174. *f.* 3.
Ephemerum malabaricum, flore tripetalo in foliorum alis ſeſſili. *Rai. ſuppl.* 567.
Nir-pulli. *Rheed. mal.* 10. *p.* 28. *t.* 13.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 313.
Winkelblütige Tradeſcantie. W.
*Habitat in* India. ⊙

Caulis *baſi repens, adſcendens, ramoſus.* Folia *linearia, acuta, patentia, vaginis coloratis longius ciliatis.* Flores *axillares, ſeſſiles, ſolitarii.* Calyx 3-*partitus, carinatus apicibus ciliatis: lacinia tertia planiuſcula.* Corolla 1-*petala, infundibuliformis.* Tubus *calyce duplo longior.* Laciniae 3, *patentes, breviores, coeruleae.* Stamina 6, *pilis articulatis.* Stylus *clavatus.* *König.*

15. TRADESCANTIA *formoſa.*
T. foliis oppoſitis connatis. *Linn. ſuppl.* 192.
T. (*nodiflora*) caule ſimplici flexuoſo, foliis breviſſimis margine et vagina villoſis, floribus axillaribus ſeſſilibus glomeratis. *Lamarck. encyclop.* 2. *p.* 367. *
Commelina (*ſpecioſa*) caule flexuoſo erecto, foliis amplexicaulibus lanceolatis, floribus glomeratis axillaribus. *Thunb. prod.* 59.
Schöne Tradeſcantie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

Caulis *bipedalis laevis, ſub geniculis lanatus.* Verticilli *florum plures remoti.* Folia *ſub verticillis oppoſita enſiformi-lanceolata, margine parum lanata, baſi connata.* Petala *ſex*; exteriora 3 *lanceolata rigidiora*;

interiora 3 *teneriora.* Filamenta *ſex ſuperne lanata, longitudine corollae.* Antherae *erectae.* Germen *ſuperum triquetrum.* Stylus *apice barbatus longitudine corollae.* Stigma *oblongum triquetrum.*

16. TRADESCANTIA *criſtata.*

T. repens laevis, ſpathis diphyllis imbricatis. *Iacq. Hort. t.* 137.

Commelina (*criſtata*) corollis aequalibus, involucris ſpicatim imbricatis. *Sp. pl.* 2. *p.* 62. *Fl. zeyl.* 32.

Ephemerum zeylanicum procumbens inflatum. *Herm. parad.* 148. *Raj. hiſt.* 566.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 314.

Kammförmige Tradeſcantie. W.

*Habitat in* Zeylona. ⊙ (v. v.)

Radix *annua.* Caules *teretes, laeves, ramoſi, diffuſi, repentes.* Folia *lanceolatá, recurvata, laevia, baſi vaginantia vaginis ſtriatis.* Spathae *imbricatae, diphyllae, biflorae floribus ſeſſilibus, lunatae, ſex parium, ſecundae.* Calyx *corolla brevior.* Petala 3, *ovata, ſeſſilia, coerulea.* Filamenta *piloſa extus, pilis coeruleis articulatis.* Stylus *clavatus.* Stigma *tubuloſum, crenatum.*

17. TRADESCANTIA *papilionacea.*

T. repens laevis, ſpathis triphyllis imbricatis. *Mant* 61. 513. *Burm. ind.* 17. *t.* 7. *f.* 1. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 27. Tillandſia *decumbens*) foliis ovato-lanceolatis. *Forſk. deſcr.* 72. *n.* 25. *β*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 315.

Schmetterlingsförmige Tradeſcantie. W.

*Habitat in* India. ⊙ *Burmann.* (v. ſ.)

Radix *fibroſa.* Caules *tripollicares, articulati, ad genicula radicantes.* Folia *lineari-lanceolata, ſubtus piloſa, erecta, ſeſſilia, baſi ſubciliata: Vagina latiuſcula, breviſſima.* Spatha *terminalis, cordata, deorſum complicata, margine ſubciliata; ſub hac* Foliola 2, *lanceolato-lunata, ſuperiori breviore; inter quae flos; carinae loco, inter praedicta* 2 *foliola alia proditura Spatha, etiammum brevis, cum ſuis foliolis nondum conſpicuis; ſic refert Spatha florem papilionaceum.* Corolla *violacea (non coerulea).* Filamenta 6, *pilis articulatis apice globiferis, coerulea, apice longiora.* Caulis *viridis, nec rufeſcens: Ceterum ſimillima* Tr. criſtatae, *ut qui velit pro varietate habere poterit, ſed*

Tr. papilionacea *habet Stamina corollis longiora, quod non in* T. criſtata.

## *608. MNASIUM.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 544.

*Spatha* 2-valvis multiflora. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 1-petala, tubo breviſſimo, tridentata. *Antherae* foliolo terminatae. *Stigmata* 3 ſpiraliter contorta.

### *1. MNASIUM *paludoſum.*

Rapatea paludoſa. *Aubl. guj. i. p.* 305. *t.* 118.*

Sumpf-Spathelkraut. W.

*Habitat in ſylvis paludoſis* Gujanae. 4

Planta *habitu Pontederiis proxima ſed floris ſtructura aliena.* Folia *bipedalia, radicalia, lanceolata, infra medium anguſtata, baſi dilatata.* Scapi *radicales ſuperne incraſſati.* Spatha *bivalvi multiflora floribus longiore terminati.* Calyx *ſquamis imbricatis ſuffultus.* Corolla *flava.* W.

## 609. PONTEDERIA.

*Gen. pl. edit. Schreb. n.* 545.

*Cor.* 1-petala, 6-fida, bilabiata. *Stamina* 3, apici ſ. tubo corollae inſerta. *Capſ.* 3-locularis.

### 1. PONTEDERIA *rotundifolia.*

P. foliis orbiculato-cordatis. *Linn. ſuppl.* 192.

Rundblättrige Pontedere. W.

*Habitat in* Surinamo. *C. G. Dalberg.*

Folia *radicalia, petiolata, orbiculato-cordata ſ. reniformia obtuſa avenia.* Folium *caulinum unicum ex cujus petioli vagina exit pedunculus ſemiteres digitalis.* Spatha *monophylla ovata perſiſtens terminalis.* Spadix *hiſpidus.* Spica *pedunculata ovata, floribus pedicellatis, breviſſima, fere imbricata in capitulum.* Corolla *ſexfida inaequalis, facie et magnitudine floris neutri Centaureae cyani.* Stamina *ſex.* Germen *ſuperum triquetrum.* Stylus *ſimplex.*

### *2. PONTEDERIA *azurea.*

P. foliis ſubrotundo-ellipticis, baſi petiolisque incraſſa-

tis, floribus ſpicatis. *Swartz. prod. p.* 57. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 609. *

P. aquatica cauleſcens, foliis majoribus orbiculatis. *Brown. jam.* 195.

Himmelblaue Pontederie W.

*Habitat in foſſis* Jamaicae. 2

3. PONTEDERIA *vaginalis.*

P. foliis cordatis, racemo cernuo. *Burm. ind.* 80.

Plantaginis ſtellatae foliis, florum ſpica ex utriculo caulis erumpente. *Pluk. alm.* 215. *t.* 215. *f.* 4.

Olus paluſtre. *Rumph. amb.* 6 *p.* 178. *t.* 75. *f.* 1.

Caringola. *Rheed. mal.* 11. *p.* 91. *t.* 44.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 316.

Scheidenblütige Pontederie. W.

*Habitat in* Indiae *orientalis aquoſis.* 2 (v. ſ.)

Folia *radicalia, cordata, acuminata, nervoſa, laevia, petiolata*: Petioli *longiſſimi, ſupra medium parum dilatati ſ. vaginantes rima laterali.* Racemus *lateralis, ſimplex, folio brevior, e vagina petioli, erectus, abſoluta floreſcentia reflexus*: Flores 4 *ſ.* 5, *alterni, breviter pedicellati* Petala 6. *Stamina* 6. Stylus *clavatus.* Germen *certe ſuperum.*

*4. PONTEDERIA *limoſa.*

P. foliis cordato-ovatis, ſcapis lateralibus unifloris, floribus triandris. *Swartz. prod.* 57. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 611. *

Nymphaeae affinis planta paluſtris aquatica, flore hexapetalo ſtellato coeruleo. *Sloan. jam. hiſt.* 1. *t.* 149. *f.* 1.

Schlamm-Pontederie. W.

*Habitat ad ripas limoſas fluviorum* Jamaicae, Hiſpaniolae. 2 (v. ſ.)

5. PONTEDERIA *cordata.*

P. foliis cordatis, floribus ſpicatis. *Loeſl. it.* 54. * *Mill. dict. n.* 1.

P. floribus ſpicatis. *Hort. cliff.* 133. *Gron. virg.* 37. *Roy. lugdb.* 37. *Cold. noveb.* 69.

Gladiolus lacuſtris virginianus coeruleus, ſagittae folio. *Pet. gaz.* 1. *t.* 1. *f.* 12.

Sagittae ſimilis planta paluſtris virginiana, ſpica florum caerulea. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 618. *ſ.* 15. *t.* 4. *f.* 8.

Plantagini aquaticae quodammodo accedens, floribus coeruleis hyacinthi ſpicatis. *Pluk. mant.* 152. *t.* 349. *f. ult.*

*Houttuyn Linn. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 317.
Herzblättrige Pontedere. W.
*Habitat in* Virginiae *aquoſis.* 24 (v. ſ.)

6. PONTEDERIA *haſtata.*

P. foliis haſtatis, floribus umbellatis. *Sp. pl.* 412. *Lin. ſuppl.* 192.*

P. floribus umbellatis. *Fl. zeyl.* 129. *Mill. dict. n.* 2. Sagittae quodammodo ſimilis planta maderaſpatana, floribus medio caule quaſi ex utriculo prodeuntibus. *Pluk. alm.* 326. *t.* 220. *f.* 8. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 618. *ſ.* 15. *t.* 4. *f.* 7.

*Houttuyn Lin. Pfl.* Syſt. 6. *p.* 318.
Spontonblättrige Pontedere. W.
*Habitat in* India. 24 (v. ſ.)

*Huic* Germen *ſuperum, ovatum.* Corolla *ſexpartita, aequalis.*

Corolla *hexapetala.* Filamenta *ſex, omnia baſi corollae inſerta, quorum unum calcaratum.* Antherae *luteae, una in filamento calcarato, reliquis major, coerulea.* Germen *ſuperum. Hanc obſervationem fecit amiciſſimus* Klein *in India orientali. In ſpecimine meo video eandem ſtructuram et ſtylum unicum, longitudine antherae majoris et ſtigma obtuſum.* Linnaeus *filius perperam in ſupplemento l. c.* Stylos *tres breves indicavit, quos non obſervavi.* W.

*Poſſideo varietatem e Java,* foliis *ſagittatis obtuſis.* W.

## 610. HAEMANTHUS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 546.

*Involucr.* polyphyllum, multiflorum. *Cor.* 6-partita, ſupera. *Bacca* 3-locularis.

1. HAEMANTHUS *coccineus.*

H. foliis linguiformibus planis laevibus humi adſpreſſis bifariis, umbella coarctata faſtigiata involucro breviori, limbo patulo. *Ait. Kew.* 1. *p.* 403.

H. foliis linguiformibus planis laevibus. *Roy. lugdb.* 42. *Mill. dict. n.* 1.

H. foliis ſeſſilibus linguiformibus decumbentibus glabris. *Thunb. prod.* 59.

H. foliis obtuſis baſi truncatis. *Comm. hort.* 2. *p.* 127. *t.* 64.

Narciſſus indicus puniceus. *Ferr. cult.* 137.
Narciſſus indicus ſerpentarius. *Herm. mex.* 885. *t.* 899.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 131.
Scharlachfarbige Blutblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24 (v. v.)

*2. HAEMANTHUS *coarctatus.*

H. foliis linguiformi-oblongis planis laevibus apice callolis erectis, umbella coarctata faſtigiata involucro breviori, limbo erecto. W.
H. (*coarctatus*) foliis lanceolatis glabris immaculatis, umbella coarctato-oblonga. *Iacq. hort. Schönb.* 1. *p.* 30. *t.* 57.
Gedrängtblütige Blutblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

3. HAEMANTHUS *puniceus.*

H. foliis oblongis ellipticis acutis retuſis undulatis, umbella coarctata faſtigiata, limbo ſtaminibusque erectis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 404.
H. foliis lanceolato-ovatis undulatis erectis. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upſ.* 88. *Roy. lugdb.* 42. *Mill. dict. n.* 3.
H. foliis petiolatis oblongis erectis undulatis glabris. *Thunb. prod.* 59.
H. colchici foliis, perianthio herbaceo. *Dill. elth.* 167. *t.* 140. *f.* 2. *Trew. ehret.* 44.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 134.
Dunkelrothe Blutblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24 (v. v.)

*4. HAEMANTHUS *multiflorus.*

H. foliis elliptico-lanceolatis acutis concavis erectis, umbella multiflora involucro longiore, pedunculis articulatis, limbo patulo, ſtaminibus adſcendentibus. W.
Haemanthus multiflorus. *Martyn. monograph.*
Hyacintho affinis africana, caule maculato. *Seba. muſ.* 1. *p.* 20 *t.* 12. *f.* 1. 2. 3.
Satyrium e Guinea. *Swert. floril.* 1. *p.* 62. *f.* 3. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 491. *ſ.* 12. *t.* 12. *f.* 11. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 210. *f.* 3.
Vielblütige Blutblume. W.
*Habitat in* Sierra Leone. 24

*5. HAEMANTHUS *tigrinus.*

H. foliis linguiformibus planis glabris margine ciliatis depreſſis, umbella coarctata, limbo, ſtaminibusque erectis. W.

H. (*tigrinus*) foliis oblongis ciliatis ſubtus maculatis, ſcapo maculato, umbella coarctata. *Jacq. hort. Schönb.* 1. *p.* 29. *t.* 56.
Getiegerte Blutblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

*6. HAEMANTHUS *quadrivalvis.*
H. foliis oblongis baſi anguſtatis planis patulis ſuperne villoſis, margine ciliatis, involucro tetraphyllo umbella coarctata longiore, limbo ſtaminibusque erectis. W.
H. (*quadrivalvis*) foliis ſublanceolatis ciliatis ſupra villoſis ſubtus glabris, involucro campanulato quadrivalvi. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 30. *t.* 58.
Vierblättrige Blutblume. W.
*Habitat ad* Cap b. ſpei. 4
Folia *ſuperne apicem verſus albo-villoſa, margine ciliata.* W.

7. HAEMANTHUS *pubeſcens.*
H. foliis oblongo-lanceolatis, undique hirſutis, umbella faſtigiato-rotundata, limbo ſtaminibusque erectis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 404.
H. foliis linguiformibus villoſis. *Linn. ſuppl.* 193.
H. foliis linguiformibus piloſis. *Thunb. prod.* 59.
Behaarte Blutblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

*8. HAEMANTHUS *ciliaris.*
H. foliis lanceolatis glabris ciliatis, involucro lato umbella rotundata breviore, limbo reflexo. *Ait. Kew.* 1. *p.* 404.
H. foliis linguiformibus ciliatis. *Sp. pl.* 413.
H. foliis oblongis ciliatis, corollae laciniis reflexis. *Thunb. prod* 59.
Amaryllis (*ciliaris*) ſpatha multiflora, corolla ſexpartita reflexa, foliis ciliatis. *Linn. ſuppl.* 195.
Amaryllis (*ciliaris*) ſpatha multiflora, foliis ciliatis. *Sp. pl.* 422.
Amaryllis guttata. *Syſt. Veg. ed.* 13. *p.* 265.
Lilium africanum ſphaericum, floribus obſolete puniceis minoribus. *Herm. lugdb.* 357.
Bulbus oblongus aethiopicus, foliis guttatis et cilii inſtar piloſis. *Breyn. cent. t.* 39.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 133. 192.
Gefranzte Blutblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

*Variat figura foliorum, latitudine et longitudine, etiam ciliorum colore.*

*9. HAEMANTHUS *albiflos.*

H. foliis ellipticis acutiusculis planis glabris margine ciliatis, involucro tetraphyllo umbella rotundata breviore, limbo patulo. W.

H. (*albiflos*) foliis lanceolatis ciliatis, scapo hirsuto declinato. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 31. *t.* 59. *

Weisse Blutblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

10. HAEMANTHUS *toxicarius.*

H. foliis bifariis oblongis planiusculis glabris, pedunculis spatha floreque longioribus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 405.

H. foliis ensiformibus obliquis, limbi laciniis lanceolatis. *Thunb. prod* 59.

Amaryllis (*disticha*) spatha multiflora, corollis aequalibus campanulatis, foliis distichis incumbenti-patentibus. *Linn. suppl.* 195. *Patters. itin. ed. germ.* 48. *t.* 1.

Giftige Blutblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. *in regione* Rogge-Veld. 4

Flores *incarnati.*

*11. HAEMANTHUS *lanceaefolius.*

H. foliis ellipticis basi attenuatis depressis planis glabris, margine ciliatis, pedunculis spatha floreque longioribus, limbo patente. W.

H. (*lanceaefolius*) foliis longe lanceolatis retrorsum ciliatis, scapo glabro, umbella fastigiata involucro duplo longiore. *Jacq. hort. Schönb.* 1. *p.* 31. *t.* 60 *

Lanzenblättrige Blutblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

12. HAEMANTHUS *carinatus.*

H. foliis linearibus carinatis. *Mill. dict. n.* 2. †

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 135.

Kielförmige Blutblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

*13. HAEMANTHUS *pumilio.*

H. foliis lineari-lanceolatis erectis glabris, pedunculis spatharum florumque longitudine, limbo patenti. W.

H. (*pumilio*) foliis lineari-lanceolatis glabris falcatis, umbella pauciflora. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 32. *t.* 61. *

Kleine Blutblume. W.

*Habitat ad* Cap. b ſpei. 2.

*14. HAEMANTHUS *ſpiralis.*

H. foliis ſetaceis, ſcapo filiformi baſi ſpirali flexuoſo, involucris ſubulatis umbella uni-quadriflora brevioribus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 405.

H. ſcapo filiformi ſpirali, foliis filiformibus. *Thunb. prod.* 58.

Crinum (*tenellum*) ſpatha multiflora, ſcapo inferne ſpirali, foliis filiformibus. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 363. *Collect. ſuppl. p.* 43. *

Fadenblättrige Blutblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2.

## 611. MASSONIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 552.

*Cor.* infera limbo 6-partito. *Filamenta* collo tubi impoſita. *Capſula* 3-alata 3-locularis polyſperma.

1. MASSONIA *latifolia.*

M. foliis ſubrotundis patentibus, laciniis corollae patulis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 405. *t.* 3.

M. foliis orbiculatis glabris. *Linn. ſuppl.* 193.

M. foliis rotundato-ovatis glabris. *Thunb. prod.* 60. *Diſſ. Nov. pl gen.* 2. *p.* 40. *

Breitblättrige Maſſonie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in regione* Rogge-Veld. 2.

Folia *radicalia bina laevia.* Flos *aggregatus exſcapus.* Fructus *non baccatus, ſed capſula membranacea, alius Haemanthus eſſet.*

2. MASSONIA *anguſtifolia.*

M. foliis oblongo-lanceolatis erectis, laciniis corollae reflexis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 405. *t.* 4.

M. foliis lanceolato-oblongis glabris. *Linn. ſuppl.* 193.

M. (*lanceolata*) foliis lanceolatis integris glabris. *Thunb. prod* 60. *Diſſ Nov. pl gen.* 2. *p.* 40. *

Schmalblättrige Maſſonie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in ſummo monte* onderſte Rogge-Veld. 2.

*3. MASSONIA *undulata.*

M. foliis lanceolatis undulatis glabris. *Thunb. prod.* 60. *Diſſ. Nov. pl. gen.* 2. *p.* 41. *

Wellenblättrige Maſſonie. W.
*Habitat in* Cap. b. ſpei *interioribus regionibus.* 2
Folia *radicalia* 3, 4 *vel* 5 *inferne valde anguſtata enſiformi-lanceolata undulata erecta glabra digitalia.* Scapus *erectus ſenſim incraſſatus glaber pollicaris.* Flores *terminales umbellati.* Pedunculi *breviſſimi uniflori.* Thunb. Diſſ. l. c.

4. MASSONIA *echinata*.

M. foliis ovatis muricatis piloſis. *Linn. ſuppl.* 193. *Thunb. prod.* 60. *Diſſ. Nov. pl. gen.* 2. *p.* 41.
Scharfblättrige Maſſonie. W.
*Habitat in* Cap. b. ſpei, *ad margines montis* Bocklands-Berg. 2
Folia *radicalia* 2 *ovata obtuſa cum acumine integra plana depreſſa tota ſupra tuberculis muricata piloſa, pilis ſparſis albis, pollicaria.* Scapus *nullus vel breviſſimus.* Flores *glomerati inter folia.* Thunb. Diſſ. l. c.

## 612. GALANTHUS.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 547.

*Petala* 3, concava. *Nectarium* ex petalis 3, parvis, emarginatis. *Stigma* ſimplex.

1. GALANTHUS *nivalis.*

Galanthus. *Hort. cliff.* 134. *Hort. upſ.* 73. *Roy. lugdb.* 35. *Mill. dict. Iacq. auſtr. t.* 330. *Knoph. cent.* 1. *n.* 34. *Knorr. del.* 1. *t.* S. 15. *n.* 2. *Roth. germ. I.* 144. *II.* 378. *Hoffm. germ.* 114.
G. uniflorus, petalis alternis cordatis. *Hall. helv. n.* 1254.
Leucojum bulboſum trifolium minus. *Bauh. pin.* 56. *Dod. cor.* 200.
Leucojum bulboſum praecox minus. *Cluſ. pann.* 181. 182.
Evangelia. *Reneal. ſpec.* 97. *t.* 96.
*Houttuyn Lin Pfl. Syſt.* 11. *p.* 136.
Gemeines Schneeglöckchen. W.
*Habitat ad radices Montium* Veronae, Tridenti, Germaniae, Carniolae, Viennae. 2 (v. v.)

## 613. LEUCOIUM.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 548.

*Cor.* campaniformis, 6-partita, apicibus incraſſata. *Stigma* ſimplex.

### 1. LEUCOIUM *vernum.*

L. ſpatha uniflora, ſtylo clavato. *Mill. dict. n.* 1. *Iacq. auſtr. t.* 312. *Knorr. del.* 1. *t. S.* 15. *n.* 1. *Roth. germ. I.* 144. *II.* 378. *Hoffm. germ.* 114.

Galanthus uniflorus, petalis ſubaequalibus. *Hall. helv. n.* 1253.

Leucojum. *Hort. cliff.* 135. *Hort. upſ.* 74. *Roy. lugdb.* 35.

L. bulboſum vulgare. *Bauh. pin.* 55. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 95. *f.* 1.

L. bulboſum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 169.

Narciſſus VII. Matthioli. *Camer. epit.* 957. R.

L. bulboſum hexaphyllon. *Dodon. coron. p.* 202. *hiſt.* 230. R.

*Houttuyn Lin. Pfl.* Syſt. 11. *p.* 138.

Frühlings Knotenblume. W.

*Habitat in* Germaniae, Helvetiae, Italiae *umbroſis pratis ad rivulos.* 24 (v. v.)

Culmus *raro biflorus.* R.

### 2. LEUCOIUM *aeſtivum.*

L. ſpatha multiflora, ſtylo clavato. *Mill. dict. n.* 2. *Iacq. auſtr. t.* 202. *Scop. carn. n.* 393. *Hoffm. germ.* 114.

L. bulboſum majus ſ. multiflorum. *Bauh. pin.* 55.

L. bulboſum ſerotinum majus. 1. *Cluſ. hiſt. p.* 170.

Polyanthemum. *Renealm. ſpec.* 99. *t.* 100.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 139.

Sommer Knotenblume. W.

*Habitat in* Pannonia, Hetruria, Monſpelii, Auſtria. 24 (v. v.)

*Folia hujus lata ut in L. verno, nec filiformia ut in L. autumnali.*

### 3. LEUCOIUM *autumnale.*

L. ſpatha multiflora, ſtylo filiformi. *Loefl. it.* 136. *Kniph. cent. n.* 39.

L. bulboſum autumnale. *Bauh. pin.* 56.

L. bulboſum autumnale tenuifolium. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 170.

Tricophyllum. *Reneal. ſpec.* 101. *t.* 100.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 139.
Herbſt Knotenblume. W.
*Habitat in* Luſitania. 4

## *614. STRUMARIA.

*Jacq. Collect. ſuppl.* 45.

*Cor.* hexapetala patens. *Styl.* infra medium incraſſatus ſ. cum filamentis cohaerens. *Stigma* 3-fidum. *Capſ.* infera ſubrotunda 3-locularis.

### * 1. STRUMARIA *linguaefolia.*

S. foliis lineari-enſiformibus rotundato-obtuſis planis, ſcapo tereti, ſuperne compreſſo, ſtaminibus longitudine corollae. W.

S. (*linguaefolia*) ſtyli ſtruma cum filamentis connata utrinque acuta, foliis linguaeformibus. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 356. *Collect. ſuppl.* 45.*

Zungenblättrige Kropflilie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4.

Spathae *binae pedunculis duplo breviores lanceolatae rubicundae.* Corolla *candida externe apicibus virescens.* Stylus *triſulcato-incraſſatus, ſulcis utrinque attenuatis.* Filamenta *baſi ſtyli adnata.* W.

### * 2. STRUMARIA *truncata.*

S. foliis lineari-enſiformibus rotundato-obtuſis planis, ſcapo compreſſo, ſtaminibus corolla longioribus. W.

S. (*truncata*) ſtyli ſtruma cum filamentis connata ſuperne truncata, foliis linguaeformibus. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 357. *Collect. ſuppl.* 47.*

Abgeſtutzte Kropflilie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Spathae *binae ovato-acuminatae pedunculis breviores rubicundae.* Corolla *candida externe baſi rubicunda.* Stylus *triſulcato-incraſſatus, ſulcis baſi attenuatis, ſuperne truncatis.* Filamenta *baſi ſtyli adnata. Simillima praecedenti, ſed* umbella *multiflora magis patula, pedunculis longioribus,* ſcapo, ſtylis, *longitudineque* ſtaminum *diſtincta.* W.

### * 3. STRUMARIA *rubella.*

S. foliis linearibus oblique flexis, petalis planis. W.

S. (*rubella*) ſtyli ſtruma cum filamentis connata utrinque

acuta, foliis linearibus obliquis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 358. *Collect. ſuppl.* 46.*

Röthliche Kropflilie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24.

Spathae *binae violaceae longitudine fere pedunculorum.* Flores *ſubnutantes.* Corolla *incarnata.* Stylus *triſulcato-incraſſatus utrinque attenuatus.* Filamenta *baſi ſtyli adnata.* W.

*4. STRUMARIA *undulata.*

S. foliis linearibus oblique flexis, petalis undulatis. W.

S. (*undulata*) ſtyli ſtruma a filamentis libera, petalis undulatis, foliis late linearibus ſubobliquis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 360. *Collect. ſuppl.* 50.*

Wellenförmige Kropflilie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

Spathae *binae ovato-acuminatae rubicundae pedunculis duplo breviores.* Corolla *alba apice rubicunda, petalis undulatis.* Stylus *triquetrus baſi incraſſatus.* Filamenta *non ſtylo adnata.* W.

*5. STRUMARIA *anguſtifolia.*

S. foliis linearibus planis, germine triglanduloſo. W.

S. (*anguſtifolia*) ſtyli ſtruma cum filamentis connata, glandulis tribus germini impoſitis, foliis linearibus. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 359. *Collect. ſuppl.* 48. *

Schmalblättrige Kropflilie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

Spathae *binae ovato-lanceolatae rubicundae pedunculis duplo breviores.* Bracteae *capillares ad pedunculorum baſin.* Stylus *triſulcato-alatus incraſſatus, ſulcis ſuperne truncatis et dentenotatis atque cum filamentis cohaerentibus.* Corolla *candida. petalis externe linea rubicunda notatis.* Glandulae 3 *ſupra germen.* W.

6. STRUMARIA *filifolia.*

S. foliis filiformibus, petalis acutis. W.

S. (*filifolia*) ſtyli ſtruma a filamentis libera, foliis filiformibus. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 361.

Leucoium (*ſtrumoſum*) ſpatha diphylla multiflora, floribus erectis, ſtylo baſi inflato globoſo. *Ait. Kew.* 1. *p.* 407. *t.* 5.

Leucoium (*ſtrumoſum*) ſpatha diphylla multiflora, ſtylo baſi inflato plicato, foliis lineari-filiformibus. *Thunb. prod.* 58. *Jacq. Collect.* 3. *p.* 222.*

Crinum (*tenellum*) ſpatha multiflora, corollis aequalibus foliis filiformibus. *Linn. ſuppl.* 194. (*excluſo ſynonymo.*)
Fadenblättrige Kropflilie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24 (v. ſ.)

Radix *bulboſa.* Folia *omnia radicalia, baſi vagina incluſa, filiformia, parum compreſſa, glabra, ſcapo longiora.* Umbella *terminalis pauciflora.* Pedunculi *filiformes glabri inaequales uniales et biunciales.* Spatha *univerſalis bivalvis, valvulae lanceolatae membranaceae, altera ſemiuncialis, altera ter brevior.* Spatha partialis *nulla.* Petala 6 *alba oblonga lanceolata patentia,* 3 *lineas longa; tria* interiora *obtuſiuſcula,* exteriora *acuta carinata, carinâ obtuſa viresceute.* Filamenta 6 *receptaculo inſerta ſubulata aequalia alba, petalis breviora.* Antherae *ſubrotundae parvae fuſcae.* Germen *inferum ſubgloboſum trigonum.* Stylus *baſi in corpuſculum germine majus, inferne plicatum, inflatus dein ſubulatus obtuſe trigonus longitudine ſtaminum.* Stigma *obſolete trifidum.* Capſula *ſubgloboſa glabra trigona, ſeu potius quaſi e tribus compoſita, trilocularis trivalvis.* Semina *plura.* Ait. l. c.

## 615. TULBAGIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 549.

*Cor.* infundibulif. *Limbo* 6-fido. *Nectarium* coronans faucem, 3-phyllum: foliolis bifidis magnitudine limbi. *Capſ.* ſupera.

1. TULBAGIA *alliacea.*

T. nectario monophyllo ſexdentato. *Ait. Kew.* 1. *p.* 408
T. nectario monophyllo, foliis enſiformibus, floribus cernuis. *Thunb. prod.* 60.
T. foliis ſubfiliformibus. *Linn. ſuppl.* 193.
Tulbagia capenſis. *Mant.* 223. *Jacq. hort.* 2. *p.* 52. *t.* 115.
Knoblauchartige Tulbaghie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei, florens Auguſto. 24

*Dixi a Generoſiſſimo Dno.* Tulbagh, *Capit. b. Sp. Gubernatore, qui facile omnes plantas capenſes miſit ad Burmannos.*

Statura *Galanthi.* Radix *bulboſa fibris plurimis, craſſis, ſubfuſiformibus.* Folia *radicalia, plurima, linearia,*

*laevia.* Scapus *foliis duplo longior.* Spatha *floribus* 5-7. Corolla *viridis, facie Hyacinthi orientalis*: Limbo *parvo acuto.* Nectarium *atro-purpureum, longitudine limbi.* Mant.

Radix *bulbosa.* Folia *radicalia plurima linearia subsi-liformia, subcarnosa.* Scapus *pedalis.* Spatha *umbelli-fera bivalvis.* Flores *cernui fusco-purpurei.* Corolla *monopetala tubulosa, basi gibba.* Limbus 6-*partitus, laciniis linearibus obtusis patulis longitudine tubi.* Nectarium *ori tubi impositum,* 6-*dentatum obsoletius obtusum crassum longitudine limbi.* Filamenta *nulla.* Antherae 6, *sessiles ovatae didymae, superiores* 3 *alternae, sub apice nectarii, inferiores* 3 *in nectario, infra superiores.* Germen *superum.* Stylus *brevis.* Stigma *simplex obtusum.* Capsula *ovata triangularis obtusa triocularis trivalvis.* Semina *plura compressa subtri-angularia.* Folia *trita s. digitis fracta odorem allia-ceum foetidum spirant, ut etiam T. cepaceae.* Suppl. l. c.

2. TULBAGIA *cepacea.*

T. nectario triphyllo. W.

T. nectario triphyllo, foliis linearibus, floribus erectis. *Thunb. prod.* 60.

T. foliis lanceolato-linearibus. *Linn. suppl.* 194. (*exclusis synonymis.*)

Zwiebelartige Tulbaghie. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 2ɥ

Radix *fasciculata.* Folia *radicalia* 2-4 *lanceolata linearia subcarnosa.* Scapus *spithamaeus.* Spatha *umbellifera bivalvis.* Flores *erecti purpurascentes.* Corolla *monopetala tubulosa basi gibba.* Limbus 6-*partitus laciniis lanceolatis obtusis patulis longitudine tubi.* Antherae *sessiles infra os tubi, tres superiores alternae. Differt a T. alliacea,* nectario *triphyllo, statura minore.*

## 616. NARCISSUS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 550.

*Petala* 6, aequalia: *Nectario* infundibuliformi, 1-phyllo. *Stam.* intra nectarium.

1. NARCISSUS *poëticus.*

N. spatha uniflora, nectario rotato breviſſimo ſcarioſo

crentulato. *Hort. upſ.* 74. *Scop. carn. n.* 394. *Mill. dict. n.* 2. *Knorr.* 1. *t. N.* 4. *Kniph. cent.* 7. *n.* 62. *Roth. germ. I.* 145. *II.* 379. *Hoffm. germ.* 115.

Narciſſus anguſtifolius. *Curt. mag.* 193.

N. uniflorus, foliis enſiformibus, ſcypho breviſſimo. *Hall. helv. n.* 1250.

N. foliis enſiformibus, floris nectario rotato breviſſimo. *Hort. cliff.* 134. *Roy. lugdb.* 55. *Sauv. monſp.* 17.

N. albus, circulo purpureo. *Bauh. pin.* 48.

N. medio purpureus. *Dod. pempt.* 223.

β. Narciſſus medio purpureus multiplex. *Bauh. pin.* 54. *Kniph. cent. 7. n.* 61.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 150.

Rothrandige Narciſſe. W.

*Habitat in* G. Narbonenſi, Italia, Helvetia, Germania. 24 (v. v.)

*2. NARCISSUS *incomparabilis.*

N. ſpatha uniflora, nectario campanulato plicato criſpo, petalis dimidio breviore, foliis planis. *Curt. mag.* 121. *

N. latifolius omnium maximus amplo calyce flavo ſive Nonpareille. *Park. theat.* 68.

Schöne Narciſſe. W.

*Habitat in* Hiſpania, Luſitania. 24 (v. v.)

*Accedit ad N. poëticum ſed* folia *duplo latiora*, flores *majores*, petalis *flavis*, nectario *profunde flavo majore plicato-undulato*. W.

3. NARCISSUS *Pſeudo-Narciſſus.*

N. ſpatha uniflora, nectario campanulato erecto criſpo, aequante petala ovata. *Mill. dict. n.* 11. *Scop. carn.* 2. *p.* 295. *Grim. in Nov. Act. A. N. C. tom.* 3. *app. p.* 296. *Roth. germ. I.* 145. *II.* 379. *Hoffm. germ.* 115.

N. foliis enſiformibus, ſcapo unifloro, ſcypho undulato, ſerrato, petalis aequali. *Hall. helv. n.* 1252.

N. foliis enſiformibus, florum nectario longitudine petalorum. *Hort. cliff.* 134. *Hort. upſ.* 74. *Sauv. monſp.* 17.

N. ſylveſtris pallidus, calyce luteo. *Bauh. pin.* 52.

N. luteus ſylveſtris. *Dod. pempt.* 227. *f.* 12.

Bulbocodium vulgatius. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 593. R.

Narciſſus luteus. *Trag.* 757.

β. N. ſylveſtris multiplex, calyce carens. *Bauh. pin.* 54.

γ. N. luteus ſylveſtris, duplici ſ. triplici tubo aureo. *Bauh. pin.* 54.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 152.
Gemeine Narciſſe. W.
*Habitat in* Galliae, Angliae, Hiſpaniae, Italiae *nemoribus*; *in* Germaniae *pratis*. 24 (v. v.)

4. NARCISSUS *bicolor*.

N. ſpatha uniflora, nectario campanulato margine patulo criſpo aequante petala. *Gouan. illuſtr.* 22.
N. albus, calyce flavo, alter. *Bauh. pin.* 52. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 70. *f.* 7.
β. N. (*major*) foliis ſubtortuoſis, ſpatha uniflora, nectario campanulato patulo criſpo aequante petala. *Curt. mag.* 51. *
N. (*hiſpanicus*) ſcapo ancipiti exſtriato unifloro, nectario petalis aequali ſexfido patulo, lobulis dentatis. *Gouan. illuſtr.* 23. *
N. major totus luteus, calyce praelongo. *Bauh. pin.* 52. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 71. *f.* 9.
N. major totus luteus, calyce praelongo alter. *Lob. ic.* 117.
N. ſylveſtris alia icon. *Dod. pempt.* 227.
Pſeudo-Narciſſus major hiſpanicus. *Cluſ. hiſt.* 165. *Swert. floril. p.* 21. *f.* 2.
Bulbocodium hiſpanicum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 594.
γ. N. Pſeudo-Narciſſus ſylveſtris multiplex calyce carens. *Bauh. pin.* 54. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 79. *f.* 10.
N. ſylveſtris multiplex involucro incluſus permanens. *Bauh. pin.* 54.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 133.
Zweyfarbige Narciſſe. W.
*Habitat in* Europa *auſtrali*, *in* Pyrenaeis. 24
*Similis N.* Pſeudo-Narciſſo, *ſed Petala alba*; *Nectarium ſaturate luteum*, *majus*: *limbo patulo*, *undulato*, *crenato*.

5. NARCISSUS *minor*.

N. ſpatha uniflora, nectario obconico erecto criſpo ſexfido, aequante petala lanceolata. *Sp. pl.* 415. *Curt. mag.* 6.
N. parvus totus luteus. *Bauh. pin.* 55. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 82. *f.* 11.
N. ſylveſtris pallidus minimus. *Barr. ic.* 796.

Pſeudo-Narciſſus minor hiſpanicus latifolius. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 165.
Bulbocodium minus. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 597.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 153.
Kleine Narciſſe. W.
*Habitat in* Hiſpania. 4 (v. v.)
*Affinis maxime* N. Pſeudo-Narciſſo, *ſed triplo omnibus partibus minor. Scapus vix ſtriatus. Spatha virens. Flos magis nutans. Petala baſi inter ſe diſtincta, lanceolata, recta, nec obliqua aut ovata. Nectarii margo ſexfidus, undulatus, criſpus.*

6. NARCISSUS *moſchatus.*

N. ſpatha uniflora, nectario cylindrico truncato ſubrepando, aequante petala oblonga. *Sp. pl.* 415.
N. totus albus, nutante flore, longa tuba. *Barr. ic.* 945. 946. 954, 955, 921, 922.
N. albus, calyce flavo, moſcari odore. *Bauh. pin.* 52. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 69. *f.* 6. *et* 73. *f.* 15, 16.
N. flavus, tubo rotundo. *Bauh. pin.* 52. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 68 *f.* 3. 4.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 154.
Biſami Narciſſe. W.
*Habitat in* Hiſpania. 4
*Nectarium cylindricum, ore obſolete repando, non dentato aut criſpo.*

7. NARCISSUS *triandrus.*

N. ſpatha ſubbuniflora nectario campanulato crenulato, dimidio breviore petalis, ſtaminibus ternis. *Sp. pl.* 416 *Curt. mag.* 48.
N. juncifolius, albo flore reflexo. *Cluſ. app. alt.*
N. albus, oblongo calyce. *Bauh. pin.* 53. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 72. *f.* 12.
*Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 155.
Dreyfadige Narciſſe. W.
*Habitat in* Pyrenaeis. 4 (v. ſ.)
*Clariſſ. Curtis obſervavit* ſtamina *ſex, quorum tria breviora vix longitudine tubi.* W.
*Magnitudo N. poëtici, ſed folia dimidio anguſtiora, canaliculata. Spatha (mihi) uniflora. Corolla tota nivea. Petala ovato-oblonga. Nectarium campanulatum, corolla dimidio brevius, margine recto inaequaliter crenulato. Stamina tria (mihi ut Cluſio), raro*

*ſex, quae tamen in quibusddm vidi individuis. Antherae luteae, nectario breviores.*

8. NARCISSUS *orientalis.*

N. ſpatha ſubbiflora, nectario campanulato trifido emarginato, petalis triplo breviore. *Mant.* 62.

N. niveus, calyce flavo, odoris fragrantiſſimi. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 52. *f.* 2. *Bauh. pin.* 50.

N. latifolius ſimplex medio luteus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 154.

β. N. orientalis, calyce rotundo aureo-luteo. *Rudb. elyſ.* 2. *p* 54. *f.* 5. *Bauh. pin.* 50.

N. orientalis, medio croceus, major. *Besl. eyſt.*

γ. N. albus major odoratus. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 50. *f.* 1. *Bauh. pin.* 49.

N. latifolius major alter. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 155.

*Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 155.

Orientaliſche Narciſſe. W.

*Habitat in* Oriente. 24 (v. v.)

Species *latifolia, facie N. Tazettae.* Corolla *alba.* Nectarium *erectum, dimidio vel triplo petalis brevius, trifidum, flavum lobis emarginatis.* H. V.

Tubus *corollae ſemiteres, hinc planus, inde convexus.* W.

9. NARCISSUS *trilobus.*

N. ſpatha ſubmultiflora, nectario campanulato ſubtrifido integerrimo, petalis dimidio breviore. *Sp. pl.* 417.

N. anguſtifolius pallidus, calyce flavo. *Bauh. pin.* 51. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 61. *f.* 3.

*Houtttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 156.

Dreylappige Narciſſe. W.

*Habitat in* Europa *auſtrali.* 24

*Similis* N. Ionquillae, *ſed Nectarium cylindricum, longitudine plus, quam dimidiae petalorum, non criſpum, ſed obſolete trilobum.*

10. NARCISSUS *odorus.*

N. ſpatha ſubbiflora, nectario campanulato ſexfido laevi, dimidio petalis breviore, foliis ſemicylindricis. *Amoen. acad.* 4. *p.* 311. *Curt. mag.* 76.

N. foliis junceis carinatis, ſcapo unifloro, ſcypho ſexies emarginato. *Hall. helv. n.* 1251. R.

N. ſcapo ancipiti unifloro exſtriato, nectario petalis duplo breviore erecto ſexfido crenulato, antheris reflexis. *Gouan illuſtr.* 23. R.

N. polyanthos, flore minore ſtellato toto luteo. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 60. *f.* 7.
N. anguſtifolius ſive juncifolius maximus amplo calyce. *Park. theat.* 89. *f.* 5.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 156.
Wohlriechende Narciſſe. W.
*Habitat in* Europa *auſtrali.* 4 (v. v.)
*Flos luteus, triplo major flore N.* Tazettae, *varians ſpatha uniflora et multiflora. Nectarium non fimbriatum, ſed ore diviſo lobis ſex obtuſis.*

* 11. NARCISSUS *biflorus.*
N. ſpatha biflora, nectario breviſſimo ſcarioſo. *Curt. mag.* 197.
N. pallidus circulo luteo. *Bauh. pin.* 50.
N. medio luteus. *Dod. pempt.* 223. *f.* 2. *Gerar. herb.* 110. *f.* 6. *Park. theat.* 74. *t.* 75. *f.* 1.
N. latifolius claſſis altera. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 156. *absque icone.*
Zweyblütige Narciſſe. W.
*Habitat in* Hiſpania, Anglia. 4 (v. v.)
Nectarium *ut in N. poëtico ſaturate flavum nec rubro marginatum.* Petala *pallide flaveſcentia fere albida.* Scapus *ſemper biflorus.* W.

12. NARCISSUS *calathinus.*
N. ſpatha multiflora, nectario campanulato ſubaequante petala foliis planis. *Sp. pl.* 415.
N. ſpatha multiflora nectario campanulato ſubcrenato aequante petala, foliis planis. *Sp. pl.* 2. *p.* 415.
N. anguſtifolius flavus, magno caule. *Bauh. pin.* 51. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 60. *f.* 5.
N. IX. anguſtifolius. 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 158.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 157.
Glockenförmige Narciſſe. W.
*Habitat in* Europa *auſtrali,* Oriente. 4
*Simillimus N.* Tazettae, *ſed Petala paulo majora et acutiora. Nectarium longitudine petalorum.*

13. NARCISSUS *Tazetta.*
N. ſpatha multiflora, nectario campanulato plicato truncato triplo petalis alterne latioribus breviore, foliis planis. W.
N. ſpatha multiflora, nectario campanulato plicato truncato triplo petalis breviore, foliis planis. *Mill. dict. n.* 8. *Knorr. del.* 1. *t. N.* 3.

N. foliis enſiformibus, florum nectario campanulato erecto petalis longe breviore. *Hort. cliff.* 134.
N. medio luteus, copioſo flore: odore gravi. *Bauh. pin.* 50. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 57. *f.* 11.
N. luteus polyanthos luſitanicus. *Bauh. pin.* 50.
N. latifolius, flore prorſus albo 1, 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 155.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 157.
Tazetten Narciſſe. W.
*Habitat in* G. Narbonenſis, Luſitaniae, Hiſpaniae *maritimis ſubhumidis.* 4 (v. v.)
*Nectarium triplo brevius eſt petalis.*
Tubus *corollae obtuſe triquetrus.* W.

*14. NARCISSUS *dubius.*

N. ſpatha multiflora, nectario campanulato truncato triplo petalis ovatis aequalibus breviore. W.
N. (*dubius*) ſpatha multiflora, petalis ovatis, nectario campanulato integerrimo petalis triplo breviore. *Gouan. illuſtr. p.* 22.
N. anguſtifolius totus albus. *Mag. bot.* 182. *Rudb. elyſ.* 2. *t.* 51. *f.* 2.
Zweifelhafte Narciſſe. W.
*Habitat* Monſpelii. 4

*Tazetta duplo humilior.* Scapus *lineatus ſubanceps.* Folia 5-6, *linearia palmaria, ſcapo breviora, vix lineas* 3 *lata.* Flores *in loco natali ſaepius* 3, *in horto* 6-7. Spatha *longitudine pedicelli longioris, aut ipſo longior.* Petala *ovata uniformia, non vero interioribus minoribus anguſtioribusque, ut in quibusdam.* Nectarium *campanulatum album integerrimum triplo brevius petala.* Stamina 6. *In horto per plures annos colui, et ſolum florum copia variat.* Gouan. l. c.

15. NARCISSUS *Bulbocodium.*

N. ſpatha uniflora, nectario turbinato petalis majore, genitalibus declinatis. *Mill. dict. n.* 6. *Curt. mag.* 88.
N. foliis ſubulatis, nectario maximo patulo, genitalibus declinatis. *Hort. cliff.* 134. *Roy. lugdb.* 35.
N. montanus alter, flore fimbriato. *Bauh. pin.* 53.
N. montanus juncifolius, calyce aureo. *Bauh. pin.* 53. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 75. *f.* 5, 7.
Pſeudo-Narciſſus juncifolius 2, flavo flore. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 166.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 159.

Aufrechte Narciſſe. W.
*Habitat inter* Ulyſſipōnem *et* Hiſpalim. 4 (v. v.)
*A reliquis diſtinctiſſimus*: flore *erecto*, nectario *magno turbinato integro*, ſtaminibus*que declinatis*. W.

16. NARCISSUS *ſerotinus.*
N. ſpatha uniflora, nectario ſexpartito breviſſimo, foliis ſubulatis. *Sp. pl.* 417.
N. ſpatha uniflora, nectario breviſſimo ſexpartito. *Loeſl. it.* 19. *Sp. pl.* 2. *p.* 417. *Mill. dict. n.* 7.
N. albus autumnalis minimus. *Bauh. pin.* 51. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 64. *f.* 8.
N. ſerotinus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 162.
N. autumnalis minor. *Cluſ. hiſt.* 251. *t.* 252.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 160.
Späte Narciſſe. W.
*Habitat in* Hiſpania, Italia, Barbaria. 4

17. NARCISSUS *Ionquilla.*
N. ſpatha multiflora, nectario campanulato brevi, foliis ſubulatis. *Syſt. Veg.* 263. *Curt. mag.* 15.
N. ſpatha multiflora, nectario hemiſphaerico crenato, breviore petalis, foliis ſemiteretibus. *Spec.* 2. *p.* 417.
N. foliis ſubulatis, florum nectario breviſſimo. *Hort. cliff.* 134. *Roy. lugdb.* 35. *Sauv. monſp.* 19.
N. juncifolius luteus minor. *Bauh. pin.* 51.
N. juncifolius, oblongo calyce luteus major. *Bauh. pin.* 51.
N. juncifolius minor et 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 159.
*Houttuyn Lin. Pfl.* Syſt. 11. *p.* 161.
Jonquillen-Narciſſe. W.
*Habitat inter* Hiſpalin *et* Gades, *inter* Guadaloupam *et* Toletum, *inque* Oriente *locis uliginoſis.* 4 (v. v.)

## 617. PANCRATIUM.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 551.

*Petala* 6: *Nectario* 12-fido. *Stam.* nectario impoſita.

1. PANCRATIUM *zeylanicum.*
P. ſpatha uniflora, petalis reflexis. *Fl. zeyl.* 126. *Mill. dict. n.* 3.
Narciſſus zeylanicus, flore albo hexagono odorato. *Herm. lugdb.* 691. *t.* 693. *Comm. hort.* 1. *p.* 75. *t.* 38. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 179. *f.* 7.

Lilium indicum. *Rumph. amb.* 6. *p.* 161. *t.* 70 *f.* 2.
Catulli-pola. *Rheed. mal.* 11. *p.* - *t.* 40.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 162.
Zeylaniſche Gilgen. W.
*Habitat in* India. 4

2. PANCRATIUM *mexicanum.*
P. ſpatha biflora, foliis lanceolatis, nectarii dentibus ſex ſtamiferis, intermediis ſimplicibus. W.
P. ſpatha biflora. *Hort. cliff.* 133. *Roy. lugdb.* 34.
P. mexicanum, flore gemello candido. *Dill. elth.* 299. *t.* 222. *f.* 289.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 164.
Mexicaniſche Gilgen. W.
*Habitat in* Mexico. 4

3. PANCRATIUM *humile.*
P. ſpatha biflora, foliis filiformibus, nectarii dentibus ſex obtuſis bifido-emarginatis non ſtaminiferis. W.
P. (*humile*) ſpatha ſubbiflora, foliis ſubulatis tenuiſſimis, intus planis. *Cavan. ic.* 3. *p.* 4. *t.* 207. *f.* 2.
Kleinſte Gilgen. W.
*Habitat in* Hiſpania. 4
*Florens abſque foliis Octobri.* W.

4. PANCRATIUM *caribaeum.* †
P. ſpatha multiflora, foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 133. *Mill. dict. n.* 4.
P. foliis compreſſis obtuſis, ſcapo nudo, floribus umbellatis. *Brown. jam.* 194.
Narciſſus totus albus latifolius polyanthos major odoratus. *Sloan. jam.* 115. *hiſt.* 1. *p.* 244. *Mart. cent.* 27. *t.* 27.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 164.
Caraibiſche Gilgen. W.
*Habitat in* Iamaica, Caribaeis. 4
*Planta reſpectu dentium* nectarii *formae nondum determinata.* W.

5. PANCRATIUM *maritimum.*
P. ſpatha multiflora, foliis lineari-lanceolatis, nectarii dentibus duodecim non ſtaminiferis. W.
P. ſpatha multiflora, petalis planis, foliis lingulatis. *Sp. pl.* 418. *Mill. dict. n.* 1. *et t.* 197. *Cavan. ic.* 1. *p.* 41. *t.* 56.
P. (*maritimum*) foliis linearibus glaucis, corollae tubo cylindraceo, ſuperne angulato, laciniis tubo brevioribus patenti-recurvis lineari-lanceolatis, baſi coronae ad-

natis, coronae ſinubus groſſe bidentatis. *Salisb. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 70. t. 9.* *

P. (*verecundum*) ſpatha multiflora, foliis linearibus, corollae laciniis lanceolatis tubo brevioribus, nectarii laciniarum nectarii ſtaminiferis. *Act. Lond. 1. p. 412.* *

P. (*carolinianum*) ſpatha multiflora, foliis lanceolatis, nectarii minibus nectarii longitudine. *Ep. pl. 418.*

Narciſſus maritimus. *Bauh. pin.* 54.

Lilio-Narciſſus albus maritimus minor. *Moriſ. hiſt 2. p. 365. ſ. 4. t. 10. f. 28.* *

Lilio-Narciſſus polyanthos flore albo. *Catesb. carol. 2. app. 5. t. 5.*

Narciſſus zeylanicus flore albo hexagono odorato. *Commel. hort. 1. p. 75. t. 38.*

Lilium javanicum. *Rumph. amb. 6. p. 161. t. 70 f. 2.*

Hemerocallis valentina. *Cluſ. hiſt. 1. p. 167.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. p. 166. 168.*

Meerſtrands Gilgen. W.

*Habitat in* Hiſpaniae *maritimis circa* Valentiam *et infra* Monſpelium, *inque* America *et* India *orientali.* 4

Petala *lanceolata, ſubtus linea viridi: exteriora* 3, *apice introrſum uncinata.* Nectarium *angulis bipartitis acuminatis, longitudine filamentorum, et divaricatis ad latitudinem petalorum.* Germina *media umbellae ſeſſilia.* Stylus *declinatus.* Filamenta *inflexa.*

*6. PANCRATIUM *fragrans.*

P. ſpatha multiflora, foliis ellipticis, nectarii dentibus ſex ſtaminiferis, intermediis nullis. W.

P. (*fragrans*) foliorum petiolis latis, corollae tubo ſexangulo eſtriato, laciniis tubo longioribus recurvis linearibus, alternis concavioribus, ſinubus repando-emarginatis. *Salisb. Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 72. t. 11.* *

P. foliis ovatis acuminatis petiolatis, ſpatha multiflora, floribus minoribus candidis fragrantibus. *Trew. ehret. t. 28.* W.

Wohlriechende Gilgen. W.

*Habitat in* Barbados, 4 (v. v.)

*7. PANCRATIUM *littorale.*

P. ſpatha multiflora, foliis lineari-lanceolatis, nectarii dentibus ſex ſtaminiferis, ſpatio intermedio repando. W.

P. foliis lineari-lanceolatis glabris, corolla tubo triangulo ſeptem ſeu octo-pollicari, laciniis tubo brevioribus

basi coronae adnatis recurvis linearibus, coronae sinubus repandis. *Salisb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 74. *t.* 13. *

P. spatha multiflora, foliis lanceolato-linearibus bifariis, corollae laciniis linearibus tubo brevioribus, nectario subintegro. *Ait. Kew.* 1. *p.* 412.

P. spatha multiflora, scapo compresso, ancipiti, corollae laciniis tubo duplo brevioribus, foliis ensiformibus. *Jacq. amer.* 99. *t.* 179. *f.* 94. * *Jacq. hort.* 3. *p.* 41. *t.* 75.

P. foliis ensiformibus, spatha multiflora, floribus magnis candidis fragrantibus. *Trew. ehret. p.* 6. *t.* 27. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 165.

Ufer-Gilgen. W.

*Habitat in insula* Terra Bomba *dicta* Americes *calidioris.* 4

*8. PANCRATIUM *speciosum.*

P. spatha multiflora, foliis ellipticis, nectarii dentibus sex staminiferis, intermediis simplicibus acutis. W.

P. foliorum petiolis angustis, corollae tubo triangulo rare striato, laciniis tubo longioribus patenti-recurvatis linearibus, alternis concavioribus, coronae sinubus ligula bifida. *Salisb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 73. *t.* 12. *

Schöne Gilgen. W.

*Habitat* - - - - 4

*Interdum unus dentium nectarii levissime bifidus.* W.

*9. PANCRATIUM *amoenum.*

P. spatha multiflora, foliis elliptico-lanceolatis, nectarii dentibus sex staminiferis, intermediis acutis bipartitis. W.

P. (*amoenum*) foliis lanceolatis glabris, corollae tubo teretiusculo dense striato, laciniis tubo longioribus recurvis linearibus aequaliter concavis, coronae sinubus ligula bifida. *Salisb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 71. *t.* 10. *

P. (*declinatum*) spatha multiflora, scapo compresso ancipiti, corollae laciniis tubum excedentibus, foliis lingulatis. *Iacq. amer.* 99. * *Iacq. hort.* 3. *p.* 11. *t.* 10. Narcissus americanus flore multiplici albo hexagono odorato. *Commel. hort.* 2. *p.* 173. *t.* 87. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 168.

Angenehme Gilgen. W.

*Habitat in* Gujana. 2

10. PANCRATIUM *illyricum.*

P. ſpatha multiflora, foliis lanceolatis, nectarii dentibus ſex acutis bifidis non ſtaminiferis. W.

P. ſpatha multiflora, foliis enſiformibus, ſtaminibus nectario longioribus. *Roy. lugdb.* 34. *Mill. dict. n.* 2.

P. *ſtellare*) foliis ſpathulaeformibus glaucis, corollae tubo triangulo, laciniis tubo longioribus patentiſſimis lanceolatis, coronae ſinubus profunde bifidis in ſtellam patentiſſimam. *Salisb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 74. *t.* 14. *

Narciſſus illyricus liliaceus. *Bauh. pin.* 55. *Seb. theſ.* 1. *p.* 17. *t.* 8. *f.* 1.

Lilionarciſſus hemerocallidis facie. *Besl. eyſt. vern.* 3. *t.* 16. *f.* 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 169.

Illyriſche Gilgen. W.

*Habitat in* Galliae *maritimis.* 2 (v. ſ.)

11. PANCRATIUM *amboinenſe.*

P. ſpatha multiflora, foliis cordato-ovatis acutis; nectarii dentibus ſex acutis bifidis non ſtaminiferis. W.

P. ſpatha multiflora, foliis ovatis nervoſis petiolatis. *Sp. pl.* 419. *Mill. dict. n.* 5.

Narciſſus amboinenſis, folio latiſſimo rotundo, floribus niveis inodoris. *Comm. hort.* 1. *p.* 77. *t.* 39. *Rudb. elyſ* 2. *p.* 258 *f.* 17.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 169.

Amboiniſche Gilgen. W.

*Habitat in* Amboina. 2

## 618. CRINUM.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 553.

*Cor.* ſupera infundibuliformis ſemiſexfida: tubo filiformi, limbo patulo recurvato: laciniis ſubulatis canaliculatis. *Filamenta* fauci tubi inſerta diſcreta.

1. CRINUM *aſiaticum.*

C. foliis linearibus acuminatis carinatis, floribus ſeſſilibus, tubo limbo longiore, ſpatha diphylla. W.

C. foliis carinatis. *Fl. zeyl.* 127. *Mill. dict. t.* 110. *Osb. it.* 94.

C. radice bulbosa, foliis carinatis. *l'Hérit. sert. angl.* 8.
Amaryllis bulbisperma. *Burm. prod.* 9.
Lilium zeylanicum bulbiferum et umbelliferum. *Herm. lugdb.* 682. *t.* 683. *Rudb. elys.* 2. *p.* 182. *f.* 10.
Radix toxicaria. *Rumph. amb.* 11. *p.* 155. *t.* 69.
Bellutta pola taly. *Rheed. mal. p.* 75. *t.* 38. *Rudb. elys.* 2. *t.* 90.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 172.
Asiatische Hakenlilie. W.
*Habitat in* Malabaria, Zeylona, America. 4
Folia *bifaria equitantia.* Corolla *purpurascens marginibus albis.* Stamina *declinata.* Bulbi *intra capsulas generantur.*

2. CRINUM *americanum.*

C. foliis oblongo-lanceolatis, margine glaberrimis, apice coarctato-unguiculato, floribus pedicellatis, tubo limbo breviore. *Ait. Kew.* 1. *p.* 413.
C. radice fasciculari. *l'Hérit. sert. angl.* 8.
C. corollarum apicibus introrsum uncinatis. *Sp. pl.* 419. *Mill. dict. n.* 3.
Crinum. *Hort. cliff,* 127. *Hort. upsal.* 76. *Roy. lugdb.* 37.
Lilio-Asphodelus americanus sempervirens maximus polyanthus albus. *Comm. rar.* 14. *t.* 14. *Dill. elth.* 194. *t.* 161. *f.* 195.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 176.
Amerikanische Hakenlilie. W.
*Habitat in* America. 4 (v. v)

3. CRINUM *erubescens.*

C. foliis lanceolatis cartilagineo-crenatis apice producto explanato, floribus sessilibus, tubo limbo longiore. *Ait. Kew.* 1. *p.* 413.
C. (*Commelini*) corollarum apicibus introrsum uncinatis, foliis linearibus canaliculatis, scapo subquadrifloro. *Jacq. hort. Schoenb.* 2. *p.* 40. *t.* 202.*
Crinum americanum. *s Sp. pl.* 419.
Lilio-Asphodelus americanus sempervirens minor albus. *Commel. rar.* 15. *t.* 15.
Kleine Hakenlilie. W.
*Habitat in* America *calidiore.* 4 (v. v.)
*Margo* foliorum *interdum tenuissime cartilagineo-crenatus, vix absque lente visibilis.* W.

*4. CRINUM *bracteatum*. W.

C. foliis oblongo-lanceolatis basi attenuatis, margine cartilagineis glaberis, apice subcallosis; floribus pedicellatis, tubo limbo breviore, spathis numerosis tubo longioribus. W.

Beblätterte Hakenlilie. W.

*Habitat* - - - - 4 (v. v.)

*Distinctum* petalorum *laciniis angustis reflexis canaliculatis apice unguiculatis*, bracteis *seu* spathis *oblongo-lanceolatis*. Corolla *alba*. W.

*5. CRINUM *nervosum*.

C. foliis subrotundis nervosis, filamentis basi dilatatis. *l'Hérit. sert. angl.* 8.

Caepa sylvestris. *Rumph. amb.* 6. *p.* 160. *t.* 70. *f.* 1.

Breitblättrige Hakenlilie. W.

*Habitat in* Philippinis. 4

Folia *cordato-rotundata integra acuminata, nervis concentricis*. Scapus *multiflorus polyphyllus*. Flores *longius pedunculati*. Corollae *infundibuliformes, tubo filiformi, limbo sexpartito, laciniis lanceolatis acutis patentibus*. Filamenta *fauci inserta, laciniis opposita brevioraque, basi ampliata lata libera, recta nec declinata mihi visa*. l'Herit. l. c.

## *619. AGAPANTHUS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 1742.

*Corolla* infera infundibuliformis regularis sexpartita.

1. AGAPANTHUS *umbellatus*.

A. scapo foliis linearibus longiore, floribus umbellatis, tubo brevissimo. W.

Agapanthus umbellatus. *l'Herit. sert. angl.* 18. *Ait. Kew.* 1. *p.* 414.

Mauhlia africana. *Dahl. obs.* 26.

Mauhlia (*linearis*) foliis linearibus scapo brevioribus. *Thunb. prod.* 60.

Crinum (*africanum*) foliis sublanceolatis planis, corollis obtusis. *Sp. pl.* 419. *Mill. dict. n.* 1. *Knorr. del.* 1. *t. L.* 10.

Polyanthes floribus umbellatis. *Vir. cliff.* 29. *Hort. cliff.* 126. *Roy. lugdb.* 27. *Mill. ic. t.* 210.

Tulbaghia Heisteri. *Fabr. helmst.* 4.

Tulbaghia. *Heist. Brunsw.* 10.
Hyacinthus africanus tuberosus flore caeruleo umbellato. *Breyn. prod.* 1. *p.* 39. *ic.* 23. *t.* 10. *Comm. hort.* 2. *p.* 133. *t.* 67. *Seb. thes.* 1. *p.* 29. *t.* 19. *f.* 4.
Hyacintho affinis tuberosa radice africana, umbella coerulea inodora. *Pluk. alm.* 187. *t.* 195. *f.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 180.
Doldenblütige Schmucklilie. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. 4 (v. v.)

*2. AGAPANTHUS *ensifolius*.

A. scapo foliis lanceolatis breviore, floribus racemoso-umbellatis, tubo limbo triplo breviore. W.
Mauhlia (*ensifolia*) foliis lanceolato-ensiformibus, scapo longioribus. *Thunb. prod.* 60. *t.* 3.
Schwerdblättrige Schmucklilie. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

## *620. EUSTEPHIA.

*Cavan. icon.* 3. *p.* 20.

*Cor.* supera tubulosa cylindracea bifida. *Nectar.* foveae 6 in tubo corollae. *Filamenta* tricuspidata, discreta.

*1. EUSTEPHIA *coccinea*.

Eustephia coccinea. *Cavan. ic.* 3. *p.* 20. *t.* 238. *
Scharlachrothe Glockenlilie. W.
*Habitat* - - - - 4

*Planta habitu Cyrtanthi, sed* nectariis *et* staminibus *distincta.* Folia *linearia obtusa scapo breviora.* Flores *coccinei quatuor nutantes umbellati.* Spatha *tetraphylla colorata marcescens.* W.

## *621. CYRTANTHUS.

*Ait. Kew.* 1. *p.* 414.

*Cor.* supera tubulosa clavata sexfida: laciniae ovato-oblongae. *Filamenta* tubo inserta apice conniventia.

1. CYRTANTHUS *angustifolius*.

C. foliis linearibus canaliculatis, corollis cernuis, tubo cylindraceo. W.

C. foliis obtuſe carinatis rectis, floribus cernuis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 414. *Curt. mag.* 271.
Crinum (*anguſtifolium*) foliis linearibus obtuſis, corollis cylindricis, laciniis alternis intus glanduloſis. *Linn. ſuppl.* 195. *Thunb. prod.* 59.
Amaryllis (*cylindracea*) ſpatha multiflora, corollis infundibuliformibus, tubo elongato cylindrico ſubincurvo, foliis linearibus. *l'Herit. ſert. angl.* 15.
Schmalblättrige Bogenlilie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

Flores *anguſtiores purpurei*, tubo *curvato*.

## *2. CYRTANTHUS *ventricoſus*. W.

C. foliis linearibus planis ſtrictis, corollis cernuis, tubo ventricoſo, ſtaminibus adſcendentibus. W.
Cyrtanthus (*anguſtifolius*) foliis ſubcanaliculatis erectis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 40. *t.* 76. (*excluſis ſynonymis.*)
Bauchige Bogenlilie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

*A praecedente diſtinctiſſimus*; foliis *anguſtioribus ſtrictis nec laxe erectis*, ſcapo *colorato*, tubo *corollae ventricoſo, nec cylindraceo ſurſum ſenſim ampliato*, limbo *plano, nec recto, denique* ſtaminibus *adſcendentibus*. W.

## 3. CYRTANTHUS *obliquus*.

C. foliis lanceolatis obtuſis planis oblique flexis, corollis pendulis tubo obverſe conico. W.
C. foliis planis obliquis, floribus pendulis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 414. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 39. *t.* 75.*
Crinum (*obliquum*) foliis lanceolatis obliquis, laciniis corollae alternis extus glanduloſis. *Linn. ſuppl.* 195. *Thunb. prod* 59.
Amaryllis (*umbella*) umbella reclinata, corollis incurvis infundibulo-tubuloſis, limbo ſexfido erecto, genitalibus incluſis. *l'Herit. ſert. angl.* 15. *t.* 16.
Groſsblütige Bogenlilie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24.

Flos *purpureus ſingularis foliis longis obliquis*.

## 622. AMARYLLIS.

*Gen. pl. ed. Schreb. p.* 554.

*Cor.* hexapetaloidea irregularis. *Filamenta* fauci tubi inserta declinata inaequalia proportione vel directione.

* *Spatha uniflora.*

1. AMARYLLIS *lutea.*

A. spatha indivisa obtusa, flore sessili, corolla campanulata erecta, basi breve tubulosa, staminibus erectis, alternis brevioribus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 415.

A. spatha uniflora, corolla aequali, staminibus strictis. *Syst. Veg.* 329.

A. spatha uniflora indivisa, corolla aequali sessili, stigmate simplici. *l'Herit. sert. angl.* 9.

A. spatha uniflora, corolla aequali, staminibus declinatis. *Sp. pl.* 2. *p.* 240. *Hort. cliff.* 135. *Roy. lugdb.* 36. *Mill. dict. n.* 1.

Narcissus autumnalis major. *Clus. hist.* 1. *p.* 164.
Colchicum luteum 1. majus. *Bauh. pin.* 69.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 185.
Gelbe Amaryllis. W.
*Habitat in* Hispania, Italia, Thracia. 4 (v. v.)

*2. AMARYLLIS *pumilio.*

A. spatha diphylla uniflora, corolla infundibuliformi aequali, laciniis revolutis, staminibus inclinatis, alternis brevioribus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 415.

Zwerg-Amaryllis. W.
*Habitat ad* Cap. b. Spei. 4

Folium *radicale lineare inferne angustatum.* Scapus *teres palmaris virescens.* Flos *terminalis solitarius.* Spatha *diphylla: foliola lineari-subulata, basi invicem amplexa, tubo corollae longiora, virentia.* Corolla *tubus infundibuliformis uncialis albidus externe lineis sex elevatis notatus, interne lineis sex rubris cum prioribus alternantibus.* Limbi *laciniae ovato-oblongae acutae reflexae tubo longiores, extus albidae intus lateritiae.* Filamenta *filiformia tubo infra faucem inserta, apice inflexa albida, tria alterna breviora.* Antherae *oblongae incumbentes luteae.* Germen *oblongum.* Stylus *filiformis staminibus longior albidus.* Stigma *trifidum, laciniae lineares rubicundae apice albae.* Ait. l. c.

## *3. AMARYLLIS *tubiſpatha.*

A. ſpatha monophylla tubuloſa bifida uniflora, pedunculo ſpatha duplo longiore. *l'Herit. ſert. angl.* 9.
Röhrenſcheidige Amaryllis. W.
*Habitat in* Bonaria. 4

Scapus *uniflorus erectus quadripollicaris.* Spatha *medium fere ſcapum occupans tubuloſa cylindracea bifida, laciniis oppoſitis.* Flos *longius pedunculatus erectus.* Filamenta *alterna* 3 *breviora mihi viſa.* Folia *in ſpeciminibus Commerſonianis non exſtabant.* l'Herit. l. c.

## *4. AMARYLLIS *tubiflora.*

A. ſpatha uniflora diphylla, corolla infundibuliformi, tubo longiſſimo. *l'Herit. ſert. angl.* 10.
Lilio-Narciſſus croceus monanthos. *Feuill. peruv.* 3. *p.* 29. *t.* 20.
Röhrenblütige Amaryllis. W.
*Habitat in* Limae, Chancaae *arenoſis.* 4.

Filamenta *aequalia dicit Dombejus, ſubaequalia mihi viſa.* l'Herit. l. c.

## 5. AMARYLLIS *Atamaſco.*

A. ſpatha bifida acuta, flore pedicellato, corolla campanulata ſubaequali erecta, baſi breve tubuloſa, ſtaminibus declinatis aequalibus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 416.
A. ſpatha uniflora, corolla aequali, piſtillo declinato. *Hort. cliff.* 135. *Gron. virg.* 56. *Roy. lugdb.* 36. *Mill. dict. n.* 2. *Kniph. cent.* 3. *n.* 11.
A. ſpatha uniflora bifida, corolla ſubaequali, genitalibus declinatis. *l'Herit. ſert. angl.* 10.
Lilio-Narciſſus virginienſis. *Catesb. car.* 3. *p.* 12. *t.* 12.
Lilio-Narciſſus vernus anguſtifolius, flore purpuraſcente. *Barr. ic.* 994.
Lilio-Narciſſus liliflorus carolinianus, flore albo ſingulari cum rubedine diluto. *Pluk. alm.* 220. *t.* 42. *f.* 3.
Lilio-Narciſſus indicus pumilus monanthos albus. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 266. *ſ.* 4. *t.* 24. *f.* 4.
Lilio-Narciſſus minimus foliis graminеis. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 94. *t.* 16.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 186.
Virginiſche Amaryllis. W.
*Habitat in* Virginia. 4 (v. v.)

*6. AMARYLLIS *maculata.*

A. ſpatha uniflora diphylla lineari, flore pedunculato, genitalibus declinatis. *l'Herit. ſert. angl.* 10.

Gefleckte Amaryllis. W.

*Habitat in* Chili. 2

Scapus *punctis lineatis maculatus.* Corolla *campanulata.* l'Herit. l. c.

*7. AMARYLLIS *chilenſis.*

A. ſpathi uni- ſeu biflora, ſubbifolia, floribus pedunculatis, foliis linearibus. *l'Herit. ſert. angl.* 11.

Lilio-Narciſſus monanthos coccineus. *Feuill. peruv.* 3. *t.* 21.

Chiliſche Amaryllis. W.

*Habitat in* Chili. 2

Flores *A. Belladonnae aut reginae purpurei.* Hert. l. c.

*8. AMARYLLIS *clavata.*

A. ſpatha uniflora diphylla ſubulata, corolla clavata. *l'Herit. ſert. angl.* 11. †

Keilförmige Amaryllis. W.

*Habitat in* Africa *auſtrali.* 2

Flos *pedicellatus.* Tubus *baſi anguſtus non dilatatus.* Limbus *breviſſimus.* Folia *non vidi, nec ſtamina obſervare licuit.* l'Herit. l. c.

9. AMARYLLIS *formoſiſſima.*

A. ſpatha indiviſa, flore pedicellato, corolla bilabiata nutante profunde ſexpartita, genitalibus declinatis. *Ait. Kew. 1. p.* 416.

A. ſpatha uniflora, corolla inaequali, petalis tribus, genitalibusque declinatis. *Hort. cliff.* 135. *Hort. upſ.* 75. *Act. ſtockh.* 1742. *p.* 93. *t.* 6. *Roy. lugdb.* 36. *Mill. dict.* 5. *Kniph. cent.* 10. *n.* 4. *Knorr. del.* 1. *t. N.*

A. ſpatha indiviſa uniflora, corolla bilabiata ſexpartita, petalis inferioribus genitalibusque dependentibus. *l'Herit. ſert. angl.* 11.

Lilio-Narciſſus jacobaeus, flore ſanguineo nutante. *Dill. elth.* 195. *t.* 162. *f.* 196.

Narciſſus jacobaeus major. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 89. *f.* 10.

Narciſſus indicus, flore ſanguineo. *Swert. floril.* 28.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 186.

Schönſte Amaryllis. W.

*Habitat in* America *meridionali, innotuit europaeis* 1593. 2 (v. v.)

*Squamae totidem quot filamenta, e receptaculo ortae,*

*ſtamentorum baſi arcte adſident; an ſic in reliquis? Raro biflora evadit.*

* * *Spatha biflora.*

* 10. AMARYLLIS *reginae.*

A. ſpatha ſubbiflora, pedicellis divaricatis, corollis campanulatis breve tubulosis nutantibus, fauce tubi hirſuta, foliis lanceolatis patulis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 416.

A. ſpatha multiflora, corollis campanulatis aequalibus undulatis, genitalibus declinatis. *Sp. pl.* 421. *Mill. dict. n.* 5. *ic. p.* 16. *t.* 24.

A. ſpatha ſubbiflora, corollis baſi tubulosis campanulatis quinquepartitis, fauce tubi hirſuta. *l'Herit. ſert. angl.* 12. *Houttuyn Lin. Pfl.* Syſt. 11. *p.* 191.

Königliche Amaryllis. W.

*Habitat in* Caribaeis. 4

*Differt ab A. Belladonna marginibus petalorum undulatis, nec ad ungues recurvatis.*

11. AMARYLLIS *purpurea.*

A. ſpatha ſubbiflora, corollis erectiuſculis baſi tubulosis, fauce tubi glabra, foliis lineari-lanceolatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 417.

Amaryllis elata. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 32. *t.* 62.*

A. (*ſpecioſa*) ſpatha ſubbiflora, corollis erectis baſi tubulosis campanulatis ſemiquinquefidis, fauce tubi glabra. *l'Herit. ſert. angl.* 12.

Crinum (*ſpecioſum*) foliis enſiformibus, corollis campanulatis, tribus laciniis alternis calloſo-unguiculatis. *Linn. ſuppl.* 195. *Thunb. prod.* 59.

Purpurfarbene Amaryllis. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Flores *ſanguineo-purpurei magni umbellati.*

12. AMARYLLIS *linearis.* †

A. foliis linearibus, corollis campanulatis, laciniis duabus anguſtioribus.

Crinum lineare. *Linn. ſuppl.* 195. *Thunb. prod.* 59.

Linienblättrige Amaryllis. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Flores *magni albi.*

13. AMARYLLIS *equeſtris.*

A. ſpatha ſubbiflora, pedicellis erectis ſparſis brevioribus, tubo filiformi horizontali, limbo oblique patulo ſur-

ſum curvo, fauce piloſa. *Ait. Kew.* 1. *p.* 417. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 33. *t.* 63.*

Amaryllis dubia. *Lin. amoen. acad.* 8. *p.* 254.

Lilium americanum puniceo flore Belladonna dictum. *Herm. parad.* 194. *t.* 194.

Lilium rubicundum. *Merian. ſurinam.* 22. *t.* 22.

Ritter Amaryllis. W.

*Habitat in* America *calidiore.* 4

*14. AMARYLLIS *reticulata.*

A. ſpatha ſubbiflora, corollis baſi tubulofis nutantibus, fauce tubi glabra, ſcapo compreſſo, foliis oblongis baſi attenuatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 417.

A. ſpatha ſubmultiflora, corollis nutantibus, baſi tubulofis, limbo reticulatis, foliis oblongis. *l'Herit. ſert. angl.* 12.

Netzförmige Amaryllis. W.

*Habitat in* Braſilia. 4

Petalis *transverſe venoſis diſtincta.* Faux *glabra.*

*15. AMARYLLIS *tatarica.*

A. ſpatha ſubbiflora, corollis ſubcampanulatis profunde ſexpartitis, lacinia ſuprema anguſtiſſima, inferiore obovata acuminata, foliis linearibus ſcapo longioribus. W.

Amaryllis tatarica. *Pall. itin.* 3. *app. n.* 85. *t. D. f.* 1.* *mala.*

Tatariſche Amaryllis. W.

*Habitat in* Sibiria *circum lacum Inderienſem.* 4 (v. ſ.)

Corolla *fere hexapetala.* Filamenta *corolla breviora tria breviora.*

* * * *Spatha multiflora.*

16. AMARYLLIS *Belladonna.*

A. corollis erectiuſculis hexapetalis laciniis planis, ſcapo compreſſo, foliis acute canaliculatis obtuſe carinatis glaberrimis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 417.

A. floribus unibellatis pedunculatis ſubhexapetalis, foliis canaliculatis. *l'Herit. ſert. angl.* 12.

A. ſpatha multiflora, corollis campanulatis aequalibus ungue reflexis, genitalibus declinatis. *Hort. cliff.* 135. *Roy. lugdb.* 36. *Mill. dict n.* 6. *et ic. t.* 23.

Lilio-Narciſſus polyanthos, flore incarnato: fundo ex luteo albeſcente. *Sloan. jam.* 115. *hiſt.* 1, *p.* 244. *Seb. theſ.* 1. *p.* 25. *t.* 17. *f.* 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 190.

Weſtindiſche Amaryllis. W.
*Habitat in* Caribaeis, Barbados, Surinamo. 2 (v. ſ.)
Bulbus *viridis*. Scapus *teres, ſubcompreſſus*. Corolla *regularis, campanulata, incarnata fundo viridi-albicante*. Petala 3 *exteriora intus apice reverſo*; Pet. 3 *interiora baſi ciliata*. Stylus *ruber*.

* 17. AMARYLLIS *vittata*.
A. floribus pedicellatis, corollis cuneiformi-infundibuliformibus, petalorum exteriorum rachibus interiorum margini adnatis, ſcapo tereti, ſtigmatibus ſulcatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 418. *Curt. mag.* 129.
A. ſpatha multiflora, floribus pedunculatis ſubhexapetalis, petalis exterioribus margine liberis. *l'Herit. ſert. angl.* 13. *t.* 15.
Bandirte Amaryllis. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei? 2 (v. v.)
Petala *inferne connata in tubum carnoſum, ſed margines exteriorum ad baſin liberi*. l'Herit. l. c.

* 18. AMARYLLIS *falcata*.
A. corollis pedunculatis erectis hexapetalis, ſcapo compreſſo longitudine umbellae, foliis planis humi adpreſſis margine falcatis albo-cartilagineo-crenatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 418.
A. floribus umbellatis longius pedunculatis ſexpartitis, foliis falcatis, margine cartilagineo muricato diſcolore. *l'Herit. ſert. angl.* 13.
Crinum falcatum. *Iacq. hort.* 3. *p.* 34. *t.* 60.*
Haemanthus (*falcatus*) foliis linearibus falcatis, corollae laciniis erectis lanceolatis. *Thunb. prod.* 58.
Sichelblättrige Amaryllis. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2

* 19. AMARYLLIS *ornata*.
A. floribus ſeſſilibus, corollis baſi tubuloſis, tubo ſpathis limboque longiore curvo, limbi laciniis oblongis ariſtatis, lacinia infima divaricata, concava. *Ait. Kew.* 1. *p.* 418.
Zierliche Amaryllis. W.
*Habitat in* Guinea. 2

20. AMARYLLIS *longifolia*.
A. floribus pedicellatis, ſpatha 12-20-flora, corollis baſi tubuloſis, tubo curvo brevi, limbi laciniis lanceolatis obtuſis, foliis lato-ſubulatis canaliculatis apice flaccidis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 419.

A. floribus umbellatis pedunculatis basi tubulosis sexpartitis, foliis scapo duplo longioribus. *l'Herit. sert. angl.* 13.

A. spatha multiflora, corollis campanulatis aequalibus, genitalibus declinatis, scapo compresso longitudine umbellae. *Sp. pl.* 421. *Roy. lugdb.* 56. *Ehret. pict. t.* 13. *Mill. dict. n.* 7. *Jacq. ic.* 2. *t.* 362. *Collect.* 4. *p.* 205.*

Lilium africanum humile longissimis foliis, polyanthos saturato colore purpurascens. *Herm. parad.* 195. *t.* 195.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 192.

Langblättrige Amaryllis. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4 (v. v.)

*21. AMARYLLIS *montana.*

A. corollis campanulatis aequalibus, laciniis alternis aristatis, genitalibus rectis corolla duplo brevioribus, scapo folioso, foliis linearibus. W.

A. spatha multiflora, foliis linear-subulatis, petalis alternis mucronatis, genitalibus erectis. *Billard. ic. pl. syr.* 2. *p.* 5. *t.* 1.*

Berg-Amaryllis. W.

*Habitat in altis montibus* Libani. 4

Corolla *coerulea. Singularis* scapo *folioso*, spatha *terminali multiflora et axillaribus unifloris.* W.

22. AMARYLLIS *zeylanica.*

A. spatha multiflora, corollis reclinatis, tubo filiformi longissimo, laciniis uncinatis. *l'Herit. sert. angl.* 13.

A. spatha multiflora, corollis campanulatis aequalibus, genitalibus declinatis, scapo tereti-ancipiti. *Sp. pl.* 421. *Roy. luggb.* 36.

A. (*bulbispermia*) spatha multiflora, corollis campanulatis aequalibus, genitalibus declinatis, pericarpio bulbigero. *Burm. prod.* 19.

Crinum (*zeylanicum*) foliis scabro-dentatis, scapo compressiusculo. *Syst. Veg.* 263.

Lilio-Narcissus africanus scillae foliis, flore niveo linea purpurea striato. *Ehret. pict* 5. *f.* 2. *Trew. ehret. t.* 13.

Lilio-Narcissus zeylanicus latifolius, flore niveo externe linea purpurea striato. *Commel. hort.* 1. *p.* 73. *t.* 75.* *Rudb. elys.* 2. *p.* 191. *f.* 9.

Tulipa javana. *Rumph. amb.* 5. *p.* 30. *t.* 105.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 176.
Zeylaniſche Amaryllis. W.
*Habitat in* India *orientali.* 2

Statura *Crini americani.* Folia *ſcillae officinalis carnoſa, margine denticulato-ſcabra.* Spatha *bivalvis praeter ramenta aliquot interiora.* Germina *ſeſſilia.* Corollae *tubus ſcapo concolor rufeſcens.* Limbus *albus petalis lanceolatis recurvis, ſubtus rubro-carinatis.* Filamenta *et* ſtylus *ſanguinea.*

*23. AMARYLLIS *revoluta.*

A. floribus pedicellatis, corollis baſi tubuloſis, tubo filiformi brevi curvo, foliis linearibus anguſtis canaliculatis longis ab ortu flaccidis. *Ait. Kew.* I. *p.* 419.

A. ſpatha multiflora, corollis breviter pedicellatis baſi tubuloſis reclinatis, laciniis corollae revolutis, foliis linearibus. *l'Herit. ſert. angl.* 14.
Zurückgebogene Amaryllis. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2

Folia *bipedalia ſemunciam lata canaliculata.* Scapus *pedalis.* Umbella 4-6 *flora.* Flores *ſuaveolentes.* Tubus *trigonus virescens inflexus.* Laciniae *bimciales intus albae extus ſecundum medium dilute rubentes, ad medium revolutae.* Ait. l. c.

*24. AMARYLLIS *latifolia.*

A. ſpatha multiflora, floribus pedicellatis baſi tubuloſis, foliis oblongo-lanceolatis. *l'Herit. ſert. angl.* 14.
Crinum (*latifolium*) foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſeſſilibus planis. *Sp. pl.* 419.
Sjovanna-pola-tali. *Rheed. mal.* II. *p.* 77. *t.* 39. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 91. *f.* 12.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 171.
Breitblättrige Amaryllis. W.
*Habitat in* Indiae *orientalis arenoſis.* 2 (v. ſ.)

Folia 3 *ſ.* 4 *digitos tranſverſos lata, a baſi ſenſim attenuata.* Antherae *filiformes lineares incumbentes, longitudine dimidii filamenti ſ. corollae.*

*25. AMARYLLIS *aurea.*

A. floribus pedicellatis erectiuſculis, corollis infundibuliformi-clavatis ſubhexapetalis, laciniis lineari-lanceolatis, genitalibus rectis, foliis linearibus erectis canaliculatis margine reflexo glabro. *Ait. Kew.* I. *p.* 419.

A. ſpatha multiflora, corollis baſi tubuloſis ſexpartitis,

laciniis linearibus undulatis, genitalibus corolla longioribus. *l'Herit. sert angl.* 14.

**A.** spatha multiflora, floribus pedicellatis fere ad basin usque sexpartitis, genitalibus declinatis, ramentis lanceolatis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 38. *t.* 73.

Goldene Amaryllis. W.

*Habitat in* China. 4 (v. v.)

Folia *linearia carinata margine parum reflexo sesquipedalia vix unciam lata.* Scapus *parum compressus vix bipedalis.* Spatha *diphylla lanceolata marcescens triuncialis* 5-9 *flora.* Pedicelli *inaequales longiores unciales ad basin bractea suffulti membranacea lanceolata pedicellorum longitudine.* Corolla *infundibuliformis lutea.* Tubus *trigonus vix semiuncialis.* Limbi *laciniae lineari-lanceolatae apice incrassatae subuncinatae duas cum semiuncia longae obtuse carinatae, carinis virescentibus.* Filamenta *fauci inserta recta, tria alterna corolla longiora, alterna breviora albida.* Antherae *lineari-oblongae rectae pallide lutescentes.* Germen *ovatum obtuse trigonum.* Stylus *filiformis rectus staminibus longior albidus.* Stigma *tripartibile coccineum.* Ait. l. c.

## 26. AMARYLLIS *orientalis.*

**A.** spatha multiflora, floribus pedicellatis sexpartitis pedunculis sesquibrevioribus irregularibus, germinibus cuneiformibus angulatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 420.

**A.** umbella multiflora, floribus longissime pedunculatis sexpartitis, germinibus cuneiformi-triangularibus. *l'Herit. sert. angl.* 14.

**A.** spatha multiflora corollis inaequalibus, foliis linguiformibus. *Sp. pl.* 422. *Büttn. cunon.* 215. *Mill. dict. n.* 11. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 39. *t.* 74. *

**A.** spatha multiflora, foliis ovato-oblongis obtusis. *Roy. lugdb.* 37.

Lilio-Narcissus indicus maximus sphaericus, floribus plurimis rubris liliaceis. *Moris. hist.* 2. *p.* 568. *s.* 4. *t.* 10. *f.* 35.

Narcissus indicus orientalis. *Swert. floril.* 31. *f.* 1.

Narcissus indicus flore liliaceo sphaericus. *Ferr. flor.* 125. *t.* 129. 131. 133.

Brunsvigia. *Heist. monog. c. fig.*

*Houttuyn Lin. Syst.* 11. *p.* 191.

Orientalische Amaryllis. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24 (v. ſ.)

27. AMARYLLIS *ſarnienſis.*

A. petalis linearibus planis, genitalibus rectiuſculis corolla longioribus, ſtigmatibus patulis revolutis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 420.

A. ſpatha multiflora, corollis ſubhexapetalis lineari lanceolatis, genitalibus rectiuſculis exſertis. *l'Herit. ſert. angl.* 15.

A. ſpatha multiflora, corollis revolutis, genitalibus erectis. *Hort. upſ.* 75. *Mill. dict. n.* 4.

A. ſpatha multiflora, corollis aequalibus patentiſſimis revolutis, genitalibus longiſſimis. *Hort. cliff.* 131. *Roy. lugdb.* 36.

Narciſſus japonicus rutilo flore. *Corn. canadenſ.* 157. *t.* 158. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 23. *f.* 14. *Ehret. ſelect. t.* 9. *f.* 3. *Kaempf. amoen.* 872. *Seb. muſ.* 1. *t.* 17. *f.* 5.

Lilium ſarnienſe. *Dugl. monogr. t.* 1. 2.

β. A. (*ſarnienſis*) ſpatha multiflora, corollis patentiſſimis apice reflexis, genitalibus rectiuſculis corolla longioribus, foliis enſiformi-linearibus. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 34. *t.* 66.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 193.

Japaniſche Amaryllis. W.

*Habitat in* Japonia, *nunc in Sarnia inſula* Angliae. β. *ad* Cap. b. ſpei. 24

*28. AMARYLLIS *marginata.*

A. petaſis oblongis revolutis, genitalibus rectiuſculis corolla longioribus, foliis lingulatis humi adpreſſis cartilagineo-marginatis. W.

A. ſpatha multiflora, corollis patentiſſimis et apice reflexis, pedicellis erectis, foliis ſublinguaeformibus proſtratis, cinctis margine colorato et verſus apicem undulato. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 34. *t.* 65.*

Gerandete Amaryllis. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

Folia *Haemanthi coccinei.* Flores *coccinei.* W.

*29. AMARYLLIS *curvifolia.*

A. petalis oblongis undulatis revolutis, genitalibus corolla longioribus rectiuſculis, foliis ſtrictis lineari-enſiformibus canaliculatis. W.

A. ſpatha multiflora, corollis revolutis undulatis, pedicellis erectis, foliis ſublinearibus late canaliculatis ſubfalcatis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 33. *t.* 64.*

Krummblättrige Amaryllis. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ

30. AMARYLLIS *undulata.*

A. petalis linearibus canaliculatis undulatis, genitalibus deflexis corolla brevioribus, ſtigmata obſoleto. *Ait. Kew.* 1. *p.* 420.

A. ſpatha multiflora, corollis ſubhexapetalis linearibus canaliculatis undulatis, genitalibus deflexis corolla brevioribus. *l'Herit. ſert. angl.* 16.

A. ſpatha multiflora, corollis patulis, petalis undulatis mucronatis baſi dilatatis. *Syſt. Veg.* 264. *Jacq. hort.* 3. *p.* 11. *t.* 13.

Wellenförmige Amaryllis. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ *Dav. Royen.* (v. v.)

Scapus *cum umbella magnitudine umbellae cum pedunculo Geranii Zonalis.* Spatha *profert circiter* 12 *flores purpureos, petalis anguſto-lanceolatis, apice valde mucronatis; baſi ipſa ovata.* Stamina *declinata.*

*31. AMARYLLIS *radiata.*

A. petalis lanceolatis undulatis, genitalibus deflexis divergentibus corolla duplo longioribus, ſtigmate obſoleto. *Ait. Kew.* 1. *p.* 421.

A. ſpatha multiflora corollis ſubhexapetalis linearibus undulatis revolutis, genitalibus deflexis divergentibus, corolla duplo longioribus. *l'Herit. ſert. angl.* 16.

Lilio-Narciſſus V. *Seligm. aves. t.* 35.

Schneeglöckchenblättrige Amaryllis. W.
*Habitat* - - - - 2ɬ

*32. AMARYLLIS *humilis.*

A. ſpatha tri-ſeu quadriflora, petalis lanceolatis ſubringenti-patentibus, apice undulato-reflexis, infimo divaricato, genitalibus adſcendentibus petalis brevioribus, foliis linearibus obtuſis glabris nudis planis. W.

A. ſcapis paucifloris, petalis patentibus, infimo divaricato; foliis linearibus obtuſis planis. *Jacq. hort. Schönb.* 1. *p.* 36. *t.* 69.*

Niedrige Amaryllis. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ

*Simillima ſequenti, ſed* ſcapo *et* foliis *duplo minoribus et notis indicatis diverſa.* W.

*33. AMARYLLIS *flexuoſa.*

A. ſpatha multiflora, petalis lanceolatis, ſubringenti-patentibus, apice undulato-reflexis, infimo divaricato,

genitalibus adſcendentibus petalis brevioribus, foliis linearibus obtuſiuſculis concavis puſtulato-punctatis. W.

A. ſpatha multiflora, petalis patentibus, infimo divaricato, foliis linearibus punctatis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 35. *t.* 67.*

Gebogene Amaryllis. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4 (v. ſ.)

Folia *juniora albo-puſtulata, adultiora punctata, exſiccatione puncta evaneſcunt.* W.

*34. AMARYLLIS *Radula.*

A. ſpatha multiflora, petalis lanceolatis ſubringenti-patentibus planis, infimo divaricato, genitalibus adſcendentibus petalorum longitudine, foliis ellipticis humi adpreſſis puſtulato-ſcabris. W.

A. ſpatha multiflora, petalis patentiſſimis, infimo divaricato, foliis facie ad oras muricato-aſperis proſtratis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 35. *t.* 68.*

Raſpelblättrige Amaryllis. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4.

*35. AMARYLLIS *ſtriata.*

A. ſpatha multiflora, corollis campanulatis breve tubuloſis, laciniis planis apice reflexis, genitalibus adſcendentibus longitudine ſtaminum, foliis elliptico-ovatis erectis marginatis. W.

A. ſpatha multiflora, corollis campanulatis aequalibus apice reflexis, foliis ſubovatis, dorſo ſtriatis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 36. *t* 70.*

Geſtreifte Amaryllis. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

*36. AMARYLLIS *criſpa.*

A. ſpatha pauciflora, petalis patentiſſimis oblongis obtuſis undulatis, ſtaminibus divaricatis corolla brevioribus, ſtylo recto, foliis lineari-filiformibus laxis. W.

A. ſpatha pauciflora, petalis patentiſſimis criſpis, foliis linearibus anguſtiſſimis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 37. *t.* 72.*

Krauſe Amaryllis. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Flores *omnium minutiſſimi.* W.

*37. AMARYLLIS *ſtellaris.*

A. ſpatha multiflora, corollis patentibus planis, tubo breviſſimo, ſtaminibus inaequalibus divaricatis corolla brevioribus, ſtylo recto, foliis linearibus erectis. W.

A. ſpatha multiflora, petalis patentiſſimis, tribus alternis infra medium barbatis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 37. *t.* 71.*

Sternförmige Amaryllis. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

*38. AMARYLLIS *caſpia.*

A. ſpatha multiflora, corollis campanulatis, tubo breviſſimo, filamentis erectis corolla longioribus, foliis lanceolatis undulatis. W.

Crinum caſpium. *Pall. itin.* 2. *app. n.* 105. *Tab.* Q.*

Caſpiſche Amaryllis. W.

*Habitat in herbidis circa mare* Caſpium *primo vere.* 4

*Non eſt Crini ſpecies ob defectum tubi longiſſimi filiformis.* Spatha *eſt multiflora bivalvis.* Flores *albo-incarnati erecti parvi.* W.

## *623. MILLEA.

*Cavan. ic. p.* 76.

*Cor.* infundibuliformis, limbo ſexpartito plano. *Antherae* fauci inſertae. *Germen* pedicellatum. *Capſula* ſupera.

*1. MILLEA *biflora.*

Milla biflora. *Cavan. ic.* 2. *p.* 76. *t.* 196.*

Zweyblütige Mille. W.

*Habitat in* Mexico. 4

Bulbus *faſciculatus.* Folia *anguſta linearia canaliculata laxa.* Scapus *erectus biflorus.* Spathae *vel* bracteae *tres minutae.* Corolla *magna alba.* Facies *floris Siſyrinchi.* W.

## 624. BULBOCODIUM.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 555.

*Cor.* infundibulif. hexapetala: unguibus anguſtis ſtaminiferis. *Capſ.* ſupera.

1. BULBOCODIUM *vernum.*

B. foliis lanceolatis. *Roy. lugdb.* 41. *Hort. cliff.* 133. *Mill. dict. n.* 2. *Retz. obſ.* 2. *p.* 17. *t.* 1.

Colchicum vernum hiſpanicum. *Bauh. pin.* 69. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 128. *f.* 2.

Colchicum vernum. *Cluſ. hiſt.* 2. *app.* 203. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 199.

Frühlings-Uchtblume. W.

*Habitat in* Hiſpania, Ruſſia. 24 (v. v)
Flores *interdum tetrapetali, tetrandri.* Pall. *it.* 3. *p.* 651. R.

## 625. APHYLLANTHES.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 556.

*Cor.* hexapetala. *Filamenta* fauci corollae inſerta. *Capſ.* ſupera. *Glumae* calycinae univalves imbricatae.

1. APHYLLANTHES *monſpelienſis.*
Aphyllanthes. *Hort. cliff.* 493. *Sauv. monſp.* 8.
A. monſpelienſium. *Lob. adv.* 190. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 336.
Caryophyllus coeruleus monſpelienſium. *Bauh. pin.* 209.
*Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 562. *ſ.* 5. *t.* 25. *f.* 12.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 210.
Zarte Nelkenlilie. W.
*Habitat* Monſpelii *prope Caſtelneuf locis montoſis ſaxoſis ſterilibus.*
Radix *repens. Culmi nudi, ſimplices, cincti baſi vaginis uti Iuncus. Gluma bivalvis, biflora; Gluma propria etiam bivalvis. Iuncus eſſet, ſi Corolla careret.*

## 626. ALLIUM.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 557.

*Cor.* 6-partita, patens. *Spatha* multiflora. *Umbella* congeſta. *Capſ.* ſupera.
* *Fol. caulina plana. Umbella capſulifera.*

1. ALLIUM *Ampelopraſum.*
A. caule planifolio umbellifero, umbella globoſa ſtaminibus tricuſpidatis, petalis carina ſcabris. *Sp. pl.* 423. *Hoffm. germ.* 115.
A. radice ſobolifera, foliis gramineis, ſpica ſphaerica, ſtaminibus alterne trifidis. *Hall. helv. n.* 1218. R.
A. ſtaminibus alterne trifidis, foliis gramineis, floribus ſphaerice congeſtis, radice laterali ſolida. *Hall. all.* 5. *opuſc.* 344.
Porrum Ampelopraſum. *Mill. dict n.* 2.
Porrum radice laterali ſolida, foliis linearibus. caule erecto, umbella ſubgloboſa. *Roy. lugdb.* 40.
Allium ſphaerico capite, folio latiore ſ. Scorodopraſum alterum. *Bauh. pin.* 74. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 151.*

Scorodoprasum latifolium spontaneum italicum, floribus dilute purpureis odoratis. *Mich. gen. 25. t. 24. f. 5.*
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 203.
Breitblättriges Lauch. W.
*Habitat in* Oriente, *inque insula* Holms *Angliae etc.* 24
*Stamina corolla paulo longiora.* Synonymon *Micheli excludere jubet Linnaeus (Syst. Veg.); citatur tamen ab Hallero.* R.

## 2. ALLIUM *Porrum.*

A. caule planifolio umbellifero, staminibus tricuspidatis, radice tunicata. *Hort. upsl.* 77. *Mat. med. p.* 92.
A. radice abeunte tunicata, foliis gramineis, spica sphaerica, staminibus alterne trifidis. *Hall. helv. n.* 1217.
A. staminibus alterne trifidis, foliis gramineis, floribus sphaerice congestis, radice tunicata cauli circumnata. *Hall. all.* 7.
Porrum radice ambiente tunicata oblonga solitaria. *Hort. cliff.* 136. *Roy. lugdb.* 40.
Porrum commune capitatum. *Bauh. pin.* 72. *Blackw. t.* 421.
Porrum sativum latifolium. *Bauh. pin.* 72.
Porrum sativum. *Mill. n.* 1.
Porrum. *Camer. epit.* 321.
β. Porrum sectile. *Matth.* 550. *Hall.* R.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 204.
Gemeines Lauch. W.
*Habitat in vineis* Helvetiae. ♂ (v. v.)
*Affinis nimium praecedenti et forte sola varietas. Petala carina scabra.*

## 3. ALLIUM *lineare.*

A. caule planifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus tricuspidatis corolla duplo longioribus. *Mill. dict. n.* 4.
A. staminibus alterne trifidis, radice tunicis reticulatis obducta. *Hall. all.* 9.
Porrum caule tereti foliosо, foliis linearibus planis, umbella globosa, staminibus corolla longioribus. *Gmel. sibir.* 1. *p.* 56. *t.* 13. *et* 14. *f.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 206.
Linienblättriges Lauch. W.
*Habitat in* Sibiria. 24 (v. s.)

*4. ALLIUM *fuaveolens.*

A. caule planifolio umbellifero, umbella capitata, ſtaminibus ſubulatis corolla duplo longioribus. W.

A. (*fuaveolens*) ſcapo nudo teretiuſculo, foliis linearibus carinatis, umbella ſubrotunda, ſtaminibus ſubulatis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 364. *Collect.* 2. *p.* 305. *

Wohlriechendes Lauch. W.

*Habitat in* Auſtria. 4. (v. ſ.)

*5. ALLIUM *deflexum.* W.

A. caule planifolio umbellifero, ſtaminibus tricuſpidatis, longitudine corollae, foliis anguſto-linearibus, ſcapo declinato. W.

Schiefſtieliges Lauch. W.

*Habitat* - - - - 4 (v. v.)

*Hoc ſub nomine A. linearis accepi, ab hoc vero valde diſtinctum; at convenit habitu cum ſequenti, ſed valde diverſum*: ſcapo *adſcendenti deflexo, folio unico inſtructo*, foliis *anguſtiſſimis linearibus*, umbella *non capitata*, floribus *pallidioribus et* ſtaminibus *corollae longitudine.* W.

6. ALLIUM *rotundum.*

A. caule planifolio umbellifero, ſtaminibus tricuſpidatis, umbella ſubgloboſa, floribus lateralibus nutantibus. *Pollich. pal. n.* 325. *Roth. germ. I.* 145. *II.* 379. *Hoffm. germ.* 115.

A. radice multiplici, foliis gramineis, ſpica ſphaerica, ſtaminibus alterne trifidis. *Hall. helv. n.* 1219. *de all.* 350. *n.* 8.

A. ſeu Moly montanum 5. *Cluſ. pann.* 216. 218. *Haller.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 207.

Rundes Lauch. W.

*Habitat in* Europa *auſtraliori*, *in* Thuringia, Palatinatu. 4 (v. ſ.)

Stamina *corolla longiora.* Petala *atro-ſanguinea conniventia.* W.

7. ALLIUM *Victorialis.*

A. caule planifolio umbellifero, umbella rotundata, ſtaminibus lanceolatis corolla longioribus, foliis ellipticis. *Mat. med.* 92. *Mill. dict. n.* 17. *Iacq. auſtr. t.* 216. *Blackw. t.* 544. *Roth. germ. II.* 380.

A. radice oblonga, reticulo obducta, foliis ovato-lanceo-

latis, umbella ſphaerica. *Hall. helv. n.* 1229. *de all.* 20. R.

A. foliis caulinis lanceolatis, floribus umbellatis. *Roy. lugdb.* 39.

A. montanum latifolium maculatum. *Bauh. pin.* 74.

A. anguinum. *Cam. epit.* 329. *Matth.* 559.

A. alpinum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 566. R.

Victorialis longa. *Cluſ. pann.* 223. 224. *Hall.* R. *Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 208.

Netzwurzliches Lauch. W.

*Habitat in alpibus* Helvetiae, Italiae, Auſtriae, Sileſiae. 24 (v. v.)

*Huic Folia in toto genere latiſſima Colchici.*

## 8. ALLIUM *ſubhirſutum.*

A. caule planifolio umbellifero, foliis inferioribus hirſutis, ſtaminibus ſubulatis. *Osb. it.* 49. *Mill. dict. n.* 16.

A. foliis radicalibus ſubhirſutis, caulinis glabris, floribus umbellatis. *Hall. all.* 18.

A. foliis lanceolato-linearibus, florum umbella faſtigiata. *Roy. lugdb.* 39.

Moly anguſtifolium umbellatum. *Bauh. pin.* 75.

Moly dioſcoridis. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 192.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 211.

Behaartes Lauch. W.

*Habitat in* Africa, Italia, Hiſpania, Oriente. 24 (v. f.)

## 9. ALLIUM *magicum.*

A. caule planifolio umbellifero, ramulo bulbifero, ſtaminibus ſimplicibus. *Mill. dict. n.* 6.

A. caule tereti, propagine ex ala. *Hort. cliff.* 137. *Roy. lugdb.* 39. *Sauv. monſp.* 18.

A. foliis caulinis lanceolatis, floribus umbellatis, ex ala bulbiferum. *Hall. all.* 19.

Moly latifolium liliflorum. *Bauh. pin.* 75.

Moly indicum, flore purpureo. *Swert. Fl.* 61.

β. Caucaſon. *Lob. ic.* 162.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 212.

Zauber Lauch. W.

*Habitat* - - - - 24

*Caulis teres, nudus, pedalis, infirmus. Folia radicalia canaliculata, ampla, obtuſa. Capitulum bulbiferum. Sauv.*

10. ALLIUM *obliquum.*

A. caule planifolio umbellifero, ſtaminibus filiformibus flore triplo longioribus, foliis obliquis. *Mill. dict. n.* 7. *Kniph. cent.* 9. *n.* 4.

Allium ramoſum. *Jacq. ic. rar.* 1. *t.* 62. *Miſc.* 2. *p.* 308.*

A. radice tunicata, foliis planis linearibus caulinis, capitulo umbellato. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 49. *t.* 9. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 212.

Schiefblättriges Lauch. W.

*Habitat in* Sibiria. 2 (v. v.)

Caulis *bipedalis, teres.* Folia *alterna, plano-canaliculata, obliqua: Vaginis teretibus.* Umbella *globoſa*; Spatha *globoſa, purpurea, acuminata.* Petala *ovata, erecta, concava, flava carina viridi.* Filamenta *albida, corolla duplo longiora. Antherae luteae.* Germen *ſubgloboſum.*

11. ALLIUM *ramoſum.*

A. caule ſubplanifolio umbellifero, ſtaminibus ſubulatis longioribus, umbella globoſa, foliis linearibus ſubconvexis. *Mill. dict. n.* 8. *Willich. obſ. bot. p.* 17.

A. umbellatum. *Hall. in Comm. Goett.* 1752. *p.* 337. *t.* 9. *et t.* 10. *f.* 2? *Willich.* R.

A. ſcapo nudo tereti farcto, foliis ſemicylindricis, ſtaminibus corolla longioribus. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 52. *t,* 11. *f.* 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 213.

Aeſtiges Lauch. W.

*Habitat in* Sibiria. *G. Demidoff.*

Caulis *ferme bipedalis, teres.* Folia *alterna, planiuſcula, canaliculata, ſubtus convexa, margine obtuſa.* Umbella *globoſa.* Petala *ovata, purpuraſcentia carina ſaturatiore.* Filamenta *purpurea, corolla parum longiora. Antherae violaceae.* Germen *ſubrotundum: maculis* 3, *viridibus. E medio caule ex ala folio oppoſita* Ramus *nudus, longitudine caulis.*

12. ALLIUM *tataricum.*

A. caule planifolio umbellifero, foliis ſemicylindricis, ſtaminibus ſimplicibus, umbella plana. *Linn. ſuppl.* 196.

Tatariſches Lauch. W.

*Habitat in* Sibiria. 2

Caulis *teres laevis ſemipedalis verſus baſin folioſus.*

Folia *ſemicylindrica canaliculata laevia, vix caule breviora.* Spatha *bivalvis ſubrotunda marceſcens.* Umbella *plana faſtigiata.* Corolla *plana alba; petalis lanceolatis ſubcarinatis.* Filamenta *baſi coalita petalis breviora.* Antherae *fuſcae.* Stylus *ſimplex albus longitudine ſtaminum.* Capſula *ſubrotunda obtuſa lateraliter triloba.*

13. ALLIUM *roſeum.*

A. caule planifolio umbellifero, umbella faſtigiata, petalis emarginatis, ſtaminibus breviſſimis ſimplicibus. *Syſt. Veg.* 266.

A. ſcapo nudo umbellifero, pedicellis brevibus, petalis ovalibus, ſtaminibus breviſſimis, foliis linearibus. *Sp. pl.* 2. *p.* 432. *Mill. dict. n.* 9.

A. caule planifolio umbellifero, umbella faſtigiata, filamentis ſimplicibus baſi dilatatis. *Ger. prov.* 150. *Gouan. monſp.* 166.

A. foliis enſiformibus, radice bulbillis ſtipata, floribus amplis umbellatis. *Sauv. monſp.* 42.

A. ſylveſtre ſ. Moly minus, roſeo amplo flore. *Magn. monſp.* 11. *t.* 10. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 166. *f.* 17. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 214.

Roſenfarbenes Lauch. W.

*Habitat* Monſpelii, Pedemonti *in vineis.* 4

Folia *linearia, plana, longitudine vix Scapi.* Scapus *teres, nudus.* Spatha *obtuſa.* Umbellae *radii pedunculares floribus breviores.* Petala *obovato-oblonga, obtuſa, atropurpurea, magna.* Stamina *ſimplicia, alba, breviſſima. Bulbi ad Fructum nulli.* Flores *majores, quam in reliquis.*

* * *Fol. caulina plana. Umbella bulbifera.*

14. ALLIUM *ſativum.*

A. caule planifolio bulbifero, bulbo compoſito, ſtaminibus tricuſpidatis. *Hort. upſ.* 76. *Mat. med. p.* 92. *Mill. dict. n.* 1.

A. radicis bulbo multipartito, capitulo bulbifero, foliis linearibus. *Hort. cliff.* 137. *Roy. lugdb.* 39.

A. ſtaminibus alterne trifidis, foliis gramineis, capite bulbifero, radicibus in unum bulbum congruentibus. *Hall. all.* 1.

A. ſativum. *Bauh. pin.* 73.

Allium. *Cam. epit.* 328.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 215.
Starkriechendes Lauch. W.
*Habitat in* Sicilia. 4 (v. v.)

15. ALLIUM *Scorodopraſum.*
A. caule planifolio bulbifero, foliis crenulatis: vaginis ancipitibus, ſtaminibus tricuſpidatis. *Hort. upſ.* 77. *Mill. dict. n.* 2. *Scop. carn. n.* 396. *Pollich. pal. n.* 326. *Roth. germ. I.* 145. *II.* 381. *Hoffm. germ.* 116.
A. capitulo bulboſo erecto, foliis planis ſubcrenatis: vaginis ancipitibus. *Fl. ſuec.* 266. 278.* *It. Oel.* 60.
β. A. ſtaminibus alterne trifidis, capite bulbifero, ſcapo ante maturitatem contorto. *Hall. all.* 2.
Allium ſativum alterum ſ. Alliopraſum caulis ſummo circumvoluto. *Bauh. pin.* 73.
Allii genus Ophioſcorodon dictum quibusdam. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 599.
Porrum radice laterali cordata ſolida, pedunculo revoluto, capite bulbifero. *Hort. cliff.* 136.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 217.
Rockenbollen Lauch. W.
*Habitat in* Oelandia, Dania, Pannonia, Germania. 4 (v. v.)

16. ALLIUM *arenarium.*
A. caule planifolio bulbifero, vaginis teretibus, ſpatha mutica, ſtaminibus tricuſpidatis. *It. ſcan.* 227. *Fl. ſuec.* 2. 279.* *Oed. dan. t.* 290. *Mill. dict. n.* 10. *Roth. germ. I.* 146. *II.* 381.
A. foliis ciliatis, umbella bulbifera, ſtaminibus alterne trifidis. *Hall. helv. n.* 1222.
A. ſtaminibus alterne trifidis, capite bulbifero, foliis gramineis leviter ſerratis. *Hall. all. n.* 3.
Porrum planifolium, ſtaminibus alterne trifidis, umbella bulbifera. *Rupp. ed. Hall.* 154. *t.* 2. *f.* 2.
Allium montanum bicorne latifolium, flore dilute purafcente. *Bauh. pin.* 74.
A. ſeu Moly montanum latifolium. *Cluſ. pann. p.* 212. *Hall.* R.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 218.
Sand Lauch. W.
*Habitat in* Thuringia, Helvetia, Scania. 4
Caulis *ante antheſin cernuus.*
Scopoli *et* Pollich *nomen Halleri ad praecedens Allium amandant; ſi recte, pleraque ſynonyma illuc re-*

*ferenda.* Tabula 290 *flor. dan. nomen* A. Scorodoprasi *gerit, a Linneo tamen ad A. arenarium citatur. Forsan* A. Scorodoprasum *et* arenarium *una eademque planta est.* R.

17. ALLIUM *carinatum.*

A. caule planifolio umbellifero, staminibus subulatis. *Fl. suec.* 2. *n.* 281. *Mill. dict. n.* 11. *Scop. carn. n.* 397. *Pollich. pal. n.* 327. *Roth. germ. I.* 146. *II.* 382. *Hoffm. germ.* 116.

A. umbella bulbifera, vagina bicorni, foliis carinatis. *Hall. all.* 27. *t.* 2. *f.* 2.

A. bulbo fobolifero, foliis succulentis, spatha bicorni, umbella bulbifera. *Hall. helv. n.* 1224.

A. sylvestre bicorne purpureum proliferum. *Bauh. hist.* 2. *p.* 561. R.

Ampeloprasum proliferum. *Lob. ic.* 156. *

ß. Allium montanum bicorne angustifolium, flore dilute purpurascente. *Bauh. pin.* 74.

Allium s. Moly montanum 2. *Clus. hist.* 1. *p.* 193.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 219.

Getraide Lauch. W.

*Habitat in* Germania, Helvetia, Carniolia. 4 (v. v.)

Spatha *longissima.*

* * * *Fol. caulina teretia. Umbella capsulifera.*

18. ALLIUM *Sphaerocephalon.*

A. caule teretifolio umbellifero, foliis semiteretibus, staminibus tricuspidatis corolla longioribus. *Mill. dict. n.* 12. *Roth. germ. I.* 146 *II.* 382. *Hoffm. germ.* 116.

A. radice gemella, foliis fistulosis, capite sphaerico, staminibus alterne trifidis. *Hall. helv. n.* 1220. *secundum Pollich, quod vero synonymon excludere jubet Linnaeus in Syst. Veget. ed Murray. p.* 266.

Allium s. Moly montanum, purpureo flore. *Clus. hist.* 1. *p.* 195.

Allii genus forte Scorodoprasum alterum. *Bauh. hist.* 2. *p.* 564.

Scorodoprasum montanum juncifolium, capite rotundo dilute janthino, floribus paucis. *Mich. gen.* 25. *t.* 24. *f.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 221.

Rundköpfiges Lauch. W.

*Habitat in* Italia, Sibiria, Helvetia, Germania. 4

19. ALLIUM *parviflorum.*

A. caule subteretifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus simplicibus corolla longioribus, spatha subulata. *Sp. pl.* 427.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* II. *p.* 221.
Kleinblütiges Lauch. W.
*Habitat in* Europa *australi.* 4

*Facies A. sphaerocephali.* Bulbus *oblongus, tunicatus.* Caulis *teres, striatus, foliosus.* Folia *longitudine fere caulis subulata.* Umbella *globosa*: Floribus *minimis.* Petalis *exterioribus ovatis, tristioribus; interioribus duplo longioribus, lanceolatis, purpurascentibus.* Stamina *simplicia, corolla longiora, uti etiam Stylus.* Spatha *subulata, corolla longior, diphylla. Adeoque simillimum A. sphaerocephalo, sed stamina simplicia.*

*20. ALLIUM *Pallasii.*

A. caule subteretifolio umbellifero difformi, staminibus simplicibus corollam aequantibus, stylo brevissimo. *Murr. Comm. goett.* 6. 1775. *p.* 32. *t.* 3.*
Pallasisches Lauch. W.
*Habitat in* Sibiria. 4

Bulbus *globosus solitarius tunicatus magnitudine nucis avellanae exiguae.* Caulis *teres sesquipedalis gracilis foliosus.* Folia *semitereti-subulata longa caule breviora alterna.* Vagina *pallide striata, lineis prominentibus violaceis.* Spatha *diphylla umbella dimidio brevior, valvis ampliatis acuminatis.* Umbella *multiflora rotundata capsulifera interspersis floribus quibusdam abortientibus.* Pedunculi *supra incrassati longissimi pollicares purpurei.* Corolla *exigua purpurea, petalis ovato-lanceolatis aequalibus, carina profundius colorata.* Stamina *corollae aequalia*, filamentis *subulatis purpureis*, antheris *fuscis.* Pistillum *stylo brevissimo.* Capsula *triquetra.* Murr. l. c.

21. ALLIUM *descendens.*

A. caule subteretifolio nmbellifero, pedunculis exterioribus brevioribus, staminibus tricuspidatis. *Hort. upsl.* 78. *Mill. dict. n.* 100.
A. staminibus alterne trifidis, foliis fistulosis, capite sphaerico non bulbifero atropurpureo. *Hall. all. n.* 11. *t.* 2. *f.* 1.
A. f. Moly latifolium, capite sphaerico, flore purpureo. *Rudb. elys.* 2. *p.* 160. *f.* 20.

Moly atropurpureum. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 165. *f.* 13. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 222.
Violetes Lauch. W.
*Habitat in* Helvetia. 4 (v. v.)

22. ALLIUM *moſchatum.*
A. caule teretifolio umbellifero, umbella faſtigiata ſubſexflora, petalis acutis, ſtaminibus ſimplicibus, foliis ſetaceis. *Sp pl.* 427.
A. foliis teretibus caulinis, floribus umbellatis. *Hall. all.* 17.
Moly moſchatum, capillaceo folio. *Bauh. pin.* 76. *prodr.* 28. *t.* 28. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 166. *f.* 14. *Sauv. monſp.* 10. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 223.
Biſam Lauch. W.
*Habitat in* Galloprovinciae, Narbonae, Hiſpaniae *apricis elevatis.*

23. ALLIUM *flavum.*
A. caule teretifolio umbellifero, floribus pendulis, petalis ovatis, ſtaminibus corolla longioribus. *Mill. dict. n.* 13. *Jacq. auſtr. t.* 141.
A. foliis teretibus, vagina bicorni, umbella lutea pendula. *Hall. opuſc.* 24.
A. juncifolium bicorne luteum. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 157. *f.* 6.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 223.
Gelbes Lauch. W.
*Habitat* Monſpelii, *in* Auſtria. 4 (v. v.)
Caulis *folioſus, teres rore glauco.* Folia *teretia, ſupra baſin planiuſcula.* Spathae *valvula altera foliacea, umbella duplo longior.* Umbella *pedicellis pendulis, flavis.* Petala *flaviſſima, ovata, obtuſa, concava, erecta.* Stamina *ſimplicia, corollis duplo longiora.* Stylus *brevis.*

24. ALLIUM *pallens.*
A. caule ſubteretifolio umbellifero, floribus pendulis truncatis, ſtaminibus ſimplicibus corollam aequantibus. *Gouan. illuſtr.* 24.
A. umbella non bulbifera lutea, vagina bicorni, foliis teretibus. *Hall. all.* 21.
A. montanum bicorne, flore pallido odoro. *Bauh. pin.* 75.
Gethioides ſylveſtre. *Colum. ecphr.* 2, *p.* 6. *t.* 7. *f.* 2.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 224.

Bleiches Lauch. W.

*Habitat in* Italia, Hiſpania, Monſpelii, Pannonia. 4 (v. v.)

Caulis *bipedalis, teres, laevis.* Folia *alterna, ſemiteretia, fiſtuloſa, heptagona, erecta.* Spatha *ſubulata, nervoſa.* Corolla *campanulata, truncata, alba*; Petalis *obovatis, obtuſiſſimis, erectis, concauis, carina viridi.* Stamina *ſimplicia, longitudine petalorum.* Flores *mox a floreſcentia pendent.* Stylus *vix ullus, poſt antheſin excreſcens, breviſſimus.*

25. ALLIUM *paniculatum.*

A. caule ſubteretifolio umbellifero, pedunculis capillaribus effuſis, ſtaminibus ſimplicibus, ſpatha longiſſima. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 398. *Hoffm. germ.* 116.

A. radice duplici, foliis ſucculentis, ſpatha bicorni, umbellae radiis pendulis. *Hall. helv. n.* 1225.

A. foliis teretibus, vagina bicorni, umbella pendula ſuave purpurea. *Hall. opuſc.* 386. *n.* 25. *cum ic.*

A. montanum bicorne, floribus triquetris purpureis, pedunculis longis et reflexis. *Segu. ver.* 2. *p.* 70.

*Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 225.

Rispenförmiges Lauch. W.

*Habitat in* Sibiria, Auſtria, Italia, Helvetia, Carniolia, Oriente. 4 (v. ſ.)

Folia *ſubulata, canaliculata.* Flores *pedunculis capillaribus, longiſſimis, laxis.* Petala *purpurea, obovata, longitudine ſtaminum.* Spatha *apice ſubulato, longiſſimo.* *Cum* pallente *jungit Gerard.*

26. ALLIUM *vineale.*

A. caule teretifolio bulbifero, ſtaminibus triculſpidatis. *Pollich. pal. n.* 329. *Roth. germ. I.* 146. *II.* 383. *Hoffm. germ.* 117.

A. radice multiplici, foliis fiſtuloſis, capite ſphaerico, bulbifero, ſtaminibus alterne trifidis. *Hall. helv. n.* 1221.

A. ſtaminibus alterne trifidis, foliis fiſtuloſis, capite bulbifero, radice multiplici. *Hall. all.* 4.

A. ſylveſtre campeſtre purpuraſcens. *Bauh. pin.* 74.

A. campeſtre juncifolium capitatum purpuraſcens majus et minus. *Bauh. pin.* 74.

A. ſylveſtre 1. *Fuchſ.* 737. *Hall.* R.

A. ſylveſtre tenuifolium. *Dodon.* 683. *Lob. ic.* 156.

Porrum ſylveſtre vinearum. *Bauh. pin.* 72.

β. Porrum ſylveſtre, gemino capite. *Bauh. pin.* 72. *Moriſ. hiſt.* 391. *ſ.* 4. *t.* 15. *f.* 4.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 226.
Acker Lauch. W.
*Habitat in* Germania, Helvetia. 4 (v. v.)
*Capitulum arctum bulbis acuminatis recurvis, ſaepe in longiora acumina crinitis. Corollae parvae, violaceae. Stamina ſetis duabus longis, extra florem eminentibus.*

27. ALLIUM *oleraceum.*

A. caule teretifolio bulbifero, foliis ſcabris ſemiteretibus ſubtus ſulcatis, ſtaminibus ſimplicibus. *Gort. ingr.* 49. *Schreb. ſpicil. p.* 37. *Roth. germ. I.* 146. *II.* 383. *Hoffm. germ.* 117.
A. umbella bulbifera, vagina bicorni, foliis teretibus. *Hall. all. n.* 26. *f.* 2.
A. bulbo ſimplici, foliis fiſtuloſis, ſpatha bicorni, umbella bulbifera. *Hall. helv. n.* 1223.
A. bicorne, proliferum, flore intus albeſcente, cum ſtria purpuraſcente. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 560. *Hall.* R.
A. ſylveſtre bicorne, flore viridi. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 561. *Hall.* R.
A. ſ. Moly montanum 3. *Cluſ. pann.* 213. 215. *Hall.* R.
Cepa capitulo bulboſo prolifero, foliis ſemiteretibus novemangularibus ſcabris fiſtuloſis. *Fl. ſuec.* 265. 280. *
Porrum radice ſolida, caule erecto, capitulo bulbifero. *Roy. lugdb.* 40. *Gort. geldr.* 69.
Allium montanum bicorne, flore exalbido. *Bauh. pin.* 75. *Rudb. elyſ.* 156.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 227.
Gemüſe Lauch. W.
*Habitat in* Suecia, Germania, Helvetia, Ingria. 4.
Folia *fiſtuloſa.*

* * * * Folia *radicalia.* Scapus *nudus.*

28. ALLIUM *nutans.*

A. ſcapo nudo ancipiti, foliis linearibus planis, ſtaminibus triculſpidatis. *Hort. upſ.* 80.
A. ſtaminibus alterne trifidis, foliis latiſſimis, capite ſphaerico, radice laterali ſolida. *Hall. all.* 6.
Porrum ſcapo nudo ancipiti, antequam floruerit nutante, foliis enſiformibus: hinc paullo convexioribus. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 55. *t.* 12.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 229.
Hängendes Lauch. W.
*Habitat in* Sibiria. 4 (v. v.)
Staminum *dentes in antiquo obliterantur. Variat aetate et loco prae reliquis, ut vix dignoſcatur.*

29. ALLIUM *aſcalonicum.*
A. ſcapo nudo tereti, foliis ſubulatis, umbella globoſa, ſtaminibus tricuſpidatis. *Sp. pl.* 429.
Cepa foliis ſubulatis, radicibus oblongis conglobatis. *Hort. cliff.* 36. *Hort. upſ.* 79.
Cepa aſcalonica. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 383. *ſ.* 4. *t.* 14. *f.* 3. *Mill. dict.*
Cepa ſterilis. *Bauh. pin.* 72.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 230.
Scharlotten Lauch.
*Habitat in* Palaeſtina. *Haſſelquiſt.* 4. (v. v.)
*Statura fere A. Schoenopraſi.* Scapus *ſubnudus, teres, ſpithamaeus et ultra.* Spatha *membranacea.* Umbella *globoſa, floribus A. Schoenopraſi minoribus.* Petala *erecta, ovato-lanceolata, coerulea, carina atrocoerulea.* Stamina *longitudine petalorum: alternis latiſſimis apice trifidis.* Antherae *flavae.* Stylus *ſtigmate obtuſo.*

30. ALLIUM *ſeneſcens.*
A. ſcapo nudo ancipiti, foliis linearibus ſubtus convexis laevibus, umbella ſubrotunda, ſtaminibus ſubulatis. *Hort. upſ.* 79. *Mill. dict. n.* 14. *Kniph. cent.* 8. *n.* 5. *Hoffm. germ.* 117. *Roth. germ. II.* 385.
A. caule ancipiti teretiuſculo, foliis enſiformibus: hinc paulo convexioribus. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 53. *t.* 11. *f.* 2.
A. foliis linearibus, florum umbella ſubgloboſa. *Roy. lugdb.* 39.
A. radice bulboſa, foliis gramineis, umbella erecta non bulbifera, vaginis breviſſimis. *Hall. all.* 19. *n.* 2.
A. narciſſifolium. *Scop. carn.* 2. *n.* 400. R.
A. umbelliferum pratenſe. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 564. *Hall. R.*
A. ſeu Moly, Narciſſinis foliis. 1. *Cluſ. pann.* 220. 221. *Hall. R.*
A. montanum, foliis narciſſi, majus. *Bauh. pin.* 75.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 231.
Grauwerdendes Lauch. W.
*Habitat in* Sibiria, Silicia, Sileſia, Helvetia. 4 (v. ſ.)
*Petala erecta, a ſe invicem dehiſcentia ſ. diſtantia.*

*canaliculata, inflexa. Folia obliqua et Stamina corollae paullo longiora huic, non vero A. nigro.*

*Cum* A. anguloso *conjungunt Hallerus, Scopolius.* R.

* 31. ALLIUM *illyricum.*

A. scapo nudo tereti, foliis lineari-lanceolatis planis, umbella fastigiata, staminibus subulatis. W.

A. scapo nudo tereti, foliis sublinearibus basi canaliculatis, caeterum planis cum dorso subcarinato, umbella fastigiata. *Jacq. ic. 2. t.* 365. *Collect.* 3. *p.* 273.*

Allium roseum. *Host. synop.* 183. *descriptio nec synonyma.*

Illyrisches Lauch. W.

*Habitat in vineis et olivetis* Austriae *littoralis.* 4 (v. s.)

32. ALLIUM *odorum.*

A. scapo nudo teretiusculo, foliis linearibus canaliculatis subtus angulatis, umbella fastigiata. *Mant.* 62. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 233.

Gutriechendes Lauch. W.

*Habitat in* Europa *australi.* 4 (v. v.)

Folia *basi connexa in culmum s. fasciculum stipitatum, linearia, longa, vix carnosa, subtus striata, supra canaliculata, minime hirsuta.* Scapus *pedalis, teres, vel unico obscuro angulo, aphyllus, erectus, pedalis.* Spatha *brevis, cum rudimentis spathaceis s. membranaceis inter omnes pedunculos.* Pedunculi *plurimi, erecti, floribus longiores.* Corollae *albae, odoratae: petalis ovato-oblongis, acutiusculis, erectiusculo-patulis, carina rufescente.* Stamina *subulata, simplicia, corolla dimidio breviora.* Germen *punctis excavatis, cinereum. Stylus albus.* H. V.

* 33. ALLIUM *inodorum.*

A. scapo nudo subtriquetro, foliis linearibus planis subtus carinatis, umbella fastigiata florifera, staminibus simplicibus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 427.

Geruchloses Lauch. W.

*Habitat in* Carolina. 4 (v. v.)

*Simile sequenti, sed duplo major et notis indicatis distinctum.* W.

34. ALLIUM *angulosum.*

A. scapo nudo ancipiti, foliis linearibus canaliculatis subtus subangulatis, umbella fastigiata. *Hort. upsal.* 79. * *Mill. dict. n.* 15. *Hoffm. germ.* 117. *Roth. germ. I.* 147. *II.* 384. *Jacq. austr.* 5. *p.* 11. *t.* 423.

Cepa ſcapo nudo ſubangulato farcto, foliis linearibus ſubtus angulosis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 58. *t.* 14. *f.* 2.

A. radice ſeneſcente lignoſa, transverſa, foliis radicalibus gramineis, floribus umbellatis. *Hall. helv. n.* 1227. *var.* a.

A. radice ſeneſcente lignoſa transverſa, umbella erecta. *Hall. all.* 19.

A. petraeum umbelliferum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 564. *t.* 564.

A. montanum, foliis narciſſi, minus. *Bauh. pin.* 75. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 11. *p.* 233.

Eckiges Lauch. W.

*Habitat in* Sibiriae, Germaniae *humidinſculis.* 4 (v. v.)

Folia *interdum ſubtus vix angulata, at* Scapus *ſuperne parum angulato-ſtriatus;* Petala *interiora apice patentia, omnia lateribus conniventia.*

Hallerus *dubitat, an ſatis ſit diverſum ab* A. ſeneſcente? *certiſſime diſtincta ſpecies, utramque ultra* 20 *annos alui.*

* 35. ALLIUM *ſtriatum.*

A. ſcapo nudo ſubtriquetro foliis linearibus ſubtus ſtriato-ſulcatis breviore, umbella faſtigiata, petalis obtuſis, ſtaminibus ſimplicibus. W.

A. ſcapo nudo obſolete triquetro, foliis linearibus obliquis ſubcanaliculatis ſubtus ſtriatis, umbella faſtigiata pauciflora. *Jacq. ic.* 2. *t.* 366. *Collect. ſuppl.* 51.*

Geſtreiftes Lauch. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

* 36. ALLIUM *narciſſiflorum.*

A. ſcapo nudo tereti, foliis lineari-ſubulatis longiore, umbella faſtigiata, petalis mucronatis, ſtaminibus ſimplicibus. W.

A. caule nudo tereti, umbella terminali inclinata, petalis lanceolatis, ſtaminibus ſimplicibus brevioribus. *Villars. delph.* 2. *p.* 258. *t.* 6.*

Narciſſenblütiges Lauch. W.

*Habitat in* Galliae *auſtralis montibus.* 4

Stamina *corolla breviora.* W.

* 37. ALLIUM *pedemontanum.* W.

A. ſcapo ſubtetragono, foliis linearibus obtuſis, umbella pauciflora. W.

Allium nigrum. *Allion. pedem. n.* 1881. *t.* 25. *f.* 1.

Piemonteſiſches Lauch. W.
*Habitat in alpibus* Pedemontanis. 24 (v. ſ.)

Bulbus *oblongus*. Folia *radicalia linearia obtuſa glabra carinata ſcapo breviora*. Scapus *pedalis compreſſo-tetragonus glaber*. Spatha *bivalvis membranacea diaphana alba nervoſa, valvulis apice bifidis*. Flores *umbellati* 10-15. Petala *oblonga obtuſa apice acuta. Simile A. narciſſiflоro, ſed differt*: foliis *linearibus obtuſis, nec apice ſubulatis*; ſcapo *ſubtetragono, nec tereti*; petalis *obtuſis apice acutis, nec ovato-lanceolatis mucronatis. Ab A. nigro diſtinctum*: foliis *linearibus, nec lanceolatis*; umbellis *pauciſloris, nec multiſloris, hemiſphaericis, denique odore Allii, quum A. nigrum plane inodorum*. W.

## 38. ALLIUM *nigrum*.

A. ſcapo nudo tereti, foliis lanceolatis, umbella hemiſphaerica, petalis patentibus, ſtaminibus ſimplicibus. W.

A. ſcapo nudo tereti, foliis linearibus, umbella hemiſphaerica, petalis erectis, ſpatha mucronata bifida. *Sp. pl.* 430. *Retz. obſ.* 1. *p.* 15. * *et* 6. *p.* 27.

A. (*multibulboſum*) ſcapo nudo tereti, foliis lanceolato-elongatis ſeſſilibus, umbella faſtigiata, petalis omnibus patentiſſimis. *Murr. ſyſt.* 323. *Jacq. auſt.* 1. *p.* 9. *t.* 10.

A. (*monſpeſſulanum*) ſcapo tereti ſolido, umbella faſtigiata, petalis linearibus, foliis lanceolatis, ſtaminibus ſubulatis. *Gouan. illuſt.* 24. *t.* 16. *

A. montanum bicorne latifolium, flore magno dilute purpuraſcente. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 160. *ſ.* 21. *Burſ. Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 235.

Schwarzes Lauch. W.
*Habitat* Algiriae *inque* Galloprovincia. 24 (v. v.)

Folia *radicalia, plana, quaterna, lanceolato-linearia*. Germen *fuſcum*. Petala *alba*. Folia *pollicem lata*.

## 39. ALLIUM *canadenſe*.

A. ſcapo nudo tereti, foliis linearibus, capitulo bulbifero. *Kalm. it.* 3. *p.* 79. *Mill. dict. n.* 19.

A. bulbiferum virginianum. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 146. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 235.

Canadiſches Lauch. W.
*Habitat in* Canada. 24

Radix *perennis*. Folia *linearia, plana, laevia, recta, ſpithamea*. Scapus *ſubnudus, teres, laevis, vix foliis longior*. Spatha *ovata, mucronata, acutiuſcula*. Capitulum *ex bulbis*. Floſculi *pauci, pedicellati, albidi*: *Petalis ovalibus*. Stamina *ſimplicia, longitudine corollae*. *Antherae rufeſcentes*.

40. ALLIUM *urſinum*.

A. ſcapo nudo triquetro, foliis lanceolatis petiolatis, umbella faſtigiata. *Mill. dict. n.* 3. *Scop. carn. n.* 401. *Hoffm. germ.* 117. *Roth. germ. I.* 147. *II.* 385. *Flor. dan. t.* 757.

A. foliis radicalibus petiolatis, ovato-lanceolatis, floribus umbellatis. *Hall. helv. n.* 1228.

A. foliis lanceolatis, ſcapo nudo ſemicylindraceo, bulbo ſetis obvallato. *Fl. ſuec.* 163, 277. *It. gotl.* 169.

A. foliis radicalibus petiolatis, floribus umbellatis. *Roy. lugd.* 39. *Hall. all.* 21. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 49.

A. ſylveſtre latifolium. *Bauh. pin.* 74.

A. ſylveſtre latioris folii ſ. Allium urſinum. *Dod. pempt.* 683. *Hall.* R.

A. urſinum. *Fuchſ. hiſt.* 739. *Cam. epit.* 330. *Lob. ic.* 159.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 236.

Bären Lauch. W.

*Habitat in* Europae *ſeptentrionalioris nemoroſis, roridis*. 4 (v. v.)

* 41. ALLIUM *cluſianum*.

A. ſcapo nudo tereti, foliis linearibus planis ciliatis, umbella pauciflora, petalis obovatis concavis. *Retz in litt.*

Moly Minus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 192. *figura bona*.

Cluſiſches Lauch. W.

*Habitat in* Europa *auſtrali*. 4

Bulbus *parvus piſi magnitudine, candidus ovato-turbinatus, baſi bulbillos emittens fibrasque praelongas*. Folia *graminea lucida ſcapo longiora linearia plana, ſaepe ſpiralia, flaccida, margine pilis albidis ciliata*. Scapus *ſpithamaeus teres*. Spatha *ante floreſcentiam cylindrica ſubulata, demum irregulariter fiſſa marceſcens*. Umbella *pauciflora, pedunculis inaequalibus* $\frac{1}{2}$ - 1 *pollicaribus*. Corolla *candida patens inodora*. *Petala obovata rotundata cava, extus carinata, tria alternalatiora*. Stamina *ſimpliciſſima lon-*

*gitudine petalorum, candida.* Germen *pallide viride.* Stylus *candidus.* Stigma *ſimplex.* Capſula *et* Semina *generis.* Bulbi *odor et ſapor cepaceus, foliorum contritorum debilior. Ab A. ciliato Cyrilli plane diverſum.* Retz. in Litt.

42. ALLIUM *triquetrum.*

A. ſcapo nudo, foliisque triquetris, ſtaminibus ſimplicibus. *Mill. dict. n.* 20. *Gouan. illuſtr.* 24. *Oſb. it.* 51.

A. caule triangulo. *Tournef. inſt.* 385. *Roy lugdb.* 39.

A. pratenſe, folio graminеo, flore prorſus albo, radice oblonga. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 159. *f.* 16.

Moly parvum, caule triangulo. *Bauh. pin.* 75.

Moly caule et foliis triangularibus. *Park. par.* 142. *t.* 143. *f.* 4.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 238.

Dreyeckiges Lauch. W.

*Habitat in* Hiſpania, circa Narbonam. *Gou.* 24 (v. ſ.)

Folia *Sparganii, triquetra ſ. enſiformia, valde curinata.* Scapus *erectus, triqueter, foliis brevior.* Spatha *lanceolata, bivalvis.* Umbella *longitudine Spathae.* Corolla *Petalis* 6, *lanceolatis, acuminatis, erectis, albis, carina obſolete viridi.* Stamina *et* Piſtilla *petalis dimidio breviora.* Antherae *flavae.* Stigma *acutum.*

43. ALLIUM *Cepa.*

A. ſcapo nudo inferne ventricoſo longiore foliis teretibus. *Hort. upſ.* 77. *Mat. med.* 93. *Regn. bot.*

A. ſtaminibus alterne trifidis, caule ad terram ventricoſo. *Hall. all.* 10.

Cepa. *Mill. dict.*

Cepa ſcapo nudo ventricoſo foliis longiore, radice depreſſa. *Hort. cliff.* 137. *Roy. lugdb.* 40.

Cepa vulgaris. *Bauh pin.* 71.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 239.

Gemeines Lauch. W.

*Habitat* - - - - - - 24 (v. v.)

44. ALLIUM *Moly.*

A. ſcapo nudo ſubcylindrico, foliis lanceolatis ſeſſilibus, umbella faſtigiata. *Hort. upſ.* 76. *Mill. dict. n.* 5.

A. foliis radicalibus ſeſſilibus lanceolatis, floribus umbellatis. *Roy. lugdb.* 38. *Hall. all.* 23.

A. foliis lanceolatis, umbella laxa. *Hort. cliff.* 72.
Moly latifolium luteum, odore allii. *Bauh. pin.* 75.
Moly flavo flore. *Swert. flor.* 1. *t.* 60. *f.* 2.
Moly montanum latifolium, flavo flore. *Cluſ. app. alt.*
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 250.
Goldfarbenes Lauch. W.
*Habitat in* Hungaria, Baldo, Monſpelii, Pyrenaeis. 4 (v. v.)
Petala *patentia, tria exteriora magis patentia, interiora erecta.*

45. ALLIUM *tricoccum.*

A. ſcapo nudo ſemitereti, foliis lanceolato-oblongis planis glabris, umbella globoſa, ſeminibus ſolitariis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 428.
Dreyſamiges Lauch. W.
*Habitat in* America boreali. 4

46. ALLIUM *fiſtuloſum.*

A. ſcapo nudo adaequante folia teretia ventricoſa. *Hort. upſ.* 78.
A. ſtaminibus ſimplicibus, caule medio ventricoſo. *Hall. all.* 13.
Cepa ſcapo longitudine foliorum, foliis ventricoſis, radice oblonga. *Hort cliff.* 136. *Roy. lugdb.* 40.
Cepa oblonga. *Bauh. pin.* 71. *Dod. pempt.* 687.
β. Allium altaicum. *Pall. itin.* 2. *app. n.* 108. *t. R.*
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 251.
Röhrenſtieliges Lauch. W.
*Habitat in* - - - β, in Sibiria. 4 (v. v.)
*Varietas β ſpecies vix diverſa. Nullam, praeter magnitudinem minorem, veram differentiam obſervare potui.* W

47. ALLIUM *Schoenopraſum.*

A. ſcapo nudo adaequante folia teretia ſubulato-floriformia. *Hort. upſ.* 78. *Gort. ingr.* 49. *Hoffm. germ.* 117. *Roth. germ. I.* 147. *II.* 386. *Kniph. cent.* 8. *n.* 4.
A. radice multiplici, foliis radicalibus teretibus, ſcapi longitudine, floribus umbellatis cylindricis. *Hall. helv. n.* 1226.
A. ſtaminibus ſimplicibus, foliis radicalibus teretibus ſcapi longitudine. *Hall. all.* 14.
Cepa ſcapis foliisque ſubulatis teretibus fiſtuloſis aequalibus, ſpathis globoſis. *Fl. ſuec.* 264. 282. *It. oel.* 54. 64.

Cepa ſcapo longitudine figuraque foliorum, foliis ſubulatis filiformibus, ſpathis globoſis. *Hort. cliff.* 136.
Porrum ſectivum juncifolium. *Bauh. pin.* 72.
Schoenopraſum. *Dod. pempt.* 689.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 255.
Suppen Lauch. W.
*Habitat in alpeſtribus* Sibiriae, Oelandiae, *locis rupeſtribus.* 24 (v. v.)

## 48. ALLIUM *ſibiricum.*

A. ſcapo ſubnudo tereti, foliis ſemiteretibus, ſtaminibus ſubulatis, petalis lanceolatis acutis. W.
A. ſcapo nudo tereti, foliis ſemicylindricis, ſtaminibus ſubulatis. *Mant.* 562. *Ait. Kew.* I. *p.* 429.
Allium Schoenopraſum *β. Sp. pl.* 433. *Murr. Nov. Comment. goett.* 6. 1775. *p.* 33. *t.* 4.
Allium roſeum. *Krock. Siles. n.* 505. *t.* 43.
Cepa ſcapis foliisque teretibus, capitulis pyramidatis. *Gmel. ſib.* I. *p.* 59. *t.* 15. *f.* 1.
Cepa paluſtris altiſſima. *Buxb. cent.* 4. *p.* 27. *t.* 45.
Cepa alpina paluſtris tenuifolia. *Tournef. inſt.* 383.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 254.
Sibiriſches Lauch. W.
*Habitat in* Sibiria, *inque montibus* Sileſiae. 24 (v. f.)

Folia *ſemicylindrica, ſubcanaliculata, minime angulata.* Scapi *teretes, foliis longiores.* Umbella *faſtigiata, florifera.* Spatha *parva, ovata, ſcarioſa.* Petala *ovata, ſinu obtuſo diſtincta, acuta, alba, carina vireſcente.* Stamina *ſubulata, corollis breviora.* Germen *cinereum.* Stigma *ſimplex.*

Petala *ſaepius acuminata. Haec et binae ſpecies praecedentes ſcapo gaudent folioſo.* W.

## *49. ALLIUM *ſtellerianum.* W.

A. ſcapo nudo tereti, foliis ſemicylindricis umbellis denſis, ſtaminibus ſubulatis corolla longioribus. W.
Cepa ſcapo nudo tereti inani, foliis ſemicylindraceis, capitulis ſpisſis multifloris. *Gmel. ſib.* I. *p.* 63. *t.* 16. *f.* 1. 2. *
Stellerſches Lauch. W.
*Habitat in* Sibiria *ad* Jeniſeam fluvium. 24 (v. f.)

## *50. ALLIUM *capillare.*

A. ſcapo nudo tereti, foliis capillaceis, umbella pauciflora, petalis lanceolatis acutis. W.

A. foliis radicalibus capillaribus ſcapo brevioribus. *Cavan. ic.* 3. *p.* 4. *t.* 206. *f.* 1. *
Haarblättriges Lauch. W.
*Habitat in regno* Valentino. 24 (v. ſ.)

51. ALLIUM *tenuiſſimum.*

A. ſcapo nudo tereti, foliis lineari-ſubulatis, umbella pauciflora, petalis ſubrotundo-ovatis obtuſis. W.
A. ſcapo nudo tereti inani, foliis ſubulatis filiformibus, capitulis laxis paucifloris. *Gmel ſibir.* 1. *p.* 61. *t.* 15. *f.* 2. 3.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 254.
Schmales Lauch. W.
*Habitat in* Sibiria.

Stamina *in hoc et praecedente corolla breviora.* W.

*52. ALLIUM *gracile.*

A. ſcapo nudo tereti longiſſimo, foliis linearibus canaliculatis, ſtaminibus ſubulatis baſi connatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 429.
Weſtindiſches Lauch. W.
*Habitat in* Jamaica. 24

Folia *narciſſina pedalia.* Scapus *tripedalis tenuis.* Petala *erecta alba unguiculata, ungues inferne cum ſtaminibus connata in tubum viridem. Forte ſui generis planta.* Ait. Kew. l. c.

53. ALLIUM *Chamae-Moly.*

A. ſcapo nudo ſubnullo, capſulis cernuis, foliis planis ciliatis. *Sp. pl.* 433. *Cavan. ic.* 3. *p.* 4. *t.* 207. *f.* 1. *
Moly humile, folio gramineo. *Bauh. pin.* 75. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 166. *f.* 15.
Chamae Moly an Moly dioſcoridis. *Column. ecphr.* 325. *t.* 326.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 259.
Zwerg Lauch. W.
*Habitat in* Italia, Hiſpania. 24

Saturnia *Marati.*

## 627. LILIUM.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 558.

*Cor.* 6-petala, campanulata: linea longitudinali nectarifera. *Capſ.* valvulis pilo cancellato connexis.

*1. LILIUM *cordifolium.*

L. foliis cordatis petiolatis. W.

Lilium (*cordifolium*) foliis cordatis. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 332.

Hemerocallis (*cordata*) foliis cordatis venoſis. *Thunb. jap.* 143. *

Sjire rectius Sjicoi et Osjiroi. *Kaemph. amoen.* 870. *Banks. icon. Kaempf. t.* 46.

Herzblättrige Lilie. W.

*Habitat in* Japonia. 2

*2. LILIUM *longiflorum.*

L. foliis ſparſis lanceolatis, corollis tubulato-campanulatis, caule glabro. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 333.

Lilium candidum. *Thunb. jap.* 133. *

Langblütige Lilie. W.

*Habitat in* Japonia *prope* Nagaſaki *et* Miaco. 2

Caulis *teres noduloſus glaber inanis erectus bipedalis.* Folia *ſparſa ſeſſilia lanceolata integra glabra trinervia baſi adpreſſa, apice recurva ſesquipollicaria.* Corollae *albae tubulato-campanulatae palmares erectae.* *Differt a L. candido*: foliis *baſilatioribus, apice acutioribus ſtrictioribus reflexis, non undatis.* Corolla *triplo longiori cylindrica.* *A L. bulbifero diſtinctum*: corolla *maxima alba*, caule *laevi tereti.* Thunb. Act. l. c.

*3. LILIUM *candidum.*

L. foliis lanceolatis ſparſis baſi attenuatis, corollis campanulatis intus glabris. W.

L. foliis ſparſis, corollis campanulatis: intus glabris. *Hort. cliff.* 120. *Hort. upſ.* 80. *Mat. med.* 93. *Roy. lugdb.* 30. *Gron. orient.* 105. *Mill. dict. n.* 1. *Ludw. ect. t.* 190. *Kniph. cent.* 7. *n.* 4. *Knorr. del.* 1. *tab. L. Blackw. t.* 11. *Hall. helv. n.* 1231.

L. album, flore erecto, vulgare. *Bauh. pin.* 76.

L. candidum. *Dod. pempt.* 197. *Camer. epit.* 570.

ε. L. album floribus dependentibus, ſ. peregrinum. *Bauh. pin.* 76.

L. (*peregrinum*) foliis ſparſis, corollis campanulatis cernuis, petalis baſi anguſtioribus. *Mill. dict. n.* 2.

γ. L. caule plano compreſſo. *Gron. orient.* 106.
Lilii albi pulchri et ignoti ſpecies. *Bauh. pin.* 76.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 261.
Weiſſe Lilie. W.
*Habitat in* Palaeſtina, Syria, Gades, Helvetia. 24 (v. v.)

*4. LILIUM *japonicum.*

L. foliis ſparſis lanceolatis, corollis cernuis ſubcampanulatis. *Thunb. jap.* 133.
Japaniſche Lilie. W.
*Habitat in* Japonia.

Caulis *teres ſimplex laevis glaber bipedalis.* Folia *alterna petiolata lanceolata acuminata integerrima marginata glabra ſesquipalmaria, ſubtus pallidiora trinervia et quinquenervia.* Flores *terminales reflexo-cernui.* Corolla *campanulata albida palmaris. Affine L. albo, differt vero:* foliis *paucis in caule, remotis longiſſimis petiolatis nervoſis, et* caule *debiliori uniflоro.* Thunb. l. c.

5. LILIUM *lancifolium.*

L. foliis ſparſis lanceolatis, corollis erectis ſubcampanulatis. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 333.
Lilium bulbiferum. *Thunb. jap.* 134.
Kentan. *Kaempf. amoen.* 871.
Lanzenblättrige Lilie. W.
*Habitat in* Japonia. 24

Caulis *angulatus hirſutus erectus ſimplex pedalis et ultra.* Folia *alterna ſeſſilia lanceolata glabra digitalia, ſuperiora ſenſim breviora.* Corollae *parvae unguiculares albae. Axillae foliorum ſuperiorum bulbiferae.* Thunb. Act. l. c.

6. LILIUM *bulbiferum.*

L. foliis ſparſis, corollis campanulatis erectis: intus ſcabris. *Hort. cliff.* 120. *Hort. upſ.* 80. *Roy. lugdb.* 31. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 41. *Gron. orient.* 104. *Mill. dict. n.* 3. *Jacq. auſtr. t.* 226. *Scop. carn. n.* 404. *Knorr. del.* 1. *t. I.* 4. *Hoffm. germ.* 118. *Roth. germ. I.* 152. *II.* 396. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 333. *
Lilium philadelphiacum. *Thunb. jap.* 135.

L. caule folioſo, foliis ſulcatis, floribus campanulatis, intus floccoſis. *Hall. helv n.* 1232.
L. purpureo-croceum majus. *Bauh. pin.* 76.
β. L. purpureo-croceum, flore pleno.
γ. L. purpureo croceum minus. *Bauh. pin.* 77.
δ. L. phoeniceum. *Bauh. pin.* 77.
ε. L. bulbiferum latifolium majus. *Bauh. pin.* 77.
ζ. L. bulbiferum anguſtifolium. *Bauh. pin.* 77.
η. L. bulbiferum minus. *Bauh. pin.* 77.
L. humile. *Mill. dict. n.* 4.
ϑ. L. bulbiferum incanum. *Bauh. pin.* 77.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 263.
Feuer Lilie. W.
*Habitat in* Italia, Auſtria, Sibiria, Helvetia, Carniolia, Francofurti ad Moenum. 4 (v. v.)
*Planta japonica ab Illuſt. Thumbergio deſcripta in Actis Soc. Lin. Lond. l. c. videtur a noſtra diverſa.* W.

*7. LILIUM *Cateſbaei.*

L. foliis ſparſis lineari-lanceolatis, caule unifloro, corolla erecta, petalis longe unguiculatis margine undulatis, apice reflexis. W.
Lilium Cateſbaei. *Curt. mag.* 259. *
L. (*Cateſbaei*) foliis ſparſis, caule bipedali, flore unico erecto, corolla campanulata, petalis unguibus anguſtis longis, *Walt. carol.* 123.
L. (*ſpectabile*) foliis ſparſis, floribus ſolitariis erectis, petalorum unguibus anguſtis, alternis extus utrinque ſulcatis, laminis revolutis. *Salisb. Icon. rar.* 5. *t.* 5.*
L. (*carolinianum*) foliis ſparſis lineari-ſubulatis, flore unico erecto, petalis longe unguiculatis. *Lamarck. encyclop.* 3. *p.* 514. *
L. carolinianum, flore croceo punctato, petalis longioribus et anguſtioribus. *Catesb. Carol.* 2. *p.* 58. *t.* 58.
Caroliniſche Lilie. W.
*Habitat in* Carolinae *humidiuſculis.* 4

*8. LILIUM *ſpecioſum.*

L. foliis ſparſis ovatis petiolatis; caule ramoſo, ramis unifloris, flore cernuo, corollis revolutis intus papilloſo-dentatis. W.
L. (*ſpecioſum*) foliis ſparſis ovato-oblongis, floribus reflexis, corollis revolutis, caule ramoſo. *Thumb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 332.

Lilium ſuperbum. *Thunb. jap.* 134. *
Kasbiako. *Kaempf. amoen. p.* 871. *Banks. Icon. Kaempf. tab.* 47.
Prächtige Lilie. W.
*Habitat in* Japonia. 2|.

## 9. LILIUM *pomponium.*

L. foliis ſparſis lineari-ſubulatis, floribus reflexis, corollis revolutis intus papilloſo-dentatis. W.
L. foliis ſparſis ſubulatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Hort. cliff.* 120. *Hort. upſ.* 81. *Roy. lugdb.* 31. *Mill. dict. n.* 5. *et ic. t.* 65. *f.* 2. *Kniph. cent.* 2. *n.* 40. *Knorr. del.* 1. T. 4.
L. foliis ſparſis lineari-ſubulatis, apice caulis nudiuſculo, floribus reflexis, corollis revolutis. *Lamarck. encyclop.* 3. *p.* 514. *
L. radice tunicata, foliis ſparſis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 42. *n.* 9.
L. reflexum, montanum, humile, anguſtifolium, aurantium. *Amm. ruth. n.* 138. *Gmel.* R.
L. rubrum anguſtifolium. *Bauh. pin.* 78.
L. rubrum praecox. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 133.
β. L. miniatum odoratum anguſtifolium. *Bauh. pin.* 79. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 176. *f.* 3.
γ. L. brevi et gramineo folio. *Bauh. pin.* 79.
L. (*anguſtifolium*) foliis linearibus ſparſis, pedunculis longiſſimis. *Mill. dict. n.* 6. R.
*Houttuyn Lin. Pſl.* Syſt. 11. *p.* 266.
Pomponiſche Lilie. W.
*Habitat in* Pyrenaeis, Sibiria. 2| (v. v.)
Folia *linearia, acuta, triquetra, canaliculata, ſparſa.* Nectarii *rima valde dentata.*

## 10. LILIUM *chalcedonicum.*

L. foliis lineari-lanceolatis ſparſis, floribus reflexis, corollis revolutis intus punctatis. W.
L. foliis ſparſis lanceolatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Hort. cliff.* 120. *Hort. upſ.* 81. *Roy. lugdb.* 31. *Mill. dict. n.* 7. *Scop. carn. n.* 403. *Kniph. cent* 3. *n.* 54.
L. foliis ſparſis lanceolatis, caule usque ad apicem folioſo, floribus reflexis, corollis revolutis. *Lamark. encyclop.* 3. *p.* 515. *
L. byzantinum miniatum. *Bauh. pin.* 78.

L. rubrum f. miniatum byzantinum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 131.

β. L. byzantinum miniatum polyanthos. *Bauh. pin.* 78.

γ. L. purpureo-ſanguineum, flore reflexo. *Bauh. pin.* 78.

Hemerocallis chalcedonica. *Lob. ic.* 169.

*Houttuyn Lin. Pfl.* Syſt. 6. *p.* 268.

Chalcedoniſche Lilie. W.

*Habitat in* Perſia, Carniolia. 4 (v. v.)

Racemus *ante floreſcentiam vix incurvatus ut in* 9. 11. *et* Caulis *usque ad apicem* Foliis *veſtitus confertis.*

## 11. LILIUM *ſuperbum.*

L. foliis imis verticillatis, caeteris ſparſis, floribus racemoſo-pyramidatis reflexis, corollis revolutis. *Lamarck. encyclop.* 3. *p.* 515.

L. foliis ſparſis lanceolatis, floribus ramoſo-pyramidatis reflexis, corollis revolutis. *Mill. dict. n.* 8.

L. foliis ſparſis, multiflorum, floribus reflexis fundo aureo limbo aurantio punctis nigricantibus, pedunculis ſingulis uno foliolo. *Trew. ehret.* 2. *t.* 11.

L. f. Martagon canadenſe, flore luteo punctato. *Cateſb. car.* 2. *p.* 56. *t.* 56.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 270.

Stolze Lilie. W.

*Habitat in* America *ſeptentrionali.* 4

Folia *conſtanter trinervia. Gouan. illuſtr. p.* 25. *n.* 1. *in not.* R.

## 12. LILIUM *Martagon.*

L. foliis verticillatis ovato-lanceolatis, floribus reflexis, corollis revolutis. W.

L. foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Hort. cliff.* 120. *Hort. upſ.* 81. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 44. *Roy. lugd.* 31. *Mill. dict. n.* 9. *Iacq. auſtr. t.* 351. *Scop. carn. n.* 402. *Pollich. pal. n.* 331. *Hoffm. germ.* 118. *Roth. germ. I.* 152. *II.* 396. *Kniph. cent.* 3. *n.* 55. *Knorr. del.* 1. *tab. T.* 6.

L. foliis verticillatis, floribus pendulis revolutis. *Hall. helv. n.* 1233.

Martagon. *Camer. epit.* 617.

L. floribus reflexis, montanum. *Bauh. pin.* 77.

L. ſylveſtre. *Dod. pempt.* 201.

ε. L. floribus reflexis, alterum hirſutum. *Bauh. pin.* 87. *Mill. dict. n.* 10.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 271.
Gelbwurzliche Lilie, W.
*Habitat in* Hungaria, Helvetia, Sibiria, Germania. 24 (v. v.)

13. LILIUM *canadenſe.*

L. foliis verticillatis linearibus, floribus reflexis, corollis revoluto-campanulatis. W.
L. foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revoluto-campanulatis. *Mill. dict. n.* 11.
L. anguſtifolium, flore flavo maculis nigris diſtincto. *Tournef. inſt.* 371. *Barr. rar.* 778. *t.* 125.
L. Martagon canadenſe maculatum. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 408. *ſ.* 4. *t.* 20. *f.* 9. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 177. *f.* 5.
L. ſ. Martagon canadenſe, floribus magnis flavis non reflexis. *Catesb. car.* 3. *p.* 11. *t.* 11.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 273.
Canadiſche Lilie. W.
*Habitat in* Canada. 24 (v. ſ.)
Folia *verticillata, trilineata.* Corollae, *aeque ac Martagon, revolutae, baſi flavae, punctis atris.*

*14. LILIUM *maculatum.*

L. foliis ſparſis et verticillatis lanceolatis glabris, corollis campanulatis intus maculatis, limbo reflexo. *Thunb. Act. Soc. Linn. Lond.* 2. *p.* 334.
Lilium canadenſe. *Thunb. jap.* 135.
Gefleckte Lilie. W.
*Habitat in* Japonia. 24

Caulis *teres ſtriatus glaber ſimplex inanis pedalis, ſuperne ſubumbellatus.* Folia *ſparſa et verticillata ſeſſilia lanceolata glabra multinervoſa erecta digitalia.* Flores *ſubumbellati.* Pedunculi *digitales erecti.* Corolla *campanulata, limbo reflexo, incarnata, intus maculis purpureis plurimis adſperſa. Differt a L. canadenſi:* foliis *baſi latis et* corollis *minus revolutis.* Thunb. Act. l. c.

15. LILIUM *camſchatcenſe.*

L. foliis verticillatis, flore erecto, corolla campanulata, petalis ſeſſilibus. *Amoen. acad.* 2. *p.* 348.* *Mill. dict. n.* 12.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 274.
Kamtſchatiſche Lilie. W.
*Habitat in* Canada, Camſchatca. 24

16. LILIUM *philadelphicum.*

L. foliis verticillatis, floribus erectis, corolla campanulata, petalis unguiculatis. *Sp. pl.* 435.

L. foliis verticillatis brevibus, corollis campanulatis, unguibus petalorum angustioribus, floribus erectis. *Mill. dict. n.* 13. *et ic. t.* 165. *f.* 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 274.

Philadelphische Lilie. W.

*Habitat in* Canada. 24 (v. s.)

*Simillimum est L. camchatcensi, sed ejus petala ovata sessilia; hujus unguibus oblongis distinctis; separandum itaque secundum vivi autoptam Millerum.*

## 628. FRITILLARIA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 559.

*Cor.* 6-petala, campanulata, supra ungues cavitate nectarifera. *Stam.* longitudine corollae.

1. FRITILLARIA *imperialis.*

F. racemo comoso inferne nudo, foliis integerrimis, *Hort. upsal.* 82. *Mill. dict. n.* 8. *Kniph. cent.* 3. *n.* 39. *Knorr. del.* 1. *t. K. Regn. bot. ic.*

Petilium foliis caulinis. *Hort. cliff.* 119. *Roy. lugdb.* 30.

Lilium s. Corona imperialis: genus. *Bauh. pin.* 79.

Tusai. *Clus. hist.* 1. *p.* 127. 128.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 276.

Büschlige Schachblume. W.

*Habitat in* Persia? *Constantinopoli venit in Europam.* 24 (v. v.)

2. FRITILLARIA *persica.*

F. racemo nudiusculo, foliis obliqnis. *Hort. upsal.* 82. *Mill. dict. n.* 6.

F. racemo nudo terminali. *Hort. cliff.* 119.

F. radice rotunda. *Roy. lugdb.* 30.

Lilium persicum. *Bauh. pin.* 79. *Rudb. elys.* 2. *p.* 183. *f.* 1. *Swert. floril.* 44. *f.* 1.

Lilium susianum. *Clus. hist.* 1. *p.* 130.

*f.* Fritillaria minima. *Swert. floril.* 7. *f.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl.* Syst. 11. *p.* 279.

Persische Schachblume. W.

*Habitat in* Perſia? *e Suſis venit in Europam* 1573. 24 (v. ſ.)
*Folia infima ſunt bina, ſ. terna, ſ. quaterna verticillatim oppoſita.*

*3. FRITILLARIA *verticillata*. W.

F. foliis verticillatis lineari-lanceolatis, caule unifloro. W.
Wirtelblättrige Schachblume. W.
*Habitat in* Sibiria. 24 (v. ſ.)
*Ab omnibus ſpeciebus abunde diſtincta* caule *pedali erecto*, foliis *quaternis quinisve verticillatis ſeſſilibus linearibus apice valde attenuatis*, flore *ſolitario terminali*. Folia *exſiccata apice criſpantur ac ſi cirrho eſſent inſtructa*. W.

4. FRITILLARIA *pyrenaica*.

F. foliis infimis oppoſitis, floribus nonnullis folio interjectis. *Sp. pl.* 436.
F. caule multifloro, foliis infimis oppoſitis. *Hort. cliff.* 81. *Sp. pl.* 2. *p.* 436. *Pall. it.* 1. *p.* 147.
F. flore minore. *Bauh. pin.* 64.
F. pyrenaea. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 256. *poſth.* 10.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 280.
Pyrenäiſche Schachblume. W.
*Habitat in* Pyrenaeis, Ruſſia. 24 (v. v.)

5. FRITILLARIA *Meleagris*.

F. foliis alternis linearibus canaliculatis, caule unifloro. W.
F. foliis omnibus alternis, caule unifloro. *Hort. upſ.* 31. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 283. *Mill. dict. n.* 1. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 405. *Gouan. illuſtr.* 25. *Knorr.* 1. *t. F.* 2. *Kniph. cent.* 6. *n.* 40.
F. caule paucifloro, foliis caulinis gramineis alternis. *Hall. helv. n.* 1235.
F. e foliorum alis florens. *Hort. cliff.* 119.
F. radice depreſſa. *Roy. lugdb.* 30.
F. praecox purpurea variegata. *Bauh. pin.* 64.
Meleagris. *Reneal. ſpec.* 147. *t.* 146.
β. F. alba variegata. *Bauh. pin.* 64.
γ. F. alba praecox. *Bauh. pin.* 64.
δ. F. ſerotina atropurpurea. *Bauh. pin.* 64.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 281.
Gemeine Schachblume. W.
*Habitat in* Gallia, Italia, Auſtria, Upſaliae, Sibiria, Helvetia, Carniolia. 24 (v. v.)

Caulis *in ſpontaneis ſaepe 4- imo 5-florus. Pall. it.* 3. *p.* 653. R.

*6. FRITILLARIA *latifolia.* W.

F. foliis alternis oblongo-lanceolatis planis, caule unifloro. W.

Breitblättrige Schachblume.

*Habitat* - - - - - - 4 (v. v.)

*Diſtinguo hanc plantam in hortis noſtris non raram, quum facies a praecedente aliena;* folia *viridia nec glauceſcentia, latiora plana, nunquam canaliculata,* corollae *obſcuriores,* ſtigmata *obtuſa canaliculata, nunquam acuta. Nec faciem cultura mutat et praecocius floret.* W.

## *629. EUCOMIS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 1743.

*Cor.* infera 6- partita perſiſtens patens. *Filamenta* baſi in nectarium adnatum connata.

1. EUCOMIS *nana.*

E. ſcapo clavato, foliis lato-lanceolatis acutis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 432. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 47. *t.* 92. *Collect.* 4. *p.* 213.

Fritillaria (*nana*) racemo comoſo, foliis bifariis amplexicaulibus lanceolatis. *Mant.* 223. *Burm. prod.* 9.

Ornithogalum nanum. *Thunb. prod.* 62.

Orchidea capenſis Tulipae flore roſeo. *Petiv. gaz. t.* 85. *f.* 6.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 278.

Zwerg Schopflilie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Folia *acutiuſcula, baſi attenuata, plura, recurvato-patentia.* W.

*2. EUCOMIS *bifolia.*

E. ſcapo clavato, foliis ellipticis acutis geminis humi adpreſſis. W.

E. ſcapo clavato, foliis geminis lanceolato-ovatis acutis. *Jacq. ic.* 2. *t.* 449. *Colleet.* 4. *p.* 215. *

Zweyblättrige Schopflilie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

*Differt a praecedente:* foliis *geminis humi adpreſſis, bracteis acuminatis,* floribus *erectis nec nutantibus.* W.

3. EUCOMIS *regia.*

E. ſcapo cylindrico, foliis lingniformibus obtuſis humi adpreſſis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 433.

Fritillaria (*regia*) racemo comoſo inferne nudo, foliis crenatis. *Sp. pl.* 435. *Mill. dict. n.* 9.

Corona regalis lilii folio crenato. *Dill. elth.* 110. *t.* 92. *f.* 109.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 277.

Königliche Schopflilie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

*4. EUCOMIS *undulata.*

E. ſcapo cylindrico, foliis ovato-oblongis undulatis patentibus, comae foliis longitudine fere racemi. *Ait. Kew.* 1. *p.* 433.

Ornithogalum undulatum. *Thunb. prod.* 62.

Wellenförmige Schopflilie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24 (v. ſ.)

*5. EUCOMIS *punctata.*

E. ſcapo cylindrico, foliis oblongo-lanceolatis canaliculatis patentibus, comae foliis brevibus, racemis longiſſimis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 433.

Encomis punctata. *l'Herit. ſert. angl.* 18. *tab.* 18.

Aſphodelus comoſus. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 381. *t.* 83.

Ornithogalum punctatum. *Thunb. prod.* 62.

Punctirte Schopflilie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24 (v. v.)

## 630. UVULARIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 560.

*Cor.* 6-petala, erecta. *Nectarii* fovea baſeos petali. *Filamenta* breviſſima.

1. UVULARIA *amplexifolia.*

U. foliis amplexicaulibus cauleque glabris. W.

U. foliis amplexicaulibus. *Mill. dict. n.* 1. *Hall. helv. n.* 1237. *Mattuſch. ſil. n.* 237. *Hoffm. germ.* 118.

U. foliis cordato-oblongis. *Roy. lugdb.* 29.

Smilax perfoliata ramoſa, flore albo. *Barr. rar.* 58. *t.* 720. *et t.* 719.

Polygonatum latifolium ramoſum. *Bauh. pin.* 303. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 531. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 537. *ſ.* 13. *t.* 4. *f.* 11. *Rai. hiſt.* 665.

Polygonatum latifolium 4, ramoſum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 276.
Laurus alexandrina. *Cam. epit.* 936.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 11. *p.* 284.
Stengelumfaſſendes Zäpfchenkraut. W
*Habitat in* Bohemiae, Sileſiae, Saxoniae, Helvetiae, Delphinatus *montibus.* 4 (v. ſ.)
Pedunculus *geniculo flexo.* Corolla *Medeolae aſparagoidis.*

*2. UVULARIA *hirta.* †
U. foliis amplexicaulibus hirtis, caule villoſo. *Thunb. fl. jap.* 36.
Haariges Zäpfchenkraut. W.
*Habitat in* Japonia *juxta* Jedo. 4
Caulis *teres pilis longis denſis valde hirſutus erectus, craſſitie calami, pedalis.* Folia *alterna amplexicaulia cordata oblonga acuminata ſeptemnervia, patentia villoſa, pilis breviſſimis, bipollicaria.* Flores *non vidi*: Thunb. l. c.

*3. UVULARIA *lanceolata.*
U. foliis perfoliatis ovato-lanceolatis acuminatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 434.
Polygonatum ramoſum flore luteo minus. *Corn. canad.* 40. *t.* 41.
Lanzettenblättriges Zäpfchenkraut. W.
*Habitat in* America *boreali.* 4

4. UVULARIA *perfoliata.*
U. foliis perfoliatis ovatis. *Ait. Kew* 1. *p.* 434.
U. foliis perfoliatis. *Amoen. Acad.* 2. *p.* 337. *Mill. dict. n.* 2.
U. caule perfoliato. *Gron. virg.* 37. *Cold. noveb.* 74.
U. folio integerrimo. *Roy. lugdb.* 29.
Uvularia. *Hort. cliff.* 121.
Polygonum ramoſum, flore luteo, majus. *Corn. canad.* 38. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 538. *ſ.* 13. *t.* 4. *f.* 12.
Polygonatum latifolium perfoliatum braſilianum. *Bauh. pin.* 303. *prodr.* 139. *Burſ. XVII.* 61.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 286.
Eyförmiges Zäpfchenkraut. W.
*Habitat in* Virginia, Canada. 4 (v. ſ.)
*Plantae* Burſeri *ex Toupinambault Braſiliae a pharmacopaeo allatae, et C. B. communicatae, videntur mihi omnes ex Canada fuiſſe.*

5. UVULARIA *ſeſſilifolia.*
U. foliis ſeſſilibus. *Sp. pl.* 437.
U. foliis ſeſſilibus, flore unico. *Cold. noveb.* 73.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 287.
Sitzendes Zäpfchenkraut. W.
*Habitat in* Canada. *Kalm.* 4 (v. ſ.)
Habitus *praecedentis*; Caulis *bifidus, uniflorus.* Folia *lanceolato-ovata, alterna, at ubi Flos ex altero ramo exit, folia bina adſunt. Pedunculus nudus.*

*6. UVULARIA *cirrhoſa.*
U. foliis ſeſſilibus cirrhoſis. *Thunb. jap.* 136.
Rankiges Zäpfchenkraut. W.
*Habitat in* Japonia. 4
Caulis *teres articulatus ſtriatus glaber ſimplex erectus.* Folia *ex eadem gemma duo ſeſſilia linearia apice cirrhoſa integerrima glabra digitalia.* Flores *ex gemma foliorum pedunculati cernui.* Pedunculus *reflexus uniflorus unguicularis.* Petala 6 *oblonga lutea ſubpollicaria.* Filamenta 6 *germini inſerta alba corolla duplo breviora.* Antherae *oblongae didymae incluſae.* Stylus *unicus corolla paulo brevior ſtaminibus longior.* Stigmata *tria reflexa.* Thunb. l. c.

## 631. GLORIOSA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 561.
*Cor.* 6-petala, undulata, reflexa. *Stylus* obliquus.

1. GLORIOSA *ſuperba.*
G. foliis cirrhiferis. *Hort. cliff.* 121. *Fl. zeyl.* 122. * *Roy. lugdb.* 29. *Mill. dict. n.* 1.
Methonica malabarorum. *Herm. lugd.* 688. *t.* 689. *Pluk. alm.* 249. *t.* 116. *f.* 3.
Lilium zeylanicum ſuperbum. *Comm. hort.* 1. *p.* 69. *t.* 35. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 178. *f.* 7.
Mendoni. *Rheed. mal.* 7. *t.* 107. *f.* 57.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 287.
Rankenblättrige Prachtlilie. W.
*Habitat in* Malabaria. 4 (v. v.)
Caulis *orgyalis, teres: ramis duobus, oppoſitis, lateralibus. Caulis poſtquam ramos emiſit, pedunculum ſingulis foliorum alis exſerit.* Folia *alterna, at ſub*

*ramis terna* Flos *cernuus, figura Flammae ſupra crateres, ſpectatiſſimus, coccineus, baſi flavus, demum totus coccineus. Petala flava, lanceolata, longa, lateribus undulata, coccinea, prope baſin reflexa.* Radix *rectangula, decumbens, venenata.*

2. GLORIOSA *ſimplex.*

G. foliis acuminatis. *Mant.* 62.
G. foliis ovato-lanceolatis acutis. *Mill. dict.* 2.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 290.
Einfache Prachtlilie. W.
*Habitat in* Senegal.
Folia *non cirrhoſa.* Flores *coerulei.*

## 632. ERYTHRONIUM.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 562.

*Cor.* 6-petala, campanulata: *Nectario* tuberculis 2, petalorum alternorum baſi adnatis.

1. ERYTHRONIUM *Dens canis.*

Erythronium. *Hort. cliff.* 119. *Hall. helv. n.* 1234. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 39. *t.* 7. *Roy. lugdb.* 30. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 406. *Gouan. illuſtr.* 25. *Kniph. cent.* 6. *n.* 39. *Knorr. del.* 1. *t. H.* 8.
E. foliis ovatis. *Mill. dict. n.* 1.
Dens canis latiore rotundioreque folio. *Bauh. pin.* 87.
Dens caninus. *Dod. pempt.* 203.
β. Dens canis anguſtiore longioreque folio. *Bauh. pin.* 87.
Erythronium (*longifolium*) foliis lanceolatis. *Mill. dict.* 2.
γ. E. foliis ovato-oblongis glabris nigro-maculatis. *Gron. virg.* 151. *flore flavo.*
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 291.
Gemeiner Hundszahn. W.
*Habitat in* Liguria, Allobrogibus, *Auguſtae* Taurinorum, Sibiria, Virginia, Monſpelii. 24 (v. v.)
Variat *flore purpureo, carneo, albo et pleno. Gmel. l. c.*

## 633. TULIPA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 563.

*Cor.* 6-petala, campanulata. *Stylus* nullus.

1. TULIPA *ſylveſtris.*

T. caule unifloro glabro, flore ſubnutante, petalis acutis apice barbatis, foliis lanceolatis. W.

T. flore subnutante, foliis lanceolatis. *Fl. suec.* 2. *n.* 284: * *Hall. helv. n.* 1236. *Scop. carn. n.* 407. *Gouan. illustr.* 25. *Pall. it.* 3. *p.* 562. *Hoffm. germ.* 118 *Oed. dan. t.* 375. *Kniph. cent.* 8. *n.* 96. *Roth. germ. I.* 152. *II.* 397.

T. minor lutea italica. *Bauh. pin.* 63.

β. T. (*turcica*) flore erecto petalis lanceolato-acuminatis, foliis lanceolato-linearibus. *Roth. catal.* 1. *p.* 45. *

T. minor lutea gallica. *Bauh. pin.* 63. *Sauv. monsp.* 306.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 249.

Wilde Tulpe. W.

*Habitat* Monspelii, *inque* Apenninis, Germania, Sibiria, Helvetia. 4 (v. v.)

Distinguitur *a T. gesneriana*: Caule *altiore*, Foliis *angustioribus*, Scapo *versus florem inflexo et ante florescentiam nutante. Sed praeprimis staminum filamentis basi valde attenuatis, et supra basin hirsutis.* Petala *interiora margine hirsuta sunt, et flos odorus.*

Petala *omnia apice, tria interiora etiam basi villosa. Leers. herb. n.* 259.

*2. TULIPA *suaveolens.*

T. caule unifloro pubescente, flore erecto, petalis obtusis glabris, foliis ovato-lanceolatis. W.

T. flore erecto, scapo longitudine foliorum villoso. *Roth. catal. bot.* 1. *p.* 45. *

T. pumilio. *Lobel. ic.* 127.

Wohlriechende Tulpe. W.

*Habitat in* Europa *australi.* 4 (v. v.)

Scapo *pubescente*, corolla *patula odorata*, praecocitate *floris ab omnibus et exigua* magnitudine *distincta.* W.

3. TULIPA *Gesneriana.*

T. caule unifloro glabro, flore erecto, petalis obtusis glabris, foliis ovato-lanceolatis. W.

T. flore erecto, foliis ovato-lanceolatis. *Mill. dict.* 2. *Pall. it.* 3. *p.* 652. *Kniph. cent.* 2. *n.* 95. 96. *Knorr. del.* 1. *t. T. et T.* 1. 2. 3.

T. scapo triphyllo, foliis ovato-lanceolatis. *Hort. upf.* 82.

T. *Hort. cliff.* 118. *Roy. lugdb.* 31. *Fl. suec.* 262.

T. (genus fere totum.) *Bauh. pin.* 57.

T. turcarum. *Cord. hist.* 213.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 295.

Gemeine Tulpe. W.
*Habitat in* Cappadocia, *unde in Europam* 1559. *Gesnero authore; in* Russia. 4 (v. v.)

4. TULIPA *biflora.*
T. floribus erectis planiusculis, caule diphyllo bi-s. triloro, foliis lineari-subulatis. *Lin. suppl.* 196.
Tulipa biflora. *Pall. it.* 3. *app. n.* 86. *t. D. f.* 3.
Zweyblütige Tulpe. W.
*Habitat ad* Wolgam *locis desertis maxime argillosis, imo salsuginosis.* 4 (v. s.)
Planta *magnitudine Ornithogali lutei.* Caulis *palmaris glaberrimus.* Folia *bina alterna linearia utrinque attenuata recurva canaliculata, inferius caulem vaginans.* Pedunculi *foliis breviores bini s. terni quasi in umbella.* Flores *Ornithogali lutei aliquoties majores patentes.* Petala *tria exteriora lanceolata dilute cyanea s. virescentia, interiora alba basi macula magna fulva.* Filamenta *basi barbata.* Bulbus *quotannis post defloreſcentiam perpendiculariter demittit bulbillum, qui succedit post floreſcentiam exsucco.*

5. TULIPA *breyniana.*
T. caule multifloro polyphyllo, foliis linearibus. *Sp. pl.* 438. *Thunb. prod.* 65.
Sisyrinchium, ex phoeniceo suaverubente flore aethiopicum. *Breyn. cent. t.* 36. *Rudb. elys.* 2. *p.* 13. *f.* 11. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 328.
Capische Tulpe. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. 4
*Folia caulina* 6. *s.* 7, *alterna, lineari-lanceolata: suprema sensim breviora. Flores ad apicem* 3 *s.* 4 *minores quam plantae Breynii cultae. Petala basi angustata. Stylus nullus.*

## 634. ALBUCA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 564.

*Cor.* 6-petala, interioribus conniventibus, exterioribus patulis. *Stylus* triqueter.

* *Staminibus tribus fertilibus.*

1. ALBUCA *altissima.*
A. petalis interioribus apice glandulosis inflexis, foliis

subulatis canaliculato-convolutis. *Dryander. Act. holm.* 1784. *p.* 292. *

A. petalis interioribus apice glandulosis et inflexis, foliis canaliculato-convolutis et sic subulatis. *Jacq. ic. rar.* 1. *t.* 36. *Collect.* 2. *p.* 264. *

Höchste Stiftblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4 (v. v.)

Scapus *quadripedalis.* Pedunculi *recurvato-patentes.* Petala *alba linea lata viridi notata* Folia *lata lineari-lanceolata convoluta flaccida, ut fere subulata.* W.

2. ALBUCA *major.*

A. petalis interioribus apice glandulosis inflexis, pedunculis patentibus, foliis lineari-lanceolatis planis reflexis. W.

A. petalis interioribus apice glandulosis inflexis, foliis lineari-lanceolatis, planiusculis. *Dryander. Act. holm.* 1784. *p.* 293. *

A. foliis lineari-lanceolatis planiusculis reclinatis, racemo longissimo, pedunculis patentissimis, floribus nutantibus, filamentis alternis sterilibus. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 443. *Collect. suppl.* 96. *

A. foliis lanceolatis. *Berg. cap.* 87. *Thunb. prod.* 65. *Mill. dict. n.* 1.

Ornithogalum (*canadense*) petalis patentibus: interioribus erectis. *Sp. pl.* 1. *p.* 308.

Ornithogalum luteo-virens indicum. *Corn. canad.* 160. *Rudb. elys.* 2. *p.* 140. *f.* 7. *Rai. hist.* 1154. *Moris. hist.* 2. *p.* 423. *s.* 4. *t.* 24. *f.* 7. *Barr. ic.* 1118. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 330.

Grosse Stiftblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. Spei. 4

Scapus *tripedalis.* Pedunculi *sub angulo acuto patentes.* Petala *exteriora externe flava, apice et basi macula viridi notata, interne viridia flavo-marginata, interiora albido-flavescentia.* W.

3. ALBUCA *flaccida.*

A. petalis interioribus apice glandulosis inflexis, pedunculis rectangule patentibus, foliis lanceolato-linearibus oblique flexis. W.

A. foliis lanceolato-linearibus flaccidis, racemo brevi, pedunculis patentissimis, floribus nutantibus, filamentis alternis sterilibus. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 444. *Collect.* 4. *p.* 291. *

Welke Stiftblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

Folia *duplo anguſtiora.* Scapus *bipedalis et ultra.* Pedunculi *ſub angulo recto patentes.* Petala *luteo-alba tria exteriora externe apice et baſi viridia, interiora albo-luteſcentia.* W.

4. ALBUCA *minor.*

A. petalis interioribus apice glanduloſis inflexis, ſcapo erecto, floribus nutantibus, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis glabris. W.

A. petalis interioribus apice glanduloſis inflexis, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis. *Dryand. Act. holm.* 1784. *p.* 294. *

A. foliis ſubulatis. *Sp. pl.* 438. *Mill. dict. n.* 2. *Thunb. prod.* 65.

Ornithogalum africanum flore viridi altero alteri innato. *Herm. parad.* 209. *t.* 209.
*Houttuyn Lin. Pfl.* Syſt. II. *p.* 331.
Kleine Stiftblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

Folia *lineari-ſubulata pedalia vel ultra, baſi ſemiunciam lata.* Scapus *ſemipedalis diametro vix lineari.* Racemus *ſemipedalis et ultra.* Pedunculi *ſesquiunciales.* Bracteae *virides marginibus hyalinis cito marceſcentes ſemiunciales.* Flores *lutei.* Petala *uncia breviora,* exteriora *apice incraſſata,* interiora *apice aucta glandula uniformi inflexa alba.* Filamenta *ſterilia linearia, apice filiformi-inflexo.* Antherae *nullae.* Stylus *obverſe pyramidalis longitudine germinis tectus ramentis glanduloſis.* Stigma *pyramidale inter petala interiora conniventia prominens.* Dryand. l. c.

*5. ALBUCA *viridiflora.*

A. petalis interioribus apice glanduloſis inflexis, ſcapo erecto flexuoſo, floribus cernuis, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis, externe hirtis. W.

A. foliis linearibus canaliculatis foris villoſis, racemo pauciflo·o, pedunculis patentibus, floribus nutantibus, filamentis alternis ſterilibus. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 446. *Collect. ſuppl.* 98. *

Grünblütige Stiftblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

Scapus *pedalis erectus baſi hirtus ſuperne glaber flexuoſus quadriflorus.* Pedunculi *patentiſſimi.* Flo-

res *cernui.* Petala *exteriora laete-viridia, interiora luteo-virescentia.* W.

*6. ALBUCA *coarctata.*

A. petalis interioribus apice fornicatis, foliis glabris, pedunculis longitudine bractearum. *Dryand. Act. holm.* 1784. *p.* 295. *Ait. Kew.* 1. *p.* 436.

Gedrängtblütige Stiftblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

Folia *linearia-subulata profunde canaliculata bipedalia et ultra, basi semi uncia fere angustiora.* Scapus *foliis paulo brevior, penna anserina angustior.* Racemus *coarctatus semipedalis.* Pedunculi *patentes uncia paulo longiores.* Bracteae *fere longitudine pedunculi.* Flores *lutei.* Petala *exteriora oblonga apice incrassata, uncia longiores, interiora ovalia apice fornicata, exterioribus paulo breviora.* Filamenta *sterilia fertilibus paulo breviora extus convexa, intus canaliculata.* Antherae *sagittatae effoetae.* Stylus *prismaticus longitudine germinis, terminatus* stigmate *ex angulis styli apice rotundatis.* Dryand. l. c.

* * *Staminibus omnibus fertilibus.*

*7. ALBUCA *fastigiata.*

A. petalis interioribus apice fornicatis, foliis linearibus planiusculis, scapo foliis breviore, pedunculis longissimis patentibus. W.

A. petalis interioribus apice fornicatis, foliis glabris, pedunculis longissimis. *Dryand. Act. holm.* 1784. *p.* 296.

A. foliis lanceolato-ensiformibus, floribus erectis, panicula fastigiata. *Thunb. prod.* 65.

Gipfelblütige Stiftblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

Folia *linearia, primum canaliculata, dein planiuscula sesquipedalia, unciam lata.* Scapus *foliis dimidio brevior crassitie pennae anserinae.* Racemus *fastigiatus longitudine scapi.* Pedunculi *sub anthesi patentes, post florescentiam erecti tri-vel quadriunciales.* Bracteae *membranaceae hyalinae dorso rufescentes semiunciales.* Flores *albi.* Petala *exteriora lineari-oblonga apice incrassata uncia breviora, interiora ovali-oblonga apice fornicata, exterioribus paulo breviora.* Filamenta *omnia fertilia, tria alterna paulo breviora, extus con-*

*vexa intus canaliculata.* Stylus *prismaticus fuleatus germine paulo longior, staminibus paulo altior, tectus ramentis brevissimis praecipue versus apicem, viridis sulcis luteis, terminatus* stigmate ex *angulis styli apice rotundatis.* Dryand. l. c.

*8. ALBUCA *caudata.*

**A.** petalis interioribus apice glandulosis inflexis, foliis lineari-lanceolatis margine convolutis strictis scapo duplo brevioribus, pedunculis rectangule-patentibus longissimis, floribus rectis. W.

**A.** foliis lanceolato-linearibus canaliculatis stricte erectis, pedunculis patentissimis. *Jacq. ic. rar. 2. t. 442. Collect. 4. p. 203.* *

Geschwänzte Stiftblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

Scapus *ultra bipedalis arcuatim erectus.* Pedunculi *triunciales sub angulo recto patentes.* Flores *in apice pedunculi recti vel quod idem horizontaliter siti, nec nutantes.* Petala *tria exteriora alba ab apice ad medium usque macula viridi notata, interiora alba linea* patenti *lata viridi picta apice flava.* W.

*9. ALBUCA *setosa.*

**A.** petalis interioribus apice glandulosis inflexis, foliis lineari-lanceolatis planiusculis, pedunculis rectangule-patentibus, floribus erectis. W.

**A.** foliis lanceolato-linearibus, pedunculis patentissimis, floribus erectis, squamis bulbi apice setosis. *Jacq. ic. rar. 2. t. 440. Collect. suppl. 100.* *

Borstige Stiftblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

Squamae *bulbi apice setis terminati.* Folia *fere longitudine scapi laxa reflexa.* Pedunculi *interiores triunciales superiores sensim breviores sub angulo recto patentes.* Flores *erecti nec recti, nec nutantes.* Petala *exteriora viridia albo marginata, interiora flavescentia linea lata dorsali viridi. An varietas A. fastigiatae?* W.

*10. ALBUCA *aurea.*

**A.** petalis interioribus apice glandulosis inflexis, foliis lineari-lanceolatis planis, pedunculis longissimis erectis patentiusculis, floribus erectis. W.

**A.** foliis lanceolato-linearibus, pedunculis floribusque erectis. *Jacq. ic. rar. 2. t. 441. Collect. 4. p. 202.* *

Goldfarbene Stiftblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Scapus *ſesquipedalis.* Pedunculi *triunciales erecti fere adpreſſi.* Flores *erecti.* Petala *aurea linea longitudinali viridi notata.* Filamenta *exteriora ſub apice gibba.* W.

*11. ALBUCA *abyſſinica.*

A. petalis interioribus apice fornicatis, foliis lineari-lanceolatis canaliculatis ſtrictis, pedunculis flore cernuo brevioribus, bracteis lineari-ſubulatis flore longioribus. W.

A. petalis interioribus apice fornicatis, foliis glabris, bracteis flore longioribus. *Dryand. Act. holm.* 1784. *p.* 297. *Jacq. ic.* 1. *t.* 64. *Collect.* 1. *p.* 55.

Abyſſiniſche Stiftblume. W.
*Habitat in* Abyſſinia? 4

Petala *flavo-viridia.* W.

*12. ALBUCA *fragrans.*

A. petalis interioribus apice fornicatis, foliis lineari-lanceolatis canaliculatis, pedunculis patentibus longitudine floris nutantis, bracteis breviſſimis. W.

A. foliis lineari-lanceolatis canaliculatis glabris, pedunculis patentiſſimis, floribus cernuis, filamentis omnibus fertilibus, bulbo depreſſo. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 44. *t.* 84. *

Wohlriechende Stiftblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

*Habitus fere Antherici.* Petala *flavo-viridia, linea dorſali lata viridi notata.* W.

13. ALBUCA *viſcoſa.*

A. petalis interioribus apice fornicatis, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis piloſo-viſcoſis, pedunculis patentibus flore nutante duplo longioribus. W.

A. petalis interioribus apice fornicatis, foliis piloſo-glandulosis. *Dryander. Act. holm.* 1784. *p.* 297. *Jacq. ic.* 2. *t.* 445. *Collect. ſuppl.* 99. *

A. floribus erectis, foliis linearibus villoſo viſcoſis. *Lin. ſuppl.* 196.

A. foliis linearibus villoſo-viſcoſis. *Thunb. prod.* 65. *Act. holm.* 1786. *p.* 58. *

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 332.
Klebrige Stiftblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Scapus, Bracteae, *et* Folia *piloso-viscosi*, pedunculi *vero glabriusculi*. Petala *alba linea dorsali viridi lata notata, interiora apice flavescentia*. W.

14. ALBUCA *spiralis*.

**A.** petalis interioribus apice fornicatis, foliis linear-subulatis convolutis, apice spiraliter tortis villoso-scabris, scapo longioribus. W.

**A.** floribus nutantibus, foliis spiralibus. *Lin. suppl.* 196. *Thunb. prod.* 65. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 499. *Collect. suppl.* 100.* *Thunb. Act. holm.* 1786. *p.* 58. *t.* 2. *f.* 1.* *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 332.

Spiralblättrige Stiftblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei *in summitate montis* Ribecks Castel. 2|.

Petala *sordide flavescentia linea dorsali lata viridi notata*. W.

## 635. GETHYLLIS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 184.

*Cor.* 6-partita, tubo filiformi longissimo. *Cal.* o. *Bacca* clavata radicalis unilocularis.

1. GETHYLLIS *spiralis*.

G. foliis linearibus spiralibus glabris, limbi laciniis ovato-oblongis. *Lin. suppl.* 198. *Thunb. Diss.* 1. *Nov. gen. p.* 14. *Thunb. prod* 59.

Gethyllis afra. *Sp. pl.* 633.

Papiria spiralis. *Thunb. Act. lund.* 1. *sect* 2. *p.* 111.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 662.

Spiralblättrige Papierlilie. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 2|

2. GETHYLLIS *ciliaris*.

G. foliis linearibus spiralibus ciliatis, limbi laciniis ovato-oblongis. *Lin. suppl.* 198. *Thunb. Diss.* 1. *Nov. gen. p.* 14. *Thunb. prod.* 59. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 41. *t.* 70.*

Papiria ciliaris. *Thunb. Act. lund.* 1. *sect.* 2. *p.* 111.*

Gefranzte Papierlilie. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 2|

3. GETHYLLIS *villosa*.

G. foliis linear-filiformibus spiralibus villosis, limbi la-

ciniis ovato-oblongis. *Lin. ſuppl.* 198. *Thunb. Diſſ.* 1. *Nov. gen. p.* 14. *Thunb. prod.* 59.
Papiria villoſa. *Thunb. Act. lund.* 1. *ſect.* 2. *p.* 111.
Haarige Papierlilie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

4. GETHYLLIS *plicata.*

G. foliis linearibus utrinque attenuatis plicato-nervoſis piloſo-ciliatis, laciniis limbi lanceolatis. W.
G. (*plicata*) foliis lineari-enſiformibus plicatis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 42. *t.* 80. *
Hypoxis (*plicata*) ſcapo unifloro triquetro, foliis lanceolatis plicatis villoſis. *Lim. ſuppl.* 197.
Hypoxis (*plicata*) foliis plicatis ciliatis, ſcapis ſimplicibus. *Thunb. prod.* 60.
Fabricia plicata. *Thunb. in Fabricii iter norveg.* 29.
Faltenblättrige Papierlilie. W.
*Habitat in* Cap. b. ſpei *collibus arenoſis.* 24
Bulbus *globoſus.* Folia *enſiformia plicata ſubciliata, baſi carina et margine denticulata.* Corolla *flava extus vireſcens*, Antherae *baſi bifidae.*

5. GETHYLLIS *lanceolata.*

G. foliis lanceolatis planis, limbi laciniis lanceolatis. *Lin. ſuppl.* 198. *Thunb. Diſſ.* 1. *Nov. gen. p.* 14. *Thunb. prod.* 59.
Papiria lanceolata. *Thunb. Act. lund.* 1. *ſect.* 2. *p.* 112.
Lanzettenförmige Papierlilie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24
Faciem *Colchici habent Gethyllides omnes, ſed* corolla *monopetala et* bacca *bene dignoſcuntur.* Flores *fructum proferunt absque foliis.* Bacca *gratiſſimi odoris et bene ſapit.*

## *636. CURCULIGO.

*Roxb. corom. p.* 14.

*Cor.* 6-petala plana. *Spatha* 1-valvis. *Stylus* breviſſimus. *Stigmata* 3 divergentia. *Capſ.* 1-locul. 4-ſperma ſpongioſa roſtrata.

*1. CURCULIGO *orchioides.*

C. orchioides. *Roxb. corom.* 1. *p.* 14. *t.* 13. * *Gaert. ſem.* 1. *p.* 63. *t.* 16.

Orchis amboinica major. *Rumph. amb.* 6. *p.* 116. *t.* 54. *f.* 1.
Ragwurzartige Rüſſellilie. W.
*Habitat in* Indiae locis umbroſis incultis, prope Samulcotah. 4
Radix *tuberoſa ovata ſulcis circularibus notata.* Folia *lineari-enſiformia ſcapo triplo longiora trinervia.* Racemus *multiflorus.* Flores *flavi longe pedunculati.* Germen *triloculare, loculis* 6-8 *ſpermis, ſed loculamentum unicum cüm quatuor ſeminibus tantum ad maturitatem pervenit.* W.

## 637. HYPOXIS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 565.

*Cor.* 6-partita perſiſtens, ſupera. *Capſ.* baſi anguſtior. *Spatha* 2-valvis.

### 1. HYPOXIS *erecta.*

H. piloſa, ſcapo ſubquadrifloro foliis lineari-lanceolatis breviore, pedunculis flore duplo longioribus. W.
H. piloſa capſulis ovatis. *Sp. pl.* 439.
Ornithogalum *hirſutum* ſcapo angulato, pedunculis umbellatis villoſis. *Sp. pl.* 1. *p.* 306.
Ornithogalum ſcapo bifloro. *Roy. lugdb.* 31.
Ornithogalum vernum luteum, foliis anguſtis hirſutis. *Gron. virg.* 37.
Ornithogalum virginianum luteum. *Pet. gaz.* 1. *t.* 1. *f.* 4.
Ornithogalum herbaceum luteum parvum virginianum, foliis gramineis hirſutis. *Pluk. alm.* 272. *t.* 350. *f.* 12. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 333.
Aufrechtſtehender Härtling. W.
*Habitat in* Virginia, Canada. 4 (v. f.)
Folia *Caricis ſ. Iunci piloſi.* Scapus *foliis brevior, erectus piloſus.* Bracteae 2, *ſubulatae, erectae, inter quas flos* 1. *ſ.* 2. *ſeſſilis, longitudine bractearum.*

### *2. HYPOXIS *ſobolifera.*

H. piloſa, ſcapo ſubquadrifloro, foliis lineari-lanceolatis patentibus longitudine ſcapi, pedunculis flore duplo longioribus. W.
H. ſcapis racemoſis hirſutis, floribus longe pedicellatis, foliis lanceolato-linearibus hirſutis ſtriatis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 372. *Collect. ſuppl.* 53. *

Wuchernder Härtling. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ
*Vix praecedente diſtincta, niſi* foliis *brevioribus magis villoſis, minus incurvatis, et* petalis *obtuſioribus.* W.

3. HYPOXIS *villoſa.*
H. villoſa, ſcapo ſubquadrifloro foliis lineari-lanceolatis breviore, pedunculis flore brevioribus, fructibus cylindraceis. W.
H. foliis lineari-enſiformibus villoſis, ſtigmate ſimplici trigono acuto. *Lin. ſuppl.* 198.
H. foliis lineari-enſiformibus, ſcapis diviſis. *Thunb. prod.* 60.
H. ſcapis ſubracemoſis, foliis lineari-enſiformibus villoſis, petalis tribus ſubtus ad apicem barbatis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 370. *Collect. ſuppl.* 51.*
Fabricia villoſa. *Thunb. in Fabric. it. norv.* 31.
Haariger Härtling. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ (v. ſ.)
*Variat magnitudine.*

4. HYPOXIS *decumbens.*
H. piloſa, ſcapo ſubbifloro decumbente foliis lineari-lanceolatis breviore. W.
H. piloſa, capſulis clavatis *Sp. pl.* 439. *Amoen. acad.* 5. *p.* 396. * *Swartz. obſ.* 126. *
Ornithogalum foliis gramineis, floribus geminatis, pedunculis longiſſimis alaribus. *Brown. jam.* 195.
Anthericum ſeſſile, foliis linearibus planis, caule decumbente. *Mill. dict. t.* 39. *f.* 2.
Crocus foliis et radice ſcorzonerae. *Plum. ic.* 108. *f.* 1? *Houttuyn. Lin. Pſl. Syſt.* II. *p.* 334.
Liegender Härtling. W.
*Habitat in campis arenoſis montium* Jamaicae. 2ɬ

5. HYPOXIS *obliqua.*
H. ſcapo ſubtrifloro piloſo longitudine foliorum, pedunculis flore triplo-longioribus, foliis lanceolatis obliquo flexis glabris, margine nervoque medio lanatis. W.
H. ſcapis bifidis vel trifidis hirſutis, foliis lineari-lanceolatis acuminatis ad oras lanatis ſubobliquis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 371. *Collect. ſuppl.* 54.*
Gedrehtblättriger Härtling.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ

## 6. HYPOXIS *aquatica.*

H. foliis linearibus, ſcapis umbelliferis ſ. unifloris. *Lin. ſuppl.* 197. *Ait. Kew.* 1. *p.* 439.

Waſſer Härtling. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in foſſis aqua repletis.* 4

Folia *radicalia linearia laxa apice nutantia.* Scapi *filiformes altitudine aquae.* Flores *in aliis ſolitarii hermaphroditi, in aliis umbellati mares.*

## 7. HYPOXIS *minuta.* †

H. foliis triquetris carnoſis glabris, ſcapis bifidis. *Lin. ſuppl.* 197. *Thunb. prod.* 59.

Helonias (*minuta*) foliis linearibus ſcapis ramoſis. *Mant.* 225.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 521.

Kleiner Härtling. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *juxta urbem locis glareoſis.*

Planta *puſilla.* Bulbus *conicus ratione herbae magnus ſubtus truncatus et marginatus apice ſquamis linearibus conniventibus.* Folia *radicalia linearia ſubcarnoſa acuta ſcapis longiora digitalia.* Scapi *plures breviſſimi teretiuſculi baſi ſquamis involuti ramoſi;* Ramis *ſ. pedicellis unifloris.* Corolla *hexapetala patens nivea.* Filamenta 6, *corolla breviora.* Antherae *haſtatae erectae filamentis longiores.* Germen *oblongum.* Styli 3, *membranacei germini adhaerentes in figuram pyramidalem.* Koenig.

## 8. HYPOXIS *alba.*

H. ſcapo unifloro foliis filiformibus teretibus glabris breviore. W.

H. foliis teretibus glabris, ſcapis ſubbifidis, petalis immaculatis. *Lin. ſuppl.* 198. *Thunb. prod.* 60. *Jacq. Collect.* 4. *p.* 135. *t.* 2. *f.* 1.

Weiſser Härtling. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Planta *parvula.*

## 9. HYPOXIS *ovata.*

H. foliis ovato-lanceolatis integris glabris, ſcapis unifloris. *Lin. ſuppl.* 197. *Thunb prod.* 60.

Eyförmiger Härtling. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Flos *pulchellus albus.*

* 10. HYPOXIS *veratrifolia*. W.

H. ſcapo unifloro foliis oblongo-ellipticis glabris plicato-nervoſis breviore. W.

Hypoxis plicata. *Jacq. ic. rar. 2. t. 367. Collect. ſuppl. 55.* * (*excluſis ſynonymis.*)

Germerblättriges Härtling. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

Folia *fere Veratri ſed minora.* Scapi *filiformes.* Flores *magni lutei, externe viresçentes fere magnitudine H. ſtellatae.* W.

11. HYPOXIS *ſtellata.*

H. ſcapo unifloro foliis lineari-lanceolatis laxis carinatis glabris breviore. W.

H. ſcapo unifloro, foliis linearibus ſtriatis, petalis maculatis. *Lin. ſuppl.* 197. *Jacq. ic. rar. 2. t.* 368. *Collect. 4. p.* 134. *

H. foliis planis integris glabris, ſcapis ſimplicibus unifloris, petalis baſi fuſco-maculatis. *Thunb. prod.* 60.

Fabricia ſtellata. *Thunb. in Fabr. it. norv.* 27.

Amaryllis (*capenſis*) ſpatha uniflora remotiſſima, corolla aequali, ſtaminibus piſtilloque rectis. *Sp. pl.* 420. *Amoen, acad. 6. afr.* 11. *

Amaryllis vernalis. *Mill. dict. n.* 10

Siſyrinchium indicum. *Cornut. canad.* 168. *Moriſ. hiſt. 2. p.* 421. *ſ. 4. t. 23. f.* 9. *Rudb. elyſ. 2. p. 256. f.* 17.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 184.

Sternförmiger Härtling. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

*Liliacea pulchella.* Macula *nigricans ad ungues petalorum.*

12. HYPOXIS *ſerrata.*

H. ſcapo unifloro foliis linearibus ciliato-ſerratis carinatis breviore, corollis defloratis reflexis. W.

H. foliis canaliculatis glabris ciliato-ſerratis, ſcapis unifloris. *Lin. ſuppl.* 197. *Thunb. prod.* 60.

H. ſcapis unifloris, foliis linearibus canaliculatis glabris aculeato-ciliatis. *Iacq. ic. rar. 2. t.* 369. *Collect. 4. p.* 134. *

Fabricia ſerrata. *Thunb. in Fabr. it. norv.* 29.

Geſägter Härtling. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

*13. HYPOXIS *juncea.*
H. foliis canaliculatis pilosis integerrimis scapis unifloris. *Smith. spicil. tab.* 16. *
Binsenartiger Härtling. W.
*Habitat in* Carolinae *turfosis.* 4

14. HYPOXIS *fascicularis.*
H. tubis florum longissimis. *Sp. pl.* 439. †
Allium sylvestre s. Moly minus, amplo flore. *Russel. alep.* 34. *t.* 2.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 335.
Büschelblütiger Härtling. W.
*Habitat ad* Aleppo. 4
Corollae *tubus in icone Russelii longissimus, ostendit plantam a genere Hypoxidis distinctam, forte Gethyllidis speciem.* W.

15. HYPOXIS *sessilis.*
H. pilosa, acaulis, fructificationibus subradicalibus. *Sp. pl.* 439. †
Ornithogali virginici facie herba tuberosa carolinensis. *Dill. elth.* 298. *t.* 220. *f.* 287.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 335.
Sitzender Härtling. W.
*Habitat in* Carolina. 4

*638. ERIOSPERMUM.
*Jacq. Collect. suppl.* 72.
*Cor.* 6-petala campanulata persistens. *Filamenta* basi dilatata. *Caps.* 3-locularis *Semina* lana involuta.

1. ERIOSPERMUM *latifolium.*
E. foliis subrotundis acuminatis basi cucullatis. W.
E. foliis ex ovato-subrotundis. *Jacq. ic.* 2. *t.* 420. *Collect. suppl.* 73. *
Ornithogalum (*capense*) foliis cordato-ovatis. *Sp.* 441. *Roy. lugdb.* 31. *It. scan.* 73. * *Mill. dict. n.* 9.
Ornithogalum (*capense*) foliis cordatis petiolatis. *Thunb. prod.* 62.
Ornithogalum capense plantaginis roseae foliis, radice tuberosa. *Comm. hort.* 2. *p.* 175. *t.* 88.
Ornithogalo affinis radice tuberosa cyclaminis folio, flore

pallide caeruleo. *Breyn. Cent. t.* 41. *Rudb. elyſ.* 1. *p. f.* 14.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 11. *p.* 352.
Breitblättriger Wollenſame. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ

Racemus *longus, pedunculis longiſſimis arcuatim patulis plus quam decies flore longioribus.* W.

*2. ERIOSPERMUM *lanceaefolium.*
E. foliis ovato-lanceolatis margine ſubundulato involuto. W.
E. foliis lanceolatis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 421. *Collect. ſuppl.* 72. *
Lanzenblättriger Wollenſame. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ (v. ſ.)

Racemus *anguſtus elongatus, pedunculis triplo flore longioribus erecto-patentibus.* W.

*3. ERIOSPERMUM *parvifolium.*
E. foliis ellipticis obtuſis planis. W.
E. foliis oblongis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 422. *Collect. ſuppl.* 74. *
Kleinblättriger Wollenſame. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ

Folium *ſesquiunciale omnium minutiſſimum.* Scapus *pedalis.* Pedunculi *rectangule-patentes flore quadruplo longiores.* W.

## 639. ORNITHOGALUM.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 566.

*Cor.* 6-petala, erecta, perſiſtens, ſupra medium patens. *Filamenta* baſi dilatata. *Capſula* 3-locularis. *Sem.* ſubrotunda nuda.

* *Staminibus omnibus ſubulatis.*

1. ORNITHOGALUM *uniflorum.*
O. ſcapo diphyllo, foliis oppoſitis, pedunculo unifloro, petalis exterioribus lanceolatis retuſis, interioribus ellipticis duplo latioribus. W.
O. ſcapo diphyllo, pedunculo unifloro. *Mant.* 62.
O. foliis caulinis alternis vaginantibus, pedunculo unifloro. *Laxman. Nov. Act. Petropol. vol.* XVIII. *t.* 6. *f.* 3.]

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 336.
Einblütige Vogelmilch. W.
*Habitat in* Sibiriae *montium Sinie Sopka et Maloi Altai ſummo apice.* 4 *Eric. Laxmann.* (v. ſ.)
*Planta refert omnino O. luteum, ſed* Pedunculus *inviſus, uniflorus.* Flos *dimidio minor Tulipae ſylveſtris, ſed triplo major O. lutei.* Petala *lanceolata, obtuſiuſcula, lutea, ſubtus viridia.* Filamenta *et* Antherae *luteae, petalis breviores.* Germen *oblongum.* Stylus *longitudine ſtaminum.* Stigmata *tria, obtuſa, omnia lutea.* Folia *caulis* 2, *altero ſuperiore, longitudine ambo floris ſ. plantae, Or. lutei duplo latiora.* H. V.

*2. ORNITHOGALUM *ſtriatum.* W.
O. ſcapo folioſo unifloro, foliis alternis oblongo-lanceolatis, radicalibus filiformibus, petalis aequalibus obtuſis nervoſis. W.
Geſtreifte Vogelmilch. W.
*Habitat in* Sibiria. 4 (v. ſ.)
Folia *radicalia lineari-filiformia ſtricta.* Scapus *trif. quadriuncialis foliis tribus oblongo-lanceolatis canaliculatis inſtructus uniflorus. Flos magnitudine A. lutei,* petalis *obtuſiſſimis nervoſis, nervis coloratis.* W.

3. ORNITHOGALUM *bulbiferum.*
O. ſcapo folioſo unfloro, foliis alternis lineari-ſubulatis baſi bulbiferis, radicalibus filiformibus, petalis aequalibus acutis. W.
O. bulbis axillaribus, caule polyphyllo unifloro. *Lin. ſuppl.* 199.
Ornithogalum bulbiferum. *Pall. itin.* 2. *app. n.* 106. *tab. O.*
Zwiebeltragende Vogelmilch. W.
*Habitat in aridis limoſis ad* Wolgam *et* Jaicum. 4 (v. ſ.)
*Diſtinctiſſima planta* caule *ſimplici unifloro,* foliis *alternis filiformibus,* bulbulo *in axillis omnibus,* floribus O. *minimi luteis,* petalis *ſubulatis.*

*4. ORNITHOGALUM *ſpathaceum.*
O. ſcapo ſubtereti monophyllo, pedunculis ſubternis, umbellatis involucro triphyllo, foliis lineari-filiformibus ſtrictis. W.
O. (*ſpathaceum*) ſcapo ſubtereti, ſpatha univalvi, umbella pedunculata ſubtriflora. *Haynein Uſteri Neue Annalen* 15. *Stück. p.* 11. *t.* 1.

O. (*Haynii*) foliis filiformibus ſtrictis, ſcapo ſubtereti monophyllo, umbella pedunculata ſubtriflora. *Roth. in Roem. Archiv.* 3. *p.* 42. *

Ornithogalum minimum. *Fl. dan. t.* 612.

α. umbella triflora, involucro pentaphyllo.

β. umbella biflora, involucro tetraphyllo.

γ. umbella uniflora, involucro triphyllo.

Scheidenartige Vogelmilch. W.

*Habitat in nemoroſis humidiuſculis prope* Hamburgum *inque ducatu* Oldenburgenſi. 2 (v. f.)

Planta *ab O. minimo diſtinctiſſima*: foliis *radicalibus ſtrictis*, ſcapo *folio a floribus remoto lanceolato ſpathiformi inſtructo*, involucris *margine ſubciliatis*, pedunculis *nunquam ultra tribus*, *ſemper glabris*. W.

*5. ORNITHOGALUM *bohemicum.*

O. ſcapo folioſo ſubunifloro, foliis alternis lanceolatis, radicalibus filiformibus, pedunculis piloſiuſculis, petalis aequalibus lanceolatis obtuſiuſculis. W.

O. caule ſubunifloro, foliis radicalibus filiformibus, caulinis alternis lanceolatis. *Schmidt. bohem. n.* 336. *

Ornithogalum bohemicum. *Zeuſchm. Act. bohem.* 2. *p.* 121. *cum icone.* *

Böhmiſche Vogelmilch. W.

*Habitat in ſaxoſis udis* Bohemiae. 2 (v. f.)

Floris *ſtructura ſimillimum ſequenti, ſed notis indicatis diſtinctiſſimum.* W.

6. ORNITHOGALUM *luteum.*

O. ſcapo anguloſo baſi monophyllo, foliis radicalibus linearibus, pedunculis umbellatis glabris, petalis lanceolatis. W.

O. ſcapo anguloſo diphyllo, pedunculis umbellatis ſimplicibus. *Fl ſuec.* 270. 285. *Mill. dict. n.* 5. *Scop. carn. n.* 410. *Pollich. pal. n.* 332. *Roth. germ. I.* 150. *II.* 293. *Hoffm. germ.* 119.

O. (*pratenſe*) ſcapo polyphyllo, pedunculis ſimplicibus triquetris glabris. *Perſoon in Uſteri Neue Annalen* 5. *Stück. p.* 8. *t.* 2. *f.* 1. *

Phalangium radice bulboſa, ſtipulis maximis hirſutis, floribus umbellatis, petiolis unifloris. *Hall. helv. n.* 1213.

Ornithogalum ſcapo diphyllo, pedunculis ſimplicibus terminalibus, filamentis omnibus ſubulatis. *Hort. cliff.* 124. *Roy. lugdb.* 31.

O. pumilum graminifolium. *Amm. ruth. n.* 140. *Gmel.* R.
O. luteum. *Bauh. pin.* 71.
Pyrrochiton. *Reneal. ſpec.* 91. *t.* 90.
β, O. (*ſylvaticum*) ſcapo diphyllo, pedunculis ſimplicibus triquetris glabris. *Perſoon in Uſteri Neue Annalen* 5. *Stück. p.* 7. *t.* 1. *f.* 1. *
Ornithogalum luteum. *Fl. dan. t.* 612.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 337.
Gelbblütige Vogelmilch. W.
*Habitat in* Europae *cultis, macellis.* 4 (v. v.)

*Clariſſimus Linnaeus* folia *bina baſi plerumque ſcapum vaginantia intelligere videtur, ſi ſcapum dixit diphyllum. Celeber. Perſoon vero ſub* ſcapo *diphyllo et polyphyllo involucra autumat.* W.

## 7. ORNITHOGALUM *minimum.*

O. ſcapo angulato nudo, pedunculis umbellatis ſubramoſis pubeſcentibus, petalis aequalibus lanceolatis acutis. W.
O. ſcapo angulato diphyllo, pedunculis umbellatis ramoſis. *Fl. ſuec.* 271. 286. * *Mill. dict. n.* 6. *Gunn. norv. n.* 1114. *Gouan. monſ.* 309. *illuſtr.* 26. *Leers. herb. n.* 254. *Roth. germ. I.* 150. *II.* 394. *Hoffm. germ.* 119.
O. (*arvenſe*) ſcapo polyphyllo, pedunculis ramoſis teretiuſculis tomentoſis. *Perſoon in Uſteri Neue Annalen* 5. *Stück. p.* 8. *t.* 1. *f.* 2. *
Phalangium radice bulboſa, ſtipulis maximis hirſutis, floribus umbellatis, petiolis multifloris. *Hall. helv. n.* 1214.
Ornithogalum pannonicum minus flore luteo. *Cluſ. pann.* 190. 391. *Hall.* R.
O. luteum minus. *Bauh. pin.* 71.
Ornithogalum pallido flore. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 624.
O. luteum. *Tabernaem.* 633. *Hall.* R.
Hypoxis *Reneal. ſpec.* 92.
β. Ornithogalum bulbiferum minimum. *Colum. ecphr.* 363. 324. *Rudb. elyſ.* 139. R.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 338.
Kleinſte Vogelmilch. W.
*Habitat in* Europae *cultis oleraceis.* 4 (v. v.)

*Simillimum praecedenti, ſed* petala *acutiora.*

8. ORNITHOGALUM *circinatum.*

O. ſcapo nudo, pedunculis ſubternis umbellatis pubescentibus, petalis tribus exterioribus longioribus acuminatis, foliis filiformibus. W.

O. hirſutie caneſcens, foliis linearibus recurvatis canaliculatis, radicali ſolitario, caulinis tribus, caule tri-ſ. quadrifloro. *Lin. ſuppl.* 199.

Ornithogalum reticulatum. *Pall. itin.* 3. *app. n.* 85. *t. D. f.* 2. *

Netzhautige Vogelmilch. W.

*Habitat in ſiccis limoſis nitroſis verſus* Aſtrachan. 4 (v. ſ.)

*Simillimum O. minimo, at diſtinctiſſimum.* Vagina *laxa fibroſa reticulata ferruginea folium et ſcapum quaſi cucullo circumdans.* Folium *radicale unicum gracile recurvatum lineare canaliculatum ſcapo et cyma longius.* Folia *caulina tria ſ. quatuor, tot ac flores quibus adſident, figura radicalis.* Cyma *diviſione et numero florum ut in O. minimo.* Flores *majores et ſpecioſiores quam in O. luteo.* Petala *exteriora valde ſubulata. Tota planta, flore excepto, hirſutie minima caneſcente tecta.*

*9. ORNITHOGALUM *paradoxum.*

O. cauleſcens foliis multifidis ciliatis, ſcapo racemoſo pauciflоro, corollis campanulatis, filamentis lanceolatis. W.

Ornithogalum paradoxum. *Jacq. Collect. ſuppl.* 81. *t.* 1. *

Schiltzblättrige Vogelmilch. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Radix *tuberoſa.* Planta *florifera aphylla.* Scapus *biuncialis ſexflorus.* Flores *erecti ſubſeſſiles bractea lanceolata ſuffulti.* Corolla *hexapetala campanulata.* Petala *lanceolata obtuſa viridia margine alba.* Filamenta *lanceolata petalis breviora.* Planta *ſterilis emittit caules quadriunciales folioſos.* Folia *conferta linearia anguſta tri-ſeu quadrifida ciliata.* Fructus *ignotus. Forte proprii generis planta?* W.

*10. ORNITHOGALUM *niveum.*

O. racemo pauciflоro, petalis lanceolatis, foliis filiformibus canaliculatis, filamentis ſubulatis. *Ait. Kew.* 1. p. 440.

Schneeweiſse Vogelmilch. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Folia *glabra vix digitalia.* Scapus *foliis brevior.*

Pedunculi *vix ſemiunciales.* Bracteae *oblongae acuminatae breviſſimae.* Petala *quadri-linearia alba, tria exteriora carina vireſcente.* Filamenta *petalis dimidio breviora, alterna ſesquilatiora.* Antherae *flavae.* Ait. l. c.

11. ORNITHOGALUM *umbellatum.*

O. corymbo pauciflоro, pedunculis bracteis longioribus, filamentis ſubulatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 440.

O. floribus corymboſis, pedunculis ſcapo altioribus, filamentis baſi dilatatis. *Syſt. veg.* 271. *Pollich. pal. n.* 353. *Hoffm. germ.* 119. *Roth. germ. I.* 151. *II.* 395.

O. floribus corymboſis, pedunculis ſcapo altioribus, filamentis emarginatis. *Sp. pl.* 441. *Hort. cliff.* 124. *Hort. upſ.* 84. *Roy. lugdb.* 22. *Gron. orient.* 111. *Scop. carn. n.* 403. *Mill. dict. n.* 7. *Lepech. it.* 1. *p.* 196. *Jacq. auſt.* 4. *p.* 22. *t.* 343.

O. ſtipulis maximis, petiolis lateralibus longiſſimis. *Hall. helv. n.* 1215.

O. umbellatum medium anguſtifolium. *Bauh. pin.* 70.

Bulbus leucanthemos minor, I. Ornithogalum. *Dod. cor.* 185. *hiſt.* 221.

Eliocarmos. *Reneal. ſpec.* 88. *t.* 87.

*Houttuyn Lin. Pfl.* Syſt. 11. *p.* 348.

Doldenblütige Vogelmilch. W.

*Habitat in* Germania, Gallia, Oriente. 4 (v. v.)

Stercus columbinum. *Bibliis.*

*12. ORNITHOGALUM *pyrenaicum.*

O. racemo longiſſimo, petalis linearibus obtuſis, filamentis lanceolatis aequalibus, ſtylo longitudine ſtaminum. *Ait. Kew.* 1. *p.* 441.

Ornithogalum pyrenaicum. *Hudſ. angl.* 143. *Jacq. auſt.* 2. *p.* 2. *t.* 103. *Hoffm. germ.* 119. *Scop. carn. n.* 409.

Phalangium longiſſime ſpicatum, filamentis latis lanceolatis. *Hall. helv. n.* 110.

O. majus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 187.

O. pyrenaicum. *Cluſ. cur.* 21.

Pyrenäiſche Vogelmilch. W.

*Habitat in alpibus* Helvetiae, Carnioliae, *inque pratis* Germaniae, Angliae. 4

13. ORNITHOGALUM *ſtachyoides.*

O. racemo longiſſimo, petalis lanceolato-oblongis, filamentis late lanceolatis, alternis dimidio brevioribus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 441.

O. (*pyrenaicum*) racemo longiſſimo, filamentis lanceolatis, pedunculis floriferis patentibus aequalibus: fructiferis ſcapo approximatis. *Sp. pl.* 440. *Gouan. monſp.* 309. *illuſtr.* 26.

O. racemo longiſſimo, filamentis dilatato-linearibus capſulis erectis. *It. ſcan.* 220.

O. ſpica longiſſima, filamentis triangularibus. *Grou. orient.* 110.

O. anguſtifolium majus, floribus ex albo vireſcentibus. *Bauh. pin.* 70. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 134. *f.* 3.

Stachyoides. *Reneal. ſpec.* 93. *t.* 90.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 340.

Aehrenförmige Vogelmilch. W.

*Habitat in* Europa *auſtrali.* 24

Altitudo *tripedalis ferme.* Stipulae *ſolitariae, non amplexicaules, pedicellorum longitudine.* Stamina *alterna breviora.* Gouan. l. c. R.

*14. ORNITHOGALUM *lacteum.*

O. racemo longo, filamentis ſubulatis alternis ſublanceolatis, bracteis membranaceis ovatis pedunculo duplo brevioribus, foliis lanceolatis acutis margine ciliatis. W.

O. filamentis alternis ad baſin leviter marginatis, racemo pyramidato denſo longo, foliis lanceolatis planis ad apicem conniventibus, ad oras villoſis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 434. *Collect. ſuppl.* 76. *

Milchweiſſe Vogelmilch. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

*15. ORNITHOGALUM *ovatum.* †

O. foliis ovatis integris glabris, racemo ovato. *Thunb. prod.* 62.

Eyförmige Vogelmilch. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

16. ORNITHOGALUM *ciliatum.* †

O. foliis ovatis acutis ciliatis, floribus racemoſis. *Lin. ſuppl.* 199.

O. foliis ovatis acutis ciliatis, racemo erecto. *Thunb. prod.* 62.

Gefranzte Vogelmilch. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

17. ORNITHOGALUM *crenulatum.*

O. foliis oblongis obtuſis ciliatis, floribus racemoſis erectis. *Lin. ſuppl.* 198. *Thunb. prod.* 62.

O. (*unifolium*) folio radicali solitario carnoso oblongo ciliato, scapo nudo, racemo brevi. *Retz. obs.* 2. *p.* 17.*
Gekerbte Vogelmilch. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

18. ORNITHOGALUM *pilosum.* †
O. foliis lineari-ensiformibus ciliatis, floribus racemosis, pedunculis incurvis. *Lin. suppl.* 199. *Thumb. prod.* 61.
Haarige Vogelmilch. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

*19. ORNITHOGALUM *revolutum.*
O. racemo paucifloro, petalis lineari-oblongis oblique flexis emarginatis, filamentis lanceolato-subulatis, foliis linearibus. W.
O. filamentis subulatis, foliis sublinearibus planiusculis glabris, scapo flexuoso racemoso, petalis ad oras revolutis. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 46. *t.* 89. *
Zurückgebogene Vogelmilch. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

*20. ORNITHOGALUM *conicum.*
O. racemo conico, filamentis subulatis, bracteis membranaceis longitudine pedunculorum, foliis lanceolatis planis margine villosis. W.
O. filamentis subulatis, racemo conico, foliis lanceolatis utrinque acuminatis ad oras villosis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 428. *Collect.* 3. *p.* 232. *
Kegelförmige Vogelmilch. W.
*Habitat ad.* Cap. b. spei. 4

21. ORNITHOGALUM *narbonense.*
O. racemo oblongo, filamentis lanceolatis membranaceis, pedunculis floribusque patentibus. *Amoen acad.* 4. *p.* 312. * *Pall it.* 3. *p.* 654. *Gouan. illustr.* 26. *Hoffm. germ. I.* 151. *II.* 394.
O. majus spicatum, flore albo. *Bauh. pin.* 70.
O. narbonense, *Dod. pempt.* 222.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* II. *p.* 342.
Französische Vogelmilch. W.
*Habitat in* Galliae *australis et* Italiae, Sibiriae, Germaniae *agris.* 4
*Minus quam O. pyrenaicum; pro varietate habent* Gerard, *Mygind.*
Folia *sesquipedalia, pollicem lata, in O. stachyoide vix palmaria, angustissima. Gou. l. c. R.*

## 22. ORNITHOGALUM *latifolium.*

O. racemo longiſſimo, filamentis ſubulatis, pedunculis flore multoties longioribus, foliis lanceolatis. W.

O. racemo longiſſimo, foliis lanceolato-enſiformibus, *Sp. pl.* 440. *Lin. ſuppl.* 202. *Mill. dict. n.* 3. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 424. *Collect.* 2. *p.* 318. *

O. latifolium et maximum. *Bauh. pin.* 70.

O. vel Lilium alexandrinum, floribus albis innumerabilibus. *Swert. floril.* 58.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 243.

Breitblättrige Vogelmilch. W.

*Habitat in* Arabia, Aegypto, 4 (v. v.)

Folia *radicalia pedalia pollicis transverſi latitudine.* Scapus *ſesquipedalis teres viridis.* Racemus *longiſſimus.* Pedunculi *pollicis transverſi longitudine ſeu bracteis vix longiores.* Flos *utrinque albiſſimus.* Petala *lanceolata patentia.* Filamenta *erecta lanceolata petalis dimidio breviora alba.* Antherae *flavae.* Germen *vireſcens.* Stylus *ſimplex albus.* Stigma *ſimplex.*

## 23. ORNITHOGALUM *altiſſimum.*

O. racemo longiſſimo, filamentis lubulatis, pedunculis flore duplo longioribus, foliis oblongis apice convoluto-cuſpidatis. W.

O. foliis oblongis obtuſis glabris, racemo quadripedali. *Lin. ſuppl.* 199.

O. foliis oblongo-ellipticis, racemo longiſſimo, bracteis ſetaceis. *Thunb. prod.* 62.

O. (*giganteum*) filamentis ſublanceolatis, foliis linearilanceolatis apice connivente mucronatis, ſcapo racemoque longiſſimis, bracteis ſubulatis brevibus. *Jacq. hort. Schoenb.* I. *p.* 45. *t.* 87. *

Höchſte Vogelmilch. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

## *24. ORNITHOGALUM *ſcilloides.*

O. racemo longiſſimo, filamentis ſubulatis, pedunculis longitudine florum, bracteis pedunculorum longitudine, foliis lineari-lanceolatis laxis, apice convolutis. W.

O. filamentis ſubulatis, foliis ſubenſiformibus apice caudatis, racemis longiſſimis cylindricis. *Jacq. hort. Schoenb.* I. *p.* 46. *t.* 88. *

Meerzwiebelartige Vogelmilch. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ

*25. ORNITHOGALUM *longebracteatum.*

O. racemo longiſſimo, bracteis pedunculis fere duplo longioribus, foliis lanceolato-enſiformibus. *Murr. Syſt.* 327. *Jacq. hort. t.* 29. *

O. (*bracteatum*) foliis enſiformibus acuminatis, bracteis floribus longioribus. *Thunb. prod.* 62.

Langbeblätterte Vogelmilch. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ

*26. ORNITHOGALUM *japonicum.*

O. racemo ſpicato cylindrico longiſſimo, ſcapo ſtriato. *Thunb. jap.* 137.

Japaniſche Vogelmich. W.

*Habitat in* Japonia *juxta* Jedo et Nagaſaki, 2ɬ

Radix *bulboſa.* Bulbus *conicus carnoſus albus nuce avellana paulo major.* Folia *radicalia linearia plana glabra erecta digitalia ſcapo breviora.* Scapus *teres ſtriatus glaber erectus pedalis vel longior.* Flores *racemoſi erecti.* Racemus *ſpicatus cylindricus ſenſim florens digitalis vel ultra.* Bractea *ſub pedunculis linearis marceſcens perſiſtens, pedunculo brevior.* Pedunculi *capillares erecti miſlori longi.* Corolla *hexapetala purpureo-coerulea patens perſiſtens.* Petala *lanceolata lineam longa.* Filamenta 6, *ſubulata erecta alba corollae longitudine, alterne baſi latiora.* Antherae *ovatae didymae.* Germen *ſuperum.* Stylus *ſubulatus erectus albus longitudine corollae.* Stigma *ſimplex obtuſum album.* Capſula *ovata acuta triquetra ſex ſtriata, ſubvilloſa trivalvis trilocularis.* Thunb. l. c.

27. ORNITHOGALUM *comoſum.*

O. racemo breviſſimo, bracteis lanceolatis longitudine florum, petalis obtuſis, filamentis ſubulatis. *Amoen. Acad.* 4. *p.* 312.

O. filamentis lanceolatis, racemo breviſſimo, bracteis lanceolatis longitudine pedunculorum, foliis linearibus canaliculatis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 426. *Collect* 2. *p.* 315. * *Hoſt. ſynop.* 189.

O. pannonicum albo flore ſive quartum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 187.

O. ſpicatum flore viridi lacteſcente. *Bauh. pin.* 70.

O. ſpicatum ſ. comoſum, flore lacteo. *Bauh. pin.* 70. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 135. *f.* 1.

Ornithogali lactei ſpecies major. *Beſl. eyſt. vern. O. S. fol.* 14. *f.* 3.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 342.
Schopfartige Vogelmilch. W.
*Habitat in* Auſtria *ad thermas* Badenſes. 4

28. ORNITHOGALUM *pyramidale.*

O. racemo conico, floribus numeroſis adſcendentibus, petalis elliptico-oblóngis planis, ſtaminibus lanceolatis aequalibus, ſtylo breviſſimo. *Ait. Kew.* 1. *p.* 441.
O. racemo conico, floribus numeroſis adſcendentibus. *Roy. lugdb.* 32. *Mill. dict. n.* 2. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 425. *Collect.* 2. *p.* 317. *
O. anguſtifolium ſpicatum maximum. *Bauh. pin.* 70. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 134. *f.* 4.
O. lacteum maximum. *Beſl. eyſt. vern.* 5. *t.* 14. *f.* 2. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 344.
Pyramidenförmige Vogelmilch. W.
*Habitat in collibus* Luſitaniae. 4

*29. ORNITHOGALUM *tenellum.*

O. racemo brevi, filamentis ſubulatis, petalis lanceolatis, bracteis pedunculo duplo brevioribus, foliis linearibus acuminatis canaliculatis. W.
O. filamentis ſubulatis, ſcapo filiformi laxe racemoſo, bracteis pedunculo duplo brevioribus, foliis linearibus canaliculatis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 427. *Collect.* 2. *p.* 316. *
O. (*graminifolium*) foliis linearibus integris glabris, racemo ſpicato erecto. *Thunb. prod.* 61?
Zarte Vogelmilch. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4
Petala *lactea lanceolata acuta externe linea lata flaveſcenti colorata.* W.

*30. ORNITHOGALUM *odoratum.*

O. racemo elongato, filamentis ſubulatis, petalis lanceolatis obtuſis apice calloſo-inflexis, foliis linearibus depreſſis planis. W.
O. filamentis lanceolatis, racemo longo, foliis lanceolato-linearibus ſuperne planis humi proſtratis. *Jacq. ic.* 2. *t.* 432. *Collect. ſuppl.* 78. *
Riechende Vogelmilch. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4
Racemus *elongatus multiflorus floribus diſtantibus.*

Pedunculus *flore duplo longior.* Petala *luteſcentia linea medio viridi notata.* W.

*31. ORNITHOGALUM *ſuaveolens.*

O. racemo paucifloro, filamentis ſubulatis, petalis obtuſis, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis. W.

O. filamentis lanceolatis racemo brevi, foliis linearibus canaliculatis longitudine ſcapi. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 431. *Collect.* 2. *p.* 316. *

O. (*albucoides*) foliis linearibus canaliculatis glabris, racemo erecto. *Thunb. prod.* 62?

Stiftblumenartige Vogelmilch. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Flos *praecedentis ſed diſtinctum:* foliorum *forma,* racemo *paucifloro quatuor duntaxat floribus ornato,* pedunculisque *longitudine corollae.* W.

*32. ORNITHOGALUM *ſecundum.*

O. racemo paucifloro ſecundo, filamentis ſubulatis, foliis linearibus ciliatis. W.

O. filamentis lanceolatis, racemo brevi ſecundo, foliis ſublinearibus ad apicem acutum fornicatis, ad oras cartilagineo-muricatis erectis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 433. *Collect. ſuppl.* 79. *

O. (*maculatum*) foliis lanceolatis, floribus ſecundis, petalis tribus exterioribus brevioribus fuſco-maculatis. *Thunb. prod.* 62?

Einſeitigblütige Vogelmilch. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

*33. ORNITHOGALUM *fuſcatum.*

O. racemo multifloro, filamentis ſubulatis tribus latioribus, petalis linearibus obtuſis, foliis lineari-enſiformibus, apice convoluto-cuſpidatis ſcapo triplo brevioribus planis. W.

O. filamentis lanceolatis tribus latioribus, racemo oblongo, foliis paucis lineari-cuneiformibus, ſcapo triplo brevioribus, capſulis alato-trilobis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 429. *Collect. ſuppl.* 80. *

Bräunliche Vogelmilch. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

*34. ORNITHOGALUM *barbatum.*

O. racemo paucifloro, filamentis ſubulatis, petalis linearibus obtuſis, tribus exterioribus apice barbatis, interioribus mucronatis, foliis filiformibus. W.

O. filamentis ſubulatis, foliis ſubgeminis ſubulatis, petalis tribus alternis ad apicem barbatis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 47. *t.* 91. *

Bärtige Vogelmilch. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

*35. ORNITHOGALUM *polyphyllum.*

O. racemo paucifloro, filamentis ſubulatis, petalis linearibus obtuſis, apice calloſo-inflexis, foliis lineari-ſubulatis ſemiteretibus. W.

O. filamentis lanceolatis, racemo brevi, foliis plurimis ſubulatis ſemiteretibus. *Jacq. ic.* 2. *t.* 430. *Collect. ſuppl.* 79. *

Vielblättrige Vogelmilch. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

*36. ORNITHOGALUM *juncifolium.*

O. racemo elongato multifloro, filamentis ſubulatis, petalis lanceolatis acutis, foliis filiformi-ſubulatis. W.

O. filamentis ſublanceolatis, racemo longiſſimo, foliis ſubulatis plurimis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 46. *t.* 90. *

Binſenblättrige Vogelmilch. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

37. ORNITHOGALUM *ruperſtre.*

O. foliis filiformibus carnoſis, ſcapo paucifloro. *Lin. ſuppl.* 199.

O. foliis filiformibus carnoſis, floribus reflexis. *Thunb. prod.* 61.

Felſen Vogelmilch. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24 (v. v.)

38. ORNITHOGALUM *arabicum.*

O. corymbo multifloro, filamentis ſubulatis, corolla late campanulata, petalis exterioribus obſolete tridentatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 412.

O. floribus corymboſis, pedunculis ſcapo humilioribus, filamentis ſubemarginatis. *Roy. lugdb.* 32. *Mill. dict. n.* 8.

O. umbellatum maximum. *Bauh. pin.* 69. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 130. *f.* 1.

O. arabicum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 186. *Beſl. eyſt. vern.* 5. *t.* 12. *f.* 1.

Melanomphale. *Reneal. ſpec.* 89. *t.* 90.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 344.

Arabiſche Vogelmilch. W.

*Habitat Aexandriae* Aegypti, *inque* Madera. 4

*Stamina connata. Hall. goett.* 81. Bracteae *amplexicaules, cordatae.*

*39. ORNITHOGALUM *thyrsoides.*

O. corymbis multifloris racemiformibus, filamentis alternis furcatis, foliis lanceolatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 442.

α. floribus luteis, bracteis pedunculo brevioribus.

Ornithogalum dubium. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 347. *t.* 82. *f.* 3.

β. floribus albis, bracteis longitudine pedunculi.

O. (*thyrsoides*) floribus racemosis confertissimis, filamentis emarginatis. *Murr. Syst.* 328. *Jacq. hort.* 3. *p.* 17. *t.* 28. *Thumb. prod.* 62.

O. racemo conico laxo, pedunculis longissimis, floribus erectis. *Mill. ic.* 128. *t.* 192.

Thyrsisblütige Vogelmilch. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

*40. ORNITHOGALUM *aureum.*

O. racemo coarctato subcorymboso, filamentis alternis emarginatis, foliis lanceolatis cartilagineo-denticulatis. W.

α. floribus rubris, bracteis lanceolatis pedunculo duplo brevioribus. W.

Ornithogalum miniatum. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 438. *Collect.* 3. *p.* 233. *

β. floribus aurantiis, bracteis lanceolatis pedunculo duplo brevioribus. W.

O. (*aureum*) foliis ovato-lanceolatis albo-marginatis, floribus racemosis confertis, filamentis nectario emarginato insidentibus. *Curt. mag.* 190. *

γ. floribus inapertis aurantiis, apertis albo-flavescentibus, bracteis lanceolatis, pedunculo duplo brevioribus. W.

Ornithogalum flavescens. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 437. *Collect.* 3. *p.* 233. *

δ. floribus flavis, bracteis angusto-lanceolatis fere longitudine pedunculi. W.

Ornithogalum flavissimum. *Jacq. ic.* 2. *t.* 436. *Collect. suppl.* 65. *

Goldene Vogelmilch. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

*Affine praecedenti.* W.

*41. ORNITHOGALUM *coarctatum.*
O. racemo multifloro coarctato, filamentis alternis emarginatis, foliis linearibus canaliculatis. W.
O. filamenris alternis emarginatis, racemo oblongo ob pedunculos valde approximatos coarctato, foliis linearibus canaliculatis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 435. *Collect. suppl.* 77. *
Gedrängtblütige Vogelmilch. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

*42. ORNITHOGALUM *caudatum.*
O. racemo longiſſimo, foliis lanceolato-linearibus, corollis patentibus, ſtaminibus dilatatis, alternis cuneiformibus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 442.
O. filamentis tribus baſi ovatis, tribus lanceolatis, racemo longiſſimo, foliis lanceolato-linearibus apice longe ſubulatis et teretibus. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 425. *Collect.* 2. *p.* 315. *
Geſchwänzte Vogelmilch. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24 (v. v.)

43. ORNITHOGALUM *nutans.*
O. floribus ſecundis pendulis, nectario ſtamineo campaniformi. *Mill. dict. n.* 4. *Iacq. auſtr. t.* 301. *Hoffm. germ.* 119. *Roth. germ. I.* 151. *II.* 395.
O. floribus ſpicatis, feneſcentibus pendulis, filamentis ſtaminum alternis majoribus, bicornibus. *Hall. helv. n.* 1216.
O. floribus ſecundis pendulis, filamentis latis emarginatis. *Hort. cliff.* 124. *Hort. upſ.* 84. *Roy. lugdb.* 52.
O. exoticum, magno flore minori innato. *Bauh. pin.* 70. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 137. *f.* 12.
O. neapolitanum. *Cluſ. app.* 2. *p.* 9. *t.* 9.
*Houttuyn Lin. Pfl.* Syſt 11. *p.* 350.
Hängendblütige Vogelmilch. W.
*Habitat in* Italia; *Neapoli innotuit circa* 1570; in Helvetia, Germania. 24 (v. v.)

## 640. SCILLA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 567.

*Cor.* 6-petala, patens, decidua. *Filamenta* filiformia.

1. SCILLA *maritima.*
S. nudiflora, bracteis refractis. *Mat. med. p.* 94. *Mill. dict. n.* 1. *Blackw. t.* 591.

S. radice tunicata. *Hort. cliff.* 123. *Hort. upſ.* 89. *Roy. lugdb.* 32.
S. vulgaris, radice rubra. *Bauh. pin.* 73.
S. hiſpanica. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 171.
β. Scilla radice alba. *Bauh. pin.* 73. *Seb. muſ.* 1. *t.* 44. *f.* 4. 5. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 354.
Gemeine Meerzwiebel. W.
*Habitat ad* Hiſpaniae, Siciliae, Syriae *litora areno ſa.* 24 (v. v.)
Folia *lanceolata, ſtricta.* Scapus *ante folia, longiſſimus, multiflorus.* Flores *albi*: Bracteae *lineari-lanceolatae, refractae genu in medio, ſurſum flexae, ſubtus calcaratae.*

2. SCILLA *Lilio-Hyacinthus.*

S. racemo paucifloro, pedunculis ebracteatis, foliis lanceolatis humi adpreſſis, bulbo ſquamato. W.
S. radice ſquamata. *Hort. cliff.* 123. *Roy. lugdb.* 32. *Mill. dict. n.* 2.
Hyacinthus ſtellaris, folio et radice lilii. *Bauh. pin.* 46. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 375. *t.* 12. *f.* 21.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 363.
Lilienartige Meerzwiebel. W.
*Habitat in* Biſcaja, Aquitania, Hiſpania, Pyrenaeis. N

3. SCILLA *italica.*

S. racemo conico oblongo. *Syſt. veg.* 328. *Retz. obſ.* 1. *p.* 15.
S. corymbo conferto hemiſphaerico. *Sp pl.* 2. *p.* 447. *Mill. dict. n.* 3.
S. radice ſolida, floribus corymboſis confertiſſimis. *Hort. cliff.* 123. *Roy. lugdb.* 32.
Hyacinthus ſtellaris ſpicatus cinereus. *Bauh. pin.* 46.
Hyacinthus ſtellaris italicus. *Beſl. eyſt. vern.* 42. *f.* 1.
Hyacinthus ſtellatus cinerei coloris. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 184.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 364.
Italiäniſche Meerzwiebel. W.
*Habitat* - - - - 24 (v. f.)
Racemus *conico-oblongus pedicellis erectiuſculis, longitudine floris.* Flos *patens petalis lateribus reflexis, apice obtuſis, albis aut coeruleis.* Bracteae *longitudine pedicellorum.*

4. SCILLA *tetraphylla.*

S. acaulis, floribus faſciculatis, foliis quaternis ovato-lanceolatis. *Lin. ſuppl.* 200.

Vierblättrige Meerzwiebel. W.

*Habitat in* Africa. *D. D. Fabricius Prof. Havn.*

Radix *bulbosa.* Folia *quatuor radicalia patentia cruciata cordato-lanceolata sessilia nervosa laevia.* Scapus *nullus.* Flores *foliis dimidio breviores, pedunculis filiformi-setaceis unifloris copiosissimis.* Petala *lanceolata margine membranacea.* Filamenta 6, *setaceà petalis breviora.* Antherae *oblongae.* Germen *subrotundum sexangulare obtusum.* Stylus *filiformis.* Stigma *obtusum.*

5. SCILLA *peruviana.*

S. corymbo conferto conico. *Mill. dict. n.* 4.

Hyacinthus indicus bulbosus stellatus. *Bauh. pin* 47. *Rudb. elys.* 1. *p.* 37. *f.* 1.

Hyacinthus stellatus peruanus. *Clus. hist.* 1. *p.* 182.

Eriophorus peruvianus. *Clus. hist.* 1. *p.* 173.

β. flore albo.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 364.

Peruvianische Meerzwiebel. W.

*Habitat in* Lusitania. 4 (v. v.)

Radix *tunicata, lanuginosa. Sauv.* Scapus *teres.* Corollae *senescentes recurvatae, petalorum marginibus recurvatis.*

*6. SCILLA *japonica.*

S. florum umbella terminali fastigiata. *Thunb. jap.* 137.

Japanische Meerzwiebel. W.

*Habitat in* Japonia. 4

Scapus *erectus simplex glaber palmaris.* Bracteae *in scapo et sub floribus alternae membranaceae lanceolatae erecto-adpressae unguiculares, interstitiis longiores.* Flores *terminales subumbellati.* Pedunculi *semiunguiculares.* Corolla *patens albo-purpurea.* Petala *in ungues attenuata oblonga obtusa unguicularia.* Filamenta *infima basi petalorum inserta corolla paulo breviora.* Antherae *oblongae coerulescentes.* Stylus *corolla paulo longior.* Folia *nunquam vidi in planta florente.* Thunb. l. c.

7. SCILLA *amoena.*

S. scapo angulato, pedunculis alternis flore brevioribus, bracteis obtusis brevissimis. W.

S. floribus lateralibus alternis subnutantibus, scapo angulato. *Hort. cliff.* 123. *Roy. lugdb.* 33. *Iacq. austr. t.* 218. *Mill. dict. n.* 5. *Kniph. cent.* 11. *n.* 91. *Hoffm. germ.* 120. *Roth. germ. I.* 151. *II.* 396.

Hyacinthus ſtellaris caeruleus amoenus. *Bauh. pin.* 46. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 34. *t.* 7.
Hyacinthus ſtellaris bizantinus. *Beſl. eyſt. vern.* 43. *f.* 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 184.
β. corolla campanulata. W.
*Houttuyn Lin. Pfl.* Syſt. 11. *p.* 366.
Schöne Meerzwiebel.
*Habitat forte* Byzantii, *unde venit in Europam* 1590; *in* Auſtria, Ruſſia, Germania. 4 (v. v.)
Gemmen *flavum.* Petalorum *baſis lineolis* 2 *albidis.*

*8. SCILLA *praecox.* W.
S. ſcapo angulato, racemo ſubcorymboſo, pedunculis flore duplo longioribus, bracteis obſcuris. W.
Frühe Meerzwiebel. W.
*Habitat* - - - - 4 (v. v.)
*A praecedente habitu, parvitate et praecocitate floris jam primo intuitu diſtincta; differt vero:* pedunculis *inferioribus longiſſimis triplo et ultra flore longioribus, ſuperioribus duplo flore longioribus*; bracteis *obtuſis minutiſſimis vix conſpicuis*; corolla *campanulata triplo praecedentis minore*; foliis *linearibus obtuſiusculis nunquam, ut in praecedente, baſi attenuatis.* W.

*9. SCILLA *campanulata.*
S. bulbo ſolido, racemo multifloro oblongo-ſubconico corollis campanulatis erectis, bracteis bipartitis pedunculo longioribus foliis lanceolatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 444.
Scilla hyacinthoides. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 65. *Collect.* 1. *p.* 61.
Scilla hiſpanica. *Mill. dict.*
Hyacinthus ſtellaris ſaturate coeruleus. *Bauh. pin.* 46.
Hyacinthus hiſpanicus ſtellato flore. *Cluſ. cur.* 20.
Glockenblütige Meerzwiebel. W.
*Habitat in* Hiſpania, Luſitania. 4 (v. ſ.)

10. SCILLA *bifolia.*
S. floribus racemoſis, foliis lanceolato-linearibus ſubbinis in ſcapo elevatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 444.
S. radice ſolida, floribus erectiuſculis pancioribus. *Hort. cliff.* 123. *Roy. lugdb.* 33. *Sauv. monſp.* 18. *Iacq. auſt.* 2. *p.* 11. *t.* 117. *Oed. dan. t.* 568. *Mill. dict. n.* 6. *Hoffm. germ.* 120. *Retz. obſ.* 6. *p.* 27. *
Phalangium radice bulboſa, foliis latiſſimis obtuſis, ſpica pauciflora, ſtipulis minimis. *Hall. helv. n.* 1211.

Anthericum bifolium. *Scop. carn. n.* 414.
Ornithogalum bifolium. *Necker in Act. pal. vol.* 2. *p.* 46.
Hyacinthus ſtellaris bifolius germanicus. *Bauh. pin.* 45.
Hyacinthus ſtellatus, bifolius vernus dumetorum, flore coeruleo. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 679. R.
Hyacinthus Fuchſii. *Dodon. cor.* 181. *hiſt.* 219. R.
Hyacinthus coeruleus mas minor. *Fuchſ. hiſt.* 837.
β. Hyacinthus ſtellatus, albo flore. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 184. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 367.
Zweyblättrige Meerzwiebel. W.
*Habitat in* Gallia, Germania. 4 (v. v.)
*Flores ſaepe* 4, *altitudine aequales.*

*11. SCILLA *verna.*

S. bulbo tunicato, racemo paucifloro bracteato, corollis campanulatis, foliis linearibus canaliculatis, radicalibus pluribus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 445.
S. corymbo hemiſphaerico paucifloro bracteato, foliis ſubulato-linearibus canaliculatis. *Hudſ. angl.* 142.
Ornithogalum hiſpanicum minus. *Cluſ. hiſt.* 188. *Ger. emac.* 166. *Park. par.* 139. *Raj. hiſt.* 1153.
Ornithogalum umbellatum floſculis ex albo ſubcoeruleis. *Bauh. pin.* 70.
Frühlings Meerzwiebel. W.
*Habitat in* Hiſpaniae *et* Cambria *pratis atque paſcuis, inque maritimis inſulae* Monae. 4 (v. f.)
Bracteae *membranaceae longitudine pedunculi.* W.

12. SCILLA *luſitanica.*

S. racemo oblongo conico, petalis lineatis. *Syſt veg. p.* 271.
Hyacinthus ſtellaris coeruleus, ſtaminibus e viridi luteis. *Bauh. pin.* 46. *Rud. elyſ.* 2. *p.* 34. *f.* 4.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 369.
Portugiſiſche Meerzwiebel. W.
*Habitat in* Luſitania. 4
Similis *Sc. amoenae.* Scapus *teres.* Racemus *oblongus, ſubconicus,* Floribus *diſtantibus, petiolo fere brevioribus.* Petala *elliptica, obtuſiuſcula, ſulcato-lineata, patentia.* Stamina *petalis paulo breviora: Antheris flavis.*

*13. SCILLA *orientalis.*

S. floribus erectis racemoſis, foliis elliptico-enſiformibus. *Thunb. Act. Soc. Linn. Lond.* 2. *p.* 334.

Scilla bifolia. *Thumb. jap.* 158.
Orientaliſche Meerzwiebel. W.
*Habitat in* Japonia. 4

Folia *radicalia plura inferne attenuata enſiformia glabra ſpithamaea.* Scapus *erectus glaber bipedalis, ſquamis alternis ſpathaceis.* Flores *racemoſi.* Thunb. l. c.

14. SCILLA *byacinthoides.*

S. racemo cylindraceo multifloro petalis germine ſesquilongioribus, pedunculis coloratis, foliis lanceolatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 445.

S. racemo longiſſimo, floribus pedunculo colorato brevioribus. *Syſt. veg.* 329.

S. racemo longiſſimo, floribus ſubverticillatis, pedunculis patentibus. *Gouan. illuſtr. p.* 26.

Bulbus eriophorus orientalis. *Bauh. pin.* 47.
Ornithogalum eriophorum orientale. *Tournef. inſt.* 381.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 364.
Hyacinthenartige Meerzwiebel. W.
*Habitat in* Madera. 4 (v. l.)

Flores *coerulei, numeroſi, parvi. Pedicelli ſparſi, filiformes, coerulei, floribus triplo longiores.*

*Probe notat Dodonaeus, quod, niſi ſaepius a bulbo principe avellantur bulbilli, per annos ſaepe viginti non florebit. Gouan. l. c.*

15. SCILLA *autumnalis.*

S. foliis filiformibus linearibus, floribus corymboſis, pedunculis nudis adſcendentibus longitudine floris. *Sp. pl.* 443. *Mill. dict. n.* 7. *Cavan. ic.* 3. *p.* 38. *t.* 274. *f.* 2.*

Anthericum autumnale. *Scop. n.* 415.

S. radice ſolida foliis ſetaceis, floribus faſtigiatis, pedunculis arcuatis ex ala tuberculi mammillaris. *Guett. ſtamp.* 131. *Dalib. pariſ.* 102.

S. radice ſolida, ſcapo multifloro, floribus capitatis. *Sauv. monſp.* 19.

Hyacinthus ſtellaris autumnalis minor. *Bauh. pin.* 47.
Hyacinthus autumnalis minor. *Cluſ.* I. *p.* 185.
*Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 370.
Herbſt Meerzwiebel. W.
*Habitat in* Hiſpania, Gallia, Veronae, *ſolo glareoſo.* 4

Corolla *magnitudine piſi, longitudine pedicelli.*

16. SCILLA *unifolia.*
S. folio teretiuſculo latere ſubſpicato. *Sp. pl.* 443.
Ornithogalum ſpicatum unifolium, flore niveo odorato. *Griſl. luſit.*
Bulbus monophyllus, flore albo. *Bauh. hiſt. 2. p.* 622. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 372.
Einblättrige Meerzwiebel. W.
*Habitat in* Luſitania.

## 641. CYANELIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 568.

*Cor.* hexapetala: petalis 3 inferioribus pro-pendentibus. *Stamen* infimum declinatum, longius.

1. CYANELLA *capenſis.*
C. caule folioſo paniculato, racemis divaricatis, foliis lanceolatis undulatis. W.
C. foliis undulatis, caule patentiſſimo. *Lin. ſuppl.* 201.
C. foliis lanceolatis undatis, ramis divaricatis. *Thunb. Act. holm.* 1794. *p.* 196. * *Thunb. prod.* 65.
Cyanella capenſis. *Syſt. veg.* 13. *p.* 272. *Iacq. hort.* 3. *p.* 21. *t.* 35.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 374.
Blaue Caplilie. W.
*Habitat ad radices montis* Tabularis *in* Cap. b. Spei. 24
Statura *Scillae.* Flores *irregulares.*

*2. CYANELLA *orchidiformis.*
C. caule ramoſo, racemis erectis, foliis caulinis enſiformibus ſtrictis, radicalibus ovatis. W.
C. foliis lanceolatis baſi canaliculato-amplexicaulibus ſuperne planis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 447. *Collect.* 4. *p.* 211. *
Ragwurzartige Caplilie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24 (v. ſ.)
Folia *glauca margine cartilagineo-denticulata.* Corolla *violaceo-purpurea.* Stamina *diſtantia tria cum petalis tribus erecta, tria cum tribus petalis deflexa.* W.

3. CYANELLA *lutea.*
C. ſcapo nudo ſubramoſo: racemis erectis, foliis lineari-lanceolatis planis. W.

C. foliis enſiformibus, ramis erectis. *Lin. ſuppl.* 201.
C. foliis enſiformibus planis, ramis erectis. *Thunb. Act. holm.* 1794. *p.* 195. *t.* 7. *f.* 1. * *Thunb prod.* 65.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 375.
Gelbe Caplilie. W.
*Habitat in campis inundatis arenoſis* Cap. b. ſpei. 4

*Convenit cum C. capenſi:* Filamentis *baſi in urceolum natis.* Anthera *una majori.* Stigmate *ſimplici. Differt ab illa:* Foliis *radicalibus lanceolatis nec linearibus.* Pedunculis *minus divaricatis.* Petalis *majoribus luteis.*

Filamenta *tria erecta, tria deflexa cum majori.* W.

4. CYANELLA *alba.*

C. ſcapo nudo unifloro, foliis filiformibus. W.
C. foliis lineari-filiformibus. *Lin. ſuppl.* 201. *Thunb. Act. holm.* 1794. *p.* 195. *t,* 7. *f.* 2. * *Thunb, prod.* 65.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 375.
Weiſſe Caplilie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in* Bockland. 4

Bractea *filiformis in medio ſcapi.* Stamina *erecta, majus tantum deflexum.* W.

## 642. ASPHODELUS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 569.

*Cor.* 6-partita. *Nectarium* ex valvulis ſex germen tegentibus.

1. ASPHODELUS *luteus.*

A. caule folioſo, foliis triquetris ſtriatis. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upſ.* 83. *Roy. lugdb.* 33. *Blackw. t.* 233. *Mill. dict. n.* 1. *Iacq. hort. t.* 77. *Kniph. cent.* 8. *n* 9.
A. caule folioſo, foliis angulatis, ſtriatis, ſtipulis maximis. *Hall. helv. n.* 1206.
A. luteus. *Dodon. coron. p.* 142. 143. R.
A. luteus flore et radice. *Bauh. pin.* 28.
A. femina. *Cam. epit.* 372.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 375.
Gelber Alfodil. W.
*Habitat in* Sicilia. ♂ (v. v.)

Bracteae *membranaceae, albae, majuſculae.* Corollae *ſexpartitae: petalis* 4 *in crucem diſpoſitis: duobus intra ſuperiora tria petala poſitis.* Stamina *declinata, quorum tria breviora.*

*2. ASPHODELUS *creticus*.

A. caule folioso superne nudo ramoso, foliis filiformibus striatis denticulatis subciliatis. *Lamarck. encyclop.* 1. *p.* 297. *

A. creticus luteus serotinus patulus, folio aspero. *Tournef. cor.* 25.

Cretischer Affodil. W.

*Habitat in* Creta.

3. ASPHODELUS *ramosus*.

A. caule nudo ramoso, pedunculis alternis bractea longioribus, foliis ensiformibus carinatis laevibus. W.

A. caule nudo, foliis ensiformibns carinatis laevibus. *Mat. med.* 94. *Mill. dict. n.* 2. *Osb. it.* 47.

A. caule nudo, foliis laxis. *Hort. cliff.* 127. *Roy. lugdb.* 24. *Sauv. monsp.* 20.

A. albus ramosus mas. *Bauh. pin.* 28.

Asphodelus primus. *Clus. hist.* 1. *p.* 196.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 377.

Aestiger Affodil. W.

*Habitat in* Narbona, Lusitania, Hispania, Italia, Carniolia. 4 (v. s.)

*4. ASPHODELUS *albus*. W.

A. caule nudo simplici, pedunculis confertis longitudine bractearum, foliis linearibus carinatis laevibus. W.

Asphodelus ramosus. *Murr. Comment. nov. Goett.* 1776. *p.* 37. *tab.* 7. *

A. verus albus. *Blackw. t.* 238.

Asphodelus secundus. *Clus. hist.* 1. *p.* 197.

Weisser Affodil. W.

*Habitat in saxosis editioribus* Lusitaniae, Hispaniae, Narbonae, Croatiae. 4 (v. v.)

*Distinguo hanc plantam a praecedente, quacum conjuncta erat, ob habitum et characteres constantes. Differt*: foliis *angustioribus*, caule *semper indiviso*, bracteis *pedunculorum longitudine*, floribus *minoribus non alternis remotis sed multo confertioribus*. W.

5. ASPHODELUS *fistulosus*.

A. caule nudo, foliis strictis subulatis striatis subfistulosis. *Hort. cliff.* 83. * *Mill. dict. n.* 4. *Fabric. helmst. p.* 5. *Gouan. monsp.* 174. *illustr.* 26. *Cavan. ic.* 3. *p.* 1. *t.* 202. *

A. caule nudo, foliis strictis. *Roy. lugdb.* 34.

A. foliis fistulosis. *Bauh. pin.* 29.

A. minor. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 197.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 379.
Röhriger Affodil. W.
*Habitat in* Gallo-Provincia, Hiſpania, Creta. 4 (v. v.)

*6. ASPHODELUS *altaicus.*

A. caule nudo ſimplici, ſtaminibus corolla duplo longioribus, foliis linearibus canaliculatis. W.
A. ſcapo nudo ſimpliciſſimo, foliis triquetro-carinatis laevibus. *Pall. Act. Petrop.* 1779, *p.* 260. *tab.* 10. *
Altaiſcher Affodil. W.
*Habitat ad radices montium* Altaicorum. 4 (v. ſ.)

*7. ASPHODELUS *liburnicus.* †

A. caule ſimplici baſi folioſo, corollis cernuis monopetalis, foliis ſetaceis.
A. (*liburnicus*) foliis ſetaceis. *Scop. carn. n.* 411. *t.* 12. *
Hyazinthenartiger Affodil. W.
*Habitat in* Iſtria.
*Planta adhuc obſcura ob corollas campanulatas ſexdentatas, habitu tantum Aſphodelis proxima. Diſtinguant autoptae.* W.

## 643. ANTHERICUM.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 570.

Cor. 6-petala, patens. *Capſ.* ovata.

* Phalangium *foliis canaliculatis. Filamentis ſaepius glabris.*

1. ANTHERICUM *ſerotinum.*

A. foliis planiuſculis, ſcapo unifloro.
Phalangium foliis craſſulis, ſcapo unifloro. *Hall. helv. n.* 1209.
Bulbocodium foliis ſubulato-linearibus. *Roy. lugdb.* 41. *Sp. pl.* 1. *p.* 294.
Bulbocodium alpinum juncifolium, flore unico intus albo extus ſqualide rubente. *Raj. angl.* 3. *p.* 374. *t.* 17. *f.* 1.
Narciſſus ſerotinus. *Cluſ. pan.* 162.
Narciſſus autumnalis minor. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 662.
Pſeudo-Narciſſus gramineo folio. *Bauh. pin.* 51. *prodr.* 27. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 64. *f.* 9. *Burſ. III.* 41.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 326.
Späte Zaunblume. W.
*Habitat in alpibus* Angliae, Helvetiae, Taureri *raſtadienſis*, Wallaeſiae, Sibiriae. 4 (v. ſ.)

Radix *oblonga, obducta ſquamis ramentaceis.* Scapus *bracteis ſ. foliis* 3. *ſ.* 4, *lanceolatis, alternis, minutis, vaginantibus abſque Spatha.* Flos *inferus.* Petala *lineis rufis, unguibus luteis.* Filamenta *non lanata.*

*2. ANTHERICUM *fragrans.*

A. foliis tereti-filiformibus ſtrictis ſcapo brevioribus, ſcapo ſimplici. W.

A. filamentis glabris, radice bulboſa, foliis ſemifiliformibus ſemiteretibus rectis, ſcapo erecto duplo brevioribus. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 45. *t.* 86. *

Wohlriechende Zaunblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2

Corolla *albida, petalis obtuſis externe purpuraſcentibus coſta media viridi notatis.* W.

*3. ANTHERICUM *filifolium.*

A. foliis filiformibus flexuoſis reflexis ſcapo longioribus, ſcapo ſimplici filiformi, racemo paucifloro. W.

A. filamentis glabris, radice bulboſa, foliis filiformibus flexuoſis glabris, ſcapo ſimplici flexuoſo. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 414. *Collect. ſuppl.* 93. *

Fadenblättrige Zaunblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in regione* Namaquas. 2

Petala *obtuſa nivea coſta media viridi.* W.

*Anthericum filifolium a Clariſſ. Thunbergio prod.* 62. *indicatum, eſt forte praecedens vel haec ſpecies, nam ex diagnoſi ſequenti:* foliis filiformibus ſcapo erecto brevioribus, *non auſim quid certi determinare.* W.

4. ANTHERICUM *flexifolium.*

A. foliis lineari-filiformibus flexuoſis reflexis, baſi ciliatis, ſcapi ramoſi longitudine. W.

A. filamentis glabris, radice tuberoſa fuſiformi ſaepe bifida, foliis ſubulatis flexuoſis, ſcapo ramoſo. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 412. *Collect. ſuppl.* 93. *

A. foliis ſubulatis glabris flexuoſis, caule ramoſo. *Lin. ſuppl.* 201.

A. foliis linearibus ſpiralibus ſcapo ramoſo longioribus. *Thunb. prod.* 62.

Schlankblättrige Zaunblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2

*5. ANTHERICUM *filiforme.*

A. foliis filiformi-teretiuſculis ſcabridis, filamentis glabris, petalis lanceolatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 451.

Fadenförmige Zaunblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Scapus *filiformis pedalis, foliis brevior baſi rufeſcens maculis pallidis.* Petala *tria exteriora intus alba, extus viridia, tria interiora alba, extus linea viridi.* Ait. l. c.

*6. ANTHERICUM *exuviatum.*

A. foliis lineari-ſubulatis canaliculatis, ſcapo ſimplici foliis breviore, ſquamis radicalibus transverſim rugoſis. W.

A. filamentis glabris, radice bulboſa, foliis ſubulatis foris convexis, intus concavis, erectis, baſi incluſis vaginae ſcarioſae et transverſim ſtriatae, ſcapo ſimplici. *Iacq. ic. rar. 2. t.* 415. *Collect. ſuppl.* 89. *

Häutige Zaunblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

*7. ANTHERICUM *elongatum.* †

A. foliis lineari-ſiliformibus ſcapo ramoſo brevioribus, racemis elongatis.

Anthericum filiforme. *Thunb. prod.* 62.
Langährige Zaunblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

*Mutavi nomen, quum mihi diverſum videatur.* W.

8. ANTHERICUM *graecum.*

A. foliis planis, ſcapo ſimplici, floribus corymboſis, filamentis lanatis. *Syſt. Veg.* 272.

Bulbocodium graecum, myoſotidis flore. *Tournef. cor.* 50. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 387.
Griechiſche Zaunblume. W.
*Habitat in* Oriente. *Burmannus.* 4 (v. ſ.)

*Bulbus.* Folia *linearia, glabra, longitudine fere ſcapi.* Scapus *ſimplex Foliis* 3 *ſ.* 4, *brevioribus.* Corymbus *terminalis, ſubquinqueflorus: pedunculo intermedio unifloro; lateralibus bifloris.* Corolla *alba A. ramoſi. Stamina corolla breviora et Stylus ſtaminibus brevior.*

Filamenta *non lanata.* *Mant* 365.

9. ANTHERICUM *planifolium.*

A. foliis planis, ſcapo filamentisque lanatis. *Vandell. mſs. Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 388.
Flachblättrige Zaunblume. W.
*Habitat in* Luſitania *trans Tagum, prope Capo de Spizel, florens Aprili. D. Vandelli.* 4

Radices *oblongae, craſſae flaveſcentes.* Folia *radicalia, linearia, planiuſcula, ſtriata, ſubcarinata, extremitate involuto-ſubulata.* Scapus *ramoſus*: Bracteis *lanceolatis.* Pedunculis *ſubracemoſis.* Flores *rubri, magnitudine Anth. ramoſi.* Filamenta *lanata.* Antherae *flavae.* Stylus *ſtaminibus brevior.*

Statura *Anth. graeci, ſed flores minores,* Filamentis *non laevibus.*

10. ANTHERICUM *ſquameum.*

A. ſcapo ſquamis membranaceis tumidis imbricato. *Lin. ſuppl.* 202.

A. (*brevifolium*) foliis lanceolatis breviſſimis, floribus remotiſſimis. *Thunb. prod.* 62?

Schuppige Zaunblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2

Radix *tuberoſa, tuberibus oblongis tomentoſis pluribus, filo pendulis.* Folia *tria radicalia graminea palmaria in quibusdam transverſe plicata.* Scapus *pollicaris brevis baſi undique cinctus paleis membranaceis diaphanis amplexicaulibus ſublanceolatis laxis.* Racemus *terminalis e paleis ſcarioſis hyalinis acutiſſimis.* Pedunculi *inter ſingulas paleas ſolitarii pubeſcentes filiformes longitudine palearum uniflori.* Corolla *infundibuliformis extus ſubpubeſcens ſexpartita.* Tubus *cylindricus.* Limbus *acutus carinatus longitudine pedunculi carina nudi.* Stamina *ſex limbo dimidio breviora.* Stigma *ſimplex.* Capſulae *globoſae cernuae. Media planta inter Hyacinthos, Ornithogala et Antherica.* Radix *tuberoſa, ideo non Hyacinthus, Ornithogalum ſive Scilla. Variat foliis hirſutis et glabris.*

*11. ANTHERICUM *comoſum.* †

A. foliis enſiformibus glabris, ſcapo ramoſo comoſo. *Thunb. prod.* 63.

Schopftragende Zaunblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2

*12. ANTHERICUM *floribundum.*

A. foliis planis glabris lineari-lanceolatis acutis, ſcapo ſimplici, racemo multifloro cylindrico compacto, petalis patentibus, ſtaminibus glabris. *Ait. Kew.* 1. *p.* 447.

A. (*Lagopus*) foliis lineari-enſiformibus ſcapo ſimplici brevioribus, racemo erecto longiſſimo. *Thunb. prod.* 63?

Vielblütige Zaunblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2

13. ANTHERICUM *revolutum.*

A. foliis trigonis ſcabris, ſcapo ramoſo, corollis revolutis. *Mill. dict. n.* 1.

A. foliis linearibus ſcapo longioribus. *Thunb. prod.* 62.

Phalangium aethiopicum ramoſum, floribus albis, petalis reflexis. *Comm. hort.* 1. *p.* 67. *t.* 34. *Murray. prodr.* 214.

Aſphodelus foliis compreſſis aſperis, caule patulo. *Tournef. inſt.* 343.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 389.

Zurückgebogene Zaunblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

14. ANTHERICUM *ramoſum.*

A. foliis planis, ſcapo ramoſo, corollis planis, piſtillo recto. *Pollich. pal. n.* 334. *Mill. dict. n.* 2. *Scop. carn. n.* 413. *Iacq. auſtr. t.* 161. *Kniph. cent.* 12. *n.* 12. *Hoffm. germ.* 120. *Roth. germ. I.* 149. *II.* 319.

Phalangium radicibus teretibus, foliis gramineis, caule ramoſo, laxe paniculato. *Hall. helv. n.* 1208.

Anthericum foliis planis, corollis planis deciduis. *It. gotl.* 178. * *Fl. ſuec.* 267, 289.

A. caulibus ramoſis, foliis planis. *Guett. ſtamp. p.* 129.

Phalangium, parvo flore, ramoſum. *Bauh. pin.* 29. *Lob. ic.* 47.

Phalangium majus. *Cam. epit.* 580.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 390.

Aeſtige Zaunblume. W.

*Habitat in* Europae *auſtralioris rupibus calcareis.* 4 (v. v.)

Horologium florae. *Act. bernenſ.* 1766. *t.* 6.

*15. ANTHERICUM *elatum.*

A. foliis planis ſcapo ramoſo, pedunculis aggregatis, corollis planis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 448.

Aſphodelus foliis planis, caule ramoſo, floribus ſparſis. *Mill. ic.* 38. *t.* 56.

Hohe Zaunblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

16. ANTHERICUM *falcatum.*

A. foliis carnoſis enſiformibus falcatis glabris, caule ramoſo racemoſo. *Lin. ſuppl.* 202.

A. foliis enſiformibus falcatis glabris, ſcapo ramoſo. *Thunb. prod.* 63.

Sichelblättrige Zaunblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

Folia *depreſſa terrae incumbentia et latere falcata.*

17. ANTHERICUM *contortum.*

A. foliis planis enſiformibus, caule ramoſo, floribus remotiſſimis. *Lin. ſuppl.* 202.

A. foliis enſiformibus caule ramoſo brevioribus, floribus remotiſſimis. *Thunb. prod.* 63.

Gedrehte Zaunblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

Corolla *contorta.*

*18. ANTHERICUM *veſpertinum.*

A. foliis lineari-enſiformibus carinato-triquetris ſcapo ramoſo brevioribus. W.

A. filamentis muricatulis acaule, foliis triquetris integerrimis rectis, ſcapo tereti ramoſo. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 44. *t.* 85.

Abend Zaunblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

*19. ANTHERICUM *graminifolium.* W.

A. foliis linearibus planis depreſſis ſcapo ramoſo brevioribus, petalis alternis undulatis. W.

A. (*undulatum*) filamentis glabris, radice faſciculata, foliis linearibus carinatis proſtratis, ſcapo ramoſo, petalis alternis undulatis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 411. *Collect. ſuppl.* 87.*

Grasblättrige Zaunblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

*20. ANTHERICUM *japonicum.*

A. foliis enſiformibus convolutis glabris, ſcapo ramoſo angulato, floribus racemoſis cernuis. *Thunb. jap.* 158.*

Japaniſche Zaunblume. W.
*Habitat in* Japonia, China *et* Java.

*21. ANTHERICUM *longifolium.*

A. foliis linearibus decumbentibus margine ciliatis ſcapo ramoſo longioribus. W.

A. filamentis glabris, radice faſciculata, foliis ſubtriquetris linearibus utrinque glabris ad oras ciliatis proſtratis, ſcapis axillaribus ramoſis flexuoſis proſtratis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 413. *Collect. ſuppl.* 92.*

Langblättrige Zaunblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ

*Anthericum fimbriatum Thunb. prod.* 63. *forte eadem?* W.

*22. ANTHERICUM *hirſutum.* †

A. foliis linearibus hirſutis ſcapo ramoſo brevioribus, racemo longiſſimo. *Thunb. prod.* 63.

Haarige Zaunblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ

*23. ANTHERICUM *Adenantliera.*

A. foliis linear-enſiformibus baſi connatis, glandula inter filamentum et antheram. *Forſt. prod. n.* 149.

Drüſige Zaunblume. W.

*Habitat in* Nova Caledonia.

*24. ANTHERICUM *reflexum.*

A. foliis lanceolato-enſiformibus, ſcapo ſimplici baſi folioſo, petalis tribus exterioribus anguſtiſſimis, filamentis glanduloſis, antheris cohaerentibus. W.

A. antheris coalitis. *Cavan. ic.* 3*rp.* 21. *t.* 241. *

Zurückgedrehte Zaunblume. W.

*Habitat* - - - - 2ɬ

Corolla *lutea, petalis tribus exterioribus triplo anguſtioribus apice reflexis, tribus interioribus ovatis.* W.

*25. ANTHERICUM *piloſum.*

A. ſcapo ſimplici folioſo glabro, foliis lanceolatis vaginantibus utrinque piloſis. W.

A. filamentis glabris, radice bulboſa, foliis ſublanceolatis planis utrinque piloſis ciliatis, ſcapo ſimplici glabro, *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 416. *Collect. ſuppl.* 87. *

Scheidenblättrige Zaunblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ

*26. ANTHERICUM *undulatum.* †

A. foliis enſiformibus falcatis undulatis ſcapo longioribus. *Thunb. prod.* 65.

Wellenblättrige Zaunblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ

*27. ANTHERICUM *triflorum.*

A. foliis canaliculato-enſiformibus, ſcapo ſimplici, bracteis remotis trifloris. *Ait. Kew.* 1. *p.* 448.

A. (*bipeduncularum*) filamentis glabris, radice faſciculata, foliis lanceolato-linearibus carinatis, ſcapo racemoſo ſimplici, bracteis ſubbifloris. *Iacq. ic.* 2. *t.* 410. *Collect. ſuppl.* 88. *

Dreyblütige Zaunblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ

*28. ANTHERICUM *canaliculatum.*

A. foliis ſubcarnoſis piloſis enſiformi-triquetris latere anguſtiori canaliculatis, ſcapo ſimplici. *Ait. Kew.* 1. *p.* 448. Rinnenblättrige Zaunblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ

Scapus *teres piloſus.* Racemus *multiflorus*, pedunculi *teretes glabri vix unciales.* Bracteae *lanceolatae acuminatae ſub antheſi pedunculo breviores glabrae.* Petala *patula alba dorſo ſordide vireſcentia ſemiuncialia.* Filamenta *ſubulata alba petalis brevioru hiſpidiuscula, tria alterna minus hiſpida.* Stylus *longitudine ſtaminum.* Ait. l. c.

*29. ANTHERICUM *Albucoides.*

A. foliis linearibus canaliculatis glabris, margine cartilagineis, ſcapo ſimplici. *Ait. Kew.* 1. *p.* 449. Stiftblumenartige Zaunblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ

Petalis *luteis, carina viridi, apice fornicatis, refert Albucam, ſed differt* petalis *interioribus prtulis et* filamentis *ſupra baſin non complicatis.* Ait. l. c.

30. ANTHERICUM *Liliago.*

A. foliis planis, ſcapo ſimpliciſſimo, corollis planis, piſtillo declinato. *Hort. upſ.* 83. *It. ſcan.* 104. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 290. *Mill. dict. n.* 3. *Iacq. hort.* 83. *Pollich. pal. n.* 355. *Fl. dan. t.* 616. *Kniph. cent.* 12. *n.* 11. *Hoffm. germ.* 121. *Roth. germ. I.* 150. *II.* 592.

Phalangium radicibus teretibus, foliis radicalibus carinatis, enſiformibus, petiolis unifloris. *Hall. helv. n.* 1207.

Phalangium Liliago. *Schreb. ſpicil.* 56.

Anthericum caulibus non ramoſis, foliis planis. *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 128.

Phalangium parvo flore, non ramoſum. *Bauh. pin.* 29. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 333. *ſ.* 4. *t.* 1. *f.* 10.

Phalangium non ramoſum. *Dod.* 106.

Liliago. *Cord. hiſt.* 2. *c.* 106. *p.* 190. *b.*

Liliago Cordi. *Lob. ic. p.* 48. R.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 11. *p.* 391.

Gemeine Zaunblume. W.

*Habitat in* Helvetia, Germania, Gallia, 2ɬ (v. v.)

Folia *radicalia carinata. A planta Halleri n.* 1207.

*differt, quod petala non sint petiolata, uno ordine omnia sita, non extus virente linea inscripta, sed* Capsula *ovata, trilocularis et trivalvis.* Iacq. l. c. R.

## 31. ANTHERICUM *Liliastrum.*

A. foliis planis, scapo simplicissimo, corollis campanulatis, staminibus declinatis. *Lepech. it.* 1. *p.* 197. *Kniph. cent.* 7. *n.* 30.
Hemerocallis floribus spicatis secundis. *Hall. helv. n.* 1230.
Hemerocallis (*Liliastrum*) scapo simplici, corollis hexapetalis campanulatis. *Hort. cliff.* 128. *Sp. pl.* 1. *p.* 324. *Mill. dict. n.* 4.
Liliastrum alpinum majus et minus. *Tournef. Scheuchz. alp.* 1. *p.* 48. *et* 7. *p.* 514. *Hall.* R.
Phalangium magno flore. *Bauh. pin.* 29.
Phalangium allobrogicum majus. *Clus. cur. app. alt.*
Phalangium. *Dalech. hist.* 852.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* II. *p.* 392.
Lilienartige Zaunblume. W.
*Habitat in alpibus* Helveticis, Allobrogicis. 4 (v. v.)
Radix *fasciculata fibris carnosis.* Corolla *Lilii candidi, sed minor.*

## 32. ANTHERICUM *spirale.*

A. scapo spirali. *Mant.* 224.
A. (*spiratum*) foliis tereti-filiformibus flexuosis scapo flexuoso brevioribus. *Thunb. prod.* 62.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* II. *p.* 394.
Spiralförmige Zaunblume. W.
*Habitat sub monte Leonis* Cap. b. spei, *locis glareosis. König.* 4
Planta *aphylla.* Foliorum *rudimenta inferne scapum vaginantia.* Radix *bulbosa.* Scapus *palmaris, filiformis, spiralis contrarius, aphyllus, subquadriflorus, nonnihil scandens.* Pedunculi *proprii, recti, floribus triplo longiores.* Bracteae *minutae, ovatae.* Flores 3 *s.* 4, *magnitudine Polygoni avicularis, ex apice caulis, quos vivos nondum videram.*

** Bulbine *foliis carnosis, Filamentis barbatis.*

## 33. ANTHERICUM *frutescens.*

A. foliis carnosis teretibus, caule fruticoso erecto ramoso. W.

A. foliis carnosis teretibus, caule fruticoso. *Mill. dict. n.* 4.
A. caulescens, foliis pulposis teretibus subulatis supine convexo-planis. *Wach. ultr.* 305.
Bulbine caulescens. *Hort. cliff.* 122. *Roy. lugdb.* 122.
Phalangium capense caulescens, foliis cepitiis succosis. *Dill. elth.* 310. *t.* 231. *f.* 298.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 394.
Strauchartige Zaunblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. v.)

## *34. ANTHERICUM *rostratum.*

A. foliis carnosis teretibus glaucis, caule fruticoso brevissimo radicante. W.
A. antheris barbatis, caulibus fruticosis radicantibus brevissimis, foliis subulatis teretibus pulposis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 403. *Collect. suppl.* 82.
Schnabelblättrige Zaunblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄

## 35. ANTHERICUM *Alooides.*

A. foliis carnosis linguiformi-lanceolatis utrinque planiusculis. W.
A. foliis carnosis subulatis planiusculis. *Hort. upsal.* 83. *Mill. dict. n.* 5.
A. foliis pulposis lanceolato-subulatis supine excavatis. *Wach. ultr.* 304.
Bulbine acaulis. *Hort. cliff.* 123. *Roy. lugdb.* 33.
Phalangium capense sessile, foliis aloeformibus pulposis. *Dill. elth.* 312. *t.* 232. *f.* 300.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 396.
Aloëblättrige Zaunblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. ♃ (v. v.)

## *36. ANTHERICUM *nutans.*

A. foliis carnosis lanceolatis planis basi concavis, apice reflexis, racemo apice nutante. W.
A. filamentis barbatis, acaule radice perenni divisa incrura longa, foliis subensiformibus planis pulposis patulis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 407. *Collect. suppl.* 86.
A. foliis lineari-ensiformibus scapo brevioribus, racemo ovato cernuo. *Thunb. prod.* 63.
Hängende Zaunblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. ♃

*37. ANTHERICUM *incurvum.* †
A. foliis carnosis trigonis incurvis breviſſimis, racemo elongato cernuo. *Thunb. prod.* 62.
Krummblättrige Zaunblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

38. ANTHERICUM *latifolium.*
A. foliis carnosis oblongo-lanceolatis acuminatis nervosis rectis ſcapo quadruplo brevioribus. W.
A. foliis carnosis lato-enſiformibus glabris, racemo longiſſimo, caule ſimplici. *Lin. ſuppl.* 202.
A. filamentis barbatis, acaule, radice ſubrotunda perenni, foliis enſiformibus acuminatis ſubnervosis pulposis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 408. *Collect.* 249. *
A. foliis lato-enſiformibus glabris ſcapo brevioribus, racemo longiſſimo. *Thunb. prod.* 63.
Breitblättrige Zaunblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

*39. ANTHERICUM *pugoniforme.*
A. foliis carnosis linearibus acuminatis canaliculatis, ſcapo foliis duplo longiore. W.
A. filamentis barbatis acaule, radice ſubrotunda perenni, foliis craſſo-ſubulatis antice ſulcatis apice teretibus pulposis erectis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 405. *Collect. ſuppl.* 83.
Fauſtförmige Zaunblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

*40. ANTHERICUM *praemorſum.*
A. foliis carnosis linearibus canaliculatis diſtichis erectis ſcapo brevioribus. W.
A. filamentis barbatis, acaule, radice perenni difformi praemorſa, foliis ſubtriquetris antice ſulcatis erectis, baſi vaginante mutuo imbricatis amplexicaulibus diſtichis pulposis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 406. *Collect. ſuppl.* 85. *
Abgebiſſene Zaunblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

41. ANTHERICUM *Aſphodeloides.*
A. foliis carnosis lineari-ſubulatis ſemiteretibus ſtrictis. W.
A. foliis carnosis ſubulatis ſemiteretibus ſtrictis. *Hort. upſ.* 83. *Mill. dict. n.* 6. *Iacq. hort. t.* 181.
A. caule foliis pulposis teretibus ſubulatis ſupine convexo-planis. *Wach. ult.* 305.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 11. *p.* 397.

Affodilartige Zaunblume. W.
*Habitat in* Aethiopia. ⊙ (v. v.)
Folia *vix ſtriata, ſed ſtricta, margine aſpera, dorſo verſus alterum latus gibboſiora.*

* 42. ANTHERICUM *longiſcapum.*
A. foliis carnoſis ſubulatis ſemiteretibus flexuoſis glaucis, ſcapo triplo brevioribus. W.
A. filamentis barbatis, caulibus fruticoſis breviſſimis, foliis ſubulatis ſemiteretibus pulpoſis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 404. *Collect. ſuppl* 84. *
A. (*favoſum*) foliis carnoſis ſemiteretibus ſcapo brevioribus, racemo erecto longiſſimo. *Thunb. prod.* 63?
Langſchäftige Zaunblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

43. ANTHERICUM *annuum.*
A. foliis carnoſis ſubulatis teretiuſculis, ſcapo ſubracemoſo. *Hort. upſ.* 83. * *Mill. dict. n.* 7.
A. acaule, foliis ſetaceis caule anguſtioribus. *Wach. ultr.* 305.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 397.
Jährige Zaunblume. W.
*Habitat in* Aethiopia. ⊙ (v. v.)

44. ANTHERICUM *hiſpidum.*
A. foliis carnoſis compreſſis hiſpidis. *Sp. pl.* 446.
A. filamentis muricatis, acaule, foliis hiſpidis pulpoſis, ſcapo hiſpido. *Iacq. ic.* 2. *t.* 409. *Collect. ſuppl. p.* 91. *
A. foliis carnoſis lineari-enſiformibus hiſpidis ſcapo longioribus. *Thunb. prod.* 63.
Aſphodelus caule ſeminudo ramoſo, foliis planis lanceolatis. *Mill. dict. t.* 56?
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 398.
Vielhaarige Zaunblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ℓ
Radix *fibroſa.* Folia *ſubcarnoſa, compreſſa, ſtriata, ſemipedalia, recurvata, hiſpida undique pilis patulis.* Scapus *ſimplex, hiſpidus.* Racemus *bracteis lanceolatis, longitudine pedicellorum hiſpidis, uti Pedicelli.* Flores *albi carina viridi. Antherae luteae.*

45. ANTHERICUM *muricatum.*
A. foliis carnoſis compreſſis muricatis ſtriatis. *Lin. ſuppl.* 202.
A. foliis linearibus muricatis ſtriatis, ſcapo ramoſo inferne muricato. *Thunb. prod.* 63.

Stachliche Zaunblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei.
Folia *longa ſcaberrima.* Scapus *bipedalis baſi hirſutus, poſtea ramoſus.*

46. ANTHERICUM *ciliatum.*
A. foliis enſiformibus carnoſo-ſubtriquetris ciliatis, ſcapo ſimplici, racemo longiſſimo. *Suppl.* 202.
A. foliis enſiformibus carnoſis ciliatis ſcapo ſimplici aequalibus, racemo longiſſimo. *Thunb. prod.* 63.
Gefranzte Zaunblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei.
Folia *longiſſima carnoſa.*

47. ANTHERICUM *Cauda felis.*
A. foliis canaliculato-enſiformibus, ſcapo ſimplici, racemo oblongo. *Lin. ſuppl.* 202.
A. (*caudatum*) foliis canaliculato-enſiformibus ſcapo longioribus, racemo oblongo erecto. *Thunb. prod.* 63.
Geſchwänzte Zaunblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

48. ANTHERICUM *triquetrum.*
A. foliis filiformibus triquetris ſcapo ſimplici brevioribus, racemo ovato. *Lin. ſuppl.* 202.
A. foliis filiformibus trigonis racemo ovato brevioribus. *Thunb. prod.* 62.
Dreyeckige Zaunblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

49. ANTHERICUM *ſcabrum.*
A. foliis triquetris ſerrulatis, caule ramoſo ſcabro, pedunculis fructiferis recurvis. *Lin. ſuppl.* 202.
A. foliis trigonis ſerrulatis ſcapo ramoſo ſcabro longioribus, pedunculis fructiferis recurvis. *Thunb. prod.* 63.
Scharfblättrige Zaunblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

*50. ANTHERICUM *cirrhatum.*
A. foliis lanceolatis planiuſculis, ſcapo paniculato, filamentis barbatis bicirrhatis. *Forſt. prod. n.* 148.
Rankenfädige Zaunblume. W.
*Habitat in* Nova Zeelandia.

*51. ANTHERICUM *criſpum.* †
A. foliis ellipticis criſpis ciliatis, ſcapo ramoſo. *Thunb. prod.* 63.
Krausblättrige Zaunblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

*** Narthecium *foliis enſiformibus.*

52. ANTHERICUM *oſſifragum.*

A. foliis enſiformibus, filamentis lanatis. *Fl. ſuec.* 268. 287. *Oed. dan. t.* 42. *Mill. dict. n.* 9. *Gunn. norv. n.* 136. *Weber ſpicil. ſt. goett. p.* 11. *Hoffm. germ.* 121. *Roth. germ. I.*150. *II.* 392.

A. ſcapo folioſo laxe ſpicato, filamentis villoſis. *Fl. lapp.* 136. *Roy. lugdb.* 45.

Narthecium. *Moehr. E. N. C.* 1742. *p.* 389. *t.* 5. *f.* 1. *Wach. ultr.* 303. *Gort. gelr.* 69.

Pſeudo-Aſphodelus paluſtris anglicus. *Bauh. pin.* 29.

Aſphodelus luteus paluſtris. *Dod. pempt.* 208.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 399.

Sumpf Zaunblume. W.

*Habitat in* Europae *borealis uliginoſis.* 4 (v. ſ.)

*** Scilloides *ſtaminibus medio ventricoſis, radice bulboſa.*

*53. ANTHERICUM *phyſodes.*

A. foliis oblongis, racemo ſubcorymboſo, ſtaminibus medio dilatatis papilloſis. W.

A. filamentis glabris, radice bulboſa, foliis oblongis planis lucidis erectis, ſcapo ſimplici, racemo corymboſo. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 418. *Collect. ſuppl.* 94. *

A. (*marginatum*) foliis oblongis obtuſis marginatis, ſcapo ſimplici brevioribus, racemo ſubumbellato. *Thunb. prod.* 63.

Aufgeblaſene Zaunblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

*Floret ante foliorum explicationem; facies ceterum Scillae.* W.

*54. ANTHERICUM *puſillum.*

A. foliis linearibus, racemo ſubcorymboſo, ſtaminibus medio dilatatis glabris. W.

A. filamentis lanceolatis glabris, radice bulboſa, foliis lanceolato-linearibus planis nitidis, in orbem proſtratis, ſcapo ſimplici, racemo corymboſo. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 417. *Collect. ſuppl.* 95. *

Anthericum pauciflorum. *Thunb. prod.* 63?

Kleinſte Zaunblume. W.

*Habitat ad.* Cap. b. ſpei. 4

*Facies Scillae, floret ante explicationum foliorum.*
Scapus *vix triuncialis.* W.

## 644. LEONTICE.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 571.

*Cor.* 6-petala. *Nectarium* 6-phyllum, unguibus corollae insidens, limbo patens. *Cal.* 6-phyllus, deciduus.

### 1. LEONTICE *Chrysogonum.*

L. foliis pinnatis: foliis verticillatis lanceolatis acutis tricuspidatis. W.

L. foliis pinnatis: petiolo communi simplici. *Hort. cliff.* 122. *Gron. orient.* 113. *Mill. dict. n.* 1.

Leontopetalum foliis costae simplici innascentibus. *Tournef. cor.* 49.

Leontopetalo affinis, foliis quernis. *Bauh. pin.* 324. *Morif. hist.* 2. *p.* 285. *f.* 3. *t.* 15. *f.* 7.

Chrysogonum dioscoridis. *Rauv. itin.* 119. *Rai. hist.* 1326.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 407.

Geliedertes Löwenblatt. W.

*Habitat inter* Graeciae *segetes.* 4

### 2. LEONTICE *Leontopetalum*

L. foljis radicalibus biternatis, caulinis ternatis, fructu ovato. W.

L. foliis decompositis: petiolo communi trifido. *Hort. cliff.* 122. *Gron. orient.* 114. *Mill. dict. n.* 2.

Leontopetalon foliis costae ramosae innascentibus. *Tournef. cor.* 49.

Leontopetalon. *Bauh. pin.* 324. *Cam. epit.* 565. *Morif. hist.* 2. *p.* 285. *f.* 3. *t.* 15. *f.* 6. *Raj. hist.* 1326.

Leontopodium vulgare. *Barr. ic.* 1030.

*β.* Leontopodium ramosum polyanthes. *Barr. ic.* 1029.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 467.

Aechtes Löwenblatt. W.

*Habitat in* Apulia, Hetruria, Creta. 4

*Rumicis vesicariae fructus, ideoque fructificatio ulterius describenda.*

### *3. LEONTICE *vesicaria.*

L. foliis biternatis, fructibus obovatis inflatis. W.

Leontice incerta. *Pall. it.* 3. *app. n.* 84. *t. V. f.* 2.*

Aufgeblaſenes Löwenblatt. W.
*Habitat in* Sibiria *ad lacum* Inderienſem *primo vere*. 24
*Simillima praecedenti ſed* fructibus *diverſiſſima*. W.

*4. LEONTICE *altaica*.
L. foliis radicalibus decompoſitis, caulinis quinatis, foliolis lanceolatis. W.
L. foliis caulinis ternis quinatis, radicalibus ternato-quinatis, racemo laxo ſeſſili. *Pall. Act. Petrop.* 1779. *p.* 257. *t.* 8. *f.* 1. 2. 3. *
Altaiſches Löwenblatt. W.
*Habitat in apricis montium* Altaicorum. 24 (v. f.)
Folia *radicalia decompoſita, petiolus enim eſt trifidus et in quolibet apice annectit foliola quinque alliptico-lanceolata integerrima.* Folia *caulina quinata, plerumque tria verticillatim poſita.* Bracteae *ellipticae obtuſae*. W.

5. LEONTICE *thalictroides*.
L. folio caulino triternato (27), florali biternato (9). *Sp. pl.* 448.
L. foliis ſupradecompoſitis. *Gron. virg.* 151. * *Cold. noveb.* 75.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 409.
Thalictrumartiges Löwenblatt. W.
*Habitat in* Virginia. 24
*Modus creſcendi Epimedii.* Caulis *nudus, terminatus* Foliis *tribus, patentibus, petiolatis*: Petiolus *ſingulus trifidus, adnatis novem foliolis, quorum lateralia duo, ſeſſilia, biloba; intermedium petiolatum, trilobum; infra diviſuram primam caulis exſerit e latere Petiolos tres ſimplice triphyllos, infra quos Racemus ſimplex cum duobus lateralibus.*

## *645. POLLIA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 572.

*Cor.* hexapetala infera, tria exteriora majora, tria interiora reflexa. *Bacca* polyſperma.

*1. POLLIA *japonica*.
P. Japonica. *Thunb. Diſſ.* 1. *Nov. pl. gen. p.* 11. * *Fl. jap.* 138. *
Japaniſche Pollie. W.
*Habitat in* Japonia *et* Java. 24

Caulis *bipedalis erectus angulatus articulatus parum ramosus villoso-asperatus.* Rami *alterni breves.* Folia *in infimo caule approximata in supremo valde remota, alterna amplexicaulia ensiformia nervosa glabra, sed tamen retrorsum aspera, subtus albida. Flores albi verticillato-corymbosi.* Pedunculi *verticillati* 4-6, *villosi.* Thunb. l. c.

## 646. ASPARAGUS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 573.

*Cor.* 6-partita, erecta: petalis tribus interioribus apice reflexis. *Bacca* 3-locularis, 2-sperma.

### 1. ASPARAGUS *officinalis.*

α. Asparagus *maritimus.*

A. caule herbaceo tereti erecto, foliis setaceis, stipulis paribus. *Mat. med.* 94. *Pollich. pal. n.* 336. *Gmel. sib.* 1. *p.* 37. *Mill. dict. n.* 1. *Scop. carn. n.* 416. *Leers. herb. n.* 257. *Ludw. ect. t.* 78. *Hoffm. germ.* 121.

A. caule herbaceo erecto paniculato, floribus dioicis, pedunculis in medio articulatis. *Lamarck encyclop.* 1. *p.* 291. *

A. foliis filiformibus stipulatis. *Hall. helv. n.* 1239.

A. caule herbaceo erecto, foliis setaceis, stipulis duabus interioribus, una exteriore. *Fl. suec.* 272, 291. *Hort. cliff.* 121. *Roy. lugdb.* 28.

α. Asparagus *maritimus.*

A. maritimus, crassiore folio. *Bauh. pin.* 490. *Gmel. sib.* 1. *p.* 38.

A. marinus. *Clus. hist.* 2. *p.* 179.

β. A. sylvestris tenuissimo folio. *Bauh. pin.* 490. *Tournef. inst.* 300.

A. (*tenuifolius*) humilis, caule herbaceo ramosissimo folioso, floribus hermaphroditis, pedunculis longis sub flore nodosis. *Lamarck. encyclop.* 1. *p.* 291. *

Asparagus sylvestris. *Matth.* 478.

γ. Asparagus *altilis.*

A. sativa. *Bauh. pin.* 489. *Mill. t.* 55. *Blackw. t.* 332. *Kniph. cent.* 6. *n.* 12. *Knorr. del.* 1. *t. S.* 22. *Regn. bot.*

Asparagus. *Camer. epit.* 259.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 320.

Gemeiner Spargel. W.

*Habitat in* Europae *arenosis.* 4 (v. v.)

Caules *herbacei, erecti, paniculati.* Stipulae *ſolitariae exteriores et binae interiores minores, inter quas Folia terna, raro 4 ſ. 5, linearia, ſed in ſummis ramis, ubi nulli flores; at in infimis ramulus.* Pedunculi *gemini, laxi, uniflori, penduli, geniculo articulato.* Corolla *campanulata, petalis interioribus longioribus.*

Var. ß. *dioicam eſſe. Ger. prov.* 134; *certe hortenſis non eſt dioica; hujus* Stipulae *baſi ſpina recumbente molli, ut in A. declinato, unde affinitas;* Aſpar. ß. *ſpina reverſa nonihil rigidior;* Folia *apice ſetacea.* Rami *ſtriato-angulati, qui in ſativo teretes laeves.*

Culta *et* ſpontanea *noſtra planta ſemper dioica.* Leers *l. c. It quod etiam obſervavi.* W.

2. ASPARAGUS *declinatus.*

A. caule inermi tereti, ramis declinatis, foliis ſetaceis.
*Roy. lugdb.* 29.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 322.
Gebogener Spargel. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24 (v. ſ.)

Similis *A. officinali, ſed altior,* Foliis *pluribus, duploque longioribus.* Caulis *annuus.* Stipulae *ſolitariae, lanceolato-ſubulatae, baſi deorſum mucrone membranaceo.* Folia 7 *ſ.* 10, *filiformia, patentia.*

Planta *mea mas eſt e Cap. b. ſpei.*

*3. ASPARAGUS *decumbens.*

A. caule herbaceo inermi decumbente ramoſiſſimo, ramis flexuoſis, foliis ſetaceis, pedunculis ſolitariis terminalibus. W.

A. herbaceus inermis decumbens, ramis ſubreflexis, foliis ſubſetaceis. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 71. *t.* 97. *
Liegender Spargel. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

*Similis A. officinali, ſed folia minora,* caulis *decumbens ramoſiſſimus,* pedunculi *ſolitarii uniflori ſub ramulorum apice,* corolla*que reflexa.* W.

*4. ASPARAGUS *flexuoſus.*

A. herbaceus inermis, caule flexuoſo, foliis lanceolatis.
*Thunb. prod.* 66.
Bogiger Spargel. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

*5. ASPARAGUS *ſcandens*. †
A. herbaceus inermis volubilis, foliis lanceolatis falcatis. *Thunb. prod.* 63.
Kletternder Spargel. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

6. ASPARAGUS *falcatus.*
A. aculeis ſolitariis reverſis, ramis teretibus, foliis faſciculatis linearibus falcatis, pedunculis axillaribus unifloris aggregatis. W.
A. aculeis ſolitariis reverſis, ramis teretibus, foliis enſiformibus falcatis. *Syſt. veg.* 274.
A. aculeis ſolitariis, foliis enſiformibus falcatis. *Fl. zeyl.* 123. * *Sp. pl.* 2. *p.* 449.
A. foliis falcatis ex uno puncto numeroſis. *Burm. zeyl.* 36. *t.* 13. *f.* 2.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 322.
Sichelblättriger Spargel. W.
*Habitat in* Zeylona. ♄

*7. ASPARAGUS *racemoſus*. W.
A. aculeis ſolitariis, ramis ſtriatis, foliis faſciculatis lineari-ſubulatis falcatis, racemis multifloris axillaribus. W.
Traubenblütiger Spargel. W.
*Habitat in* India *orientali.* ♄ (v. ſ.)
*A. praecedente diſtinctiſſimus*: foliis *decies brevioribus, quadruplo anguſtioribus*, racemis *ſesquiuncialibus multifloris.* Flores *ceterum parvi et* pedunculi *bracteis oblongis minutiſſimis ſuffulti.* W.

8. ASPARAGUS *retrofractus.*
A. aculeis ſolitariis, ramis teretibus reflexis retrofractisque, foliis ſetaceis faſciculatis. *Mill. dict. n.* 5.
A. fruteſcens, foliis faſciculatis ſetaceis terminalibus, ramis reflexis retroflexis. *Hort. cliff.* 121. * *Roy. lugdb.* 28.
A. africanus tenuifolius, viminalibus virgis, foliis laricis adinſtar ex uno puncto numeroſis ſtellatim poſitis. *Pluk. amalth.* 40. *t.* 375. *f.* 3.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 322.
Lerchenbaumblättriger Spargel. W.
*Habitat in* Africa. ♄ (v. ſ. ſ. ſ.)
Rami *teretes, dichotomi, dichotomiis verrucoſis aculeo minuto nutante.*

9. ASPARAGUS *aethiopicus.*

A. aculeis solitariis reversis, ramis angulatis, foliis lanceolato-linearibus. *Mant.* 63.

A. aculeatus africanus, corrudae 3. Clusii similis. *Rai. suppl.* 359. *n.* 5. *et* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 325.

Aethiopischer Spargel. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♃ (v. s. s. fl.)

Similis *A. falcato*, *sed* Folia *minora* 7 *circiter*, *nec* 3. Stipulae *emittunt spinam retro spectantem.* Rami *flexuosi*, *angulati*, *quasi frutticosi*, *virides.* H. V.

10. ASPARAGUS *asiaticus.*

A. aculeis solitariis, caule erecto, ramis filiformibus, foliis fasciculatis setaceis. *Mill. dict. n.* 8.

A. aculeis alternis, ramis solitariis filiformibus, foliis setaceis fasciculatis lateralibns. *Hort. cliff.* 122. * *Roy. lugdb.* 28.

A. aculeatus minor sarmentosus. *Pluk. alm.* 54. *t.* 15. *f.* 4. *Burm.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 324.

Asiatischer Spargel. W.

*Habitat in* Asia. ♄ (v. s. s. fl.)

11. ASPARAGUS *albus.*

A. aculeis solitariis, ramis angulatis flexuosis, foliis fasciculatis triquetris muticis deciduis. *Mill. dict. n.* 4.

A. aculeis solitariis, ramulis flexuosis binis oppositis spinosis foliosis, foliis fasciculatis. *Roy lugdb.* 29.

A. aculeatus, spinis horridus. *Bauh. pin.* 490.

Corruda tertia. *Clus. hist.* 2. *p.* 178.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 324.

Weisser Spargel. W.

*Habitat in* Lusitania, Hispania. ♄ (v. v. s. fl.)

Caulis *albus.* Spinae *rectae patentes s. reflexae.*

12. ASPARAGUS *acutifolius.*

A. caule inermi angulato fruticoso, foliis aciformibus rigidulis perennantibus mucronatis aequalibus. *Mill. dict. n.* 3.

A. foliis aciformibus pungentibus, caule fruticoso inermi. *Sauv. monsp.* 45.

A. foliis acutis. *Bauh. pin* 490.

A. sylvestris. *Cam. epit.* 260.

Corruda prior. *Clus. hist.* 2. *p.* 77.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 325.

Spitzblättriger Spargel. W.
*Habitat in* Luſitania, Hiſpania, Oriente. ♄ (v. f.)
Similis *A. aphyllo, ſed folia ſeptena ſaepius, filo vix craſſiora; at illi ſaepius terna triplo craſſiora valdeque ſubulata.*

*13. ASPARAGUS *ſubulatus.* †
A. fruteſcens inermis, ramis retroflexis, foliis tereti-ſubulatis. *Thumb. prod.* 66.
Pfriemförmiger Spargel. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

*14. ASPARAGUS *dependens.* †
A. fruticoſus aculeatus, ramis reflexis, foliis ſubulatis. *Thumb. prod.* 66.
Hängender Spargel. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

15. ASPARAGUS *horridus.*
A. aphyllus fruticoſus pentagonus, aculeis tetragonis compreſſis ſtriatis. *Lin. ſuppl.* 203. *Cavan. ic.* 2. *p.* 30. *t.* 136.
A. hiſpanicus, aculeis craſſioribus horridus. *Tournef. inſt.* 300.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 326.
Fürchterlicher Spargel. W.
*Habitat in* Hiſpania. ♄ (v. f. f. a.)
Caules *lignoſi pentagoni aphylli.* Aculei *alterni ſolitarii remoti lignoſi robuſti interſtitiis longiores ſ. longitudine digiti tetragoni compreſſi ſtriati.* Folia *vix ulla.*

16. ASPARAGUS *aphyllus.*
A. caule inermi angulato fruticoſo, foliis ſubulatis ſtriatis inaequalibus divergentibus. *Hort. cliff.* 122. *Roy. lugdb.* 29. *Mill. dict. n.* 6.
A. aculeatus alter tribus aut quatuor ſpinis ad eundem exortum. *Bauh. pin.* 490.
Corruda altera. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 178.
β. Aſparagus creticus fruticoſus, craſſioribus et brevioribus aculeis, magno fructu. *Tournef. inſt.* 91. *t.* 15.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 326.
Blattloſer Spargel. W.
*Habitat in* Sicilia, Hiſpania, Luſitania. ♄ (v. f. f. a.)

*17. ASPARAGUS *lanceus.*
A. aculeis ſolitariis, foliis lanceolatis ſubfalcatis, pedunculis axillaribus ſolitariis. *Thumb. prod.* 66.

Lanzenblättriger Spargel. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ. ſ. ſl.)

18. ASPARAGUS *capenſis.*

A. ſpinis quaternis, ramis aggregatis teretibus, foliis ſetaceis. *Sp. pl.* 450.
A. rubicundus. *Berg. cap.* 58. *Pluk. alm. t.* 78. *f.* 5.
A. foliis quinis ſetaceis, ſpinis terminalibus lateralibusque, ramulis ternis quaternisque. *Hort. cliff.* 121.
Corruda africana, ſpinis brevibus aduncis. *Raj. ſuppl.* 359.
*Houttuyn Lin. Pfl.* Syſt. 6. *p.* 327.
Capiſcher Spargel. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Radix *tuberoſa.* Caules *fruticoſi, filiformes, flexuoſi.* Spinae 4, *patentes, ſubrecurvae, acutiſſimae.* Ramuli *ex axillis ſpinarum filiformes, laxi, inermes, decidui:* Foliolis *ſetaceis, acutis, inermibus, brevibus.* Rami, *inter ramulos, ſolitarii, rigidi.*

19. ASPARAGUS *ſarmentoſus.*

A. foliis ſolitariis lineari-lanceolatis, caule flexuoſo, aculeis recurvis. *Fl. zeyl.* 124. * *Mill. dict. n.* 11.
A. aculeatus zeylanicus maximus ſarmentoſus. *Herm. lugdb.* 62. *t.* 650. 63. *Raj. hiſt.* 1877.
Schadaveli Kelangu. *Rheed. mal.* 10. *p.* 19.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 328.
Rankender Spargel. W.
*Habitat in* Zeylona. ♄

*Affinis maxime Medeolae aſparagoidi.*

20. ASPARAGUS *verticillaris.*

A. foliis verticillatis. *Sp. pl.* 450. †
A. orientalis, foliis gallii. *Tournef. cor.* 21. *Buxb. cent.* 5. *app.* 47. *t.* 37.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 328.
Wirtelblättriger Spargel. W.
*Habitat in* Oriente, *circa* Derbentum *et alibi.*

## 647. DRACAENA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 574.

*Cor.* 6-partita, erecta. *Filam.* medio ſubcraſſiora. *Bacca* 3-locularis, 1-ſperma.

1. DRACAENA *Draco.*

D. arborea, foliis ſubcarnoſis apice ſpinoſis. *Syſt. Veg.* 275.

Asparagus Draco. *Sp. pl. 2. p. 451. Vandell. monogr. Ulyss. 1768. Behrens diss. Goett. 1770.*
Palma Draco. *Mill. dict. n. 11.*
Stoerkia Draco. *Cranz. Diss. p. 30. f. 1. 2.* *
Oedera dragonalis. *Cranz. Diss. p. 30. f. 3.* *
Cordyline foliis inermibus integerrimis flaccidis. *Roy. lugdb. 22.*
Palma foliis longissimis pendulis, absque pedunculis e caudice glabro enatis. *Boerh. lugdb. 2. p. 169.*
Draco arbor. *Bauh. pin. 503. Clus. hist. 1. p. 1. Blackw. t. 358.*
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 1. p. 414.*
Gemeiner Drachenbaum. W.
*Habitat in* India *orientali.* ♄ (v. s.)
Pedunculi *geniculo instructi.*

*2. DRACAENA *indivisa.*
D. arborea, foliis ensiformibus acutis, racemo laterali composito. *Forst. escul. n. 33.* * *Forst. prod. n. 150.*
Ungetheilter Drachenbaum. W.
*Habitat ad portum obscurum* Novae Zeelandiae. ♄
Caulis *arboreus bi-seu triorgyalis.* Folia *terminalia sessilia semiamplexicaulia basi imbricata late ensiformia membranacea acuta integerrima patentia bipedalia, palmum lata.* Racemus *lateralis compositus ex alis foliorum (sed forsan folia jam seriora seu secundi anni prodierant), ovatus nutans, racemis partialibus in formam cylindricam thyrsoideam digestis.* Forst. l. c.

*3. DRACAENA *umbraculifera.*
D. arborea, foliis lanceolatis utrinque attenuatis, corymbo breviſſimo terminali multifloro. W.
D. arborea, foliis ensiformibus acuminatis, panicula terminali densissima subsessili. *Iacq. hort. Schoenb. 1. p. 50. t. 95.* *
Schattenreicher Drachenbaum. W.
*Habitat culta in insula* Mauritii. ♄
Corolla *infundibuliformis, tubo limbo duplo longiore.* W.

*4. DRACAENA *australis.*
D. arborea, foliis ensifermibus acutis, racemo terminali erecto supradecompoſito. *Forst. prod. n. 151.*
Südlicher Drachenbaum. W.
*Habitat in* Nova Zeelandia *ad aestuarium* Reginae Charlottae. ♄

*5. DRACAENA *cernua.*

D. arborea, foliis lanceolatis ſuboblique-flexis, panicula dependente divaricata. W.

D. caule arboreo, foliis lineari-lanceolatis acutis, panicula cernua. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 50. *t.* 96. *

Hängender Drachenbaum. W.

*Habitat in inſula* Mauritii. ♄

6. DRACAENA *ferrea.*

D. arborea, foliis lanceolatis acutis. *Syſt. Veg.* 275.

Convallaria fruticoſa. *Syſt. nat.* 10. *p.* 984.

Arbor ferrea. *Obſ. it.* 251.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 417.

Eiſenfeſter Drachenbaum. W.

*Habitat in* China. ♄

7. DRACAENA *terminalis.*

D. herbacea cauleſcens, foliis lanceolatis. *Syſt. veg.* 275.

*Iacq. ic.* 2. *t.* 448. *Collect.* 2. *p.* 354. *

Aſparagus terminalis. *Sp. pl.* 2. *p.* 450.

Terminalis. *Rumph. amb.* 4. *p.* 79. *t.* 34.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 420.

Gränzen Drachenbaum. W.

*Habitat in* India. ♄ (v. v.)

Folia *fere Caulae.* Racemus *terminalis ex aliquot racemis ramoſis.* Pedicelli *alterni, ſolitarii, flore breviores, cincti ad baſin* gluma *obtuſa.* Arbor *dura.*

*8. DRACAENA *marginata.*

D. frutiçoſa, foliis dentato-ſpinoſis, racemis axillaribus, baccis polyſpermis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 454.

Aloë purpurea. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 85. *

Aloëblättriger Drachenbaum. W.

*Habitat in inſula* Bourbon. ♄

9. DRACAENA *ſtriata.*

D. fruteſcens cauleſcens erecta, foliis lanceoſatis oblique falcatis ſtriatis, caule flexuoſo. *Lin. ſuppl.* 204.

Aſparagus (*ſtriatus*) cauleſcens erectus, foliis linearibus ſubfalcatis obtuſis. *Thunb. prod.* 65.

Geſtreifter Drachenbaum. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

10. DRACAENA *undulata.*

D. herbacea cauleſcens erecta, foliis ovatis acutis multinerviis, floribus axillaribus pedunculatis. *Lin. ſuppl.* 203.

Aſparagus (*undulatus*) cauleſcens erectus, foliis ovatis acutis multinerviis, floribus axillaribus pedunculatis. *Thunb. prod.* 66.
Wellenblättriger Drachenbaum. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

11. DRACAENA *erecta.*
D. herbacea cauleſcens erecta, foliis lanceolatis ſubulatis ſubſeſſilibus. *Lin. ſuppl.* 204.
Aſparagus (*erectus*) cauleſcens erectus, foliis lanceolatis acuminatis ſeſſilibus, floribus lateralibus. *Thunb. prod.* 65.
Aufrechter Drachenbaum. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

12. DRACAENA *enſifolia.*
D. herbacea ſubcauleſcens, foliis enſiformibus. *Syſt. veg.* 275.
Dianella nemoroſa. *Lamarck encyclop.* 2. *p.* 273. * *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 49. *t.* 94. *
Gladiolus odoratus indicus. *Rumph. amb.* 5. *p.* 145. *t.* 73.
Schwerdtblättriger Drachenbaum. W.
*Habitat in* India. 4 (v. v.)
Folia *enſiformi-lanceolata, enervia, ſubtus carinata, petiolata.* Scapus *ſ. Caulis ramoſus, paniculatus, ad exortum ramorum* Foliolis *duobus, parvis, coloratis.*
*Omnes fere ſpecies bacca gaudent polyſperma, exceptis tantum n.* 1. *et* 5. W.

13. DRACAENA *borealis.*
D. herbacea ſubcauleſcens, foliis ellipticis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 454. *t.* 5.
Nördlicher Drachenbaum. W.
*Habitat in* Terra nova, *ſinu* Hudſonis *et* Canada. 4 (v. l.)

14. DRACAENA *graminifolia.*
D. herbacea acaulis, foliis linearibus. *Syſt. veg.* 275. *Lamarck. encyclop.* 2. *p.* 322. *
Aſpargus graminifolius. *Sp. pl.* 2. *p.* 450.
Grasblättriger Drachenbaum. W.
*Habitat in* Aſia.
Statura *Antherici phalangii.* Folia *graminea, valde ſtriata, ſpithamaea.* Scapus *vix foliis longior.* Flores *ad ſingulos dentes racemi* 4 *ſ.* 5, *pedicellis flore ipſo brevioribus, quaſi e gluma obtuſa prodeuntibus. Sp. pl.* 2.

## 648. SANSEVIERA.

*Thunb. prod. praef.* 29.

*Cor.* infera monopetala tubo filiformi limbo 6-partito revoluto. *Stam.* limbo inserta. *Bacca* 1-sperma.

### 1. SANSEVIERA *guineensis.*

S. foliis lanceolatis uniformibus, stylo staminibus duplo longiore, bracteis tubo corollae triplo brevioribus, floribus sessilibus. W.

Sanseviera (*thyrsiflora*) acaulis, foliis lanceolatis carnosis, floribus geminatis. *Thunb. prod.* 65.

Aletris hyacinthoides β. guineensis. *Sp. pl.* 456.

Aletris guineensis. *Iacq. hort.* 1. *p.* 63. *t.* 84.

Aloë guineensis, radice geniculata, foliis ex viridi et atro undulatim variegatis. *Comm. hort.* 2. *p.* 39. *t.* 20. *prael.* 84. *t.* 33.

Guineensische Sanseviere. W.

*Habitat in* Guinea. ♃ (v. v.)

### 2. SANSEVIERA *zeylanica.*

S. foliis glabris oblongis acutis planis et lineari-lanceolatis canaliculatis, stylo longitudine staminum, bracteis pedunculi longitudine. W.

Sanseviera (*aethiopica*) acaulis, foliis linguiformibus convolutis, racemo oblongo, floribus erectis. *Thunb. prod.* 65?

Salmia (*spicata*) foliis rigidis canaliculatis maculatis, floribus spicatis. *Cavan. ic.* 3. *p.* 24. *t.* 264. *

Liriope (*spicata*) foliis ensiformibus glabris, spica tereti. *Loureiro cochin. p.* 248.

Aletris (*hyacinthoides*) acaulis, foliis lanceolatis carnosis, floribus geminatis. *Sp. pl.* 456.

Aloë (*hyacinthoides*) floribus sessilibus horizontalibus infundibuliformibus aequalibus, limbo revoluto. *Sp. pl.* 1. *p.* 321.

Aloë foliis lanceolatis planis rectis radicalibus. *Hort. cliff.* 132. *Hort. upsal.* 85. *Fl. zeyl.* 130.

Aloë zeylanica pumila, foliis variegatis. *Com. hort.* 2. *p.* 41. *t.* 21. *Pluck. alm.* 19. *t.* 256. *f.* 5.

Aloë foliis exterioribus lanceolatis planis erectis radicalibus, interioribus longissimis. *Roy. lugdb.* 23.

Zeylonische Sanseviere. W.

*Habitat in* Zeylona. 4

*3. SANSEVIERA *lanuginosa*. W. †

S. foliis nervosis, nervis lanuginosis, inferioribus oblongis, reliquis linearibus, stylo staminum longitudine, pedunculis ebracteatis. W.

Katu Kapel. *Rheed. mal.* 11. *p.* 83. *t.* 42.

Wollige Sanseviere. W.

*Habitat in* Indiae *arenosis*. 4

*Distinxi hanc ex descriptione et icone Clariss. Rheede, quum multis notis diversa videatur.* W.

## 649. CONVALLARIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 575.

*Cor.* 6-fida. *Bacca* maculosa, 3-locularis.

* Lilium convallium T. *corollis campanulatis.*

1. CONVALLARIA *majalis.*

C. scapo nudo laevi, foliis ovatis. W.

C. scapo nudo. *Fl. lapp.* 113. *Fl. suec.* 283. 292. *Mat. med.* 95. *Blackw. t.* 70. *Hort. cliff.* 124. *Roy. lugdb.* 26. *Gmel. sib.* 1. *p.* 34. *Pollich. pal. n.* 337. *Mill. dict. n.* 1. *Ludw. ect. t.* 87. *Knoph. cent.* 10. *n.* 23. *Sabb. hort.* 1. *t.* 5. *Knorr. del.* 2. *t. C.* 3. *Hoffm. germ.* 121. *Roth. germ. I.* 147. *II.* 386.

Polygonatum scapo diphyllo, floribus spicatis, nutantibus, campaniformibus. *Hall. helv. n.* 1241.

Lilium convallium album. *Bauh. pin.* 304. *Camer. epit.* 618. *Dodon. cor.* 137.

Lilium convallium alpinum. *Bauh. pin.* 304.

Lilium convallium latifolium. *Bauh. pin.* 304.

*Houttuyn. Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 335.

Gemeines Mayblümchen. W.

*Habitat in* Europa *septentrionali*. 4 (v. v.)

2. CONVALLARIA *japonica.*

C. scapo nudo ancipiti, floribus racemosis secundis, foliis linearibus scapo triplo longioribus. *Lin. suppl.* 204.

C. scapo nudo ancipiti, racemo cernuo. *Thunb. jap.* 139. *

α. *major* foliis bipedalibus, scapo spithamaeo.

β. *minor* foliis palmaribus scapo duplo longioribus.

Mondo. *Kaempf. amoen.* 823. *cum. icone.*

Japanisches Mayblümchen. W.

*Habitat in* Japonia. 24 (*s. v. v.*)

*3. CONVALLARIA *spicata.* †

C. scapo nudo, racemo spicato, floribus aggregatis. *Thunb. jap.* 141.

Aehrenblütiges Mayblümchen. W.

*Habitat in* Japonia. 24

Radix *fibrosa.* Folia *radicalia linearia, inferne attenuata obtusiuscula multistriata glabra scapo longiora.* Scapus *striato-angulatus simplex erectus glaber palmaris usque pedalis.* Racemus *digitalis floscculis sparsim aggregatis.* Pedunculi *teretes patentes glabri uniflori lineam longi.* Corolla *hexapetala subglobosa glabra violacea.* Petala *ovata obtusa concava.* Filamenta 6, *germini inserta brevissima erecta.* Antherae *ovatae didymae erectae.* Germen *superum sexstriatum glabrum.* Stylus *unicus erectus albus staminibus brevior.* Stigma *simplex.* Fructus *obscurus, sed bacca videtur globosa. In alio specimine videbatur capsula trilocularis seminibus in singulo loculamento duobus.* Thunb. l. c.

** Polygonatum T. *corollis infundibuliformibus.*

4. CONVALLARIA *verticillata.*

C. foliis verticillatis. *Fl. lapp.* 114. *Fl. suec.* 275, 293. *Hort. cliff.* 125. *Roy. lugdb.* 26. *Oed. dan. t.* 86. *Pollich. pal. n.* 338. *Scop. carn. n.* 419. *Roth. germ. I.* 148. *II.* 387. *Hoffm. germ.* 122.

Polygonatum caule simplici erecto, foliis ellipticis et verticillatis. *Hall. helv. n.* 1244.

Polygonatum angustifolium non ramosum. *Bauh. pin.* 303.

Polygonatum alterum. *Dod. pempt.* 345.

ß. Polygonatum angustifolium ramosum. *Bauh. pin.* 304. *Houttuyn. Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 333.

Wirtelblättriges Mayblumchen. W.

*Habitat in* Europae *septentrionalis saltibus, praecipitiis.* 24 (*v. v.*)

5. CONVALLARIA *Polygonatum.*

C. foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunifloris. *Mat. med.* 95. *Gmel. sibir.* 1. *p.* 34. *Phil. bot.* 218. *Mill. dict.* 5. *Scop. carn.* 240. *Pollich. pal. n.* 339. *Flor. dan. t.* 377. *Knorr.*

*del.* 2. *t. P.* 4. *Hoffm. germ.* 122. *Roth. germ. I.* 148. *II.* 388.

C. foliis alternis, floribus axillaribus. *Fl. ſuec.* 274. 294. *Hort. cliff.* 124. *Gron. virg.* 37. *Roy. lugdb.* 26.

C. foliis alternis, pedunculis pendulis unifloris. *Sauv. monſp.* 42.

Polygonatum caule ſimplici, anguloſo, cernuo, foliis ovato-lanceolatis, rigidis, alis unifloris. *Hall. helv. n.* 1242.

Polygonatum flore odoro. *Cluſ. pan.* 263. 264.

Polygonatum floribus ex ſingularibus pedunculis. *Bauh. pin.* 3. *p.* 350.

Polygonatum latifolium, flore majore odoro. *Bauh. pin.* 303. *Barrel. ic.* 711. *Kniph. cent.* 3. *n.* 32. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 333.

Weiſswurz Mayblümchen. W.

*Habitat in* Europae *ſeptentrionalis praecipitiis, rupibus.* 24 (v. v.)

Variat *flore pleno.* R.

## 6. CONVALLARIA *multiflora.*

C. foliis alternis amplexicaulibus, caule tereti, pedunculis axillaribus multifloris. *Phil. bot.* 218. *Fl. ſuec.* 2. *p.* 295. *Mill. dict. n.* 3. *et. ic. t.* 101. *Scop. carn. n.* 421. *Pollich. pal. n.* 340. *Fl. dan. t.* 152. *Blackw. t.* 251. *Hoffm. germ.* 122. *Roth. germ. I.* 148. *II.* 388.

C. foliis alternis, pedunculis pendulis multifloris. *Sauv. monſp.* 4.

Polygonatum caule ſimplici cernuo, foliis ovato-lanceolatis, petiolis multifloris. *Hall. helv. n.* 1243.

Polygonatum. *Dod. purg.* 77. *Camer. epit.* 692.

Polygonatum latifolium maximum. *Bauh. pin.* 303.

Polygonatum latifolium 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 275.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 334.

Vielblütiges Mayblümchen. W.

*Habitat in* Europae *ſeptentrionalis praecipitiis, rupibus.* 24 (v. v.)

Variat *pleno flore.*

## 7. CONVALLARIA *latifolia.*

C. foliis alternis amplexicaulibus acuminatis, caule angulato, pedunculis axillaribus multifloris. *Murr. Syſt. veg.* 334. *Iacq. auſtr.* 3. *t.* 232. *Hoſt. ſyn.* 194.

Polygonatum tertium latiore folio. *Cluſ. hiſt* 1. *p.* 276. *absque icone.*

Breitblättriges Mayblümchen. W:
*Habitat in* Auſtriae, Pannoniae *ſylvis.* 4
*Habitum habet C. multiflorae, flores C. Polygonati et folia C. majalis.* Iacq. l. c.

*** Smilaces T. *corollis rotatis.*

8. CONVALLARIA *racemoſa.*
C. foliis alternis ſeſſilibns ovatis acuminatis, panicula terminali nuda. W.
C. foliis ſeſſilibus, racemo terminali compoſito. *Mill. dict. n.* 8.
C. racemo compoſito. *Roy. lugdb.* 26.
C. foliis alternis, racemo terminali. *Hort. cliff.* 125. *Gron. virg.* 38.
Polygonatum racemoſum. *Corn. canad.* 36. *t.* 37.
Polygonatum racemoſum et racemoſum ſpicatum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 537. *ſ.* 13. *t.* 4. *f.* 9.
Polygonatum racemoſum americanum, ellebori albi foliis ampliſſimis. *Pluk. alm.* 301. *t.* 311. *f.* 2.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 335.
Traubenblütiges Mayblümchen. W.
*Habitat in* Virginia, Canada. 4 (v. ſ.)

9. CONVALLARIA *ſtellata.*
C. foliis alternis amplexicaulibus ellipticis acutiuſculis, racemo terminali ſimplici. W.
C. foliis amplexicaulibus plurimis. *Mill. dict. n.* 6. *Kniph. cent.* 2. *n.* 18.
Polygonatum virginianum erectum ſpicatum, flore ſtellato. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 536. *ſ.* 15. *c.* 4. *f.* 7.
Polygonatum canadenſe ſpicatum fertile. *Corn. canad.* 33. *t.* 33.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 336.
Sternförmiges Mayblümchen. W.
*Habitat in* Canada. 4 (v. v.)
Flores *hujus ut in C. bifolia ſaepius tetrandri.* W.

10. CONVALLARIA *trifolia.*
C. foliis amplexicaulibus ternis, racemo terminali ſimplici. *Sp. pl.* 452.
C. floribus racemoſis, foliis ovatis oblongis caulinis. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 36. *t.* 6.
Phalangium veratri foliis. *Amm. ruth.* 137.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 336.
Dreyblättriges Mayblümchen. W.

*Habitat in* Sibiriae *sylvis.* 24

### 11. CONVALLARIA *bifolia.*

C. foliis cordatis, floribus tetrandris. *Fl. lapp.* 113. *Fl. suec.* 276. 296. *Hort. cliff.* 125. *Roy. lugdb.* 26. *Oed. dan. t.* 291. *Mill. ic. t.* 105. *Pollich. pal. n.* 341. *Scop. carn. n.* 422. *Kniph. cent.* 7. *n.* 12. *Hoffm. germ.* 122.

Majanthemum Convallaria. *Roth. germ I.* 70. *II.* 196.

C. foliis cordatis petiolulatis: floribus quadrifidis tetrandris. *Neck. gallob. p.* 164.

Unifolium. *Hall. helv. n.* 1240. *Dodon. coron. p.* 138. *Gmel. sib.* 1. *p.* 35.

Lilium convallium minus. *Bauh. pin.* 304. *Barrel. ic.* 1212.

Gramen parnassi. *Cam. epit.* 744.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 337.

Zweyblättriges Mayblümchen. W.

*Habitat in* Europae *borealis pratis depressis asperis.* 24 (v. v.)

Flores 4-*fidi.*

## 650. POLYANTHES.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 576.

**Cor.** infundibulif. incurva, aequalis. *Filam.* corollae fauci inserta. *Germen.* in fundo corollae.

### 1. POLYANTHES *tuberosa.*

P. foliis linearibus scapo brevioribus. W.

P. floribus alternis. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upsal.* 76. *Fl. zeyl.* 225. *Mill. dict. Kniph. cent.* 12. *n.* 76. *Knorr. del.* 1, *t. T.* 12.

Hyacinthus indicus tuberosus, flore narcissi. *Bauh. pin.* 47. *Rudb. elys.* 2. *p.* 39. *f.* 4.

*β.* Hyacinthus indicus tuberosus flore hyacinthi orientalis. *Bauh. pin.* 47. *Rudb. elys.* 2. *p.* 39. *f.* 2.

Hyacinthus indicus, tuberosa radice. *Clus. hist.* 1. *p.* 176.

Amica nocturna. *Rumph. amb.* 5. *p.* 285. *t.* 98.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 411.

Gemeine Tuberose. W.

*Habitat in* Iava, Zeylona. 24 (v. v.)

*2. POLYANTHES *pygmaea.*

P. foliis oblongo-ovatis scapo longioribus. W.
P. scapo racemoso foliis radicalibus geminis breviore. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 380. *Collect. suppl.* 56. *
Zwerg Tuberose. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. 4 (v. s.)

Planta *simillima Agapantho ensifolio, quocum forte proprium formet genus. Differt a dicto Agapantho:* foliis *oblongo-ovatis*, staminibus *tribus corolla longioribus. Binas has plantas distinctis sub generibus proposui, quae iis auctores citati assignavere, quum vivas examinare occasio mihi deerat.* W.

## *651. DRIMIA.

*Jacq. Collect. suppl.* 39.

*Cor.* infera campanulata 6-fida, laciniis revolutis. *Stam.* corollae inserta. *Stigma* capitatum.

*1. DRIMIA *ciliaris.*

D. foliis linearibus carinatis ciliatis. W.
D. foliis sublinearibus ciliatis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 377. *Collect. suppl.* 41. *
Gefranzte Giftlilie. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. 4
Scapus *sesquipedalis foliis duplo altior.* Flores *albi submutantes.* W.

*2. DRIMIA *elata.*

D. foliis lineari-lanceolatis oblique flexis glabris, floribus nutantibus. W.
D. foliis lanceolato-linearibus glabris glaucescentibus scapo duplo brevioribus. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 373. *Collect. suppl.* 38. *
Hohe Giftlilie. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. 4
Scapus *bipedalis foliis duplo altior.* Corolla *externe virescens, interne alba linea viridi in laciniarum medio.* W.

*3. DRIMIA *pusilla.*

D. foliis lanceolatis glabris basi canaliculatis, floribus erectis. W.

D. foliis lanceolato-linearibus glabris, scapum aequantibus. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 374. *Collect. suppl.* 42. *
Niedrige Giftlilie. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. 4
Scapus *biuncialis altitudine foliorum.* Corollae *virescentes.* W.

*4. DRIMIA *undulata.*
D. foliis lanceolatis glabris undulatis, pedunculis horizontalibus. W.
D. foliis lineari-lanceolatis glabris undulatis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 376. *Collect. suppl.* 41. *
Hyacinthus (*revolutus*) corollis sexpartitis campanulatis revolutis, foliis oblongis undulatis. *Lin. suppl.* 204?
Hyacinthus (*revolutus*) corollis ovatis campanulatis reflexis, foliis lanceolatis subundulatis. *Thunb. prod.* 64?
Wellenblättrige Giftlilie. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. 4
Scapus *biuncialis longitudine foliorum.* Corollae *virescentes.* W.

*5. DRIMIA *media.*
D. foliis lineari-subulatis semiteretibus. W.
D. foliis subulatis antice subcanaliculatis glabris. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 375. *Collect. suppl.* 40. *
Mittlere Giftlilie. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. 4
Scapus *bipedalis foliis duplo altior.* Flores *albi.* W.
*Totum genus vix ab Hyacinthis satis distinctum; insertio staminum enim in diversis speciebus Hyacinthi non eadem.* W.

## 652. HYACINTHUS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 577.

*Cor.* campanulata 6-fida: pori 3 melliferi Germinis.

1. HYACINTHUS *non scriptus.*
H. corollis campanulatis sexpartitis apice revolutis. *Hort. cliff.* 125. *Roy lugdb.* 27. *Sauv monsp.* 17. *Mill. dict. n.* 1 *Blackw. t.* 61. *Kniph. cent.* 2. *n.* 33. *Knorr. del.* 2. *t. H.*
H. floribus tubulosis, basi globosis, apice sexpartito revoluto. *Hall. helv. n.* 1248.

H. non ſcriptus. *Dod. cer.* 172. *ex Hall.* R.
H. oblongo flore, caeruleus major. *Bauh. pin.* 43.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 11. *p.* 415.
Engliſche Hyacinthe. W.
*Habitat in* Angliae, Galliae, Hiſpaniae, Italiae *nemoribus*, *in* Helvetia, Perſia. *Gmel. it.* 3. *p.* 309. 24 (v. v.)

Bracteae *ſunt ſaepius floribus longiores, et binae.* Petala *apice revoluta.* Stigma *guttula madidum.* Flore *albo variat.*

2. HYACINTHUS *cernuus.*

H. corollis campanulatis ſexpartitis, racemo cernuo. *Mill. dict. n.* 4.
H. hiſpanicus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 177.
H. oblongo flore ſuaviter rubente, minor. *Bauh. pin.* 64?
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 11. *p.* 417.
Hängende Hyacinthe. W.
*Habitat in* Hiſpania. 2 (v. v.)

*Convenit cum* H. non ſcripto *habitu et facie, quamvis minor; differt vero Foliis magis linearibus minus lanceolatis, erectioribus; Racemo magis nutante; Corollis incarnatis, nec coeruleis, teretioribus, cum petalorum lateribus ad baſin minus plano-patentibus, nec dorſo linea elevata notatis, minusque revolutis (quamvis reflexa) quam in illo,* Piſtillum *demum* ſtaminibus *brevius eſt.* Bracteae *binae ſaturatius incarnatae.*

Corolla *huic baſi ventricoſior, praecedenti vero minime.*

3. HYACINTHUS *amethyſtinus.*

H. corollis campanulatis ſemiſexfidis baſi cylindricis. *Hort. upſ.* 85. *Mill. dict. n.* 5. *Pall. it.* 3. *p.* 589.
H. oblongo caeruleo flore, minor. *Bauh. pin.* 44. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 27. *f.* 8.
H. minor hiſpanicus anguſtifolius. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 587. *Cluſ. cur. app. alt.*
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 11. *p.* 419.
Amethyſtfarbene Hyacinthe. W.
*Habitat in* Hiſpania? Ruſſia. 2 (v. v.)

4. HYACINTHUS *orientalis.*

H. corollis infundibuliformibus ſemiſexfidis baſi ventricoſis. *Hort. upſ.* 85. *Hort. cliff.* 125. *Roy. lugdb.*

27. *Gron. orient.* 115. *Mill. dict. n.* 6. *Kniph. cent.* 1. *n.* 43.

H. orientalis (ſpec. 1-15.) et plenus (1-3.) *Bauh. pin.* 44.
H. orientalis major et minor. *Dod. pempt.* 216.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 420.
Gemeine Hyacinthe. W.
*Habitat in* Aſia, Africa. 4 (v. v.)
Floribus *luteis ac purpureis in Ruſſia legit* Lepechin. *It. p.* 231. R.

*5. HYACINTHUS *flexuoſus.* †

H. corollis campanulatis, racemo erecto, foliis linearibus ſcapo longioribus. *Thunb. prod.* 64.
Gebogene Hyacinthe. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

6. HYACINTHUS *corymboſus.*

H. corollis infundibuliformibus corymboſis erectis, ſcapo foliis breviore. *Mant.* 225. *Iacq. Collect.* 3. *p.* 230. *t.* 19. *f.* 2. *

H. corollis infundibuliformibus, racemo erecto foliis ſcapo longioribus. *Thunb. prod.* 64.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 465.
Doldentraubige Hyacinthe. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei *paſcuis. Koenig.* 4 (v. ſ.)
Radix *bulboſa.* Folia *radicalia, linearia, anguſtiſſima, ſaepius tria, digito breviora.* Scapus *breviſſimus, foliis brevior, corymbo terminali.* Flores *infundibuliformes, ſemiſexfidi, purpurei.* Stamina 3 *longitudine corollae;* 3 *corollae dimidio breviora. Stylus ſimplex, longitudine corollae.*

7. HYACINTHUS *convallarioides.*

H. corollis campanulatis ſexpartitis, foliis ſubulatis. W.
H. corollis pendulis ovatis, ſcapo capillari. *Lin. ſuppl.* 204. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 42. *t.* 81. *
H. corollis campanulatis ovatis pendulis, ſcapo filiformi. *Thunb. prod.* 64.
Mayblümchenartige Hyacinthe. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4
Flores *absque foliis lutei.*

*8. HYACINTHUS *brevifolius.*

H. corollis ſexpartitis, racemo cernuo, foliis ſcapo brevioribus. *Thunb. prod.* 63.
Kurzblättrige Hyacinthe. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

9. HYACINTHUS *romanus.*

H. corollis campanulatis semisexfidis racemosis, staminibus membranaceis. *Mant.* 224.

H. comosus albus belgicus. *Bauh. pin.* 42.

H. comosus albus cum coeruleis staminibus. *Bauh. hist.* 2. *p.* 584.

*Houttuyn Lin. Pfl.* Syst. II. *p.* 465.

Römische Hyacinthe. W.

*Habitat* Romae *in cultis et hortis sponte. D. Capeller.*

Folia *latitudine digiti, longissima.* Racemus *longus, teres, floribus numerosissimis.* Pedicelli *longitudine florum.* Bracteae *minutae, membranaceae, muticae.* Corollae *campanulatae (cylindrico-ovatae. Capell.) ultra medium sexfidae, albae.* Filamenta *membranacea, lato-lanceolata laciniis corollae opposita.* Antherae *coeruleae.*

10. HYACINTHUS *Muscari.*

H. corollis ovatis omnibus aequalibus. *Hort. cliff.* 126. *Hort. upsl.* 85. *Roy. lugdb.* 28. *Kniph. cent.* 10. *n.* 52.

H. racemosus moschatus. *Bauh. pin.* 43.

Muscari obsoletiore flore. *Clus. hist.* 1. *p.* 178.

*Houttuyn Lin. Pfl.* Syst. II. *p.* 466.

Muscaten Hyacinthe. W.

*Habitat in* Asia, *ultra Bosphorum, inde in Europam ante* 1554. 24 (v. v.)

11. HYACINTHUS *comosus.*

H. corollis angulato-cylindricis: summis sterilibus longius pedicellatis. *Scop. carn. n.* 423. *Pollich. pal. n.* 342. *Iacq. austr. t.* 126. *Kniph. cent.* 2. *n.* 34. *Hoffm. germ.* 123. *Roth. germ. I.* 149. *II.* 389.

H. spica longissima, floribus supremis sterilibus erectis, inferioribus secundis patulis. *Hall. helv. n.* 1247.

H. corollis globosis: summis pedunculatis, foliis ensiformibus. *Sauv. monsp.* 17.

H. comosus major purpureus. *Bauh. pin.* 42.

H. maximus, botryoides caeruleus. *Bauh. hist.* 2. *p.* 371.

Muscari comosum. *Mill. dict. n.* 2.

Hyacinthus. *Cam. epit.* 798.

β. H. (*monstrosus*) corollis subovatis. *Sp. pl.* 454. *Vir. cliff.* 28. *Roy. lugdb.* 28.

Muscari monstrosum. *Mill. dict. n.* 4.

γ. H. floribus paniculatis monstrosis. *Hort. cliff.* 126.

H. panicula coerulea. *Bauh. pin.* 42.

H. fanneſius panicula comoſa, *Col. ecphr.* 2. *p.* 10. *t.* 10. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 467. 468.
Schopfblütige Hyacinthe. W.
*Habitat in* Galliae et Europae *auſtralis agris, in* Helvetia, Germania, Perſia. *Gmel. it.* 3. *p.* 309. 24 (v. v.)
Corollae *decolores, triſtes fere Muſcari, horizontaliter exſtantes ſub et poſt antheſin; ante antheſin erectae, coeruleae, pedicellis viridibus longitudine florum.* Corollae ſuperiores *minutae, ſteriles, vix dehiſcentes, violaceae; pedicellis longiſſimis coeruleis laetis, corymbum formantibus.* Mant. 366.

## 12. HYACINTHUS *botryoides.*

H. corollis globoſis uniformibus, inferioribus remotioribus, foliis ſtrictis linearibus baſi anguſtatis canaliculatis. W.
H. corollis globoſis uniformibus, foliis canaliculato-cylindricis ſtrictis. *Scop. carn. n.* 424. *Hoffm. germ.* 123. *Roth. germ. I.* 149. *II.* 391.
H. foliis gramineis, ſpica ovata, floribus globoſis, fecundis. *Hall. helv. n.* 1246.
Muſcari botryoides. *Mill. dict. n.* 1.
H. corollis globoſis, foliis in cylindrum convolutis. *Sauv. monſp.* 19. *Hort. cliff.* 126. *Hort. upſ.* 85. *Roy. lugdb.* 28.
H. botryoides vernus minor latifolius coeruleus inodorus. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 572.
H. racemoſus caeruleus major. *Bauh. pin.* 42.
H. botryoides purpureus III. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 181.
H. botryoides caeruleus amoenus. *Lob. ic.* 108.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 469.
Steifblättrige Hyacinthe. W.
*Habitat in* Italia, Helvetia, Carniolia, Perſia. *Gmel. it.* 3. *p.* 309. 24 (v. v.)
Flores *inodori.* Folia *lineas* 3 *lata, ob breves petiolos recta.* Spica *floribus* 20-30. Corollae *dentibus candidis, ſupremis exiguis.* Mant. 366.

## 13. HYACINTHUS *racemoſus.*

H. corollis ovatis uniformibus confertis, ſummis ſeſſilibus, foliis laxis dependentibus linearibus. W.
H. corollis ovatis: ſummis ſeſſilibus, foliis laxis. *Sauv. monſp.* 17. *Iacq. auſtr. t.* 187. *Knorr. del.* 1. *tab. T.* 8. *Hoffm. germ.* 123. *Roth. germ.* 149. *II.* 390.

H. foliis carinatis, ſpica ovata, floribus globoſis. *Hall. helv. n.* 1245.
Muſcari racemoſum. *Mill. dict. n.* 3.
H. racemoſus caeruleus minor juncifolius. *Bauh. pin.* 43.
H. botryoides 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 181.
H. recentiorum 1. *Dod. cor.* 176.
Allium caninum exiguum. *Trag.* 750. *licet inodorum dixerit. ex Hall.* R.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 471.
Trauben Hyacinthe. W.
*Habitat in* Europa *auſtrali.* 4 (v. v.)
Folia *carinata, lineam* 1 *lata, ob debiles petiolos laxa, decumbentia.* Spica *floribus* 40-50: *ſummis ſterilibus.* Flores *odori.* Albo *flore variat. Hall.*

## 653. PHORMIUM.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 578.

*Cor.* 6-petala, infera; petalis 3 interioribus longioribus. *Stamina* adſcendentia exſerta. *Capſula* oblonga triquetra. *Semina* compreſſa.

### 1. PHORMIUM *tenax.*

P. tenax. *Forſt. gen. n.* 24. *prod.* 153. *Cook. it. v.* 2. *p.* 96. *t.* 96. *figura bona. Mill. faſc.* 1. *figura optima.*
P. foliis plurimis, inflorescentia ramoſa. *Lin. ſuppl.* 204.
Zähe Flachslilie. W.
*Habitat in* Nova Zeelandia. 4
*Incolae Novae Zeelandiae ex hac planta Lini ſpeciem fabricant, ex qua mulieres ſtoreas pro variis veſtimentis plectunt, in quem uſum plures ſpecies Liliaceorum adhiberi poſſent.*

## *645. LACHENALIA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 1744.

*Cor.* 6-petala infera; petalis 3 interioribus longioribus. *Stamina* erecta. *Capſula* ſubovata trialata. *Semina* globoſa.

### *1. LACHENALIA *glaucina.*

L. corollis campanulatis ſeſſilibus, petalis interioribus

longioribus patulis obtusis, stylo staminibus longiore, foliis lineari-lanceolatis glabris. W.

L. foliis geminis lineari-oblongis integerrimis immaculatis, scapo tereti immaculato, floribus sessilibus patulis. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 391. *Collect. suppl.* 39. *

Graugrüne Lachenalie. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 24

Petala *exteriora glauco viridia apicibus rubicundis, interiora albido-incarnata.* W.

2. LACHENALIA *orchioides.*

L. corollis campanulatis sessilibus, petalis interioribus longioribus patulis obtusis, stylo longitudine staminum foliis oblongo-lanceolatis margine cartilagineo-crenatis. W.

L. corollis campanulatis, petalis tribus interioribus longioribus, floribus sessilibus, foliis lanceolatis scapo brevioribus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 460. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 390. *Collect.* 3. *p.* 241. *

L. corollis campanulatis subsessilibus, foliis lanceolatis scapo brevioribus. *Thunb. prod.* 64.

Phormium (*Hyacinthoides*) foliis radicalibus binis basi maculatis, scapo racemoso simplici, corollis campanulato-patentibus. *Lin. suppl.* 204.

Hyacinthus (*orchioides*) corollis sexpartitis, petalis tribus exterioribus brevioribus. *Sp. pl.* 455.

Muscari orchioides. *Mill. dict. n.* 5.

α. petalis exterioribus albidis apice viridibus, interioribus ochroleucis. W.

Hyacinthus orchioides aphyllus serpentarius major. *Breyn. prod.* 24. *t.* 11. *f.* 3.

β. petalis coeruleis, apice saturatioribus. W.

Hyacinthus orchioides africanus major bifolius, flore coeruleo majore. *Breyn. prod.* 23. *t.* 11. *f.* 1.

Orchis angustifolia maculata. *Buxb. cent.* 3. *p.* 10. *t.* 16. *Houttuyn. Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 471.

Ragwurzartige Lachenalie. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 24

Scapus *maculatus.* Folia *basi maculata margine tenuissime cartilagineo-crenata.* W.

*3. LACHENALIA *pallida.*

L. corollis campanulatis breviſſime pedunculatis, petalis interioribus longioribus patulis obtusis, scapo apice angulato foliis lineari-oblongis breviore. W.

L. (*pallida*) corollis campanulatis, petalis tribus interiobus longioribus, floribus breviſſime pedunculatis horizontalibus, foliis lineari-oblongis ſcapo longioribus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 460.

L. (*pallida*) corollis campanulatis, pedunculis horizontalibus, foliis lanceolatis ſcapum aequantibus. *Thunb. prod.* 64.

L. (*mediana*) foliis geminis oblongo-linearibus integerrimis immaculatis, ſcapo tereti immaculato, floribus breviter pedunculatis patentiſſimis, corollis ſubcylindricis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 392. *Collect.* 3. *p.* 242. *

Bleiche Lachenalie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Petala *exteriora baſi in tubum extus gibbum coeruleſcentem connata oblonga obtuſa alba, infra apicem gibbo viridi notata*; interiora *obovata apice patentia alba, carina verſus apicem pallide viridi.* Ait. l. c.

Scapus *teres inter flores angulatus foliorum longitudine, vel paulo brevior.* W.

*4. LACHENALIA *hyacinthoides.*

L. corollis campanulatis breviſſime pedunculatis, petalis interioribus longioribus patulis emarginatis, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis laxis ſcapo duplo longioribus. W.

L. foliis plurimis ſubulato-linearibus canaliculatis immaculatis, racemo oblongo, corollis campanulatis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 382. *Collect. ſuppl.* 58. *

Hyacinthus orchioides. *Iacq. hort. vind.* 2. *t.* 178.

Hyacinthenartige Lachenalie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Petala *tria exteriora alba externe apice rubicunda et macula viridi notata, interiora alba emarginata.* W.

*5. LACHENALIA *anguſtifolia.*

L. corollis campanulatis breviſſime pedunculatis, petalis interioribus longioribus patulis obovatis obtuſis, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis laxis ſcapo longioribus. W.

L. foliis ſubulatis ſemiteretibus facie planiuſculis immaculatis, racemo digitiformi, corollis campanulatis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 381. *Collect. ſuppl.* 47. *

Schmalblättrige Lachenalie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Scapus *rubro-maculatus.* Folia *ut in binis praece-*

*dentibus immaculata.* Racemus *cylindraceus.* Petala *alba patentia, apice interne macula flavescenti notata.* W.

*6. LACHENALIA *contaminata.*

L. corollis campanulato-cylindraceis, brevissime pedunculatis erectis, petalis interioribus longioribus lanceolatis obtusis erectis, foliis lineari-subulatis canaliculatis laxis scapo longioribus. W.

L. (*contaminata*) corollis campanulatis, petalis tribus superioribus longioribus, floribus pedunculatis, foliis lineari-subulatis canaliculatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 460.

L. (*orthopetala*) foliis plurimis subulato-linearibus canaliculatis maculatis, floribus cuneiformibus rectis. *Iacq. ic.* 2. *t.* 383. *Collect.* 3. *p.* 240. *

Gefleckte Lachenalie. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 2♃.

Folia *glabra, supra maculis obscure rubentibus adspersa, scapo longiora.* Scapus *erectus semiteres vix spithamaeus maculis sordide rubris.* Racemus *multiflorus.* Pedunculi *erecti filiformes albi sesquilineares.* Bractea *ad basin singuli pedunculi, e lata basi ovata acuminata concava patentissima albida pedunculo brevior.* Petala *exteriora basi in tubum extus gibbum connata oblonga obtusa alba, superne rubentia, infra apicem gibbo retuso, supremum (scapo proximum) trilineare, duo inferiora breviora.* Petala *interiora oblonga minus obtusa prope apicem carinata, carina rubra, duo superiora longitudine supremi exterioris, infimum longitudine breviorum exteriorum.* Ait. l. c.

7. LACHENALIA *viridis.*

L. corollis campanulato-cylindraceis pedunculatis, petalis exterioribus longissimis filiformibus recurvatis, foliis linearibus canaliculatis scapo longioribus. W.

L. corollis cylindraceis, petalis tribus exterioribus longissimis subulatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 462.

L. corollis cylindricis, laciniis exterioribus setaceo-acuminatis, foliis linearibus brevioribus. *Thunb. prod.* 64.

Hyacinthus (*viridis*) corollarum exterioribus laciniis subulatis longissimis. *Sp. pl.* 454. *Murr. comment. goett.* 1781. *p.* 44. *t.* 5. * *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 66. *Misc.* 2. *p.* 331. *

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* II. *p.* 418. *t.* 84. *f.* 1.

Grüne Lachenalie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ

8. LACHENALIA *ſerotina.*

L. corollis campanulatis pedunculatis ſecundis, petalis exterioribus longioribus patulis, interioribus connatis, foliis linearibus canaliculatis. W.

Hyacinthus (*ſerotinus*) petalis exterioribus ſubdiſtinctis, interioribus coadunatis. *Sp. pl.* 453. *Cavan. ic. p.* 18. *t.* 30. *

Albuca minor. *Gleditſch. Act. Berol.* 1796. *p.* 61.

Hyacinthus obſoleto flore. *Bauh. pin.* 44.

Hyacinthus obſoleti coloris hiſpanicus ſerotinus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 177. 178.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 418.

Spätblühende Lachenalie. W.

*Habitat in* Hiſpania. 2ɬ (v. v.)

*9. LACHENALIA *puſilla.*

L. corollis cylindricis, petalis interioribus longioribus erectis, ſtaminibus corolla longioribus, foliis elliptico-linearibus baſi attenuatis ſcapo longioribus patulis. W.

L. foliis pluſculis, infra terram anguſte et longe canaliculatis dein oblongis et planis, racemo in ſinu foliorum, floribus cylindricis. *Iacq. ic.* 2. *t.* 385. *Collect. ſuppl.* 71. *

L. (*reflexa*) corollis ventricoſis ſubſeſſilibus erectis, foliis enſiformibus reflexis ſcapo longioribus. *Thunb. prod.* 64.?

Kleinſte Lachenalie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ (v. ſ.)

Folia *rubro-maculata.* Scapus *breviſſimus vix ullus.* Flores *albidi ſtricti adpreſſi.* W.

*10. LACHENALIA *patula.*

L. corollis campanulatis pedunculatis, petalis interioribus longioribus obovatis patentibus, foliis lanceolatis canaliculatis ſcapo brevioribus. W.

L. foliis geminis lineari-lanceolatis canaliculatis pulpoſo-carnoſis, ad medietatem erectis, dein reflexis, corollis campanulatis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 384. *Collect.* 4. *p.* 149. *

Sperrblättrige Lachenalie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ

Folia *inmaculata ſubcarnoſa.* Scapus *teres punctatus.* Corolla *alba, petalis exterioribus ſub apice ex-*

*terne macula viridi et interioribus ad apicem linea rubicunda notatis.* W.

*11. LACHENALIA *fragrans.*

L. corollis campanulatis pedunculatis horizontalibus, petalis interioribus longioribus obtusis, staminibus corolla longioribus, foliis lanceolatis basi attenuatis scapo duplo brevioribus. W.

L. foliis geminis lineari-lanceolatis planis maculatis glabris, scapo erecto, corollis pedicellatis subcampanulatis. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 43. *t.* 82. *

Wohlriechende Lachenalie. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

Corolla *candida, petalis exterioribus sub apice externe macula rubra pictis.* W.

*12. LACHENALIA *liliiflora.*

L. corollis subcampanulatis patentibus pedunculatis, petalis linearibus, tribus interioribus longioribus subretusis, scapo apice maculato, foliis lanceolatis pustulatis. W.

L. foliis geminis ex oblongo lanceolatis dense facie pustulatis, scapo erecto tereti, corollis patenti-reflexis, petalis sublinearibus. *Iacq. ic.* 2. *t.* 387. *Collect. suppl.* 66. *

Lilienartige Lachenalie. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

Scapus *teres interflores angulatus*, Corollae *albae.* W.

*13. LACHENALIA *pustulata.*

L. corollis campanulatis brevissimis pedunculatis, petalis interioribus longioribus obtusis, scapo triquetro reclinato, foliis lanceolatis pustulatis. W.

L. foliis geminis lanceolato-linearibus, foliis facie pustulatis, scapo triquetro reclinato, floribus subcampanulatis subsessilibus. *Iacq. ic. rar.* 2. 386. *Collect.* 3. *p.* 244.

Blasige Lachenalie. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

Folia *longitudine scapi.* Corolla *alba, petalis exterioribus subtus apice viridibus, interioribus linea viridi brevi ad apicem coloratis.* W.

*14. LACHENALIA *purpureo-coerulea.*

L. corollis campanulatis pedunculatis, petalis interioribus longioribus obtusis revolutis, staminibus corolla

longioribus, ſcapo apice angulato, foliis lanceolatis puſtulatis. W.

α. corollis coeruleis apice violaceis, foliis erectiuſculis. W.
L. (*purpureo-coerulea*) foliis geminis ex oblongo-linearibus facie puſtulatis, ſcapo erecto tereti, corollis campanulatis, limbo patentiſſimo. *Iacq. ic.* 2. *t.* 388. *Collect. ſuppl.* 63. *

β. corollis violaceis, petalis exterioribus apice ſubtus macula viridi, petalis interioribus macula atro-violacea notatis, foliis depreſſis. W.
L. (*unicolor*) foliis geminis lineari-lanceolatis, facie rariter puſtulatis, ſcapo erecto tereti, corollis ſubcylindricis, petalis interioribus apice patulis, genitalibus declinatis. *Iacq. ic.* 2. *t.* 389. *Collect. ſuppl.* 61. *
Bunte Lachenalie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɥ
Scapus *teres inter flores vero angulatus.* W.

*15. LACHENALIA *violacea.*
L. corollis campanulatis baſi planis longitudine pedunculi, petalis interioribus longioribus obtuſis, ſtaminibus corolla longioribus, ſcapo apice angulato, foliis oblongis. W.
L. foliis geminis oblongis maculatis, ſcapo tereti adſcendente, racemo erecto pedunculis patentiſſimis longitudine florum, floribus baſi planis propendulis. *Iacq. ic.* 2. *t.* 394. *Collect.* 4. *p.* 147. *
Violette Lachenalie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɥ
Scapus *teres inter flores angulatus.* Folia *oblonga baſi ſenſim anguſtata, apice rotundata cum acumine brevi, ſuperne maculis ſparſis inferne vero denſiſſimis pallidioribus obſita.* Petala *exteriora viridia, interiora violacea. Singularis corollis baſi planis.* W.

*16. LACHENALIA *purpurea.*
L. corollis cylindraceo-campanulatis pedunculatis horizontalibus, petalis interioribus longioribus obtuſis rectis, ſtaminibus corolla duplo longioribus, foliis lanceolatis tenuiſſime cartilagineo-crenatis. W.
L. foliis geminis lineari-lanceolatis immaculatis ad oras ſubtiliſſime cartilagineo-crenulatis, floribus pedunculatis patentiſſimis, corollis ſubcylindricis. *Iacq. ic.* 2. *t.* 393. *Collect. ſuppl.* 65. *
Purpurfarbene Lachenalie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

Petala *exteriora alba apice viridia, interiora atro-ſanguinea.* Filamenta *coerulea.* W.

* 17. LACHENALIA *lanceaefolia.*

L. corollis ſubcampanulatis patentibus, pedunculis corolla triplo longioribus, petalis linearibus obtuſis ſubaequalibus, foliis ovatis acuminatis. W.

L. foliis pluribus lanceolato-acuminatis maculatis in orbem proſtratis, ſcapis axillaribus racemoſis proſtratis, petalis patentiſſimis. *Iacq. ic.* 2. *t.* 402. *Collect. ſuppl.* 69. *

Lanzenblättrige Lachenalie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

Folia *variegata omnium latiſſima.* Scapi *proſtrati.* Corolla *variat colore flavo-virenti, fuſceſcente, purpureo.* W.

* 18. LACHENALIA *unifolia.*

L. corollis cylindraceis, pedunculis longitudine corollae, petalis interioribus longioribus obtuſis inaequalibus, folio ſolitario lineari-lanceolato. W.

L. folio unico canaliculato, racemo laxo. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 43. *t.* 83. *

Einblättrige Lachenalie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

Scapus *punctatus teres.* Folium *unicum baſin ſcapi vaginans margine convolutum immaculatum et baſi tantum ſtriis transverſalibus purpureis variegatum.* Petala *exteriora, alba baſi coerulea apice purpureo-punctata, interiora alba, quorum unicum reliquis majus.* W.

* 19. LACHENALIA *hirta.*

L. corollis campanulatis pedunculatis, foliis linearibus hirtis. *Thunb. prod.* 64.

Phormium (*hirtum*) ſcapo ſimplici, floribus cernuis ovatis, foliis hirſutis. *Thunb. Diſſ. Nov. Pl. Gen.* 5. *p.* 96.

Haarige Lachenalie. W.

*Habitat in* Cap. b. ſpei *aquoſis.* 24

Scapus *ſimplex flexuoſo-erectus glaber purpureo-maculatus ſpithamaeus.* Folium *unicum baſi lata vaginans, lineare hirſutum.* Flores *racemoſi cernui ovati albo-coeruleſcentes.* Thunb. Diſſ. l. c.

*20. LACHENALIA *isopetala.*

L. corollis cylindraceis pedunculatis, petalis linearibus obtusis subaequalibus, scapo apice angulato, foliis lanceolatis deflexis. W.

L. foliis geminis, scapo suberecto, floribus cylindricis erectis, petalis longitudine subaequalibus. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 401. *Collect. suppl.* 68. *

Gleichblattrige Lachenalie. W.

*Habitat ad.* Cap. b. spei. 24

Corollae *albae magnitudine sequentis, erectae apice atro-purpureae.* W.

21. LACHENALIA *tricolor.*

L. corollis cylindraceis pedunculatis pendulis, petalis interioribus longioribus emarginatis, bracteis acutis, foliis lanceolatis. W.

L. corollis cylindraceis, petalis tribus interioribus duplo longioribus emarginatis, floribus pedunculatis pendulis. *Ait. Kew.* 1 *p.* 461.

L. corollis cylindricis pedunculatis pendulis, laciniis interioribus exterioribus, foliis lanceolatis scapo brevioribus. *Thunb. prod.* 64.

Phormium (*Aloides*) foliis binis radicalibus supra fusco-maculatis, scapo racemoso simplici, floribus nutantibus cylindrico-infundibuliformibus. *Lin. suppl.* 205.

α. foliis lineari-lanceolatis, petalis interioribus apice rubris. *Ait. l. c.*

Lachenalia tricolor. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 61.

β. foliis oblongo-lanceolatis, corollis flavis basi rubentibus, apice viridibus. *Ait. l. c.*

Lachenalia tricolor. *Curt. mag.* 82.

L. (*luteola*) foliis geminis elongato-lanceolatis, plerumque immaculatis, scapo erecto, corollis propendulis cylindricis cum limbo petalorum interiorum patentissimis. *Iacq. ic.* 2. *t.* 395. *Collect.* 4. *p.* 148. *

Dreyfarbige Lachenalie. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 24 (*v. v.*)

*22. LACHENALIA *rubida.*

L. corollis cylindraceis brevissime pedunculatis pendulis, petalis interioribus longioribus, stylo staminibus longiore, foliis oblongis. W.

α. foliis patulis, scapo inferne maculato, corollis rubris, petalis exterioribus apice viridibus punctatis. W.

L. (*rubida*) foliis geminis sublanceolatis facie maculatis

ſuperne planis, ſcapo erecto ad medietatem usque maculato, floribus cylindricis incurvatulis punctatis pendulis. *Iacq. ic.* 2. *t.* 398. *Collect. ſuppl.* 60.*

β. foliis latioribus baſi ſcapum vaginantibus, ſcapo maculato, petalis exterioribus rubris apice punctatis, interioribus rubris baſi flaveſcentibus. W.

L. (*tigrina*) foliis ſubgeminis, baſi ad medietatem usque mutuo amplexantibus et convolutis, dein lanceolatis et patulis acutis maculatis, ſcapo erecto maculato, floribus cylindricis punctatis pendulis. *Iacq. ic.* 2. *t.* 399. *Collect. ſuppl.* 67.*

Röthliche Lachenalie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

*Confer. Buxb. cent.* 3. *t.* 20. W.

*23. LACHENALIA *punctata.*

L. corollis cylindraceis pedunculatis nutantibus, petalis interioribus longioribus inaequalibus obtuſis, foliis lanceolatis baſi attenuatis ſtrictis. W.

L. foliis geminis lineari-lanceolatis canaliculatis utrinque maculatis erectis, ſcapo erecto maculato pauciflo-ro, floribus cylindricis incurvulis punctatis pendulis. *Iacq. ic.* 2. *t.* 397. *Collect.* 2. *p.* 323.*

Punctirte Lachenalie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

Scapus *rubro-maculatus foliis albior pauciflorus.* Petala *exteriora incarnata ſanguineo-punctata, interiora ut in plerisque exterioribus longiora, ſed uno reliquis longiore, omnia albida rubro-punctata apice flaveſcentia.* W.

*24. LACHENALIA *pendula.*

L. corollis cylindricis pedunculatis pendulis, petalis interioribus longioribus cuneiformibus obtuſis, bracteis obtuſis, foliis oblongo-lanceolatis. W.

L. corollis cylindraceis, petalis tribus interioribus longioribus integris, floribus pedunculatis pendulis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 461. *Thunb. prod.* 64.

Phormium (*bulbiferum*) ſcapo racemoſo ſimplici, floribus nutantibus. *Cyrill. Neap. faſc.* 1. *t.* 12.

α. foliis immaculatis, petalis exterioribus rubris, interioribus flaveſcentibus apice violaceis. W.

L. (*pendula*) foliis geminis oblongis immaculatis, ſcapo erecto immaculato, corollis cylindricis impunctatis pendulis. *Iacq. ic.* 2. *t.* 400. *Collect.* 3. *p.* 239.*

β. foliis angustioribus superne maculatis, petalis exterioribus coccineis apice viridibus, interioribus flavescentibus apice atro-sanguineis. W.

L. (*quadricolor*) foliis geminis lineari-lanceolatis maculatis, scapo erecto, corollis propendulis cylindricis cum limbo petalorum interiorum patulo. *Iacq. ic.* 2. *t.* 396. *Collect. suppl.* 62.*

Hängende Lachenalie. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4 (v. s.)

## *655. LANARIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 1745.

*Cor.* supera lanata filamentis longior: limbo 6-partito patulo. *Peric.* 3-loculare.

### 1. LANARIA *plumosa.*

L. plumosa. *Ait. Kew.* 1. *p.* 462. *Thunb. prod.* 63.

Argolasia. *Juss. gen. ed Ust.* 67.

Hyacinthus (*lanatus*) corollis lanatis, caule ramoso. *Sp. pl.* 455. *Roy. lugdb.* 27.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 477.

Capische Filzlilie. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

Folia *linearia carinata canaliculata glabra, margine scabra.* Scapus *angulatus corymbosus.* Corymbi, pedunculi, bracteae, germina *et* corollae *dense pilis albis plumosis tecti.* W.

## *656. VELTHEIMIA.

*Gleditsch. Act. Berol.* 1771.

*Cor.* tubulosa 6-dentata. *Stam.* tubo inserta. *Caps.* membranacea trialata, loculis monospermis.

### 1. VELTHEIMIA *viridifolia.*

V. foliis lanceolatis plicato-undulatis obtusis, dentibus limbi rotundatis rectis. W.

V. foliis viridibus. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 41. *t.* 78.*

Aletris (*capensis*) acaulis, foliis lanceolatis undulatis, spica ovata, floribus nutantibus. *Sp. pl.* 456. *Burm. prod.* 10. *Murr. prod.* 205. *Act. holm.* 1770. *p.* 229. *t.* 5.*

Scilla radice solida corymbo contorto conico. *Fabr. helmst.* 23.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* II. *p.* 474.
Grünblättrige Veltheimie. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. 24 (v. v.)

*2. VELTHEIMIA *glauca.*

V. foliis lanceolatis glaucis margine subcrispatis apice mucronato, limbo patenti. W.
V. foliis glaucis. *Iacq. hort. Schoenb.* I. *p.* 40. *t.* 77. *
Aletris (*glauca*) acaulis, foliis lanceolatis glaucis, floribus nutantibus, limbo patente. *Ait. Kew* I. *p.* 463.
Graue Veltheimie. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. 24

*Differt a praecedenti*: foliis *glaucis vix undulatis, quae in V. viridifolia maxime undulata superne laete viridia.* Limbus *corollae patens, laciniis longioribus, quam in praecedente, obtusis quidem sed non rotundis ut in illa.* Flores *minores angustiores.* Ait. l. c.

3. VETHEIMIA *Uvaria.*

V. scapo longiore foliis ensiformibus carinatis.
Aletris (*Uvaria*) acaulis foliis ensiformibus canaliculatis carinatis. *Syst. veg.* 277.
Aloë Uvaria. *Sp. pl.* 2. *p.* 460. *Mill. dict. n.* 23. *Knoph. cent.* 9. *n.* 5. *Knorr. del.* I. *t. A.* 13.
Aloë foliis linearibus radicalibus membranaceis. *Hort. cliff.* 133. *Roy. lugdb.* 23.
Aloë africana folio triangulari longissimò et angustissimo, floribus luteis foetidis. *Commel. hort.* 2. *p.* 29. *t.* 15. *Seb. thes.* I. *p.* 29. *t.* 19. *f.* 3.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* II. *p.* 478.
Traubenblütige Veltheimie. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. 24

*4. VELTHEIMIA *pumila.*

V. scapo breviore foliis linearibus acute carinatis.
Aletris pumila. *Ait. Kew.* I. *p.* 464.
Niedrige Veltheimie. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. 24

## 657. ALETRIS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 579.

*Cor.* infundibuliformis, rugosa. *Stam.* inserta laciniarum basi. *Caps.* 3-locularis, loculis polyspermis.

### 1. ALETRIS *farinosa.*

A. acaulis, foliis lanceolatis membranaceis, floribus alternis. *Sp. pl.* 456. *Mill. dict. n.* 1.
Aletris. *Amoen. acad.* 3. *p.* 11. *
Hyacinthus caule nudo, foliis linguiformibus acuminatis dentatis. *Gron. virg.* 38.
Hyacinthus floridanus spicatus. *Pluk. amalt.* 119. *t.* 437. *f.* 2.
Mehlige Aletris. W.
*Habitat in* America *septentrionali.* 24

### 2. ALETRIS *fragrans.*

A. caulescens, foliis lanceolatis laxis. *Jacq. vind.* 309.
A. caulescens, foliis lanceolatis amplexicaulibus. *Mill. dict. n.* 5.
Aloë africana arborescens, floribus albicantibus fragrantissimis. *Comm. hort.* 2. *p.* 7. *t.* 4 *et* 1. *p.* 93. *t.* 49.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 484.
Wohlriechende Aletris. W.
*Habitat in* Africa. ♄ (v. v.)

## 658. YUCCA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 580.

*Cor.* campanulato-patens. *Stylus* nullus. *Caps.* 3-locularis.

### 1. YUCCA *gloriosa.*

Y. foliis integerrimis. *Vir. cliff.* 29. *Mill. dict. n.* 1. *Kniph. cent.* 1. *n.* 100.
Y. foliis margine integerrimis. *Hort. cliff.* 130. *Hort. upsal.* 88. *Roy. lugdb.* 29.
Y. foliis aloës. *Bauh. pin.* 91.
Y. indica foliis aloës. *Barr. rar.* 70. *t.* 1194.
Cordyline foliis pungentibus integerrimis. *Roy. lugdb.* 22,
*Houttuyn Lin. Pfl.* Syst. 6. *p.* 378.

Prächtige Yukke. W.
*Habitat in* Canada, Peru. ♄ (v. v.)

2. YUCCA *aloifolia.*
Y. foliis crenulatis ſtrictis. *Mill. dict. n.* 2.
Y. foliis crenulatis. *Vir. cliff.* 29.
Y. foliorum margine crenulato. *Hort. cliff.* 130. *α.*
Y. arboreſcens, foliis rigidioribus rectis ſerratis. *Dill. elth.* 435. *t.* 323. *f.* 416.
Aloë yuccae foliis, cauleſcens. *Pluk. alm.* 19. *t.* 256. *f.* 4.
Aloë americana, yuccae folio arboreſcens. *Comm. praet.* 64. *t.* 14.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 380.
Aloëblättrige Yukke. W.
*Habitat in* Jamaica, Vera Cruce. ♄ (v. v.)

3. YUCCA *draconis.*
Y. foliis crenatis nutantibus. *Mill. dict. n.* 3.
Y. foliorum margine crenulato. *Hort. cliff.* 130. *β. Hort. upſ.* 88.
Y. draconis folio ſerrato. *Dill. elth.* 437. *t.* 324. *f.* 417. *Comm. prael.* 42. 67. *t.* 16.
Draconi arbori affinis americana. *Bauh. pin.* 506.
Cordyline foliis pungentibus crenatis. *Roy. lugdb.* 22.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 381.
Drachenbaumartige Yukke. W.
*Habitat in* America. ♄ (v. v. f. fl.)

4. YUCCA *filamentoſa.*
Y. foliis ſerrato-filiferis. *Mill. dict. n.* 4.
Y. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis margine filamentoſis. *Gron. virg.* 152. *Trew. ehret. t.* 37.
Y. foliis filamentoſis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 419.
V. virginiana, foliis per marginem apprime filatis. *Pluk. alm.* 396.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 381.
Fadige Yukke. W.
*Habitat in* Virginia. ♄

## 659. ALOË.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 581.

*Cor.* erecta, ore patulo, fundo nectarifero.
*Filam.* receptaculo inſerta.

1. ALOË *dichotoma.*
A. caule dichotomo, foliis enſiformibus ſerratis, floribus paniculatis, ſtaminibus corolla ovata longioribus. W.

A. ramosa, ramis dichotomis, foliis ensiformibus serratis. *Lin. suppl.* 206. *Patters. it. ed. germ. p.* 55. *t.* 3. 4. 5.

A. ramis dichotomis, foliis ensiformibus serratis. *Thunb. Diss. de Aloë n.* 1. * *Thunb. prod.* 61.

Gabelästige Aloë.

*Habitat in fronte montis* Bockland Cap. b. spei. ♄

2. ALOË *spicata.*

A. caulescens, foliis planis ensiformibus dentatis, floribus spicatis campanulatis horizontalibus. *Thunb. Diss. n.* 2. * *Thunb. prod.* 61.

A. floribus spicatis horizontalibus campanulatis, foliis caulinis planis amplexicaulibus dentatis. *Lin. suppl.* 205.

Aehrentragende Aloë.

*Habitat in* Cap. b. spei *interioribus regionibus.* ♄

*Simillima A. perfoliatae at* spica *et* figura *florum valde diversa.*

*Ex hujus succo optima Gummi-resina Aloës paratur, ex reliquis speciebus vilior.*

3. ALOË *perfoliata.*

A. caulescens, foliis ensiformibus dentatis erectis, floribus racemosis reflexis cylindricis. *Thunb. Diss. n.* 3. * *Thunb. prod.* 61.

A. foliis caulinis dentatis amplexicaulibus vaginantibus, floribus corymbosis cernuis pedunculatis subcylindricis. *Syst. veg.* 337. *Ait. Kew. 1. p.* 466. *

A. floribus corymbosis cernuis subcylindricis. *Mat. med.* 95.

A. foliis caulinis dentatis amplexicaulibus vaginantibus. *Hort. cliff.* 132. *Hort. upsal.* 86. *Roy. lugdb.* 23.

α. A. africana caulescens, foliis magis glaucis caulem amplectentibus et in mucronem obtusiorem desinentibus. *Comm. prael.* 86. *t.* 17. *rar.* 44. *t.* 44.

β. A. africana caulescens, foliis minus glaucis, dorsi parte suprema spinosa. *Comm. prael.* 69. *t.* 18.

A. (*africana*) foliis latioribus amplexicaulibus, margine et dorso spinosis, floribus spicatis, caule fruticoso. *Mill. dict. n.* 4. R.

γ. A. africana caulescens, foliis glaucis latioribus et undique spinosis. *Comm. prael.* 70. *t.* 19.

δ. A. africana caulescens, foliis glaucis brevissimis, foliorum summitate interna et externa nonnihil spinosa.

*Comm. prael.* 73. *t.* 22. *rar.* 45. *t.* 45. *Mill. dict. n.* 8.

ε. A. caulescens foliis glaucis: dorso integro spinoso. *Comm. prael.* 71. *t.* 20. *hort.* 2. *t.* 13. *Hall. goett.* 71.

ζ. A. africana caulescens, foliis glaucis brevioribus: foliorum parte interna et externa nonnihil spinosa. *Comm. prael.* 71. *t.* 21.

Aloë *glauca. Mill. dict. n.* 16.

A. africana caulescens, foliis glaucis caulem amplectentibus. *Comm. hort.* 2. *p.* 27. *t.* 14.

Aloë *arborescens. Mill. dict. n.* 3.

η. A. africana caulescens perfoliata glauca et non spinosa. *Comm. prael.* 74. *t.* 23.

θ. A. africana, foliis glaucis: margine et dorsi parte superiore spinosis, flore rubro. *Comm. prael.* 75. *t.* 24. *hort.* 2. *p.* 23. *t.* 12.

ι. A. africana mitriformis spinosa. *Dill. elth.* 21. *t.* 17. *f.* 19.

A. mitriformis. *Mill. dict. n.* 1.

κ. Aloe *vera.*

A. foliis spinosis confertis dentatis vaginantibus planis maculatis. *Hort. cliff.* 130. *Hort. upsal.* 86. *Mat. med. p.* 95. *Roy. lugdb.* 22. *Brown. jam.* 197. *Regn. bot. ic.*

A. vulgaris. *Bauh. pin.* 386.

Kadanaku s. Catevala. *Rheed. mal.* 11. *p.* 7. *t.* 3.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 338.

Durchwachsene Aloë. W.

*Habitat in* Indiis, Africa, *at* λ in Italiae, Siciliae, Melitae *tectis, muris.* ♄ (v. v.)

A. verae *inflorescentia et* Flores *omnino A. perfoliatae ejusque genuina varietas, quamvis* Corolla *fere minus divisa mihi apparuit.* Caulis *saepe radicans, licet erectus.*

*Numerosas varietates enumerat et Aiton l. c. Sub hisce varietatibus vero latent sine dubio species nonnullae distinctae, quas distinguere amplius haud ausim.* W.

*4. ALOË *picta.*

A. caulescens, foliis ensiformibus dentatis pictis patentibus, floribus racemosis reflexis cylindricis. *Thunb. Diss. n.* 4. *Thunb. prod.* 61.

ε. major.

Aloë perfoliata ☉ et λ. *Sp. pl.* 458.

**A.** africana caulescens fóliis spinosis maculis ab utraque parte albicantibus notatis. *Commel. hort.* 2. *p.* 9. *t.* 5.
A. africana maculata spinosa major. *Dill. elth.* 17. *t.* 14. *f.* 15.
**g.** minor.
Aloë perfoliata *μ.* *Sp. pl.* 458.
Aloë perfoliata *ι.* saponaria. *Ait. Kew.* 1. *p.* 467.
A. africana maculata spinosa minor. *Dill. elth.* 18. *t.* 15. *f.* 16.
Bunte Aloë. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. v.)
Caulis *flexuoso-erectus spithamaeus vel paulo ultra.* Folia *ensiformia plana patentia dentata saepius fasciata maculis interruptis, pedalia.* Thunb. Diss. l. c.

5. ALOE *sinuata.*

**A.** caulescens, foliis ensiformibus sinuato-serratis reflexis, floribus racemosis erectis cylindricis. *Thunb. Diss. n.* 5. *Thunb. prod.* 61.
Aloë perfoliata *ξ.* *Sp. pl.* 458.
Aloë perfoliata *γ.* barbadensis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 466? W.
A. barbadensis mitior laete virens et splendens. *Dill. elth. p.* 23. *t.* 19. *f.* 20.
A. succotrina angustifolia spinosa, flore purpureo. *Comm. hort.* 1. *p.* 91. *t.* 48.
A. americana ananae floribus suave rubentibus. *Pluk. alm.* 19. *t.* 240. *f.* 4.
Schmalblättrige Aloe. W.
*Habitat in* Barbados *et* Cap. b. spei. ♄ (v. v.)
Caulis *spithamaeus flexuoso-erectus inaequalis.* Folia *ensiformia versus apicem valde attenuata sinuato-serrata reflexa plana pedalia et ultra.* Thunb. Diss. l. c.

*6. ALOË *humilis.*

**A.** acaulis, foliis trigonis subulatis aculeatis, floribus racemosis reflexis, cylindricis. *Thunb. Diss. n.* 6. * *Thunb. prod.* 61.
Aloë perfoliata *o.* humilis. *Sp. pl.* 458.
Aloë perfoliata *ζ.* humilis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 467.
**A.** foliis erectis subulatis radicatis undique inerme spinosis. *Hort. cliff.* 131. *Roy. lugdb.* 24.
*α.* A. africana humilis, spinis inermibus et verrucis obsita. *Commel. praelud.* 77. *t.* 26. *rar.* 46. *t.* 46.
*β.* A. (*elongata*) floribus spicatis tubuloso-triquetris sub-

ringentibus oblique dependentibus, foliis aggregatis dentato-ſpinoſis. *Murr. Comment. goett.* 9. *p.* 191. *t.* 2.*
Niedrige Aloë. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

*7. ALOË *arachnoides.*
A. acaulis, foliis trigonis cuſpidatis ciliatis, floribus ſubſpicatis erectis cylindricis. *Thunb. Diſſ. n.* 7. *Thunb. prod.* 61.
α. communis.
Aloe pumila δ. arachnoides. *Sp. pl.* 460.
A. (*arachnoides*) ſeſſilis foliis brevioribus planis carnoſis, apice triquetris, marginibus inerme ſpinoſis. *Mill. dict. n.* 17.
A. africana humilis arachnoidea. *Comm. prael.* 78. *t.* 27. *Knorr. del.* 1. *tab. A.* 11.
β. pumila.
Aloë pumila ε. *Sp. pl.* 460.
A. foliis ovato-lanceolatis carnoſis apice triquetris, angulis inerme dentatis. *Hort. cliff.* 131. *Hort. upſ.* 86. *Roy. lugdb.* 24.
Aloë herbacea. *Mill. dict. n.* 18.
A. africana minima atro-viridis, ſpinis herbaceis numeroſis ornata. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 131. *t.* 131.
Weichſtachliche Aloë. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in* Carro *juxta* Svartkops Zoutpan. ♄ (v. v.)

8. ALOË *margaritifera.*
A. acaulis, foliis trigonis cuſpidatis papilloſis, floribus racemoſis cernuis cylindricis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 468.
Aloë pumila. *Thunb. Diſſ. n.* 8. *Thunb. prod.* 61.
A. (*pumila*) floribus ſeſſilibus bilabiatis, labio ſuperiore erectiore, inferiore recurvato. *Sp. pl.* 460.
α. major.
A. foliis ovato-ſubulatis acuminatis tuberculis cartilagineis undique adſperſis. *Hort. cliff.* 131. *Roy. lugdb.* 24. *Mill. dict. n.* 14. *Kniph. cent.* 4. *n.* 3.
A. africana folio in ſummitate triangulari margaritifera, flore ſubviridi. *Comm. hort.* 2. *p.* 19. *t.* 10.
A. africana margaritifera, folio undique verrucis numeroſiſſimis. *Bradl. ſucc.* 3. *p.* 1. *t.* 21.
β. minor.
A. africana magaritifera minor. *Comm. hort.* 2. *p.* 21. *t.* 11. *Dill. elth.* 19. *t.* 16. *f.* 17.

γ. minima.
A. africana margaritifera minima. *Comm. prael.* 43. *Dill. elth.* 20. *t.* 16. *f.* 18.
Perlen Aloë. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

*9. ALOE *verrucoſa.*
A. acaulis, foliis enſiformibus acutis papillosis diſtichis, floribus racemosis reflexis clavatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 468.
Aloë diſticha. *Thunb. Diſſ. n.* 9. * *Thunb. prod.* 61.
Aloë diſticha β. *Sp. pl.* 459.
A. africana flore rubro, folio triangulari et verrucis albicantibus ab utraque parte notato. *Comm. hort.* 2. *p.* 17. *t.* 9.
Warzige Aloë. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)
*Simillima ſequenti, ſed* folia *ſuperne planiuscula.* W.

*10. ALOE *carinata.*
A. acaulis, foliis acinaciformibus papillosis, floribus racemosis cernuis curvatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 469.
Aloë carinata. *Mill. dict. n.* 21.
Aloë diſticha γ. *Sp. pl.* 459.
A. africana foliis planis conjugatis carinatis verrucoſis, caule et flore corallii colore. *Mart. cent* 11. *t.* 11.
A. africana ſeſſilis, foliis carinatis verrucoſis. *Dill. elth.* 22. *t.* 18. *f.* 20.
Hohlblättrige Aloë. W.
*Habitat in* Africa. ♄ (v. v.)
*Differt a praecedente;* foliis *ſuperne excavatis.* W.

*11. ALOË *maculata.*
A. acaulis, foliis linguaeformibus glabris pictis, floribus racemosis cernuis curvatis. *Thunb. Diſſ. n.* 10. * *Thunb. prod.* 61.
α, *pulchra*, foliis acutis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 469.
A. foliis linguiformibus variegatis, floribus pedunculatis cernuis ore inaequali. *Mill. ic.* 195. *t.* 292.
β. *obliqua*, foliis obtuſis cum acumine. *Ait. l. c.*
Gefleckte Aloë. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in* Hautniquas *montibus.* ♄

12. ALOË *Lingua.*
A. ſubacaulis, foliis linguaeformibus denticulatis glabris diſtichis, floribus racemosis erectis cylindricis. *Thunb. Diſſ. n.* 11. *Thunb. prod.* 61. *Ait. Kew.* 1. *p.* 469.
A. (*linguaeformis*) floribus racemosis erectis, corollis

cylindricis, foliis linguaeformibus distícho-patulis. *Lin. suppl.* 206.

α. *angustifolia*, foliis angustioribus longioribus. *Ait. l. c.*

**A.** (*linguiformis*) sessilis foliis linguiformibus maculatis, floribus pedunculatis cernuis. *Mill. dict. n.* 13.

**A.** (*distícha*) floribus racemosis pendulis ovato-cylindricis curvis. *Sp. pl.* 459. *Knorr. del.* 1. *t. A.* 12. *et A.* 14.

**A.** foliis linguiformibus distichis patulis. *Hort. cliff.* 132. *Hort. upsal.* 86. *Roy. lugdb.* 23.

**A.** africana, flore rubro, folio maculis albicantibus ab utraque parte notato. *Comm. hort.* 2. *p.* 15. *t.* 8.

β. *crassifolia*, foliis latioribus brevioribus. *Ait. l. c.*

Zungenblättrige Aloë. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei *in summis montibus ad* Roodesand *prope* Waterfall. ♄

*13. ALOË *plicatilis.*

**A.** subacaulis, foliis linguaeformibus laevibus distichis, floribus racemosis pendulis cylindricis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 470.

Aloë disticha ε. plicatilis. *Sp. pl.* 459.

**A.** africana arborescens montana non spinosa, folio longissimo plicatili, flore rubro. *Comm. hort.* 2. *p.* 5. *t.* 3.

Kumara disticha. *Medic. Theodora p.* 74. *tab.* 4.

Zweyzeilige Aloë. W.

*Habitat in* Africa. ♄ (v. v. s. s.)

14. ALOË *variegata.*

**A.** subacaulis, foliis trifariis pictis canaliculatis, angulis cartilagineis, floribus racemosis cylindricis. *Thunb. Diss. n.* 12. * *Thunb. prod.* 61.

**A.** floribus racemosis cernuis subcylindricis, ore patulo aequali. *Mill. dict. n.* 9. *Knorr. del.* 1. *t. A.* 7. *Kniph. cent.* 3. *n.* 10.

**A.** foliis caulinis trifariis imbricatis erectis, angulis ternis cartilagineis. *Hort. cliff.* 132. *Hort. upsal.* 87. *Roy. lugdb.* 24.

**A.** africana humilis, foliis ex albo viridi variegatis. *Comm. prael.* 79. *t.* 28. *rar.* 27. *t.* 27. *Till. pis.* 7. *t.* 7. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 342.

Schäckige Aloë. W.

*Habitat in* Aethiopiae *argillosis.* ♄ (v. v.)

Corolla *incarnata ore* 6-*fido*: *laciniis tribus interio-*

*ribus alternis patulis.* Stamina *declinata.* *Stigma simplex.* Mant. 367.

15. ALOË *viscosa.*

A. subcaulescens, foliis imbricatis trifariis ovatis, floribus racemosis cernuis cylindricis. *Thunb. Diss. n.* 13. *Thunb. prod.* 61.

A. floribus spicatis infundibuliformibus bilabiatis, laciniis quinque revolutis, summa erecta. *Sp. pl.* 460. *Mill. dict. n.* 11. *Kniph. cent.* 4. *n.* 4. *Knorr. del.* 1. *t. A.* 10.

A. foliis canaliculatis trifariam imbricatis, caulinis apice reflexo-patulis. *Hort. cliff.* 132. *Hort upsal.* 87. *Roy. lugd.* 23.

A. africana erecta triangularis et triangulari folio viscoso. *Com. prael.* 82. *t.* 31. *Till. pis.* 6. *t.* 7. *Dill. elth.* 15. *t.* 13. *f.* 13.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 346.

Klebrige Aloë. W.

*Habitat in* Cap. b. spei *campestribus.* ♄ (v. v.)

16. ALOË *spiralis.*

A. subcaulescens, foliis imbricatis octofariis ovatis, floribus racemosis recurvis. *Thunb. Diss. n.* 14. * *Thunb. prod* 61.

A. floribus spicatis ovatis muricatis crenatis: segmentis interioribus conniventibus. *Mill. dict. n.* 12. *Knorr. del.* 1. *tab. A.* 6.

α. *imbricata* foliis spiraliter imbricatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 471.

A. foliis caulinis sexfariis ovatis mucronatis. *Syst. Veg.* 278.

A. foliis ovatis acuminatis caulinis quinquefariam imbricatis. *Hort. cliff.* 132. *Hort. upsal.* 87. *Roy. lugdb.* 23.

A. africana erecta rotunda, folio parvo et in acumen acutissimum exeunte. *Dill. elth.* 16. *t.* 13. *f.* 14. *Comm. prael.* 83. *t.* 32.

β. *pentagona*, foliis quinquefariam imbricatis. *Ait. l. c.* *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 344.

Spiralförmige Aloë. W.

*Habitat in* Africae *campestribus.* ♄ (v. v.)

Folia *ovato-subulata, mucronato-spinosa, apice tricarinata, sexfariam imbricata.* Mant. 368.

17. ALOË *retusa.*

A. acaulis, foliis quinquefariis deltoideis. *Thunb. Diss. n.* 15. *Thunb. prod.* 61.

A. floribus ſpicatis triquetris bilabiatis: labio inferiore, revoluto. *Mill. dict. n.* 19. *Kniph. cent.* 3. *n.* 9. *Knorr. del.* 1. *tab. A.* 10.

A. foliis caulinis quinquefariis rhomboidalibus ventricoſis, triquetris plano exſtantibus. *Hort. cliff.* 132. *Hort. upſ.* 87. *Roy. lugdb.* 24.

A. africana, breviſſimo craſſiſſimoque folio, flore viridi. *Comm. hort.* 2. *p.* 11. *t.* 6. *Till. piſ.* 6. *t.* 5. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 345.

Abgeſtutzte Aloë. W.

*Habitat in* Africae *argilloſis.* ♄ (v. v.)

Flores *ſimillimi A. margaritiferae.*

## 660. AGAVE.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 582.

*Cor.* erecta ſupera. *Filam.* corolla longiora, erecta.

* *Acaules.*

### 1. AGAVE *americana.*

A. acaulis, foliis dentato-ſpinoſis, ſcapo ramoſo, tubo corollae medio anguſtato, ſtaminibus corolla longioribus, ſtylo ſtaminibus longiore. W.

A. acaulis, foliis dentato-ſpinoſis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 471.

A. foliis dentato-ſpinoſis, ſcapo ramoſo. *Amoen. acad.* 3. *p.* 22. *Oſb. it.* 43.

A. ſcapo arboreo ramoſo. *Hall. helv. n.* 1249.

A. foliis ſpinoſo-dentatis mucronatisque. *Hort. upſ.* 81.

A. foliis ſubcompreſſis mucronatis ad margines ſpinoſo-dentatis, ſcapo valido aſſurgenti, racemo ſpatioſo ramoſo. *Brown. jam.* 199.

Aloë foliis lanceolatis dentatis ſpina terminatis radicalibus. *Hort. cliff.* 130. *Roy. lugdb.* 22.

Aloe folio in oblongum mucronem abeunte. *Bauh. pin.* 286.

β. Aloë americana muricata, foliorum margine luteo. *Riſl. carlsr. p.* 3.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 348.

Americaniſche Agave. W.

*Habitat in* America *calidiore. Cortuſus plantam primus in Europa habuit* 1561. (*Cam. hort.* 11.) *hodie ab ea ſepes in Luſitania; in* Helvetia. ♄ (v. f.)

2. AGAVE *vivipara.*

A. acaulis, foliis dentatis, ſcapo ramoſo, tubo corollae medio anguſtato, ſtaminibus corollam aequantibus. W.

A. foliis dentatis, ſtaminibus corollam aequantibus. *Syſt. veg.* 278.

A. acaulis, foliis dentatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 471.

A. foliis reflexis, marginibus dentatis. *Mill. dict n.* 5.

Aloë americana ſobolifera. *Herm. lugdb.* 16. *t.* 17?

Aloë americana polygona. *Comm. prael.* 65. *t.* 15.

Aloë americana. *Rumph. amb.* 5. *p.* 273. *t.* 94.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 351.

Lebendiggebärende Agave. W.

*Habitat in* America. ♄

*Hermanni ſynonymum pertinet ad aliam, forte nou determinatam ſpeciem, et Rumphii citatum etiam dubium videtur.* W.

3. AGAVE *virginica.*

A. acaulis herbacea, foliis cartilagineo-ſerratis, ſcapo ſimpliciſſimo. W.

A. acaulis herbacea, foliis dentato-ſpinoſis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 472.

A. foliis dentato-ſpinoſis, ſcapo ſimpliciſſimo. *Amoen. acad.* 3. *p.* 22. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 378. *Collect.* 2. *p.* 261. *

Aloë foliis lanceolatis ſpina cartilaginea terminatis, floribus alternis ſeſſilibus. *Gron. virg.* 152.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 352.

Virginiſche Agave. W.

*Habitat in* Virginia. ♃

*4. AGAVE *cubenſis.*

A. corollis hexapetalis, foliis ciliato-ſpinoſis. *Iacq. amer.* 100. *t.* 175. *f.* 28. *

Nequametl. *Marg. braſ.* 2. *p.* 16.

Cubaſche Agave. W.

*Habitat frequens in inſula* Cuba. ♄

** *Cauleſcentes.*

*5. AGAVE *lurida.*

A. ſubcauleſcens, foliis dentato-ſpinoſis, ſcapo ramoſo, ſtaminibus corolla cylindrica longioribus, ſtylo ſtaminibus breviore. W.

A. ſubcauleſcens, foliis dentato-ſpinoſis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 472. *Iacq. Collect.* 4. *p.* 94. *t.* 1. *

α. foliis latioribus.
Agave Vera Cruz. *Mill. dict.*
β. foliis angustioribus.
Dunkle Agave. W.
*Habitat in* America *meridionali.* ♄
*Simillima A. americanae sed notis indicatis distincta,* corolla *etiam in hac virescens nec lutea ut in A. americana.* W.

*6. AGAVE *tuberosa.* †
A. caulescens, foliis dentato-spinosis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 472.
α. spinis solitariis.
Agave tuberosa. *Mill. dict. n.* 4.
β. spinis duplicibus.
Knollige Agave. W.
*Habitat in* America. ♄

7. AGAVE *foetida.*
A. caulescens, foliis integerrimis, scapo ramoso, corollis hexapetalis. W.
A. caulescens, foliis integerrimis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 473. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 379. *Collect.* 2. *p.* 312. *
A. foliis integerrimis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 22. *Mill. dict. n.* 3.
Aloë foliis integerrimis patentiusculis aculeo terminatis, radice caulescente. *Hort. cliff.* 132.
Aloë americana, viridi rigidissimo et foetido folio Piet. dicta indigenis. *Comm hort.* 2. *p.* 55. *t.* 18.
Aloë americana, radice tuberosa, minor. *Pluk. alm.* 19. *t.* 258. *f.* 2.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 353.
Stinckende Agave. W.
*Habitat in* Curassao. ♄
Plantam *Plukenetii separat Millerus, eamque* Agaven (*tuberosam; radice tuberosa, foliis longissimis, marginibus spinosis, appellat.* (*dict. n.* 4.) A. foetida *folia non dentata habet;* A. tuberosa *vero dentata ac spinosa folia gerit.* Mill. *l. c.* R.

## 661. ALSTROEMERIA.
*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 583.
*Cor.* 6-petala, subbilabiata: petalis 2 inferioribus basi tubulosis. *Stam.* declinata.

1. ALSTROEMERIA *Pelegrina.*
A. caule erecto, corollis patentibus, petalis tribus exte-

rioribus cuneiformibus tridentatis, reliquis mucronatis, foliis lineari-lanceolatis ſeſſilibus. W.

A. caule erecto. *Amoen. acad.* 6. *p.* 247. *t.* 247. *Iacq. hort. t.* 50. *Curt. mag.* 139.

Hemerocallis floribus purpuraſcentibus maculatis vulgo Pelegrina. *Feuill. peruv.* 2. *p.* 711. *t.* 5.

*Houttuyn. Lin. Pſl. Syſt.* 11. *p.* 487.

Bunte Alſtroemerie. W.

*Habitat in* Peru *et* Lima. 4 (v. v.)

*Folia reſupinata. Flores pulcherrime variegati.*

*Vox Pelegrina ab Hiſpanis in regno Peruviano uſitata, ſignificat flos ſuperbus.* W.

## 2. ALSTROEMERIA *pulchella.*

A. caule erecto, corollis reflexo-patentibus omnibus acutis, foliis ſeſſilibus, pedicellis involucro brevioribus. *Lin. ſuppl.* 206.

Schöne Alſtroemerie. W.

*Habitat in* America *meridionali.*

Planta *habitu et ſtructura ſimillima A. Pelegrinae, niſi folia anguſtiora et caulis hujus terminatus involucro irregulari, ex foliis majoribus exacte petiolatis reſupinatis.* Pedunculi *nudi ſimpliciſſimi uniflori.* Flores *quatuor ſ. ſex ſubcernui magnitudine A. Pelegrinae irregulares.* Petala *a baſi patentia récurvata acuta, alterna minora albida, apice rubra, baſi ſtriata, ſive rubro-punctata.* Stamina *declinata lutea aequalia.* Piſtillum *rubrum adſcendens.* Stigma *trifidum.*

## 3. ALSTROEMERIA *Ligtu.*

A. caule erecto, foliis ſpathulato-oblongis, pedunculis umbellae involucro longioribus, corolla bilabiata. *Lin. ſuppl.* 207.

A. caule adſcendente. *Sp. pl.* 462. *Curt. mag.* 125.

Hemerocallis floribus purpuraſcentibus ſtriatis vulgo Ligtu. *Feuill. peruv.* 2. *p.* 710. *t.* 4. *mala.*

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 11. *p.* 489.

Rachenförmige Alſtroemerie. W.

*Habitat in* Lima. 4 (v. v.)

Caules *ſteriles veſtiti foliis ſubulatis appreſſis, terminati foliis ſpathulatis oblongis reſupinatis, in roſam fere poſitis.* Caulis *floriferus veſtitus foliis ſubulatis appreſſis, terminatis involucro breviori.* Pedunculi *pauciores ſimpliciſſimi nudi involucro longiores.* Corolla *hexapetala bilabiata.* Petala *tria ſuperiora*

*majora alba basi punctata, apice rubro-maculata.* Petala *tria inferiora breviora, imprimis infimum, fere subulata rubra.* Filamenta *petalis inferioribus longiora deflexa scabra.* Antherae *didymae luteae.* Pistillum *rubrum. Spectabilis floribus magnis.*

4. ALSTROEMERIA *Salsilla.*

A. caule volubili, foliis petiolatis lanceolatis acuminatis, umbella ramosa, pedunculis involucro longioribus bracteatis laxis. *Lin. suppl.* 206.

A. caule volubili. *Sp. pl.* 462.

Hemerocallis scandens, floribus purpureis vulgo Salsilla. *Feuill. peruv.* 2. *p.* 713. *t.* 6.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* II. *p.* 492.

Windende Alstroemerie. W.

*Habitat in* Lima.

Caulis *volubilis.* Folia *petiolata nervosa acuminata resupinata.* Petioli *nulli.* Involucrum *polyphyllum subulatum reflexum.* Pedunculi *pauciores elongati, apice subbiflori.* Folium *florale ad ramificationes pedunculorum.* Petala *erecto-patentia obtusiuscula, exteriora rubicunda, interiora virescentia.*

*5. ALSTROEMERIA *ovata.*

A. caule volubili, foliis petiolatis ellipticis acuminatis superne villosis, umbella ramosa, pedunculis involucro longioribus bracteatis laxis, corolla campanulata. W.

A. caule volubili, foliis lanceolatis, superiori pagina laniginosis, inferiori lucidis, floribus umbellatis, coroliis tubulosis. *Cavan. ic.* 1. *p.* 54. *t.* 76. *

Eyförmige Alstroemerie. W.

*Habitat in* Peru. 2

Corollae *petala sex in tubum approximata ovato-oblonga; tria exteriora coccinea apice viridia; interiora viridia versus summitatem planiuscula, punctisque nigris variegata.* Cavan. l. c.

6. ALSTROEMERIA *multiflora.*

A. caule volubili, foliis petiolatis lanceolatis acuminatis, umbella simplici, pedunculis bracteis brevioribus, petalis alternis truncatis. *Lin. suppl.* 207.

Vielblütige Alstroemerie. W.

*Habitat in* America *meridionali. Mutis.*

Habitus *et* structura *herbae est A. Salsillae, at* petioli *margine rugosi, nec* umbella *pedunculata ut in A. Sal-*

*silla*, involucrum *multiflorum constat foliolis latioribus*, pedunculi *involucro et flore breviores*, *simplicissimi nudi*. Flores *magnitudine A. Salsillae*. Petala *tria exteriora breviora angustiora, integra; interiora truncata s. emarginata cum acumine*. Colorem *hujus ignoro, nam siccam misit Cl. Mutis. A reliquis distinctissima est.*

Folia *Alstroemeriarum sunt resupinata et corollae petalis alternis minoribus.*

## 662. HEMEROCALLIS.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 585.

*Cor.* campanulata: tubo cylindrico. *Stamina* declinata.

### 1. HEMEROCALLIS *flava.*

H. foliis linearibus carinatis, petalis planis acutis, nervisque petalorum indivisis. W.

H. corollis flavis. *Mill. dict. n.* 1. *Iacq. hort. t.* 139. *Knorr. del.* 1. *t. L.* 5. *Kniph. cent.* 10. *n.* 51. *Hoffm. germ.* 123.

H. foliis ensiformibus, scapo paucifloro, petiolis linearis. *Hall. helv. in Addendis. p.* 188.

H. scapo ramoso, corollis monopetalis. *Hort. upsal.* 88.

H. radice tuberosa, corollis monopetalis. *Hort. cliff.* 128. *Roy. lugdb.* 26.

H. radice tuberosa, corollis monopetalis luteis. *Gmel. sibir.* 1. *p.* 37.

Lilio-Asphodelus luteo flore. *Clus. hist.* 1. *p.* 137.

Lilium luteum, asphodeli radice. *Bauh. pin.* 80.

β. Lilio-Asphodelus luteus minor. *Tournef. inst.* 334. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 494.

Gelbe Tagblume. W.

*Habitat in* Helvetiae, Sibiriae, Hungariae *campis.* 24 (v. v.)

### 2. HEMEROCALLIS *fulva.*

H. foliis linearibus carinatis, petalis tribus interioribus obtusis undulatis, nervisque petalorum exterioribus ramosis. W.

H. corollis fulvis. *Mill. dict. n.* 2. *Kniph. cent* 7. *n.* 31.

Lilio-Asphodelus puniceus. *Clus. hist.* 1. *p.* 137.

Lilium rubrum, asphodeli radice. *Bauh. pin.* 80.

Phalangium allobrogum majus. *Cluſ. app. ult. Hort. aich. vern. ord.* 9. *t.* 6. *f.* 1.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 11. *p.* 496.
Braunrothe Tagblume. W.
*Habitat in* China. 24 (v. v.)

*Specie diverſa haec eſſe videtur, nec tamen differentiam reperi: haec major, illa minor; haec floribus fulvis, illa flavis, haec Maturationis, illa Groſſificationis menſe floret.*

*Hemerocallis fulva cultura mutatur in H. flavam, (Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 353.) quod mihi haud credibile videtur; ſi etiam mutetur color H. fulvae in pallidiorem, remanent tamen characteres conſtantes.* W.

## *3. HEMEROCALLIS *lancifolia.*

H. foliis oblongis utrinque attenuatis W.
H. (*lancifolia*) foliis lanceolatis ſeptemnerviis. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 335.
H. (*japonica*) foliis ovato-lanceolatis ſeptemnerviis. *Thunb. jap.* 142. *
Aletr[is] (*japonica*) acaulis, foliis petiolatis ovato-lanceolatis ſeptemnerviis, floribus ſpicatis. *Thunb. Act. Upſ.* 3. *p.* 208.
Aletris japonica. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 11. *p.* 486. *t.* 84. *f.* 2.
Lanzenblättrige Tagblume. W.
*Habitat in* Japonia. 24

## *4. HEMEROCALLIS *japonica.*

H. foliis ſubrotundo-ovatis acuminatis W.
H. (*japonica*) foliis ovatis undulatis multinerviis. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p* 335.
Jakſan. *Kaempf. amoen.* 863. *Banks Ic. Kaempf. t.* 11.
β. H. (*caerulea*) foliis cordatis petiolatis, corollis coeruleis. *Andrews repoſ. bot. tab.* 6. *
Japaniſche Tagblume. W,
*Habitat in* Japonia. 24

Folia *radicalia petiolata ovata acuminata undulata, coſta media multinervia, transverſim tenuiſſime venoſa glabra palmaria.* Petioli *alati membranacei palmares vel paulo ultra.* Flores *ut H. lancifolia.* Thunb. Act. l. c.

## 663. ACORUS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 586.

*Spadix* cylindricus, tectus floſculis. *Cor.* 6-petalae, nudae. *Stylus* o. *Capſ.* 3-locularis.

1. ACORUS *Calamus.*

A. ſcapi mucrone longiſſimo foliaceo. *Ait. Kew. v. p.* 474.

Acorus. *Roy. lugdb.* 6. *Fl. ſuec.* 277. 297. *Mat. med. p.* 96. *Hall. helv. n.* 1307. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 1. *Scop. carn. n.* 426. *Pollich. pal. n* 343. *Ludw. ect t.* 34. *Kniph. cent.* 9. *n.* 3. *Hoffm. germ.* 125. *Roth. germ. I.* 153. *II.* 398.

*α.* Acorus *vulgaris.*

A. verus ſ. Calamus aromaticus officinarum. *Bauh. pin.* 34. *Hort. cliff.* 137. *Blackw. t.* 466.

Typha aromatica, clava rugoſa. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 246. *ſ.* 8. *t.* 13. *f.* 4.

Acorum legitimum. *Tabern.* 642.

*β.* Acorus *verus.*

A. aſiaticus, radice tenuiore. *Herm. lugdb.* 9. *Fl. zeyl.* 132.

Calamus aromaticus. *Garz.* 288. *c. fig.*

Acorum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 178. *t.* 72. *f.* 1.

Waembu. *Rheed. mal.* 11. *p.* 99. *t.* 60.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 354.

Gemeiner Calmus. W.

*Habitat α. in* Europae, *β. in* Indiae *foſſis paludoſis.* 4 (v. v.)

* 2. ACORUS *gramineus.*

A. ſcapi mucrone ſpadicem vix excedente. *Ait. Kew.* 1. *p.* 474.

Grasartiger Calmus. W.

*Habitat cultus in* China. 4

## 664. ORONTIUM.

*Gen. pl. edit. Schreb. n.* 587.

*Spadix* cylindricus, tectus floſculis. *Cor.* 6-petalae, nudae. *Stylus* nullus. *Folliculi* 1-ſpermi.

1. ORONTIUM *aquaticum.*

O. foliis lanceolato-ovatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 474.

Orontium. *Amoen. acad.* 3. *p.* 17. *t.* 1. *f.* 3. * *Kalm. it.* 3. *p.* 54. *Giseck. ic. fasc.* 1. *n.* 6.
Arum folio enervi ovato. *Gron. virg.* 113.
Arum fluitans, pene nudo. *Banist. virg.* 1924.
*Houttuyn. Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 356.
Virginische Wasserähre. W.
*Habitat in* Virginiae, Canadae *paludibus, scaturiginibus.* 4
Radix *alte descendens.* Scapus *teres longus glaberrimus pallidus punctis fuscis.* Folia *lanceolato-ovata acuminata integerrima glaberrima petiolata.* Pedunculus *sub spica s. spadice lacteae albedinis.* Amoen. acad.
Folia *sunt venosa secundum iconem in Amoenitatibus a Linnaeo datam.* W.

*2. ORONTIUM *japonicum.*

O. foliis ensiformibus. W.
O. foliis ensiformibus venosis. *Thunb. jap.* 144.
Kiro. *Kaempf. amoen.* 785. *Banks. Ic. Kaempf. t.* 12.
Japanische Wasserähre. W.
*Habitat in* Japonia. 4
Folia *sunt nervosa nec venosa.* W.

## 665. TACCA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 588.

*Cal.* 6-partitus. *Cor.* 6-petala calyci inserta antherifera. *Stigma* stellatum. *Bacca* sicca 6-angul. polysperma infera.

TACCA *pinnatifida.*

T. pinnatifida. *Lin. suppl.* 251. *Forst. pl. esculent. n.* 28. * *Forst. prod. n.* 209.
Leontice (*Leontopetaloides*) foliis simplicibus tripartito-multifidis, corollis monopetalis calyculatis. *Sp. pl.* 448.
Leontopelaloides. *Ammann Act. petrop.* 8. *p.* 211. *t.* 113.
Tacca littorea. *Rumph. amb.* 5. *p.* 328. *t.* 114.
Tacca sativa. *Rumph. amb.* 5. *p.* 324. *t.* 112.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 408.
Halbgefiederte Tacca. W.

*Habitat in* India *orientali et* Taheiti. 24
Foliis *similis Dracontio polyphyllo.*

## 666. CORYPHA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 1690.

*Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Bacca* 1-sperma. *Sem.* globosum magnum osseum.

### 1. CORYPHA *umbraculifera.*

C. frondibus pinnato-palmatis, filo laciniis interjecto, spadice erecto. W.

C. frondibus pinnato-palmatis plicatis, petiolis ciliato-spinosis, spadice erecta. *Lamarck. encyclop.* 2. *p.* 130.

C. frondibus pinnato-palmatis plicatis filoque interjectis. *Hort. cliff.* 482. *Fl. zeyl.* 394. *Roy. lugdb.* 4.

Palma montana, folio plicatili flabelliformi maximo semel tantum frugifera. *Raj. hist.* 1363.

Codda-pana. *Rheed. mal.* 3. *p.* 1. *t.* 1-12.

Grosblättrige Schirmpalme. W.

*Habitat in* India. ♄

*Vix floret ante* 30 *s.* 40, *aetatis annum.* Rheed. l.c.

Folium *amplissimum et maximum in rerum natura.* W.

### *2. CORYPHA *rotundifolia.*

C. frondibus palmatis orbiculatis peltatis, spadice nutante. W.

C. frondibus orbiculatis palmato-peltatis radiatim plicatilibus, petiolis ciliato-spinosis, spadice pendulo. *Lamarck. encyclop.* 2. *p.* 131.

Saribus. *Rumph. amb.* 1. *p.* 42. *t.* 8.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 63. *t.* 2. *f.* 1. 2.

Rundblättrige Schirmpalme. W.

*Habitat in* Moluccis. ♄

## 667. LICUALA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 1691.

*Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-partita. *Nect.* truncatum sertiforme. *Drupa* 1-sperma.

### *1. LICUALA *spinosa.*

L. spinosa. *Wurmb. Act. Batav.* 2. *p.* 469. * *Thunb. Act. holm.* 1782. *p.* 284. * *Thunb. Nov. pl. Gen* 3. *p.* 70.

Licuala arbor. *Rumph. amb.* 1. *p.* 44. *t.* 9. *
Stachliche Strauchpalme. W.
*Habitat in* Moluccis. ♄

Palma *pumila orgyalis vix ultra.* Frons *palmata, laciniis linearibus apice truncatis dentatis.* Stipes *triquetrus ſpinoſus.* Spadix *erectus ramoſus.* W.

## *688. THRINAX.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 1686.

*Cal.* 6-dentatus. *Cor.* 0. *Stigma* infundibuliforme obliquum. *Bacca* monoſperma.

### *1. THRINAX *parviflora.*

T. parviflora. *Swartz. prod.* 57. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 614. *
Corypha palmacea, foliis flabelliformibus cum appendiculo ad imum, petiolis tenuioribus flexilibus compreſſis. *Brown. jam.* 190.
Kleinblütige Schilfpalme. W.
*Habitat in maritimis et aridis* Jamaicae, Hiſpaniolae. ♄

Palma *caudice* 10-20 *pedali.* Frondes *flabelliformes palmatae plicatae, laciniis lanceolatis rigidis.* Stipites *foliis longiores compreſſi glabri, inermes.* Spadix *erectiuſculus* 2-3 *pedalis ramoſus.* Swartz. l. c.

## 669. CALAMUS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 589.

*Cal.* 6-phyllus. *Cor.* 0. *Bacca* exarida, 1-ſperma, retrorſum imbricata.

### 1. CALAMUS *Rotang.*

C. caudice denſiſſime aculeato, aculeis erectis, ſpadice erecto. W.

C. (*petraeus*) caule craſſiſſimo ſulcato, ſpinis longis erectis. *Loureiro cochin. p.* 260. *
Arundo zeylanica ſpinoſiſſima major, fructibus rotundis ſcabris acidis. *Burm. zeyl.* 36. *Fl. zeyl.* 468.
Arundo mucifera Rotang dicta, fructu ſpadicei coloris ſtriis purpureis venuſte teſſulato. *Pluk. alm.* 53. *t.* 106. *f.* 1. 2.
Arundo Rotang dicta. *Piſ. mant.* 188.
Fructus caunae de Benghala. *Bauh. pin.* 405.
Tſieru Tſiurel. *Rheed. mal.* 12. *p.* 121. *t.* 64. 65.

Palmijuncus Calapparius. *Rumph. amb. 5. p. 88. 51.*
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 5. p. 585.*
Stein Rotang. W.
*Habitat in* Indiae *sylvis juxta fluenta.* ♄
Folia *setis fuscis tecta.* Rumph.

*2. CALAMUS *verus.*
C. aculeis caudicis horizontalibus, spadice erecto, tribus foliolis calycinis longioribus. W.
C. (*verus*) frondibus longissimis, spinis confertis longis, spadice brevi, corolla tripetala. *Loureiro cochin. p. 261.*
Palmijuncus verus. *Rumph. amb. 5. p. 105. t. 54.*
Aechter Rotang. W.
*Habitat ad fluviorum ripas* Indiae *orientalis.* ♄
*E. radice hujus crescit* caudex *solitarius nec plures ut in reliquis.* Rumph. l. c.

*3. CALAMUS *Draco.* W.
C. aculeis caudicis adpressis, frondium patentibus, spadice erecto. W.
Palmijuncus Draco. *Rumph. amb. 5. p. 114. t. 58. f. 1.*
Drachenblutgebender Rotang. W.
*Habitat in* India *orientali.* ♄

*4. CALAMUS *niger.* W.
C. aculeis caudicis et frondium horizontalibus, spadice coarctato pendulo. W.
Palmijuncus niger. *Rumph. amb. 5. p. 101. t. 52.*
Schwarzer Rotang. W.
*Habitat in littoribus* Indiae *orientalis.* ♄
Aculei *fusco-nigricantes.* Rumph. l. c.

*5. CALAMUS *viminalis.* W.
C. aculeis caudicis patentibus, frondium distantibus reflexis, spadice nutante. W.
Palmijuncus viminalis. *Rumph. amb. 5. p. 108. t. 55.*
Schlanker Rotang. W.
*Habitat in sylvis humentibus* Javae *et* Celebis. ♄.

*6. CALAMUS *rudentum.*
C. aculeis caudicis reflexis, spadice divaricato recto. W.
C. (*rudentum*) caule longissimo aequali, spinis inversis. *Loureiro cochin. p. 260.*
Palmijuncus albus. *Rumph. amb. 5. p. 102. t. 52.*
Weisser Rotang. W.
*Habitat in littoribus arenosis* Indiae *orientalis.* ♄
Haec *est vulgatissima species et per totam Indiam crescens.* Rumph. l. c.

*7. CALAMUS *equestris*. W.

C. aculeis candicis erecto-patentibus, frondium uncinatis, foliolis ellipticis utrinque attenuatis, spadice erecto. W.

Palmijuncus equestris. *Rumph. amb.* 5. *p.* 110. *t.* 56. *et. t.* 57. *f.* 1.

Ritter Rotang. W.

*Habitat in humidis saxosis* Amboinae. ♄

*8. CALAMUS *Zalacca*.

C. aculeis patentibus, spadice radicali. W.

Calamus Zalacca. *Gaert. sem.* 2. *p.* 267. *t.* 139. *f.* 1.

Palmijuncus Zalacca. *Rumph. amb.* 5. *p.* 115. *t.* 57. *f.* 2.

Fructus Baly insulae pyriformis asper. *Bauh. hist.* 1. *l.* 3. *p.* 401.

Wurzelblütiger Rotang. W.

*Habitat in sylvis humentibus* Javae *orientalis*, Balegae *et* Bandae. ♄

Fructus *hujus trispermus*. W.

*Periculum feci in distinguendis Calami speciebus a Rumphio delineatis, an characteres sufficiant, distinguent autoptae. Calamum scipionum, amarum et dioicum Loureiri non assumpsi ob notas harum specierum incertas.* W.

## 670. IUNCUS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 590.

*Cal.* 6-phyllus. *Cor.* o. *Capsul.* 1-locularis.

* *Culmis nudis.*

1. IUNCUS *acutus*.

I. culmo subnudo tereti mucronato, panicula terminali, involucro diphyllo spinoso. *Scop. carn. n.* 430. *Mill. dict. n.* 1.

I. (*maritimus*) culmo nudo mucronato pungente, panicula involucrata laterali, capsula longitudine calycis. *Lamarck. encyclop.* 3. *p.* 253. *

I. culmo pungente, panicula ex folii solitarii axilla. *Sauv. monsp.* 9.

I. panicula universali culmo breviore infime coarcta, secundariis paululum laxis, capsulis triquetro-subovatis nitentibus. *Guett. stamp.* 2. *p.* 412.

I. acutus, capitulis forghi. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 520. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 232 *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 15. *Scheuchz. gram.* 338.

β. Iuncus panicula univerſali culmo longiore, ſecundariis laxis longe pedunculatis: media praecipue. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 412.

I. (*acutus*) culmo nudo apice bivalvi, panicula terminali ſubumbellata, capſula calyce duplo longiore. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 253.

I. acutus maritimus anglicus. *Raj. hiſt.* 1303. *Moriſ. ibid. f.* 14. *Scheuchz. gram.* 340.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 12. *p.* 601.

Spitzige Simſe. W.

*Habitat in* Angliae, Galliae, Italiae, Carnioliae *maritimis paludoſis.* 24 (v. ſ.)

2. IUNCUS *conglomeratus.*

I. culmo nudo ſtricto, panicula laterali coarctato-capitata. W.

I. culmo nudo ſtricto, capitulo laterali *Roy. lugdb.* 44. *Fl. ſuec.* 278, 298. *Mill. dict. n.* 4. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 70. *Pollich. pal. n.* 344. *Leers. herb. n.* 361. *t.* 13. *f.* 1. *Fl. dan. t.* 1094. *Hoffm. germ.* 124. *Roth. germ. I.* 153. *II.* 398.

I. caule nudo, foliis teretibus mollibus, panicula conglomerata. *Hall. helv. n.* 1312.

I. culmo nudo, tereti; panicula laterali, denſa, globoſa, ſeſſili. *Scop. carn. ed.* 1. *p.* 224. *n.* 2. *ed.* 2. *n.* 427.

I. laevis panicula non ſparſa. *Bauh. pin.* 12. *theatr.* 183.

I. laevis, panicula conglomerata. *Scheuch. gram.* 343.

Iuncus. *Cam. epit.* 780. *Matthiol. ic.* 1036. laevis *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 520. alter. *Bauh. pin.* 182.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 12. *p.* 602.

Kugelriſpige Simſe. W.

*Habitat in* Europae *borealis uliginoſis.* 24

3. IUNCUS *effuſus.*

I. culmo nudo ſtricto, panicula laterali effuſa, floribus oblongis. W.

I. culmo nudo ſtricto, panicula laterali. *Roy. lugdb.* 44. *Fl. ſuec.* 279, 299. *Fl. dan. t.* 1096. *Pollich pal. n.* 345. *Leers. herb. n.* 262. *t.* 13. *f.* 2. *Hoffm. germ.* 124. *Roth. germ. I.* 153. *II.* 399.

I. culmo nudo tereti, panicula laterali ſparſa. *Scop. carn. ed.* 1. *p.* 223. *n.* 1. *ed.* 2. *n.* 428.

I. culmo nudo acuminato ad basin squamato, floribus pedunculatis. *Fl. lapp.* 117. *Gron. virg.* 38.
I. panicula arundinacea. *Bauh. hist.* 2. *p.* 520.
I. laevis panicula sparsa, major. *Bauh. pin.* 18. *theatr.* 182. *Scheuch. gram.* 241.
Iuncus laevis. *Dod. pempt.* 606. *Tabern.* 249. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 12. *p.* 603.
Weitrispige Simse. W.
*Habitat in* Europae *et* Americae *borealis uliginosis.* 4 (v. v.)

*4. IUNCUS *glaucus.*
I. culmo nudo glauco apice inflexo, panicula laterali effusa, ramis elongatis, floribus acuminatis. W.
I. (*glaucus*) culmo striato glauco, basi stipulis fuscis, panicula laterali sparsa. *Sibthorp. oxon. p.* 113. *Fl. dan. t.* 1159
Iuncus inflexus. *Leers. herb. n.* 265. *t.* 13. *f.* 3. *Hoffm. germ.* 124. *Roth. germ. I.* 154. *II.* 400.
Iuncus acutus. *Raj. synop.* 432.
Graue Simse. W.
*Habitat in* Germaniae, Angliae *udis.* 4 (v. v.)

5. IUNCUS *inflexus.*
I. culmo nudo: apice membranaceo incurvo, panicula laterali. *Sp. pl.* 464. *Scop. carn.* 2. *n.* 429.
I. culmo nudo, paniculam arcuatim tegente. *Sauv. monsp.* 9.
I. acumine reflexo, major. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 134. *Morif. hist.* 3. *p.* 235. *f.* 8. *t.* 10. *f.* 25. *Barr. ic.* 204.
I. foliaceus. *Bauh. hist.* 2. *p.* 221.
Iuncus 3. *Dod. cer.* 265.
β. I. acumine reflexo, alter. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 22. *Scheuch. gram.* 345. *n.* 5. 6.
γ. I. panicula universali laterali culmo longiore, secundariis sparsis. *Guett. stamp.* 412.
I. acutus panicula sparsa. *Bauh. pin.* 11.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 12. *p.* 604.
Gebogene Simse. W.
*Habitat in* Europa *australi.* 4.
*Culmi suprema pars non est teres, sed folii ad instar compressus.* W.

*6. IUNCUS *arcticus.* W.
I. culmo nudo stricto, umbella laterali, pedunculis multifloris, floribus sessilibus. W.

I. culmo nudo acuminato ad basin squamato, floribus sessilibus. *Fl. lapp.* 116. *Fl. dan. t.* 1095.
Nördliche Simse. W.
*Habitat in alpibus* Norvegiae, Lapponiae. 4
*Abunde distinctus a I. lacquini, cui simillimus, culmo nudo nunquam folioso.* W.

7. IUNCUS *filiformis.*
I. culmo nudo filiformi nutante, panicula laterali. *Roy. lugdb.* 44. *Gron. virg.* 152. *Fl. suec.* 280, 300. *Gmel. sib.* 1. *p.* 71. *Gort. ingr.* 51. *Mill. dict. n.* 2. *Roth. germ. I.* 159. *II.* 401. *Leers. herb. n.* 264. *t.* 13. *f.* 4. *Hoffm. germ.* 124.
I. culmo nudo, foliis teretibus mollibus, panicula laterali pauciflora. *Hall. helv. n.* 1313.
I. parvus, calamo supra paniculam longius producto. *Raj. angl.* 3. *p.* 432. *Fl. lapp.* 118. *Pluk.* 200. *t.* 40. *f.* 8.
I. laevis, panicula sparsa, minor. *Bauh. pin.* 12. *theatr.* 183. *Scheuch. gram.* 347. *t.* 7. *f.* 11.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 12. *p.* 605.
Fadenförmige Simse. W.
*Habitat in* Europae *vliginoso-paludosis turfosis.* 4 (v. s.)

*8. IUNCUS *capillaceus.*
I. culmo nudo capillaceo, panicula laterali brevissima, capsulis calyce majoribus. *Lamarck. encyclop.* 3. *p.* 255. *
Haarförmige Simse. W.
*Habitat in* Brasilia *prope* Monte-Video.
Culmus *capillaris ut in Scirpo aciculari sed multo longior, cespitosus, nudus debilis*, 6-10 *uncias longus.* Panicula *parva lateralis sessilis dichotoma* 5 *s.* 6 *linearis.* Flores 7-10, *in binis paniculae ramis sessiles.* Capsula *ovata valde obtusa calyce parum longior.* Lamarck. l. c.

9. IUNCUS *grandiflorus.*
I. culmo nudo unifloro, foliis teretibus, foliolis calycinis lineari-subulatis longissimis inaequalibus. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 255. *
I. folio tereti, culmo unifloro, flore erecto singulari nudo. *Lin. suppl.* 209.
I. folio tereti, flore solitario terminali subnudo. *Forst. Comment. Goett.* 9. *p.* 27. *t.* 5. *

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 12. *p.* 624.
Groſsblütige Simſe. W.
*Habitat in freto* Magellanico *inque* Tierra del Fuego. 24 (v. ſ.)

Gramen *vix pedale glaberrimum.* Culmus *teres baſi vaginis tectus.* Folium *unicum teres ſubulatum rectum culmo longius.* Flos *culmum terminans unicus magnus erectus.* Valvulae *calycinae erectae acutae, alternae breviores, pollicares.* Stamina *et* Piſtilla *valvulis calycinis breviora.*

*10. IUNCUS *magellanicus.*
I. culmo nudo unifloro, foliis planiuſculis anguſtiſſimis culmo longioribus, flore laterali. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 255. *
Magellaniſche Simſe. W.
*Habitat in freto* Magellanico.

Radix *non repens.* Culmi *filiformes anguloſi nudi uniflori ſex vel octo-pollicares.* Folia *radicalia plana ſubcarinata ſtricta glabra culmo longiora. Infra culmi apicem eſt* flos *unicus ſeſſilis* 6 *lineas longus ſquama parva lineari-ſubulata ſuffultus.* Foliola *calycina atra albo-marginata.* Filamenta 6 *breviſſima.* Antherae *lineares calyce breviores.* Germen *ſubrotundum atrum.* Stylus *filiformis.* Stigmata 3 *capillacea.* Lamarck. l. c.

*11. IUNCUS *rubens.* †
I. culmo nudo baſi vaginis veſtito, involucro ſpathaceo multiflo.o terminali. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 255.
Rothe Simſe. W.
*Habitat in* Braſilia *prope* Monte-Video.

Culmus *ſesquipedalis teres nudus baſi ſquamis vaginantibus alternis numeroſis tectus, apice foliis binis uncialibus rubicundis ſpathaceis inſtructus. Inter folia dicta eſt* faſciculus *capitulorum, unilateralis.* Capitula *ſunt e floribus binis vel tribus compoſita, et ſquamis totidem longitudine fere florum munita.* Flores *non examinavi.* Lamarck. l. c.

12. IUNCUS *trifidus.*
I. culmo nudo, foliis floribusque tribus terminalibus. *Fl. lapp.* 119. *Fl. ſuec.* 281, 301. *Roy. lugdb.* 43. *Oed. dan.* 107. *Scop. carn. n.* 432. *Hoffm. germ.* 124. *Roth. germ.* 159. *II.* 401.
I. monanthos. *Jacq. obſ. n.* 33. *t.* 4. *f.* 1.
I. acumine reflexo trifidus. *Hall. helv. n.* 1315.

I. acumine reflexo, minor et trifidus. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 22. *t.* 22. *theatr.* 186.
Juncoides alpinum trifidum. *Scheuch. gram.* 325. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 12. *p.* 606.
Dreytheilige Simſe. W.
*Habitat in alpibus* Lapponicis, Helveticis, Pyrenaeis. 24 (v. f.)

13. IUNCUS *ſquarroſus.*

I. culmo nudo, foliis ſetaceis, capitulis glomeratis aphyllis. *Fl. ſuec.* 282, 302. *Pollich. pal. n.* 346. *Oed. dan. t.* 430. *Hoffm. germ.* 24. *Roth. germ. I.* 154. *II.* 402.
I. (*Sprengelii*) culmo ſubtriquetro canaliculato, foliis lineari-canaliculatis, corollis acutis, capſulis obtuſis, bractea panicula multo minori. *Willd. prod. n.* 394. *t.* 4. *f.* 8.*
I. rigidus, panicula ſpicata, floribus cartilagineis. *Hall. helv. n.* 1317.
I. foliis ſetaceis, culmo nudo, capitulis glomeratis terminalibus. *Roy. lugdb.* 44.
I. montanus paluſtris. *Raj. hiſt.* 1303. *Fl. lapp.* 121.
Iunco adfinis panicula laxa, ſeu longioribus pediculis inſidente. *Scheuchz. agroſt.* 350. R.
Gramen junceum, foliis et ſpica junci. *Bauh. pin.* 5. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 226. *t.* 9. *f.* 13.
Gramen junceum, ſemine acuminato. *Loeſ. pruſſ.* 15. *t.* 29.
Gramen junceum maritimum. *Lob. ic. p.* 18. *Hall.* R. *Houttuyn Lin. Pſl.* Syſt. 12. *p.* 601.
Sparrige Simſe. W.
*Habitat in* Europae *borealis ceſpitoſis.* 24 (v. v.)
Totus *rigens foliis patentibus.*

*14. IUNCUS *capitatus.*

I. culmo nudo filiformi, capitulo terminali ſeſſili ſubſolitario involucrato. W.
I. (*gracilis*) culmo nudo erecto filiformi ſimpliciſſimo, foliis filiformibus ſemicylindricis canaliculatis, capitulo terminali, involucro ſubpentaphyllo. *Roth. germ. I.* 155. *II.* 402.*
I. (*ericetorum*) culmo nudo filiformi, foliis linearibus canaliculatis, capitulo ſubrotundo ſeſſili terminali triphyllo. *Pollich. pal. n.* 350.
I. (*mutabilis*) humilis ceſpitoſus, culmis ſubfolioſis, fo-

liis canaliculatis, floribus congeſtis ſeſſilibus. *Cavan ic.* 3. *p.* 49. *t.* 296. *f.* 2. (*excluſis ſynonymis.*)

I. foliatus minimus. *Bauh. hiſt.* 2. *p* 523. *Rupp. Ien.* 146

β. I. (*capitatus*) foliis ſetaceis, capitulis terminali alari que ſubfoliatis, petalis acutis integris pericarpio aequalibus. *Weigel obſ.* 28. *t.* 2. *f.* 5.* (*excluſis ſynonymis Halleri, Scheuchzeri et Dillenii.*)

Kopfförmige Simſe. W.

*Habitat in glareoſis ſubudis* Germaniae, Hiſpaniae. ⊙ (v. v.)

*15. IUNCUS *capenſis.*

I. culmo aphyllo compreſſo, capitulis ſeſſilibus pedunculatisque. *Thunb. prod.* 66.

I. (*cymoſus*) culmo nudo, foliis planis, panicula terminali cymoſa, involucro bivalvi. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 256?

Capiſche Simſe. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

** *Culmis folioſis.*

16. IUNCUS *punctorius.*

I. culmo nudo tereti, folio tereti articulato mucronato, panicula glomerata. *Lin. ſuppl.* 208.

I. culmo aphyllo tereti, folio ſubulato, panicula compoſita coarctata. *Thunb. prod.* 66.

Stechende Simſe. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

Culmus *bipedalis et ultra teres laevis.* Folia *radicalia nulla, ſed membranae duae, rudimenta foliorum.* Folium *caulinum unicum culmo ſimile ſed paulo longius ſtrictum mucronatum pungens intus articulatum.* Panicula *terminalis arcte conglomerata in aliquot glomeres e gluma exortos. Affinitas I. articulati ſed omnia robuſtiora ut reliqua taceam.*

17. IUNCUS *nodoſus.*

I. foliis nodoſo-articulatis, petalis mucronatis. *Sp. pl.* 466.

I. folioſus minor, pericarpiis ovatis, americanus. *Gron. virg.* 15.

Gramen junceum elatius, pericarpiis ovatis. *Pluk. alm.* 179. *t.* 92. *f.* 9.

Gramen junceum virginianum, calyculis paleaceis, bicorne. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 228. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 15.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 12. *p.* 608.
Knotige Simſe. W.
*Habitat in* America *ſeptentrionali.* 4 (v. f.)

*Simillimus I. articulato, ſed* Flores *magis capitati: capitulis rarioribus, majoribus et paniculae rami ſimplices, nec ſupradecompoſiti; imprimis diſtinguitur petalis in acumen ſubulatum protractis.*

18. IUNCUS *articulatus.*

I. culmo adſcendente, foliis nodoſo-articulatis compreſſo-teretiuſculis, panicula compoſita, foliolis calycinis aequalibus obtuſiuſculis. W.
I. foliis nodoſo-articulatis, petalis obtuſis. *Fl. ſuec.* 285, 303. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 69. *Scop. carn. n.* 431. *Leers. herb. n.* 265. *t.* 13. *f.* 6. *Fl. dan. t.* 1097.
α. Iuncus *aquaticus.*
I. foliis articulatis compreſſis, panicula ſemel ramoſa. *Hall. helv. n.* 1322. *Pollich. pal. n.* 347.
I. (*aquaticus*) culmo folioſo decumbente, foliis articulato-nodoſis ſubcompreſſis linearibus, panicula terminali compoſita. *Roth. germ. I.* 155. *II.* 405.
I. (*obtuſiflorus*) foliis nodoſo-articulatis, floribus obtuſis. *Hoffm. germ.* 125. *Ehrh. gram.* 76.
I. foliis articuloſis, panicula inaequali, capitulis ſeſſilibus, capſulis ſubulatis triquetris. *Roy. lugdb.* 43.
I. foliis articuloſis, floribus umbellatis. *Tournef. inſt.* 247. *Fl. lapp* 120.
Gramen junceum, folio articulato, aquaticum. *Bauh. pin.* 5. *prodr.* 12. *theatr.* 76. *Scheuch. gram.* 331.
β. Iuncus alpinus. *Villars. delph.* 2. p. 233.
I. foliis ſeſſilibus articulatis, panicula ſimplici, glumis ariſtatis. *Hall. helv. n.* 1321.
Iuncus alpinus, folio articuloſo. *Scheuch. gram.* 333.
γ. Iunci folioſi, foliis per ſiccitatem nodoſis. *Mich. gen.* 38. *n.* 1. 13.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 12. *p.* 609.
Gegliederte Simſe. W.
*Habitat in* Europae *aquoſis.* 4 (v. v.)

19. IUNCUS *ſylvaticus.*

I. culmo erecto, foliis nodoſo-articulatis teretibus, panicula ſupradecompoſita, foliolis calycinis ariſtatis interioribus longioribus. W.
I. (*ſylvaticus*) culmo folioſo erecto, foliis teretibus ar-

ticulato-nodosis, panicula terminali supradecomposita diffusa. *Roth. germ. I.* 155. *II.* 405.

I. (*acutiflorus*) foliis nodoso-articulatis, floribus acutis. *Hoffm. germ.* 125. *Ehrh. gram.* 66.

I. foliis articulatis teretibus panicula repetito-ramosa. *Hall. helv. n.* 1323.

Juncus articulatus γ. *Sp. pl.* 465.

Gramen junceum folio articuloso, sylvaticum. *Bauh. pin.* 5. *theatr.* 75.

Gramen junceum articulatum palustre erectum et elatius. *Moris. hist.* 3. *p.* 227. *s.* 8. *t.* 9. *f.* 1.

β. Gramen junceum folio articuloso cum utriculis. *Bauh. prod.* 12. *Scheuch. gram.* 333.

Wald Simse. W.

*Habitat in* Europae *nemoribus humidis.* 4 (v. v.)

*20. IUNCUS *subverticillatus.*

I. culmo decumbente, foliis setaceis, floribus glomeratis verticillatis, glomerulis foliosis. W.

α. culmo decumbente radicante.

I. (*uliginosus*) culmo folioso repente, ad florum glomerulos prolifero, foliis setaceis subarticulato-nodosis. *Roth. germ. I.* 155. *II.* 405. *Fl. dan. t.* 817.

I. (*subverticillatus*) culmo subdichotomo, foliis subulato-subsetaceis, floribus fasciculato-subverticillatis. *Wulffen in Iacq. Collect.* 3. *p.* 51. *

I. caule brachiato, foliis setaceis, floribus fasciculatis ad ramos sessilibus. *Hall. helv. n.* 1320.

Juncoides cauliculis paleaceis glomeratis, folio varians. *Scheuch. agrost.* 330. *t.* 7. *f.* 10.

Gramen junceum minimum paniculis foliaceis. *Moris. hist.* 3. *p.* 227. *s.* 8. *t.* 9. *f* 4.

Gramen junceum aquaticum, capitulis cum foliis capillaceis simul ortis proliferum. *Pluk. almag.* 179. *t.* 32. *f.* 3.

β. culmo erecto humiliore.

I. (*supinus*) culmo dichotomo, foliis canaliculatis filiformibus, capitulo triphyllo. *Moench hass. n.* 296. *t.* 5.* *Roth. germ. I.* 156. *II.* 409. *Hoffm. germ.* 125. *Fl. dan. t.* 1099. *exclusis synonymis.*

Wirtelblütige Simse. W.

*Habitat in* Europa *boreali* α. *locis uliginosis,* β *in siccioribus.* 4 (v. v.)

*Iuncus supinus Moenchii haud diversus videtur; differt tantum culmo erecto et foliis minoribus.* W.

## 21. IUNCUS *Tenageja.*

I. culmo ramoso paniculato, floribus solitariis sessilibus, petalis ovato-oblongis, capsula subglobosa. *Lin. suppl.* 208. *Fl. dan. t.* 1160. *Roth. germ. I.* 156. *II.* 409. *Hoffm. germ.* 125.

I. foliaceus humilior paleaceis calyculis. *Dill. giss.* 111.

I. annuus, floribus per ramulos sparsis. *Vaill. paris. t.* 20. *f.* 1.

Jährige Simse. W.

*Habitat in* Germaniae, Galliae *paludibus exsiccatis.* ⊙ (v. s.)

## 22. IUNCUS *bulbosus.*

I. culmo compresso indiviso, foliis linearibus canaliculatis, corymbo terminali, calycinis foliolis obtusis capsula subrotunda obtusa brevioribus. W.

I. foliis linearibus canaliculatis, capsulis obtusis. *Fl. suec.* 284, 304. *Mees. fris.* 160. *Oed. dan.* 431. *Pollich. pal. n.* 348. *Leers. herb. n.* 266. *t.* 13. *f.* 7. *Hoffm. germ.* 125. *Roth. germ. I.* 155. *II.* 406.

I. *compressus* foliis linearibus canaliculato-concavis, capsulis ovatis, culmo compresso. *Iacq. vind.* 235.

I. foliis carinatis, panicula sparsa, fructu globoso. *Hall. helv. n.* 1318.

I. culmo indiviso, floribus corymbosis, foliis linearibus canaliculatis. *Weig. obs. bot. p.* 29.

I. foliis linearibus canaliculato-concavis, capsulis triangularibus. *Guett. stamp.* 134.

I. foliis angulatis, culmo subnudo, panicula terminali prolifera, capsulis ovatis. *Roy. lugdb.* 43.

I. parvus cum pericarpiis rotundis. *Bauh. hist.* 2. *p.* 522.

I. repens apocarpos minor. *Barr. ic.* 114.

I. sorghi capitulis et Milii capitulis. *Barrel. ic.* 747. *n.* 11. *Gmel. sib.* 1. *p.* 67. *t.* 17. *f.* 2. *sec. Hall.* R.

Gramen junceum, junci sparsa panicula. *Morис. hist.* 3. *p.* 227. *f.* 8. *t.* 9. *f.* 11.

*Houttuyn Lin. Pl. Syst.* 12. *p.* 611.

Knollige Simse. W.

*Habitat in* Europae *pascuis sterilibus et ad vias.* 4 (v. v.)

Radix *repens, densa.* Culmi *filiformes, subcompressi.* Folia *linearia, laevia, subtus convexa et striata, supra canaliculata. Folium florale longitudine corymbi.*

Corymbus *communis et partiales inaequales.* Capsulae *ovatae, fuscae, nitidae.*

*23. IUNCUS *tenuis.* W.

I. culmo teretiusculo indiviso, foliis linearibus canaliculatis, corymbo terminali, calycinis foliolis acuminatis capsula triquetra obtusa longioribus. W.

Schlanke Simse. W.

*Habitat in* America boreali. 2 (v. s.)

Culmus *dodrantalis teretiusculus subcompressus basi foliosus.* Folia *ut in praecedente.* Flores *ut in praecedente sed duplo majores et rami laterales corymbi magis elongati.* Foliola *calycina lanceolata acuminata capsula paulo longiora.* Capsula *triquetra truncato-obtusa.* W.

24. IUNCUS *bufonius.*

I. culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus solitariis sessilibus. *Roy. lugdb.* 43. *Fl. suec.* 283, 305. *Gort. ingr.* 52. *Pollich. pal. n.* 349. *Gmel. sib.* 1. *p.* 67. *n.* 30. *Leers. herb.* 267. *t.* 13. *f.* 8. *Scopol. carn. n.* 433. *Hoffm.* 125. *Roth. germ. I.* 156. *II.* 408.

I. caule brachiato, foliis setaceis, floribus solitariis ad ramum sessilibus. *Hall. helv. n.* 1319.

I. palustris humilior, panicula laxissima. *Rupp. jen.* 130. *Flor. lapp.* 122.

I. culmo dichotomo, floribus solitariis sessilibus, petalis mucronatis margine scariosis pericarpio longioribus. *Weig. obs. bot. p.* 29.

Gramen nemorosum, calyculis paleaceis, erectum. *Scheuch. gram.* 327.

Gramen nemorósum, calyculis paleaceis. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 100.

Gramen junceum bufonium. *Tabern.* 225.

Gramen erectum latifolium. *Barrel. ic.* 263.

Holosteum. *Lob. ic.* 18.

β. Gramen nemorosum, calyculis paleaceis, repens. *Scheuch. gram.* 329. *Bauh. pin.* 99.

γ. Gramen nemorosum, calyculis paleaceis, species altera procerior. *Scheuch. gram.* 328.

δ. Gramen bufonium erectum angustifolium majus. *Barr. ic.* 264. minus. *Ej. ic.* 263.

ε. Gramen holosteum alpinum minimum. *Bauh. pin.* 7. *prodr.* 64. *theatr.* 101. *hist.* 2. *p.* 510.

Gramen juncoides minimum anglo-britannicum. *Raj. angl.* 3. *p.* 434.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 12. *p.* 613.
Kröten Simſe. W.
*Habitat in* Europae *inundatis.* ⊙ (v. v.)
Pinheaded cobweb mushroon. Pet. gaz. 51. f. 7. *hujus infans, paucis lecta.*

*25. IUNCUS *cephalotes.* †
I. culmo aphyllo tereti, foliis canaliculatis, capitulis ſubumbellatis. *Thunb. prod.* 66.
Knopfblütige Simſe. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

26. IUNCUS *ſtygius.*
I. foliis ſetaceis depreſſiuſculis, pedunculis geminis terminalibus, glumis ſolitariis ſubbifloris. *Sp. pl.* 467. *Smith. ic. ined.* 3. *p.* 55. *t.* 55.*
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 12. *p.* 614.
Schwediſche Simſe. W.
*Habitat in* Sueciae *paludibus, caeſpitoſis ſylvaticis profundis.* 4 (v. f.)
Culmi *ſpithamei, ſimplices.* Folia *lineari-ſubulata, altitudine culmi, erecta, depreſſa, laevia, tria: α. ad radicem. β. in medio culmi. γ. culmum inſtar ſpathae terminans.* Pedunculi *duo, terminales:* Gluma *biflora floſculis duobus, ſeſſilibus, glumā longioribus.* Petala *exteriora auguſtiora, acutiora, concava, extus purpurascentia; Interiora pallida.* Stamina *filiformia.* Antherae *flavae.* Germen *majuſculum.* Stylus *albus.* Stigmata *tria, reflexa.*

27. IUNCUS *Iacquini.*
I. (*biglumis*) folio ſubulato, capitulo ſubquadrifloro terminali. *Mant.* 63. *Iacq. vind.* 237. *t.* 4. *f.* 2. *auſtr.* 3. *t.* 221.
I. (*nigricans*) culmo ſimplici unifolio, floribus glomerato-faſciculatis atro-fuſcis terminalibus. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 260.*
I. caule unifolio, petiolis bifloris, floribus umbellatis. *Hall. helv. n.* 1316.
I. alpinus capitulo glomerato et nigro ſplendente. *Scheuch. it.* 1. *p.* 40. *t. f.* 2.
Iuncoides alpinum, floſculis junci glomeratis atrofuſcis. *Scheuchz. gram.* 323. *t.* 7. *f.* 9. *bene. Hall.*
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 12. *p.* 615.

Jacquinſche Simſe. W.
*Habitat in* Schneeberg *Auſtriae*, Alpibus *Helvetiae*. 4 (v. ſ.)

Caulis *folio unico, ſaepius elongato.* Flores *in capitulum, fuſco-purpurei, 4-7, glumis communibus propriisque fuſcis excepti, ſextuplo majores quam in* I. biglumi, *a quo diverſiſſimus.*

28. IUNCUS *biglumis.*

I. folio ſubulato, gluma biflora terminali. *Amoen. acad. 2. p.* 266. *t.* 3. *f.* 3. * *Fl. ſuec.* 2. *n.* 307. *Oed. dan. t.* 120.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 12. *p.* 616.
Zweyblütige Simſe. W.
*Habitat in Alpibus* Lapponicis. *D. Montin.* 4 (v. ſ.)
*Planta faciem gerit Schoeni ferruginei.*

29. IUNCUS *triglumis.*

I. foliis planis, gluma triflora terminali. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 67. *n.* 29. *Oed. dan. t.* 132. *Fl. ſuec.* 286, 306.
I. caule bifolio, foliis teretibus, floribus terminalibus ternis. *Hall. helv. n.* 1314.
I. gluma triflora culmum terminante. *Fl. lapp.* 115. *t.* 10. *f.* 5.
I. exïguus montanus mucrone carens. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 22. *theatr.* 185. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 103. *f.* 8.
Scirpus minimus capitulo ſquamoſo breviore et craſſiore fuſco. *Scheuchz. gram.* 366. *ex ſuſpicione Hall.*
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 12. *p.* 616.
Dreyblütige Simſe. W.
*Habitat frequens in Alpibus* Lapponicis, Tauro Raſtadienſi. 4 (v. ſ.)

30. IUNCUS *piloſus.*

I. foliis planis piloſis, corymbo ſubſimplici, pedunculis unifloris nutantibus, calycinis foliolis capſula brevioribus ovatis acutis. W.
I. foliis planis piloſis, corymbo ramoſo. *Fl. ſuec.* 287, 308. *Pollich. pal. n.* 351. *Leers. herb. n.* 268. *t.* 13. *f.* 10. *Roth. germ. I.* 156. *II.* 410.
I. (*vernalis*) foliis planis piloſis, pedunculis ſimplicibus, inferioribus reflexis. *Hoffm. germ.* 126.
I. (*vernalis*) foliis planis piloſis apice calloſis, panicula ſubduplicata, floribus ſolitariis longe pedicellatis, perigonii foliolis ſubaequalibus ariſtulatis, capſula triſperma vix longitudine perigonii. *Ehrh. Beitr.* 6. *p.* 137.

I. (*luzulinus*) foliis pilosis strictis floribus rotundis solitariis. *Villars. delph.* 2. *p.* 235.

I. foliis gramineis hirsutis, floribus umbellatis, solitariis, petiolatis, aristatis. *Hall. helv. n.* 1325.

I. foliis planis, panicula diffusa, pedunculis proliferis; flosculis intermediis sessilibus. *Roy. lugdb.* 43.

Gramen nemorosum hirsutum latifolium majus. *Bauh. pin.* 7. *Morif. hist.* 3. *p.* 225. *f.* 8. *t.* 9. *f.* 1. *

Gramen rore lucidum nemorense s. Luzulae. *Bauh. hist.* 2. *p.* 492.

Gramen hirsutum nemorosum. *Lob. ic.* 16.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 12. *p.* 617.

Haarige Simse. W.

*Habitat in sylvis* Europae *verno tempore.* 4 (v. v.)

*31. IUNCUS *maximus.*

I. foliis planis pilosis, corymbo decomposito, pedunculis elongatis divaricatis subtrifloris, calycinis foliolis aristatis longitudine capsulae. W.

I. (*maximus* foliis planis pilosis, paniculae ramosae floribus subternis subsessilibus. *Retz. prod. Fl. Scand. ed* 2. *n.* 434. *Fl. dan.* 441.

I. (*maximus*) foliis planis pilosis, panicula terminali ramosissima, floribus fasciculatis. *Roth. germ. I.* 157. *II.* 411. *Hoffm. germ.* 126.

I. (*maximus*) foliis planis pilosis, panicula triplicata diffusa, floribus binis s. ternis subsessilibus, perigonii valvulis subaequalibus aristatis, capsula trisperma perigonio paulo longiore. *Ehrh. Beit.* 6. *p.* 139.

I. (*latifolius*) foliis planis lanceolatis pilosis, culmeis sensim minoribus, paniculis supradecompositis cymoso-corymbosis folio longioribus, pedunculis umbellato-subtrifloris, foliolis calycum aequalibus. *Wulffen. in Iacq. Collect.* 3. *p.* 59. *

Iuncus sylvaticus. *Curt. lond.*

Iuncus pilosus. *Villars. delph.* 2. *p.* 234.

I. foliis planis hirsutis, floribus paniculatis fasciculatis. *Hall. helv. n.* 1324.

Iuncus pilosus ♂. *Sp. pl.* 468.

Gramen nemorosum hirsutum latifolium majus. *Scheuch. gram.* 317.

Gramen hirsutum latifolium maximum juncea panicula. *Morif. hist.* 3. *p.* 225. *f.* 8. *t.* 9. *f.* 2.

Gramen Luzulae maximum. *Bauh. hist.* 2. *p.* 293.

Gröſte Simſe. W.
*Habitat in montoſis ſylvaticis* Germaniae, Bohemiae, Carinthiae, Helvetiae, Galliae, Angliae, Daniae. 24 (v. l.)

*32. IUNCUS *ſpadiceus.*

I. foliis planis glabris, vaginis piloſis, corymbo decompoſito divaricato, pedunculis ſubquadrifloris, calycinis foliolis mucronatis capſula acuta brevioribus. W.
I. (*ſpadiceus*) foliis planis ex vagina piloſis, floribus minimis corymboſis ſolitariis ſubariſtatis. *Villars. delph.* 2. *p.* 256. *t.* 6. *Allion. pedem. n.* 2083.
Iuncus piloſus β. *Sp. pl.* 468.
I. foliis gramineis panicula laxa, petalis mollibus breviter ariſtatis. *Hall. helv. n.* 1326.
Gramen hirſutum nemoroſum anguſtifolium alpinum paniculis obſcure rufeſcentibus. *Scheuch. gram.* 312. *t.* 6. *optima. Scheuch. it.* 6. *p.* 458.
Gramen hirſutum anguſtifolium perenne, lini utriculis. *Barr. ic.* 748?
Braunblütige Simſe. W.
*Habitat in alpibus* Helvetiae, Delphinatus. 24 (v. f.)
Pedunculi *tri ſ. quadriflori, ſed* flores *breviſſime pedicellati, nec ſeſſiles in pedunculo communi ut in praecedente.* W.

*33. IUNCUS *luteus.*

I. foliis planis, vaginisque glabris, corymbo compoſito conferto, pedunculis multifloris, calycinis foliolis acutiuſculis ſplendentibus. W.
Iuncus luteus. *Allion. ped. n.* 2085. *Villars. delph.* 2. *p.* 235. *t.* 6. *
Iuncus campeſtris ε. *Sp. pl.* 469.
I. foliis planis glabris, ſpicis oblongis pluribus. *Ger. prov.* 140. *n.* 11.
I. foliis planis laevibus, panicula nuda umbellata flava. *Hall. enum* 257.
I. planifolius glaber, panicula nitente, floribus obtuſis. *Hall. helv. n.* 1329.
Iuncoides latifolium alpinum glabrum panicula lutea ſplendente. *Scheuch. gram.* 314.
Gelbe Simſe. W.
*Habitat in ſummis alpibus* Helvetiae, Sabaudiae, Galliae. 24 (v. f.)

*Distinctissimns jam floribus egregie flavis.* Capsulas *non vidi.* W.

* 34. IUNCUS *parviflorus.*

I. foliis planis vaginisqne glabris, corymbo decomposito erecto, pedunculis unifloris, calycinis foliolis acutis muticis. W.

I. (*parviflorus*) foliis planis nudis, paniculae ramosae floribus solitariis pedicellatis. *Retz. prod. Fl. Scand. ed. 2. n.* 434. *exclusо synonymo Scheuchzeri.*

I. (*parviflorus*) foliis planis nudis, panicula triplicata diffusa, floribus solitariis pedicellatis, perigonii valvulis subaequalibus aristulatis, capsula trisperma perigonio paulo longiore. *Ehrh. Beit.* 6. *p.* 139. *exclusis synonymis.*

Iuncus pilosus γ. *Sp. pl.* 468.

I. foliis planis, culmo paniculato, floribus sparsis. *Fl. lapp.* 124.

Iuncus pilosus β. *Fl. suec. ed.* 2. *n.* 303.

Kleinblütige Simse. W.

*Habitat in alpibus* Lapponiae. 4 (v. s.)

Planta *distinctissima a I. spadiceo:* foliis *latioribus,* vaginis *glabris,* corymbo *non divaricato,* floribus *minoribus pedunculatis,* calycibus *acutis nec mucronatis, totoque habitu. Clarissmi Viri Linnaeus, Retzius et Ehrhart hunc cum I. spadiceo confuderunt.* W.

35. IUNCUS *serratus.*

I. foliis ensiformibus planis serratis subtus canis, paniculae vaginis subulatis perfoliatis. *Lin. suppl.* 208.

I. foliis ensiformibus serratis, paniculae vaginis perfoliatis. *Thunb. prod.* 66.

Gesägte Simse. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei.

Culmi *folioси teretes crassitie digiti minoris, longitudine quadri-s. sexpedales.* Folia *alterna graminea duriora laevia subnervosa serrata longitudine vix culmi.* Panicula *conglomerata minus patula, floribus sparsis conglomeratis. Affinitas I. pilosi, sed I. acuto longe major.*

* 36. IUNCUS *albidus.*

I. foliis planis pilosis, corymbo decomposito, pedunculis subquadrifloris, calycinis foliolis mucronatis, interioribus paulo longioribus, radice fibrosa. W.

I. (*albidus*) foliis pilosis acuminatis planis, corymbis fo-

lio brevioribus, pedunculis subtrifloris. *Hoffm. germ.* 126.

I. (*angustifolius*) foliis planis pilosis, paniculis supradecompositis cymosis folio brevioribus, floribus umbellato-subtrifloris, foliolis calycum subaequalibus. *Wulfen in Iacq. Collect.* 3. *p.* 56. *

I. (*nemorosus*) foliis planis pilosis, floribus fasciculatis. *Pollich. pal. n.* 352.

I. (*leucophobus*) foliis planis pilosis, panicula triplicata diffusa, floribus binis, ternis, s. quaternis subsessilibus, perigonii valvulis subaequalibus lanceolatis acutis non aristatis, capsula trisperma perigonio paulo breviore. *Ehrh. Beitr.* 6. *p.* 141.

Iuncus niveus. *Leers. herb. n.* 269. *t.* 13. *f.* 6. *Moench. hass. n.* 299. *Roth. germ. I.* 157. *II.* 413.

Iuncus pilosus *s. Sp. pl.* 468.

I. foliis gramineis, floribus umbellatis, petalis aequalibus. *Hall. helv. n.* 1327.

Gramen hirsutum angustifolium majus. *Bauh. pin.* 7. *prod.* 16. *theatr.* 105. *Morisj. hist.* 3. *p.* 225. *s.* 8. *t.* 9. *f.* 3. *Scheuch. gram.* 318.

Gramen luzulae medium. *Bauh. hist.* 2. *p.* 493.

Weifsliche Simse. W.

*Habitat in montosis nemorosis* Germaniae, Helvetiae. 24. (v. v.)

## 37. IUNCUS *niveus.*

I. foliis planis pilosis, corymbo composito, pedunculis subquinquefloris, calycinis foliolis acutis, interioribus duplo longioribus, radice repente. W.

I. foliis planis subpilosis, corymbis folio brevioribus, floribus fasciculatis. *Sp. pl.* 468.

I. foliis gramineis, paniculis umbellatis, petalis interioribus duplo longioribus. *Hall. helv. n.* 1328.

Iuncoides montanum nemorosum, flore niveo. *Scheuch. gram.* 320. *t.* 7. *f.* 7.

Gramini Luzulae affine, flore albo. *Bauh. hist.* 2. *p.* 492. *Hall.* R.

Gramen hirsutum angustifolium minus, paniculis albis. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 106. *Morisj. hist.* 3. *s.* 8. *t.* 9. *f.* 39.

Schneeweifse Simse. W.

*Habitat in Alpibus* Bohemicis, Helveticis, Rhaeticis, Monspelii. 24 (v. s.)

## 38. IUNCUS *campestris.*

I. foliis planis pilosis, spicis pedunculatis umbellatis, intermedia sessili, calycinis foliolis mucronatis capsula longioribus. W.

I. foliis planis subpilosis, spicis sessilibus pedunculatisque. *Fl. suec.* 288, 309. *Pollich. pal. n.* 353. *Gmel. sib.* 1. *p.* 64. *Scop. carn. n.* 434. *Leers herb.* 270. *t.* 13. *f.* 5. *Hoffm. germ.* 126. *Kniph. cent.* 12. *n.* 66. *Roth. germ. I.* 157. *II.* 414.

I. foliis gramineis hirsutis, spicis petiolatis nutantibus, petalis aristatis. *Hall. helv. n.* 1330.

I. foliis planis, panicula rara, spicis sessilibus pedunculatisque. *Hort. cliff.* 137. *Roy. lugdb.* 42. *Gron. virg.* 38.

I. villosus, capitulis psyllii. *Tournef. inst.* 246. *Fl. lapp.* 126.

Iuncoides villosum, capitulis pyllii. *Scheuch. gram.* 310.

Gramen hirsutum, capitulis pyllii. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 103.

Gramen exile hirsutum cyperoides. *Lob. ic.* 15. R.

β. Iuncus foliis planis, culmo paniculato, spicis ovatis. *Fl. lapp.* 127. *t.* 10. *f.* 2.

γ. Iuncoides hirsutum, capitulo glomerato. *Scheuch. gram.* 312.

Gramen hirsutum, capitulo globoso. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 104.

δ. Iuncoides montanum nemorosum villosum latifolium elatius, capitulis florum candidis et splendentibus. *Mich. gen.* 42.

ε. Gramen hirsutum elatius, panicula juncea compacta. *Raj. angl.* 3. *p.* 416.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 12. *p.* 620.

Feld Simse. W.

*Habitat in* Europae *pascuis siccioribus.* 2 (v. v.)

## *39. IUNCUS *sudeticus.* W.

I. foliis planis glabris vaginis pilosis, spicis pedunculatis umbellatis, intermedia sessili, calycinis foliolis mucronatis longitudine capsulae. W.

Iuncus spicatus. *Krocker. sil. n.* 559. *t.* 52. *

Iuncus campestris β. *Sp. pl.* 469.

Iuncoides bohemicum, panicula minore nigricante, scapo supra eandem erecto et longius producto. *Mich. gen.* 42.

Schwarze Simſe. W.
*Habitat in* ſudetis Sileſiae *ſummis humidis.* 2. (v. ſ.)
*Affinis praecedenti, a quo tamen diverſus.* W.

40. IUNCUS *ſpicatus.*
I. foliis planis, ſpica racemoſa nutante. *Fl. lapp.* 125. *t.* 10. *f.* 4. *Fl. ſuec.* 289, 310. *Oed. dan t.* 270.
I. alpinus latifolius, paniculа racemoſa nigricante pendula. *Till. piſ.* 91. *Mich. nov. gen. p.* 42. *n.* 7.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 12. *p.* 622.
Aehrentragende Simſe. W.
*Habitat in* Lapponiae *alpibus.* 2. (v. ſ.)
*Iuncus pediformis Villars delph.* 2. *p.* 238. *t.* 6. *mihi ignotus; videtur vix ab hoc differre.* W.

## 671. RICHARDIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 591.

*Cal.* 6-partitus. *Cor.* 1-petala, ſubcylindrica. *Sem.* 3.

1. RICHARDIA *ſcabra.*
R. ſcabra. *Sp. pl.* 470.
Richardia. *Houſt. mſs.*
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 358.
Scharfe Richardie. W.
*Habitat in* Vera Cruce. 2.
*Planta ex ſtellatis XLIV.* Caulis *altus, brachiatus ſubarticulatus, obſolete tetragonus, hiſpidus: Pilis rigidiuſculis, ſparſis, reflexis.* Folia *lanceolato-ovata, alternatim nervoſa, integerrima, ſubpetiolata, ſcabra.* Flores *in capitula terminalia, paſſim etiam in verticillos congeſti; capitula terminalia, radiata Foliis* 4 *vel pluribus, ſcilicet alternis minoribus.* Corollulae *ut in Aſperulis, tenues, longae, ſed ſexfidae et fructus ex* 3 *ſeminibus; ſic differt a Spermacoce numero et caeteris.*

## 672. DUROIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 592.

*Cal.* ſuperus cylindricus truncatus. *Cor.* tubus cylindricus; *Limbo* 6-partito tubi longitudine. *Pomum* hiſpidum.

1. DUROIA *Eriopila.*
D. Eriopila. *Lin. ſuppl.* 209.

Anonyma *Merian. surin. t.* 43?
Marmolade doosees boom *Surinam.*
Rauchfrüchtige Duroie. W.
*Habitat in* Surinamo. *Dalberg.* ♄

Arbor *ramis crassis inaequalibus, apice hirsutis.* Folia *terminalia opposita approximata plura subpetiolata spithamaea obovata integerrima obtusiuscula costata, supra pubescentia, subtus reticulata.* Petioli *brevissimi hirsuti.* Flores *terminales ramorum sessiles congesti plures multi abortientes.* Corollae *similes Jasmini Sambac albae.* Fructus *magnitudine ovi Gallopavonis paulo major sphaericus densissime pilosus, pilis erectis brunneis, calyce excavato umbilicatus.* Fructus *bene sapidus et pro mensis Surinamensium gratus.*

## 673. ACHRAS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 593.

*Cal.* 6-phyllus. *Cor.* ovata, 6-fida: squamis totidem alternis interioribus. *Pomum* 10-loculare. *Sem.* solitaria hilo marginali, apiceque unguiculato.

1. ACHRAS *dissecta.*

A. floribus confertis, corollis octodecimfidis, foliis obovatis emarginato-retusis. *Forst. pl. escul. n.* 13. * *Forst. prod. n.* 155.

A. floribus solitariis, foliis cuneiformibus emarginato-retusis. *Lin. suppl.* 210.

A. (*Balata*) foliis ovato-oblongis subtus cinereis, fructu viridi olivaeformi. *Aubl. guj.* 1. *p.* 308.

Manil-Kara. *Rheed. mal.* 4. *p.* 53. *t.* 25.

Ausgerandeter Breyapfel. W.

*Habitat in insulis* Philippinis *et* Amicorum *praecipue in* Tonga-Tabu, *nunc etiam in* Malabaria, Gujana *et in insula* Mauritii. ♄

Habitus *similis congeneribus.* Ramuli *crassi teretes et tuberculati cicatricibus pedunculorum petiolorumque apice foliiferi et floriferi.* Folia *sparsa approximata petiolata glaberrima integerrima, subtus rachide costata erecta.* Pedunculi *ex omnibus foliorum axillis solitarii dependentes uniflori.*

2. ACHRAS *mammosa.*

A. floribus solitariis, foliis cuneiformi-lanceolatis. *Sp. pl.* 469.

Achras (*Zepota major*) floribus pentandris. *Iacq. amer.* 56. *t.* 182. *f.* 19.

A. fructu maximo ovato, seminibus paucioribus oblongis turgidis. *Brown. jam.* 5. *p.* 201.

Malus Persica maxima, foliis magnis integris longis, fructu maximo oblongo scabro: olliculo partim rugoso partim glabro. *Sloan. jam.* 2. *p.* 124. *t.* 218.

Arbor americana pomifera, frondosis ramulis, foliis amplis longioribus obtusis duris et venosis margine aequali. *Pluk. alm.* 39. *t.* 268. *f.* 2.

Fructus oblongus utrinque acuminatus s. conicus laevis splendens spadiceus. *Raj. hist.* 1800.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 423.

Brüstenförmiger Breyapfel. W.

*Habitat in* America *meridionali*, Cuba, Iamaica, Carthagenae. ♄

3. ACHRAS *Sapota.*

A. floribus solitariis, foliis lanceolato-ovatis. *Sp. pl.* 470. *Swartz. obs.* 128. *

A. (*Zapota*) floribus hexandris. *Iacq. amer.* 57. *t.* 41.

Achras. *Loefl. ic.* 186.

Sapota fructu ovato majore. *Plum. gen.* 43.

Achras fructu elliptico scabro majore. *Brown. jam.* 200. *t.* 19. *f.* 3.

*. Achras (*Zapotilla*) brachiatus diffusus, fructu subrotundo, cicatricula mucrone breviori. *Brown. jam.* 2. *p.* 200. *Iacq. l. c.*

Anona foliis laurinis glabris viridi-fuscis, fructu minore. *Sloan. jam.* 206. *hist.* 2. *p.* 171. *t.* 230. *Raj. dendr.* 78. *Catesb. car.* 2. *p.* 87. *t.* 87.

Sapota fructu turbinato minori. *Plum. gen.* 43.

Anona maxima, foliis laurinis glabris viridi-fuscis, fructu minimo. *Sloan. jam.* 206. *hist.* 2. *p.* 172. *t.* 169. *f.* 2. *Raj. dendr.* 79.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 425.

Gemeiner Breyapfel. W.

*Habitat in* America *meridionali.* ♄

Fructus *putrescere incipiens praefertur Bromeliae Ananas. Iacq.*

## 674. PRINOS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 594.

*Cal.* 6-fidus. *Cor.* 1-petala, rotata. *Bacca* 6-sperma.

### 1. PRINOS *verticillatus.*

P. foliis obovato-lanceolatis acuminatis duplicato-serratis, venis subtus pilosiusculis. W.

P. foliis longitudinaliter serratis. *Mill. dict. n.* 1. *Du Roi harbk.* 2. *p.* 157. *Wangenh. amer.* 97. * *Willd. arb.* 236. *

Prinos. *Gron. virg.* 39. *

Alcanna major latifolia dentata. *Munt. phyt.* 213. *t.* 51.

Aquifolium foliis deciduis. *Duham. arb.* 1. *p.* 62. *t.* 23.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 430.

Virginische Winterbeere. W.

*Habitat in* Virginiae *paludibus.* ♄ (v. v.)

An ***dioica,*** *ut Gron. virg.* 2. *p.* 54?

Variat *flore* 7-*raro* 8-*fido cum staminibus* 7 *vel* 8. *Du Roi.*

### *2. PRINOS *montanus.*

P. foliis ovatis, serratis utrinque nitidis. *Swartz. Fl. ind. occid.* 1. *p.* 622. *

P. foliis ovatis margine serratis, floribus hexandris, pedunculis axillaribus. *Swarz. prod.* 58.

Berg Winterbeere. W.

*Habitat in fruticetis montium altissimorum* Jamaicae. ♄

### *3. PRINOS *dioicus.*

P. foliis oblongo-ovatis subserratis glabris coriaceis, pedunculis axillaribus subumbellatis, floribus dioicis tetrandris. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 25. *t.* 14. *

Getrennte Winterbeere. W.

*Habitat in insula* Montserrat. ♄

### *4. PRINOS *nitidus.*

P. foliis oblongo-ovatis serratis nitidis membranaceis, pedunculis axillaribus unifloris, floribus tetrandris. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 26. *

Vierfädige Winterbeere. W.

*Habitat in insula* Montserrat. ♄

*Affinis P. dioicae, differt:* ramis *floriferis tenuioribus fuscis nec albidis,* foliis *tenuioribus magis lucidis, basin versus plerumque angustatis et acutis,* pedunculis

lis *paucioribus*, *omnibus unifloris*, floribus *duplo majoribus hermaphroditis*. Vahl. l. c.

5. PRINOS *glaber*.
P. foliis lanceolatis obtusiusculis glabris apice serratis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 478.
P. foliis apice serratis. *Sp. pl.* 471. *Wangenh. amer.* 97.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 431.
Canadische Winterbeere. W.
*Habitat in* Canada, *Kalm.* ♄ (v. f.)

*Arbor.* Foliis *alternis*, *petiolatis*, *oblongis*, *consistentibus glabris*, *versus apicem serraturis utrinque saepius binis*, *acutis*, *facie ferme Myricae*. Pedunculi *axillares*, *parvi*, *saepius triflori*. Flores *non vidi*.

Pedunculi *multiflori axillares solitarii gemini vel terni*. Calyx *et* Corolla *ut in praecedentibus*. W.

*6. PRINOS *lucidus*.
P. foliis ellipticis acuminatis laevibus apice subserratis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 478.
Glänzende Winterbeere. W.
*Habitat* - - - - ♄.

*7. PRINOS *Sideroxyloides*.
P. foliis subrotundis integerrimis. *Swartz. prod.* 58. *Fl. ind. occid.* 1. *p* 624. *
Rundblättrige Winterbeere. W.
*Habitat in insulis* Caribaeis: St. Christophori, *et* Montserrat *in monte sulphuris*. ♄

## *575. COSSIGNEA.

*Juss. Gen. ed. Usteri.* 275.

*Cal.* inferus, 5-partitus. *Cor.* 4-s. 5-petala. *Caps.* 3-locul. apice dehiscens, loculis subtrispermis.

*1. COSSIGNEA *triphylla*.
C. foliis ternatis, foliolis oblongis obtusis. W.
Coffinia (*triphylla*) foliis ternatis subtus tomentosis, foliolis oblongis obtusis. *Lamarck. encyclop.* 2. *p.* 152. *t.* 256. *
Dreyblättrige Coffignie. W.
*Habitat in insula* Borbonia. ♄

*2. COSSIGNEA *pinnata.*

C. foliis pinnatis, foliolis quinis lanceolatis emarginatis. W.

Coffinia (*pinnata*) foliis pinnatis, foliolis quinis lanceolatis ſubtus tomentoſis. *Lamarck encyclop. 2. p. 132. t. 256.* *

Gefiederte Coſſignie. W.

*Habitat in inſula* Mauritii. ♄

Inflorescentia *binarum ſpecierum eſt* panicula *terminalis e racemis ſimplicibus compoſita.* W.

## *676. BARBACENIA.

*Vandelli. in Roemer pl. hiſp. 98.*

*Cal.* ſuperus 6-dentatus. *Cor.* 6-petala. *Filam.* petaliformia dentata. *Capſ.* glanduloſa trivalvis polyſperma.

*1. BARBACENIA *braſilienſis.*

Barbacenia. *Vandelli in Roem. pl. hiſp. 1. p. 98. t. 6. f. 9.*

Braſiliſche Barbacene. W.

*Habitat in* Braſilia.

Planta *minus nota Juſſiaeis affinis.* W.

## 677. BERBERIS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 595.*

*Cal.* 6-phyllus. *Pet.* 6: ad ungues glandulis 2. *Stylus* 0. *Bacca* 2-ſperma.

1. BERBERIS *vulgaris.*

B. racemis ſimplicibus pendulis, foliis obovatis ciliato-dentatis. *Willd. arb. p. 34* *

B. pedunculis racemoſis. *Mat. med. 97. Gron. orient. 120. Mill t. 63 Blackw. t. 163. Pollich. pal. n. 354. Du Roi harbk. 1. p. 75. Scop. carn. n. 437. Hoffm. germ. 127. Knorr. del. 2. t. B. Roth. germ I. 144. II. 377.*

*α. rubra* aculeis triplicibus, baccis rubris.

B. floribus racemoſis, foliis ciliaris. *Hall. helv. n. 828.*

B. ſpinis tripliçibus. *Hort. cliff. 122. Fl. ſuec. 290, 311. Roy. lugdb. 428.*

B. dumetorum. *Bauh. pin. 454.*

B. vulgaris ſ. Creſpinus. *Cam. epit. 86.*

Oxyacantha Galeni. *Tabern.* p. 1035. R.
β. *violacea* aculeis multiplicibus, baccis violaceis.
γ. *aſperma* aculeis multiplicibus, baccis aſpermis.
δ. *canadenſis* aculeis triplicibus, ferraturis foliorum remotis.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 385.
Gemeine Berberitze. W.
*Habitat in* Europae *ſylvis, inque* Oriente, Libano, *atque in* America *boreali.* ♄ (v. v.)

Folia *prima obovata, ſerrato-ciliata, inarticulata: ſtipulae utrinque dente capillari terminatae*: Caulina *alterna: horum infimum ſubpinnatifidum dentibus ſpinoſis*: *reliqua mutata in ſpinas tripartitas.* Folia ſecundaria *bina, oblonga, ſerrata, inter folia infima et ſpinas intra ſe occultant minora folia. Ergo Foliis, anni praeſentis, mutatis in ſpinas; inſequentis anticipantia prodibunt. An ſimile in ulla alia?*

Varietas *absque arillis; altera ſpinis ſimplicibus in Syria. Rauwolf. Fl.* 23. *alia albo flore. Mill.*

2. BERBERIS *ilicifolia.*

B. racemis ſimplicibus corymboſis, foliis obovatis coriaceis ſpinoſo-dentatis. W.
B. foliis obovatis ſpinoſo-ſerratis, pedicellis elongatis cymoſis, ſpinis digitato-ſpinoſis. *Lin. ſuppl.* 210.
B. pedunculis elongatis cymoſis, ſpinis palmatis. *Forſt. Comment. goett.* 9. *p.* 28. *
Hülſenblättrige Berberitze. W.
*Habitat in* Tierra del Fuego *in rupium fiſſuris.* ♄ (v. ſ.)

Folia *ut in Ilice rigida obovata breviſſime petiolata, baſi integerrima, verſus mediüm ſerraturis utrinque duabus ſ. tribus ſpinis terminatis uti apex folii, glaberrima ſubtus glauciora.* Stipulae *palmatae.* Racemi *terminales breviſſimi, at pedicelli valde elongati.* Lignum *incolis in Tierra del Fuego ob magnam elaſticitatem ad arcus in uſu eſt.*

*3. BERBERIS *microphylla.*

B. pedunculis trifloris, foliis obovatis integerrimis ſub. mucronatis. W.
B. pedunculis trifloris, ſpinis trifurcis. *Forſt. Comm. goett.* 9. *p.* 29. *
Kleinblättrige Berberitze. W.
*Habitat in* Tierra del Fuego. ♄

4. BERBERIS *cretica.*

B. pedunculis subbifloris, foliis lanceolato-obovatis integerrimis submucronatis. W.
B. pedunculis unifloris. *Mill. dict. n.* 3.
B. cretica, buxifolio. *Tournef. cor.* 42.
B. alpina cretica. *Bauh. pin.* 454.
Lycium creticum. *Alp. exot.* 21. *t.* 20.
Lycium e Candia. *Pon. ital.* 137.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 387.
Cretische Berberitze. W.
*Habitat in* Creta. ♄

Folia *integerrima.* Racemi *subumbellati.* Sem. 3.

*Illust. Thunberg sub hoc nomine in Flora japonica pag.* 146. *plantam forte diversam descripsit.* W.

5. BERBERIS *sibirica.*

B. pedunculis unifloris solitariis, foliis obovatis ciliato-dentatis. *Willd. arb.* 35. *

B. pedunculis axillaribus nudis unifloris, foliis ovatis ciliato-spinosis, spinis subquinis. *Pall. ross.* 2. *p.* 41. *t.* 67. *

B. pedunculis unifloris solitariis cernuis, spinis palmatis. *Murr. comm. goett.* 1784. *t.* 6. *

Berberis sibirica. *Pall. itin.* 2. *app. n.* 108. *tab. P. fig.* 2.
Sibirische Berberitze. W.
*Habitat in alpibus* Altaicis Sibiriae. ♄ (v. v.)

*Tres species, novas adhuc depinxit Clariss. Lamarck. t.* 253, *quas ob descriptionis defectum non indicavi.* W.

## *678. PSATHURA.

*Juss. gen. ed. Usteri p.* 229.

*Cal.* superus 6-dentatus. *Cor.* campanulata 6-fida intus barbata. *Stigma* lamellatum. *Drupa* sicca striata 6-locularis, loculis monospermis.

*1. PSATHURA *borbonica.*

Psathura. *Lamarck. ill. gen. t.* 260.
Burbonsches Bruchholz. W.
*Habitat in insula* Borbonia. ♄

Arbuscula *Erithali affinis, ramis nodosis fragili-*

*bus.* Folia *oppoſita petiolata oblonga utrinque attenuata integerrima.* Panicula *terminalis.* W.

## *679. NANDINA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 596.

*Cal.* inferus polyphyllus imbricatus. *Cor.* 6-petala. *Bacca* exſucca diſperma.

### *1. NANDINA *domeſtica.*

N. domeſtica. *Thunb. jap.* 147. * *Thunb. Diſſ. Nov. plant. gen.* 1. *p.* 14. * *Banks ic. Kaempf. t.* 13. 14.
Nandsjokf. *Kaempf. amoen.* 776.
Garten Nandine. W.
*Habitat in* Japonia. ♄

Frutex *orgyalis.* Folia *ſupradecompoſita, foliolis lanceolatis integerrimis.* Panicula *terminalis.* W.

## *680. LINDERA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 597.

*Cal.* 0. *Cor.* 6-petala infera. *Stigmata* 2. *Capſ.* 2-locularis.

### *1. LINDERA *umbellata.*

L. umbellata. *Thunb jap.* 145. *t.* 21.*
Kuro Nosji. *Kaempf. amoen.* 908.
Doldenblütige Lindere. W.
*Habitat in* Japonia. ♄

Frutex *ramis alternis.* Folia *in ramorum apice conferta lanceolata integerrima venoſa petiolata.* Flores *in umbella ſimplici pedunculata terminali collecti, parvi.* W.

## *681. ENARGEA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 598.

*Cal.* 0. *Cor.* 6-petala petalis alternis baſi biglanduloſis. *Stigma* ſimplex. *Bacca* 3-locul. polyſperma ſupera.

### *1. ENARGEA *marginata.*

E. marginata. *Gaert. ſem.* 1. *p.* 283. *t.* 59. *f.* 3.

Callixene. *Iuſſ. gen. ed. Uſt p. 47. Lamarck ill. gen. t. 248.*
Gerandete Glanzmyrte. ♄
*Habitat in freto* Magellanico. ♄

Frutex *parvus, ramis alternis erectis flexuoſis, baſi aphyllis ſtipulatis.* Folia *alterna ſeſſilia elliptica acuta integerrima.* Flos *magnitudine Hyperici perforati terminalis ſolitarius pedunculatus.* W.

## *682. PHILESIA.

*Iuſſieu gen. ed. Uſt. p. 47.*

*Cal.* o. *Cor.* 6-petala, petalis tribus interioribus duplo longioribus. *Stigma* trilobum. *Bacca* ſupera polyſperma.

### *1. PHILESIA *buxifolia.*

Philesia. *Lamarck ill. gen. t. 248.*
Buchsbaumblättriger Lilienſtrauch. W.
*Habitat in freto* Magellanico. ♄

Frutex *parvus ramis flexuoſis alternis erectis, baſi nudis ſtipulatis.* Folia *alterna petiolata lineari-elliptica utrinque acuta ſemimcialia integerrima.* Corolla *campanulata magna ſesquiuncialis breviſſime pedunculata axillaris.* W.

## 683. CAPURA.

*Gen. pl. edit. Schreb. n. 599.*

*Germen* ſuperum. *Cal.* o. *Cor.* 6-fida. *Stam.* intra tubum. *Stigma* globoſum. *Bacca.*

### 1. CAPURA *purpurata.*

C. purpurata. *Mant. 225.*
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. p. 422.*
Purpurfarbige Capura. W.
*Habitat in* India. ♄

Arbor *ramis brachiatis, purpuraſcentibus.* Folia *oppoſita, ſubpetiolata, ovata (Loniceræ Xyloſtei,) integerrima, acutiuſcula, annua.* Florum *faſciculi axillares foliorum, foliis breviores, purpurei.*

## 684. LORANTHUS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 600.

*Germen* inferum. *Cal.* o. *Cor.* 6-fida, revoluta. *Stam.* ad apices petalorum. *Bacca* 1-sperma.

### 1. LORANTHUS *Scurrula.*

L. pedunculis unifloris congestis, foliis obovatis. *Sp. pl. ed.* 2. *p.* 472.

Scurrula. *Sp. pl. ed.* 1. *p.* 110.

Viscum vitice innascens. *Camell. luz.* 3. *n.* 36. *Pet. gaz. t.* 65 *f.* 8.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 388.

Chinesische Riemenblume. W.

*Habitat in* China, ♄

Frutex *parasiticus.* Folia *opposita, petiolata, ovata, integerrima, glabra, altero latere paulo latiora.* Flores *axillares*, 3-6, *propriis pedicellis. Germina inferne attenuata.*

### 2. LORANTHUS *tetrapetalus.*

L. floribus ad articulos quatuor verticillatis tetrapetalis, foliis oblongis oppositis subsessilibus. *Lin. suppl.* 211.

L. pedunculis unifloris subsolitariis, foliis ovatis obtusis subsessilibus *Forst. prod. n.* 156.

Vierblattrige Riemenblume. W.

*Habitat in* Nova Zeelandia. ♄ (v. s.)

Folia *opposita subpetiolata oblonga integerrima.* Flos *utrinque ad latus foliorum unus, eoque ad singulum articulum quatuor, sic per totum caulem.*

Folia *elliptica obtusa coriacea semiuncialia.* Flores *foliis longiores.* W.

### *3. LORANTHUS *glaucus.* †

L. pedunculis axillaribus unifloris, foliis ovatis glaucis. *Thunb prod.* 58.

Meergrüne Riemenblume. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄

### *4. LORANTHUS *biflorus.*

L. foliis ovato-subrotundis, pedunculis axillaribus bifloris, corolla tubulosa arcuata. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 574.

Zweyblütige Riemenblume. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄

*5. LORANTHUS *parvifolius.*

L. pedunculis axillaribus trifidis, pedicellis unifloris, foliis ovatis integris. *Swartz. prod.* 58. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 628. *

Kleinblättrige Riemenblume. W.

*Habitat in altissimis montibus* Jamaicae *supra ramos arborum.* ♄

*Distinguitur a L. pauciflora:* foliis *semper parvis,* pedunculis *trifidis nec racemosis.* Swartz l. c.

6. LORANTHUS *falcatus.*

L. racemis pauciflоris axillaribus, foliis linearibus obtusis lateraliter falcatis glaucis. *Lin. suppl.* 211.

Sichelblättrige Riemenblume. W.

*Habitat in* Madras *arboribus parasitica.* ♄

Folia *margine deorsum vergente falcata integerrima avenia cana.* Racemi *axillares pauciflori.* Flores *falcati fulvi.*

7. LORANTHUS *uniflorus.*

L. racemis simpliciſſimis longitudine foliorum, pedunculis unifloris elongatis, foliis obovato-obtusis mucronatis. W.

L. racemis simpliciſſimis. *Sp. pl.* 1672. *Iacq. amer.* 98. *t.* 69.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 389.

Einfachtraubige Riemenblume. W.

*Habitat in* Domingo *sylvaticis.* ♄

8. LORANTHUS *europaeus.*

L. racemis simplicibus terminalibus, floribus dioicis. *Sp. pl.* 1672. *Iacq. vind.* 230. *aust. t.* 30. *Hoffm. germ.* 127. *Host synop.* 201.

*Houttuyn. Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 390.

Europäiſche Riemenblume. W.

*Habitat in* Austriae *quercubus, parasiticus.* ♄ In Sibiria. Pall. it. 1. p. 372. (v. f.)

Statura *Visci albi.* Calyx *obsolete sexdentatus.* Petala *et* stamina 6. Germen *inferum.* Flores *dioici.* Baca 1-*sperma, flavescens.*

*9. LORANTHUS *longibracteatus.*

L. pentandrus, foliis lanceolatis enerviis subsessilibus, spicis terminalibus, bracteis floriferis. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 573. *

Langbeblätterte Riemenblume. W.

*Habitat in* Peru. ♄

Spica *terminalis; bracteis lineari-lanceolatis tecta.* Bracteae *supra basin habeat foveam, cui flos est insertus.* Lam. l. c.

*10. LORANTHUS *Buddlejoides.*

L. foliis ovatis, floribus congestis axillaribus quadrifidis, calyce truncato, fructibus turbinatis. *Lamarck. encyclop. 3. p. 574.**

Buddlejaartige Riemenblume. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄

Rami *teretes grisei, juniores pubescentes.* Folia *elliptica integerrima nervosa petiolata superne glabra, inferne pubescentia.* Flores *axillares pedunculati, pedunculis indivisis, et ramosis fasciculatis.* Bractea *ovalis ad basin germinis.* Calyx *truncatus.* Corolla *quadrifida laciniis erectis, tubo arcuato.* Stamina 4. Stigma *capitatum.* Inflorescentia *simillima Buddlejae diversifoliae, ut primo intuitu nova hujus generis videatur species, sed distinguitur facillimo negotio a Buddleja* germine *infero,* corollae *tubo incurvo, et laciniis profunde divisis inaequalibus.* Lamarck l. c.

*11. LORANTHUS *nodosus.*

L. foliis ovato-rotundatis, pedunculis axillaribus fasciculatis, corollae tubo longissimo, articulis nodosis. *Lamarck encycl. 3. p. 575.**

Knotige Riemenblume. W.

*Habitat in* Peru. ♄

Rami *teretes grisei nodosi dichotomi.* Folia *magna utrinque viridia petiolata septemnervia, nervis oblique ad marginem excurrentibus.* Pedunculi *in dichotomia caulis uni-s. biflori fasciculati.* Lamarck l. c.

*12. LORANTHUS *clavatus.*

L. foliis ovatis obtusis, floribus congestis lateralibus subsessilibus longe tubulosis. *Lamarck encycl. 3. p. 572.**

Keulförmige Riemenblume. W.

*Habitat in insula* Madagascar. ♄

Rami *teretes dichotomi cinerei.* Folia *avenia inferne ferruginea interdum violacea petiolata.* Flores *axillares: vel in ramis nudis circum articulos.* Pedunculi *uniflori brevissimi aggregati.* Calyx *quinquedentatus.* Corolla *sesquiuncialis, tubo arcuato, limbo trifido, laciniis binis latioribus interdum bifidis.* Stamina *quinque.* Stigma *capitatum.* Fructus *parvus ovatus.* Lamarck l. c.

*13. LORANTHUS *longiflorus.*

L. corymbis axillaribus, floribus pentandris nutantibus, foliis ovato-lanceolatis obtufis venofis. W.

L. pentander, corollae tubo praelongo fuperne incraffato, laciniis brevibus apice reflexis. *Lamarck encycl.* 3. *p.* 572. *

Valli-itti-canni. *Rheed. mal.* 10. *p.* 5. *t.* 4.

Langblütige Riemenblume. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄

*Diftinctus a plerisque foliis venofis.* W.

*14. LORANTHUS *elafticus.*

L. corymbis axillaribus, floribus pentandris nutantibus, foliis oblongis utrinque attenuatis nervofis. W.

L. pentander, foliis fellilibus ovato-acutis nervofis, corollis junioribus medio feneftratis. *Lamarck encycl.* 3. *p.* 573. *

Velutta-itti-canni. *Rheed. mal.* 10. *p.* 7. *t.* 3.

Elaftifche Riemenblume. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄ (v. f.)

15. LORANTHUS *americanus.*

L. racemis fubramofis cymofis, floribus nutantibus, foliis ovatis diffornnibus. *Swartz. obf.* 132. *

L. racemis fubramofis aequalibus, foliis ovatis. *Amoen. acad.* 5. *p.* 396. *

L. cymis ramofis. *Iacq. amer.* 97. *t.* 67.

L. racemis, flore coccineo, baccis nigris. *Plum. gen.* 17. *ic.* 166. *f.* 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syft.* 3. *p.* 390.

Doldentraubige Riemenblume. W.

*Habitat in* Americae *arboribus maritimis.* ♄

Folia *oppofita*, *avenia*, *coriacea.*

*16. LORANTHUS *emarginatus.*

L. fpicis axillaribus, foliis cuneato-ovatis emarginatis. *Swartz prod* 58. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 625. *

Ausgerandete Riemenblume. W.

*Habitat in arboribus montium* Hifpaniolae. ♄

17. LORANTHUS *occidentalis.*

L. racemis fimplicibus, floribus irregularibus. *Loefl. it.* 187. * *Amoen. acad.* 5. *p.* 396. *n.* 38. * *Swartz obf.* 133. *

Scurrula parafitica, foliis majoribus fubrotundis, fpicis florum fimplicibus alaribus. *Brown. jam.* 197.

Vifcum latioribus et fubrotundis foliis, flore purpureo. *Sloan. jam.* 168. *hift.* 2. *p.* 92. *t.* 200. *f.* 2. *Raj. dendr.* 52?

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 392.
Weſtindiſche Riemenblume. W.
*Habitat in* Americae *arboribus.* ♄

18. LORANTHUS *Loniceroides.*
L. floribus aggregato-capitatis. *Sp. pl.* 473.
Lonicera pedunculis multifloris, involucris pentaphyllis foliis ovato-lanceolatis petiolatis. *Fl. zeyl.* 83. * *Sp pl.* 1. *p.* 1.
Periclymenum ſurrectum, perſicae foliis, maderaſpatanum. *Pluk. alm.* 287. *t.* 212. *f.* 5.
Itti Canni. *Rheed. mal.* 7. *p.* 55. *t.* 29.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 392.
Lonicerenartige Riemenblume. W.
*Habitat in* Aſiae *arboribus.* ♄
Flores *huic ſaepius pentandri.*

*19. LORANTHUS *pedunculatus.*
L. racemis ſimplicibus ſolitariis, floribus ternis pedunculatis. *Iacq. amer.* 98. *
Geſtielte Riemenblume. W.
*Habitat in* Carthagenae *arboribus maritimis inundatis.* ♄
Rami *nitidi longi reclinati ſaepius radicantes.* Folia *cordato-ovata integerrima acumine brevi inſtructa bipollicaria venoſa.* Racemi *axillares foliis breviores ſolitarii ſimplices flores circiter 12 ſuſtinent, pedunculo principali compreſſo plano latoque, partialibus trifloris, propriis unifloris.* Flores *inodori parvi, calyce ovato concavo integro.* Filamenta *duplo petalis brevia, quorum* 3 *alterna augentur ſuperne duobus appendiculis ſubrotundis.* Iacq. l. c.

*20. LORANTHUS *ſeſſilis.*
L. racemis ſimplicibus ſolitariis, floribus ternis ſeſſilibus. *Iacq. amer.* 99. *
Sitzende Riemenblume. W.
*Habitat in ſylvis* Carthagenae. ♄.
Habitus *omnino praecedentis, at rami diffuſi fragiles.* Folia *ovata ſesquipollicaria.* Flores *absque pedunculis propriis inſident pedunculi partialis incraſſato apici.* Iacq. l. c.

*21. LORANTHUS *marginatus.*
L. foliis ovatis ſubacuminatis margine ſcarioſis, racemis ſolitariis axillaribus, pedicellis trifloris. *Lamarck encyclop.* 3. *p.* 571.
Gerandete Riemenblume. W.

*Habitat in* Brasilia. ♄.

Folia *ovata integerrima breviſſime acuminata petiolata margine fuſca ſcarioſa diaphana.* Lamarck. l. c.

22. LORANTHUS *Stelis.*

L. racemis trichotomis, pedunculis trigonis, floribus aequalibus. *Loeſl. it.* 87.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 395.
Cumaniſche Riemenblume. W.
*Habitat in* Cumanae *arboribus.* ♄

*23. LORANTHUS *pauciflorus.*

L. racemis tripartitis foliis brevioribus, foliis obovatis. *Swartz. prod.* 58. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 627. *
Loranthus occidentalis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 310.
Sparſamblütige Riemenblume. W.
*Habitat in arboribus* Jamaicae *interioris.* ♄

*24. LORANTHUS *braſilienſis.*

L. hexapetalus, foliis lanceolato-ovatis, corollis ante floreſcentiam longe tubuloſis rectis clavatis. *Lamarck encycl.* 3. *p.* 570. *
Braſiliſche Riemenblume. W.
*Habitat in* Braſilia. ♄

Frutex *Ramis ad folia dilatatis.* Folia *alterna, petiolata, ſubenervia, figura Lauri.* Racemi *axillares, ſolitarii ſ. bini, petiolis paulo longiores.* Corollae *ſemiquinqueſidae.* Filamenta *quinque, e medio laciniarum corollae, antheris breviora.* Antherae *erectae, longitudine corollae.*

26. LORANTHUS *ſpicatus.*

L. ſpicis quadrangularibus. *Mant.* 63. *Iacq. amer.* 97. *t.* 68.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 394.
Aehrentragende Riemenblume. W.
*Habitat* Carthagenae, *paraſiticus.* ♄

Folia *oppoſita, obtuſa, nerveſa.*

## *685. SCHRADERA.

*Vahl eclog.* 1. *p.* 35.

*Involucr. universale* multiflorum. *Cal.* superus urceolatus. *Cor.* 5-6 fida campanulata, fauce hirsuta. *Bacca* polysperma.

### *1. SCHRADERA *capitata.*

S. involucro dentato, calyce integerrimo, foliis obtusis. W.

Schradera capitata. *Vahl eclog.* 1. *p.* 35. *t.* 5. * *exclusо synonymo.*

Urceolaria. *Coth. disp. veg. p.* 10. *n.* 74.

Kopfblütige Schradere. W.

*Habitat in insula* Montserrat. ♄ (v. s.)

Frutex *scandens parasiticus, ramis tetragonis cortice cinereo tectis.* Folia *opposita subrotundo-elliptica integerrima coriacea obtusiuscula petiolata.* Pedunculus *sesquiuncialis terminalis.* Flores *capitati.* Involucrum *coriaceum monophyllum quinquefidum circiter* 15-*florum, laciniis subrotundis obtusis.* Calyx *campanulatus coriaceus persistens, margine truncato integerrimo.* Numerus *laciniarum corollae et staminum variat a* 5-6. W.

### *2. SCHRADERA *cephalotes.* W.

S. involucro integerrimo, calyce dentato, foliis acuminatis. W.

Fuchsia (*involucrata*) floribus involucratis. *Swartz prod.* 62. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 674. *

Knopfblütige Schradere. W.

*Habitat in sylvis et montibus* Jamaicae *interioris.* ♄.

Involucrum *flores aggregatos* 4-8 *continens monophyllum truncatum tetragonum glabrum crassum.* Perianthium *monophyllum ovato-campanulatum erectum involucro paulo longius indivisum subtruncatum, denticulis minutissimis octo.* Swartz. l. c.

*Annuente Clariss. Swartz in litteris, hanc a praecedente distinxi. Descriptio auctoris citati diversam esse plantam abunde demonstrat. Vidi tantum hujus folia, quae tenuiora et multo acutiora. Ceterum in hac numerus octonarius frequentissimus est, rarius denarius vel* 5-7-9 *rius.* W.

## *686. STEPHANIA. W.

*Capparis Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 58.

*Cal.* campanulatus bilobus. *Cor.* 4-petala. *Stam.* bina inferiora longiora. *Germen* pedicellatum. *Stylus* 0. *Stigma* capitatum. *Capsula?*

### *1. STEPHANIA *Cleomoides.* W.

Capparis (*paradoxa*) foliis lanceolatis acuminatis perennantibus, calycibus bipartitis. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 58. *t.* III.*

Cleomeartige Stephanie. W.

*Habitat ad* Caraccas Americes. ♄

Frutex 6-*pedalis ramis teretibus glabris.* Folia *alterna lanceolata acuminata integerrima undulata venosa nitida, juniora stellato-pubescentia.* Petioli *longissimi, longitudine fere foliorum pubescentes.* Flores *axillares solitarii cernui in ramorum apice formant racemum foliosum comosum.* Pedunculi *longitudine calycis.* Calyx *aurantius bilobus campanulatus ventricosus.* Corolla *flava calyce paulo longior, petalis rectis.* Stamina *recta calyce quadruplo longiora.* Antherae *incumbentes.* Pedicellus *germinis longitudine filamentorum breviorum.* W.

*Facies floris est ut in Cleome, cum Capparidibus nil commune habet, praeter germen pediceliatum. Iure proprium format genus, quod in honorem Clariss. F. Stephan Professoris Mosquensis dixi.* W.

## 687. HILLIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 601.

*Cal.* duplex, inferus, 6-phyllus, superus 2-4 phyllus. *Cor.* longissima contorta. *Caps.* infera, 2-locularis, polysperma. *Sem.* comosa.

### 1. HILLIA *longiflora.*

H. corollis sexfidis, laciniis lanceolatis revolutis, foliis ovatis acutis. *Swartz. prod.* 58. *Swarz. obs.* 135. *t.* 5. *f.* 1.*

Hillia parasitica. *Sp. pl.* 1662. *Iacq. amer.* 96. *t.* 66.

Fereiria. *Vandelli in Roemer pl. hiſp.* 1. *p.* 98. *t.* 6. *f.* 8. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3., *p.* 395.
Langblütige Hillie. W.
*Habitat in fruticetis humidis montium* Jamaicae, *atque in* Braſilia. ♄
Frutex *repens.* Folia *oppoſita, ovalia.* Flores *ſemipedales.*
*Non eſt paraſitica, licet radicibus inter ligna muſcoſa et vetuſta repentibus obſervetur.* Swartz obſ. l. c.

*2. HILLIA *tetrandra.*
H. corollis quadrifidis, laciniis ovatis, foliis obovatis. *Swartz prod.* 58. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 630. *
Vierfädige Hillie. W.
*Habitat in montibus altis* Jamaicae *inter radices fruticum.* ♄

## *688. ISERTIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 602.

*Cal.* ſuperus 6-dentatus. *Cor.* infundibuliformis 6-fida. *Stigma* 6-fidum. *Pomum* 6-loculare polyſpermum.

*1. ISERTIA *coccinea.*
I. foliis lanceolato-ellipticis ſubtus villoſo-incanis acuminatis utrinque acutis, pedunculis racemoſis bifidis. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 27. *
Guettarda (*coccinea*) folio ampliſſimo ovato acuto, florum racemis erectis terminalibus, fructu coccineo. *Aubl. guj.* 1. *p.* 317. *t.* 123. *
Scharlachfarbene Iſertie. W.
*Habitat in ſylvis* Cajennae, Gujanae. ♄
Arbor *tunco decem vel-duodecim-pedali, ramis tetragonis.* Folia *oppoſita oblonga utrinque attenuata integerrima venoſa petiolata.* Panicula *terminalis.* Corolla *coccinea limbo flavo.* W.

*2. ISERTIA *parviflora.*
I. foliis oblongis, inferioribus baſi ſubcordatis, thyrſo ovato. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 28. *t.* 15. *
Kleinblütige Iſertie. W.
*Habitat in inſula* Trinitatis. ♄
Folia *plerumque glabra interdum ſubtus ſubvilloſa.* Vahl. l. c.

## 689. CANARINA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 603.

*Cal.* 6-phyllus. *Cor.* 6-fida, campanulata. *Stigmata* 6. *Capſ.* infera; 6-locularis, polyſperma.

1. CANARINA *Campanula.*

C. Campanula *Mant.* 225.

Campanula (*canarienſis*) capſulis quinquelocularibus, foliis oppoſitis haſtatis dentatis petiolatis. *Spec. pl.* 2. *p.* 938. *Mill. dict. n.* 14.

Campanula foliis haſtatis dentatis, caule determinate folioſo. *Hort. cliff.* 65. *t.* 8. *Roy. lugdb.* 247.

Campanula canarienſis regia ſ. Medium radice tuberoſa, foliis ſinuatis caeſiis atriplicis aemulis ternis circum caulem ambientibus, flore amplo pendulo: colore flammeo rutilante. *Pluk. alm.* 76. *t.* 276. *f.* 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 5. *p.* 593.

Glockenblütige Canarine. W.

*Habitat in Inſulis* Canariis. 4 (v. v.)

Campanulis *maxime affinis. Ob* Herbae *ſtaturam et fructificationis numerum plurium votis ſatisfacturus diſtinguo.*

Radix *tuberoſo-fuſiformis.* Caulis *tripedalis, erectus, ſolitarius, teres, laevis, articulatus.* Rami *terni e ſingulis caulis geniculis: ſuperioribus longioribus apice dichotomis.* Ramuli *alterni.* Folia (*caulina terna, ramea oppoſita,*) *petiolata, haſtata, denticulata, laevia, venoſa.* Flores *e dichotomia ramorum ſuperiorum, pedunculati, cernui.* Corolla *rufa, intus lactior fundo flaveſcente: laciniis nervis tribus purpureis.* Antherae *flavae.*

*An Canarina zanguebarenſis Loureiro. Fl. cochin. p.* 240. *hujus generis?* W.

## 690. FRANKENIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 604.

*Cal.* 5-fidus, infundibulif. *Petala* 5. *Stigma* 6-partitum. *Capſula* 1-locularis, 3-valvis.

1. FRANKENIA *laevis.*

F. floribus ſolitariis, petalis ſubrepandis obtuſis, foliis linearibus baſi ciliatis. W.

F. foliis linearibus confertis basi ciliatis. *Roy. lugdb.* 452.
F. foliis aciformibus congestis. *Sauv. monsp.* 46.
Franca floribus solitariis sessilibus, foliis prismaticis triangularibus. *Guett. stamp.* 2. *p.* 459.
Franca maritima supina saxatilis glauca ericoides sempervirens, flore purpureo. *Mich. gen.* 23. *t.* 22. *f.* 1.
Lychnis supina maritima, ericae facie. *Raj. angl.* 3. *p.* 38.
Anthyllis repens italica, thymi foliis, rubente flore, polygoni facie. *Till pis.* 46.
Kali f. Vermiculari marinae non dissimilis planta. *Bauh. hist.* 3. *p.* 703.
Polygonum fruticosum supinum ericoides cinerenm, thymi folio hispanicum. *Barr. ic.* 714. *Bocc. mus.* 1. *p.* 7. *t.* 11.
Polygonum maritimum minus, foliis serpylli. *Bauh. pin.* 281.
*Houttuyn. Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 360.
Glatte Frankenie. W.
*Habitat in* Europae *australis maritimis, circa* Astracan.
*Lepech. it.* 1. *p.* 255. 24 (v. f.)

*2. FRANKENIA *Nothria.*
F. floribus fasciculatis, petalis acutis, foliis linearibus basi ciliatis. W.
F. caule decumbente glabro, vaginis foliorum ciliatis. *Thunb. prod.* 58.
Nothria repens. *Berg. cap.* 171. *t.* 1. *f.* 2. *
Capische Frankenie. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄

3. FRANKENIA *hirsuta.*
F. floribus fasciculatis, petalis subrepandis obtusis, foliis linearibus oblongis, caule hirsuto. W.
F. caulibus hirsutis, floribus fasciculatis terminalibus. *Gouan. illustr.* 26.
Franca maritima supina multiflora candida, caulibus hirsutis, foliis quasi vermiculatis. *Mich. gen.* 23. *t.* 22. *f.* 2.
Polygonum creticum, thymi folio. *Bauh. pin* 281. *prodr.* 131.
Alsine cretica maritima supina, caule hirsuto, foliis quasi vermiculatis. *Tournef. cor.* 45.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 361.
Haarige Frankenie. W.

*Habitat in* Apulia, Creta, *in* Sibiria. *Pallas. it. 2. p.* 465 24 (v. f.)
Flores *violacei.*

4. FRANKENIA *pulverulenta.*
F. floribus solitariis, petalis subrepandis, foliis subrotundo-obovatis subtus pulverulentis. W.
F. foliis obovatis retusis subtus pulveratis. *Sp. pl.* 474.
F. foliis ovalibus. *Sauv. monsp.* 168.
Franca maritima quadrifolia supina, chamaesyces foliorum facie. *Mich. gen.* 23.
Anthyllis valentiana. *Clus. hisp.* 2. *p.* 186.
Anthyllis marina, chamaesyces similis. *Bauh. pin.* 282.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 361.
Bestäubte Frankenie. W.
*Habitat in* Sussexiae, Narbonae, Italiae, Apuliae *litoribus.* ⊙ (v. v.)
*In ordine Naturali ad XL. referatur.*

## 691. PEPLIS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 605.

*Perianth.* campanulatum: ore 12-fido. *Petala* 6, calyci inserta. *Capsula* 2-locularis.

1. PEPLIS *Portula.*
P. floribus hexandris axillaribus solitariis, foliis petiolatis subrotundo-ovatis. W.
P. floribus apetalis. *Fl. lapp.* 128. *Fl. suec.* 291, 312. *Oed. dan. t.* 64. *Hoffm. germ.* 127. *Roth. germ. I.* 157. *II.* 415.
P. petalis senis plerumque apetala. *Hall. helv. n.* 856. *Pollich. pal. n.* 355.
Glaucoides palustre, portulacae folio, flore purpureo. *Mich. gen.* 21. *t.* 18.
Glaux palustris, flore striato clauso, foliis portulacae. T. *Petit. gen.* 43. *t.* 43.
Glaux aquatica, folio subrotundo. *Loes. prus* 106. *t.* 20.
Glaux altera subrotundo folio. *Vaill. paris.* 80. *t.* 15. *f.* 5. *Bocc. mus. t.* 84.
Anagallis serpillifolia aquatica. *Bauh. hist.* 3. *p.* 372.
Alsine fluviatilis. *Tabern.* 713.
Alsine palustris minor serpillifolia. *Bauh. pin.* 251.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 363.
Gemeine Peplis. W.

*Habitat in* Europae *inundatis.* ⊙ (v. v.)
*Rarius* Petala *habet, et tunc non omnia, ſed tantum* 1, 2, 3. *Scholl. barb. n.* 288.

*2. PEPLIS *indica.* W.

P. floribus tetrandris ſpicatis bracteatis, foliis oblongo-obovatis ſeſſilibus. W.
Indiſche Peplis. W.
*Habitat in* India *orientali.* (v. ſ.)

Caulis *adſcendens ſemipedalis et ultra tetragonus glaber.* Folia *oppoſita oblonga obovata ſubretuſa integerrima venoſa glabra.* Spicae *ſimplices foliis longiores ex omnibus axillis.* Flores *ſeſſiles oppoſiti bractea lanceolata flore duplo longiore ſuffulti.* Calyx *campanulatus octodentatus, dentibus alternis minoribus.* Petala *nulla vidi.* Stamina *quatuor.* Stylus *filiformis.* Stigma *capitatum.* W.

*Peplis tetrandra Linnaei eſt Hedyotis tuberoſa, vide appendicem noſtram.* W.

## 692. GAHNIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 606.

*Cal.* gluma 1-valvis 2-5 flora. *Cor.* gluma 2-valvis. *Stylus* dichotomus. *Sem.* 1.

1. GAHNIA *procera.*

G. paniculis ſpicatis pluribus elongatis, floſculis hexandris. - *Forſt. prod. n.* 158.
Gahnia procera. *Lin. ſuppl.* 211. *Forſt. gen. n.* 26. *Forſt. Act. upſ.* 3. *p.* 178. *
Hohe Gahnie. W.
*Habitat in* Novae Zeelandiae *collibus.*

Gramen *ſemiorgyale et ultra. Schoenis africanis ſimillima et forte jure illius generis.*

*2. GAHNIA *ſchoenoides.*

G. culmis flexuoſis, paniculis compoſitis ſpicatis rigidis ſubſolitariis. *Forſt. prod. n.* 159.
Knopfgrasartige Gahnie. W.
*Habitat in inſula* Taheiti.

## *693. BAMBUSA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 607.

*Squamae* tres ſpiculas ſubquinqueflоras tegentes. *Cal.* o. *Cor.* gluma 2-valvis. *Stylus* 2-fidus. *Semen.* 1.

### 1. BAMBUSA *arundinacea.*

B. panicula ramoſa divaricata. W.
Bambos arundinacea. *Retz. obſ.* 5. *p.* 24. *
Naſtus. *Inſſ gen. ed. Uſteri p.* 59.
Arundo (*Bambos*) calycibus multifloris, ſpicis ternis ſeſſilibus. *Sp. pl.* 120.
Arundo arbor. *Bauh. pin.* 18. *Hort. cliff.* 25. *Fl. zeyl.* 47. *Roy. lugdb.* 67.
Arundarbor vaſaria. *Rumph. amb.* 4. *p.* 8.
Tabaxir ſ. Mombu arbor. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 222.
Illy. *Rheed. mal.* 1. *p.* 25. *t.* 16.
*Houttuyn Lin. Pſi. Syſt.* 1. *p.* 229.
Gemeiner Bambos. W.
*Habitat in* India *utraque.* ♄ (v. v. ſ. ſ.)

Paniculae *ſcapus erectus rigidus, gerens ad alternos dentes ſaepius flores tres, alternatim ſ. diſtiche poſitos ſeſſiles rigidulos lineares longos.*

### *2. BAMBUSA *verticillata.* W.

B. ſpica terminali ſimplici verticillata. W.
Arundo (*multiplex*) floribus hexandris, ſpicis interruptis verticillatis, culmo diviſo, calycibus unifloris. *Loureiro cochin. p.* 73. *
Arundo arbor tenuis Leleba dicta. *Rumph. amb.* 4. *p.* 1. *t.* 1.
Wirtelblütiger Bambos. W.
*Habitat in* India. ♄ (v. ſ.)

Inflorescentia *et* foliis *baſi attenuatis, nec rotundatis, ut in praecedente, diverſiſſima. Diſtinxi tantum binas mihi notas Bambuſae ſpecies, plures alit India, quorum mentionem fecerunt Rumphius et Loureiro, ſed eas hic enumerare non auſim. Binas ſpecies depinxit Clariſſ. Lamarck. tab.* 264. *f.* 1. 2, *ſed ob deſcriptionis defectum et has omiſi.*

## 694. EHRHARTA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 608.

*Cal.* gluma 2-valvis abbreviata uniflora. *Cor.* gluma duplex, utraque bivalvis, exterior compressa acinaciformis.

* *Floribus monogynis.*

1. EHRHARTA *cartilaginea.*

E. culmo indiviso, panicula simplici, corolla exteriori ovata submutica, foliorum margine cartilagineo crispo. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 33.

E. (*Mnemateja*) foliis vaginatis crispis, corolla rugosa obtusa. *Thunb. prod.* 66.

Ehrharta Mnemateja. *Lin. suppl.* 209.

Ehrharta capensis. *Thunb. Act. holm.* 1779. *p.* 216. *t.* 8. *

Ehrharta nutans. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 343.

Wellenblättrige Ehrharte W.

*Habitat ad* Cap. b. spei.

Gramen *omnium pulcherrimum glabrum.* Radix *fibrosa.* Culmus *erectus indivisus articulatus sesquiad bipedalis.* Articuli *circiter quinque.* Folia *vaginantia ensiformia marginata crispa, inferiora palmaria, superiora multo breviora; discus glaber; margo cartilagineo-crenulatus scaber.* Panicula *simplex oblonga 15-20 flora.* Pedunculi *capillares laxi flexuosi terni gemini, aut solitarii, simplices, interdum ramosiusculi apice incrassati.* Flores *cernui.* Gluma *calycina basi colorata, corollina exterior violacea, interior pallescens.* Fasciculi *villorum albissimi splendidi.* Nectarium *et* Filamenta *alba.* Antherae *luteae.*

*2. EHRHARTA *bulbosa.*

E. culmo indiviso, panicula ramosa multiflora, corolla exteriori aristata. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 33.

E. (*aristata*) foliis planis, corolla rugosa aristata. *Thunb. prod.* 66.

Trachera striata. *Richard in Journal de Rosier* 13. *p.* 225. *t.* 3 *

Knollige Ehrharte. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei.

** *Floribus digynis.*

*3. EHRHARTA *longiflora.*

E. culmo simplici, panicula ramosa multiflora, corolla

exteriori mucronata tuberculato-hiſpida, floribus triandris. *Smith ic. ined.* 1. *p.* 32. *t.* 32. *

Langblütige Ehrharte. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

*4. EHRHARTA *panicea.*

E. culmo diviſo, panicula ſubramoſa, floribus erectis digynis. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 9. *t.* 9. *

E. (*erecta*) panicula ramoſa, floribus omnibus erectis, glumis corollinis glaberrimis albicantibus. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 344. *

Fennichartige Ehrharte. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24 (v. v.)

5. EHRHARTA *calycina.*

E. culmo ramoſo, panicula ſubſimplici, calyce colorato corollam aequante. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 33. *t.* 33. *

E. (*digyna*) foliis planis, corollis laevibus obtuſis coſtatis. *Thunb. prod.* 66.

Aira (*capenſis*) culmo ramoſo, floribus racemoſis, corollis piloſis. *Lin. ſuppl.* 108. *

Schmelenartige Ehrharte. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

# *D I G Y N I A.*

## 695. ORYZA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 609.

*Cal.* gluma 2-valvis, 1-flora. *Cor.* 2-valvis, ſubaequalis, ſemini adnaſcens.

1. ORYZA *ſativa.*

Oryza. *Bauh. pin.* 24. *theatr.* 479. *Cam. epit.* 192. *Dod. pempt.* 509. *Catesb. car.* 1. *p.* 14. *t.* 14. *Hort. cliff.* 137. *Mat. med.* 97. *Roy. lugdb.* 58. *Mill. dict. et illuſtr.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 12. *p.* 625.

Gemeiner Reiſs. W.

*Habitat forte in* Aethiopia, *colitur in* Indiae *paludoſis.*

⊙ (v. v.)

*Poſſideo* 18 *varietates hujus graminis, ſeminibus ovatis, ellipticis, oblongis, ſubrotundis, brevibus, ſulcatis, albis, nigris, fuſcis, muticis, ariſtatis etc. quae*

*ſenſim una in alteram tranſeunt, ut limites nulli obſerventur.* W.

## *696. NECTRIS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 610.

*Cal.* 6-partitus, laciniis 3 interioribus minoribus obtuſis. *Cor.* o. *Capſ.* 2, ſubcarnoſae ſtylis coronatae uniloculares polyſpermae.

### *1. NECTRIS *aquatica.*

Cabomba aquatica. *Aubl. guj.* 1. *p.* 321. *t.* 124.
Gelbes Schwimmblatt, W.
*Habitat in ſtagnis et rivulis* Cajennae Gujanae.

Folia *inferiora oppoſita demerſa capillaceo-multifida ut in Ranunculo aquatili.* Folia *ſuperiora natantia peltata integerrima orbiculata alterna.* Pedunculi *axillares longi uniflori ſolitarii.* Flos *flavus.* W.

## 697. FALKIA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 611.

*Cal.* 1-phyllus. *Cor.* 1-petala. *Styl.* 2. *Sem.* 4.

### 1. FALKIA *repens.*

F. repens. *Lin. ſuppl.* 211. *Thunb. Diſſ. Nov. pl. gen. I. p.* 17.
Convolvulus (*Falkia*) foliis cordatis exciſis caule ſarmentoſo. *Thunb. prod.* 35.
Kriechende Falkie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

*Convolvulus Falkia Iacq. hort. Schoenb.* 2. *p.* 38. *t.* 198. *eſt longe alia planta, nam in Falkia repente folia ſunt integerrima baſi exciſa.* W.

## 698. ATRAPHAXIS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 612.

*Cal.* 2-phyllus. *Petala* 2, ſinuata. *Stigmata* capitata. *Sem.* 1.

### 1. ATRAPHAXIS *ſpinoſa.*

A. ramis ſpinoſis. *Hort. cliff.* 138. *Roy. lugdb.* 409. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 28. *Mill. dict. n.* 1. *l'Herit. ſtirp. nov.* 1. *p.* 27. *t.* 14.

Atriplex orientalis, frutex aculeatus, flore pulchro. *Tournef cor.* 83. *Buxb. cent.* 1. *p.* 19. *t.* 30. *Dill. elt.* 47. *t.* 40. *f.* 47.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 396.
Dornige Atraphaxis. W.
*Habitat in* Media *ad urbem* Hansen *locis glareosis juxta fluvios*; *in* Sibiria. ♄ (v. f.)
Cal. 2-*phyllus*. Pet. 2. Stam. 6. Stigma 2. Sem. *compressum*.
*Cum* Polygono fruticante *conjungi deberejudicat* Willich *illustr. n.* 8. R.

2. ATRAPHAXIS *undulata*.

A. inermis. *Mill. dict. n.* 2.
Polygonum undulatum. *Berg. cap.* 135.
Polygonum (*atraphaxoides*, floribus hexandris digynis, foliis ovatis undulatis. *Thunb. prod.* 77.
Atraphaxis inermis, foliis undulatis. *Hort. cliff.* 137. *Roy. lugdb.* 409.
Arbuscula africana repens, folio ad latera crispo, ad polygona relata. *Dill. elth.* 36. *t.* 32. *f.* 36.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 397.
Wellenblättrige Atraphaxis. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. v.)
Cal. 4-*partitus*, *aequalis laciniis ovatis concavis*. Pet. 0. Stam. 6, *lanceolata*. Stylus *bifidus*. Sem. *subrotundum*.

# *TRIGYNIA.*

## 699. RUMEX.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 613.

*Cal.* 3-phyllus. *Petala* 3, conniventia. *Sem.* 1. triquetrum.

* *Hermaphroditi: valvulis granulo notatis.*

1. RUMEX *Patientia*.

R. floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis; unica granifera, foliis ovato-lanceolatis. *Mill. dict. n.* 1. *Blakw. t.* 489. *Hoffm. germ.* 128. *Roth. germ. I.* 160. *II.* 420.
Lapathum hortense, folio oblongo. *Bauh. pin.* 114.

Lapathum latifolium. *Dod. pempt.* 648.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 365.
Gemüse Ampfer. W.
*Habitat in* Italia, *in M.* Meissner *Hassiae*, *Moench. hass. n.* 304. *et alibi in* Germania. 4 (v. v.)
*Confer.* Lapathum hortense latifolium. *Bauh. pin.* 115.
Folia *semivalia sagittata, ut R. Acetosae.* Caulis *sulcatus.*

2. RUMEX *sanguineus.*
R. floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: unica granifera, foliis cordato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 138. *Hort. upsl.* 89. *Mat. Med.* 98. *Roy. lugdb.* 229. *Mill. dict. n.* 6. *Blackw. t.* 492. *Hoffm. germ.* 128. *Roth. germ. I.* 160. *II.* 421.
Lapathum folio acuto rubente. *Bauh. pin.* 115.
Lapathum rubens. *Dod. pempt.* 650. *Cam. epit.* 229.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 367.
Blutadriger Ampfer. W.
*Habitat in* Virginia; *in* Germania *quasi sponte. Leers. herb. n.* 274. 4 (v. v.)
Folia *venis rubris succo sanguineo.* Valvula *exterior floris grano magno globoso rubro notata, varius et altera grano minimo. Migravit Angliae Hemstedium.*

3. RUMEX *spathulatus.* †
R. foliis obovatis obtusis, valvulis graniferis. *Thunb. prod.* 67.
Spathelblättriger Ampfer. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei.

4. RUMEX *verticillatus.*
R. floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: omnibus graniferis, foliis lanceolatis: vaginis cylindricis. *Sp. pl.* 476.
Lapathum aquaticum, foliis longis angustis acutis, floribus ad genicula verticillatim congestis. *Gron. virg.* 39.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 367.
Wirtelblutiger Ampfer. W.
*Habitat in* Virginia. 4.

5. RUMEX *Britannica.*
R. floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis: omnibus graniferis, foliis lanceolatis: vaginis obsoletis. *Sp. pl.* 476.
R. aquatica, calycis foliolis omnibus aeqnalibus, radice exterius nigra vel flava. *Cold. noveb.* 83.

Lapathum foliis longis latis vix acuminatis coſtis caulibusque rubentibus, radice intu crocea. *Gron. virg.* 39. *Houttuyn Lin Pſl. Syſt.* 6. *p.* 368.
Virginiſcher Ampfer. W.
*Habitat in* Virginia. 24

*In praecedenti ſtipula cylindrica membranacea fere ad dimidium vaginans internodium, in hac vero non item, ſed ut in Europaeis. Pedicelli in priori craſſiores, in hac capillares; prior magis ſpicata, haec magis paniculata. Plantam Gron. in Fl. virginica habui a Cl. Authore, quae non rubra erat caule aut coſtis.*

*6. RUMEX *Hydrolapathum.*

R floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis graniferis, foliis lanceolatis glabris acutis integerrimis baſi attenuatis. *Ait Kew* 1. *p.* 483. *Hudſ.* 154.
Rumex Britannica. *Willd. prod. n.* 402. *Hoffm. germ.* 128 *Roth. germ. I.* 160. *II.* 421.
Lapathum foliis longe lanceolatis, paniculis denſiſſimis. *Hall. hiſt. n.* 1588.
Lapathum maximum aquaticum ſ. Hydrolapathum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 986.
Lapathum aquaticum folio cubitali. *Bauh. pin.* 116.
Fluſs Ampfer.
*Habitat in foſſis profundis et ad fluviorum ripas* Germaniae, Helvetiae, Angliae. 24 (v. v.)

7. RUMEX *criſpus.*

R. floribus hermaphroditis: valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis. *Gmel. ſib* 3. *p.* 112. *Mill. dict. n.* 5. *Gunn. norv n.* 35. *Pollich. pal. n.* 356. *Hoffm germ.* 128. *Roth germ. I* 160. *II.* 421.
R. floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis planis, foliis cordato-oblongis. *Hort. cliff.* 138. *Fl. ſuec.* 294. 314. *Roy. lugdb.* 229.
R. foliis cordato-oblongis acuminatis integris. *Fl. lapp.* 129.
Lapathum foliis criſpis, imis ovatis, ſupremis lanceolatis, calycibus verrucoſis. *Hall. helv n.* 1589.
Lapathum longifolium criſpum. *Munting. brit.* 104. *t.* 190. R.
Lapathum folio acuto criſpo. *Bauh. pin.* 115.
Lapathum acutum criſpum. *Tabern. ic.* 436. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 988.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 368.

Krauſer Ampfer. W.
*Habitat in* Europae *humoſis.* 4 (v. v.)

8. RUMEX *Nemolapathum.*
R. floribus hermaphroditis, valvulis linearibus obtuſis integerrimis graniferis, verticillis remotis, ramis patentibus, foliis inferioribus cordato-lanceolatis, ſuperioribus lanceolatis. *Lin. ſuppl.* 212. *Hoffm. germ.* 128.
R. (*conglomeratus*) floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis oblongis graniferis, foliis lanceolatis ſubundulatis. *Roth. germ. I.* 160. *II.* 482. *Murr. prod.* 52. *Leers. herb.* 257.
Rumex criſpus β. *Pollich. pal. n.* 356.
R. (*paludoſus*) floribus hermaphroditis, valvulis integris graniferis, foliis cordato-lanceolatis obtuſiuſculis, verticillis diſtinctis foliolo ſubjectis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 482.
Lapathum petiolis lateſcentibus, foliis longe lanceolatis, floribus verticillatis verrucoſis. *Hall. helv. n.* 1590.
Lapathum acutum minimum. *Lob. ic.* 284. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 985.
Wald Ampfer. W.
*Habitat in nemoribus humidis, inque paludibus* Germaniae, Helvetiae, Angliae. 4 (v. v.)

9. RUMEX *perſicarioides.*
R. floribus hermaphroditis: valvulis dentatis: omnibus graniferis, foliis lanceolatis. *Sp. pl.* 477.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 369.
Wellenblättriger Ampfer. W.
*Habitat in* Virginia. ⊙ (v. v.)
Planta *ſpithamaea, ramoſiſſima.* Folia *lanceolata, petiolata, laevia, undata, integra:* Floris *valvulae dentibus utrinque tribus longis, omnes tectae granis pallidis magnis.*

10. RUMEX *aegyptiacus.*
R. floribus hermaphroditis: valvulis trifido-ſetaceis: unica granifera. *Hort. upſ.* 89. *Mill. dict. n.* 12.
R. floribus hermaphroditis, foliis oblongis, valvulis dentato-ſetaceis longiſſimis. *Wach. ultr.* 391.
Lapathum aegyptiacum annuum, parietariae foliis, capſula ſeminis longius barbata. *Till. piſ.* 43. *t.* 37. *f.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 370.
Aegyptiſcher Ampfer. W.
*Habitat in* Aegypto. ⊙ (v. v.)

11. RUMEX *dentatus.*

R. floribus hermaphroditis: valvulis dentatis, omnibus graniferis, foliis lanceolatis. *Syst. Veg.* 284.

Lapathum aegyptiacum, capsula seminis alba et crenata. *Dill. elth* 191. *t.* 158. *f.* 191.

*Houttuyn Lin. Pfl.* Syst. 6. *p.* 370.

Gezähnter Ampfer. W.

*Habitat in* Aegypto. ⊙

Caulis *erectiusculus, spithamaeus, teretiusculus, basi ramosus.* Folia *lanceolata, petiolata, obliqua.* Flores *conferti, laterales.* Calyx *patens.* Valvulae *floris omnes grano ovato albo. et margine dentibus utrinque duobus lanceolatis, minime valvula longioribus aut setaceis.*

12. RUMEX *maritimus.*

R. floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis linearibus. *Lech. scan.* 26. *It. scan.* 248. *Fl. suec.* 2. *n.* 313. *Mill. dict. n.* 10. *Kniph. cent.* 7. *n.* 78. *Hoffm. germ.* 129. *Roth. germ. I.* 160. *II.* 423.

Lapathum aquaticum, luteolae folio. *Tournef. inst.* 504.

Lapathum minimum. *Bauh. pin.* 115.

Lapathum aquaticum, angustissimo acuminato folio. *Bocc. mus.* 2. *p.* 142. *t.* 104.

Anthoxanthon. *Bauh. pin.* 2. *p.* 987.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 371.

Schmalblättriger Ampfer. W.

*Habitat in* Europae *littoribus maritimis.* ⊙ (v. v.)

Radix rubra . .

13. RUMEX *divaricatus.*

R. floribus hermaphroditis; valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis obtusis pubescentibus. *Sp. pl.* 478.

Lapathum arvense subhirsutum, folio retuso, caule longius brachiato, capsula seminis crenata. *Till. pis.* 93. *t.* 37. *f.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 372.

Ausgebreiteter Ampfer. W.

*Habitat in* Italia. ⊙

*Cum* R. pulchro *conjungit. Haller.*

14. RUMEX *acutus.*

R. floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis foliis cordato-oblongis acuminatis. *Hort. cliff.* 138. *Mat. med.* 98. *Fl. suec.* 293, 316. *Roy. lugdb.* 229.

*Mill. dict. n.* 4. *Scop. carn. n.* 443. *Pollich. pal. n* 387 *Kniph. cent.* 3. *n.* 78. *Hoffm. germ.* 129. *Roth. germ. I.* 161. *II.* 424.

Lapathum petiolo latescente, foliis longe lanceolatis, calyce serrato. *Hall. helv. n.* 1591.

Lapathum folio acuto. *Bauh. pin.* 115. *Blackw. t.* 491. *Munting. brit. t.* 189.

Lapathum acutum I. Oxylapathum. *Bauh. hist.* 2. *p.* 983. *Lob. ic.* 284.

Lapathum acutum. *Raj. hist.* 175.

Oxylapathum. *Fuchs* 491.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 372.

Spitzblättriger Ampfer. W.

*Habitat in* Europae *succulentis.* 24 (v. v.)

Valvularum *dentes utrinque plures, inaequáles longitudine diametri ipsius valvulae.*

15. RUMEX *obtusifolius.*

R. floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis obtusiusculis crenulatis. *Gmel. sib* 3. *p.* 115. *n.* 91. *Mill. dict. n.* 8. *Hoffm. germ.* 129. *Pollich. pal. n.* 358. *Roth germ. I.* 161. *II.* 423.

Lapathum foliis ovatis, circa petiolum emarginatis, floribus dense paniculatis, serratis, verrucosis. *Hall. helv. n.* 1592.

Lapathum sylvestre, folio subrotundo, seminis involucris dentatis. *Morif hist.* 2. *p.* 580.

Lapathum folio minus acuto. *Bauh. pin.* 111. *Lob. ic.* 284.

Lapathum vulgare, folio obtuso. I. B. *Raj. hist.* 175.

Lapathum. *Cam. epit.* 228.

Hippolapathum vulgare album, folio subrotundo. *Munt. brit.* 68. *t.* 187. *Hall.* R.

Hippolapathum sylvestre. *Tabern.* 436. *Hall.* R.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 373.

Stumpfblättriger Ampfer. W.

*Habitat in* Germania, Sudermannia, Helvetia, Gallia, Anglia. 24 (v. v.)

16. RUMEX *pulcher.*

R. floribus hermaphroditis: valvulis dentatis: subunica granifera, foliis radicalibus panduriformibus. *Mill. dict. n.* 9.

Lapathum foliis radicalibus utrinque emarginatis, calycibus reticulatis, ciliatis, verrucosis. *Hall. helv. n.* 1593.

Lapathum arvenſe ſubhirſutum, folio retuſo, caule longius brachiato. *Till. piſ.* 93. *t.* 37. *f.* 2. *Wallich. illuſtr.* 5. *obſerv.* 17.
Rumex floribus hermaphroditis, foliis lyratis. *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 7.
Lapathum ramis procumbentibus, ſeminis involucro dentato, foliis inferioribus inſtar fidium. *Morif. hiſt.* 2. *p.* 580. *ſ.* 5. *t.* 27. *f.* 13.
Lapathum pulchrum bononienſe ſinuatum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 988. *Raj. hiſt.* 174.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 374.
Schöner Ampfer. W.
*Habitat in* Anglia, Gallia, Italia, Helvetia. 24 (v. v.)
Folia *Caulina lateribus non ſinuata, ovato-oblonga, integra.* Rami *floriferi recurvati.* Calycis *valvulae dentatae, apice obtuſae; harum exterior granulum gerit; reliquae vero granulum obſoletum habent.*

* * *Hermaphroditi: valvulis granulo deſtitutis, ſ. nudis.*

17. RUMEX *bucephalophorus.*

R. floribus hermaphroditis: valvulis dentatis nudis, pedicellis planis reflexis, incraſſatis. *Hort. upſ.* 90. *Mill. dict. n.* 14.
R. fructibus dentatis calyce reflexis, caput bovinum referentibus. *Hort. cliff.* 159.
Acetoſa, ocymi folio, neapolitana. *Bauh. pin.* 114.
Acetoſa, ocymi folio, bucephalophoros. *Col. ecphr.* 1. *p.* 151. *t.* 150.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 375.
Ochſenkopffrüchtiger Ampfer. W.
*Habitat in* Italia. ⊙ (v. v.)
*Flores ſemper terni.*

18. RUMEX *aquaticus.*

R. floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis glabris acutis. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 315. *Mat. med.* 98. *Mill. dict. n.* 3. *Pollich. pal. n.* 359. *Blackw. t.* 490. *Hoffm. germ.* 129. *Roth. germ. I.* 151. *II.* 425. *Hall. helv. n.* 1588.
Lapathum foliis longe lanceolatis, paniculis denſiſſimis, *Hall. helv. n.* 1588.
Lapathum aquaticum, folio cubitali. *Bauh. pin.* 116.
Lapathum paluſtre. *Tabern. ic.* 437.
Hippolapathum. *Dalech. hiſt.* 654. *Cam. epit.* 252.

Rumex paluſtris. *Trag.* 317, 318.
Herba britannica. *Munt. brit t.* 1.
*Houttuyn. Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 376.
Waſſer Ampfer. W.
*Habitat in* Europa *ad ripas fluviorum et paludum.* 24 (v. v.)

19. RUMEX *Lunaria.*

R. floribus hermaphroditis: valvulis laevibus, caule arboreo, foliis ſubcordatis. *Vir. cliff.* 32. *Hort. cliff.* 139. *Roy. lugdb.* 320. *Mill. dict. n.* 12.
Acetoſa arboreſcens; ſubrotundo folio. *Pluk. alm.* 8. *t.* 252. *f.* 3.
Lunaria magorum arabum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 994?
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 377.
Baumartiger Ampfer. W.
*Habitat in* Canariis. ♄ (v. v.)

*Flos tripartitus, nec ſexpartitus eſt.* Panicula *oppoſitifolia.*

20. RUMEX *veſicarius.*

R. floribus hermaphroditis geminatis: valvulis omnibus maximis membranaceis reflexis, foliis indiviſis. *Hort. cliff.* 130. *Hort. upſ.* 90. *Roy. lugdb.* 230. *Mill. dict. n.* 15.
Acetoſa americana, foliis longiſſimis pediculis donatis. *Bauh. pin.* 114. *prodr.* 54. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 583. *ſ.* 5. *t.* 28. *f.* 7.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 378.
Blaſenfrüchtiger Ampfer. W.
*Habitat in* Africa. ⊙ (v. v.)

21. RUMEX *roſeus.*

R. floribus hermaphroditis diſtinctis: valvulae alterius ala maxima membranacea reticulata, foliis eroſis. *Roy. lugdb.* 230.
Acetoſa (*roſea*) foliis eroſis, valvulae alterius ala maxima membranacea declinata *Mill. dict. n.* 16.
Acetoſa aegyptia, roſeo ſeminis involucro. *Schau. afr.* 5. *f.* 5.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 379.
Groſsfrüchtiger Ampfer. W.
*Habitat in* Aegypto. ⊙ (v. ſ.)

*Seminum valvulae maximae, unciales, orbiculatae, reticulatae, margine apice denticulatae, et baſi bifidae, quod non in R. tingitano.*

22. RUMEX *tingitanus.*

R. floribus hermaphroditis distinctis, valvulis cordatis obtusis integerrimis, foliis hastato-ovatis. *Sp. pl.* 479.

Acetosa dentata perennis. *Zanon. hist.* 14.

Acetosa vesicaria tingitana perennis repens, foliis longis sinuatis. *Morif. hist.* 2, *p* 583. *f.* 5. *t.* 28. *f.* 8.

Lapathum maritimum foetidum. *Bauh. pin.* 116. *prodr.* 56.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 379.

Stinkender Ampfer. W.

*Habitat in* Barbaria, Hispania. *Alstroemer.* 4.

Caules *ramosi.* Folia *petiolata, ovata, acuminata, subscabra, basi subhastata, juxta basin erosa, margine scaberrima et fere inaequalia.* Racemi *longi, floribus* 5 *f.* 3 *propriis pedicellis ad singulos dentes racemi.* Calycis *valvulae cordatae, integerrimae, nudae.*

23. RUMEX *scutatus.*

R. floribus hermaphroditis, foliis cordato-hastatis, caule tereti. *Virid. cliff.* 52. *Hort. cliff.* 138. *Hort. upf.* 89. *Roy. lugdb.* 250. *Mat. med.* 99. *Pollich. pal. n.* 360. *Kniph. cent.* 8. *n.* 79. *Hoffm. germ.* 129. *Roth. germ. I.* 161. *II.* 426.

Lapathum foliis sagittatis, cis mucronem latissimis, hamis reflexis divergentibus. *Hall. helv. n.* 1594.

Acetosa romana. *Blackw. t.* 306.

Acetosa scutata. *Mill. dict. n.* 3.

Acetosa rotundifolia hortensis. *Bauh. pin.* 114. *Morif. hist.* 2. *p.* 583 *f.* 5. *t.* 8. *f.* 9.

Oxalis rotundifolia. *Dod. pempt.* 649.

*β.* Acetosa scutata repens. *Bauh. pin.* 114. *prodr.* 55.

Acetosa cambobritannica montana. *Scheuch. alp.* 2. *p.* 128.

*γ.* Rumex (*glaucus*) floribus hermaphroditis, valvulis nudis, foliis cordato-hastatis, caule suffruticoso. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 67. *Collect.* 1. *p.* 64. *

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 382.

Grauer Ampfer. W.

*Habitat in* Helvetia, Galloprovincia, *inter acervos lapidum; ad muros* Germaniae. 4 (v. v.)

*24. RUMEX *nervosus.*

R. floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis nudis, foliis oblongis trinerviis. *Kahl. symb.* 1. *p.* 27.

R. (*perficarioides*) floribus hermaphroditis, valvulis in-

tegris nudis, foliis oblongo-lanceolatis. *Forsk descr* 76. *n.* 41.
Nervenblättriger Ampfer. W.
*Habitat in montibus* Hadiensibus. ♄

Caulis *suffruticosus.* Rami *teretes striati, articulis apice fuscis pollicaribus.* Folia *petiolata oblonga, suprema lanceolata, omnia acuta integerrima glaberrima crassa avenia trinervia glauca pollicaria et ultra.* Petiolus *longitudine foliorum.* Stipulae *membranaceae vaginantes truncatae.* Panicula *terminalis.* Pedicelli *capillares sub flore incrassati fructu longiores.* Calyx *reflexus.* Semen *valvulis orbiculatis glabris integerrimis nudis.* Vahl. l. c.

## 25. RUMEX *digynus.*

R. floribus hermaphroditis digynis. *Hort. cliff.* 138. *Fl. suec.* 294, 317. *Roy. lugdb.* 230. *Oed. dan. t.* 14. *Gmel. sib.* 3. *p.* 111. *n.* 89. *Gunn. norv. n.* 36. *Iacq. Collect.* 2. *p.* 30. *
Lapathum foliis antice emarginatis. *Hall. helv. n.* 1595.
Rumex foliis orbiculatis emarginatis. *Fl. lapp.* 132.
Acetosa (*digyna*) humilis repens, folio rotundo emarginato. *Mill. dict. n.* 4.
Acetosa rotundifolia repens eboracensis, folio in medio deliquium patiente. *Morif. hist.* 2. *p.* 583. *f.* 5. *t.* 36. *f. penult.*
Acetosa rotundifolia alpina. *Bauh. pin.* 55. *prodr.* 114.
Acetosa repens vestmorlandia, cochleariae foliis nonnihil sinuatis. *Pluk. alm.* 8. *t.* 252. *f.* 2.
Acetosa britannica rotundifolia, fructu compresso. *Blair. obs.* 67. *t.* 67.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 381.
Zweygriffliger Ampfer. W.
*Habitat in alpibus* Lapponicis, Helveticis, Sibiricis, Wallicis. 4 (v. v.)

*Flos quadrifidus: Calyce diphyllo, Corolla dipetala, Staminibus* 6, *Stylis* 2.

## *26. RUMEX *lanceolatus.* †

R. foliis lanceolatis reflexo-marginatis, caule angulato. *Thunb. prod.* 67.
Lanzenblättriger Ampfer. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei.

*** *Floribus diclinis.*

27. RUMEX *alpinus.*

R. floribus hermaphroditis ſterilibus femineisque: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis obtuſis rugoſis. *Mat. med.* 99. *Mill. dict. n.* 2. *Pall. it. p.* 195. *Blackw. t.* 262.

Lapathum foliis obtuſis, circa petiolum emarginatis, paniculis denſe ſpicatis, vaginis maximis. *Hall. helv. n.* 1587.

Lapathum floribus ſuperioribus maſculis, inferioribus femineis, foliis cordatis. *Zinn. goett.* 38.

Rumex folio pedali cordato, radice repente. *Monnier. obſ.* 165. *Sauv. monſp.* 111.

Lapathum folio rotundo alpinum. *Bauh. hiſt. 2. p.* 987. *Hall.* R.

Lapathum hortenſe rotundifolium ſ. montanum. *Bauh. pin.* 115.

Lapathum rotundifolium. *Cluſ. hiſt. 2. p.* 69. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. p.* 382.

Alpen Ampfer. W.

*Habitat in* Helvetia, Gallia *auſtrali.* ♂

Folia *magnitudine Rhei*, *rugoſa.*

*Cum* R. criſpo *male jungit Gmelin. ſib. 3. p.* 112. R.

28. RUMEX *ſpinoſus.*

R. floribus androgynis: calycibus femineis monophyllis: valvulis exterioribus reflexo-uncinatis. *Hort. upſ* 89. *Willich. obſ.* 16. *Murray prodr.* 152.

R. floribus androgynis, calycibus fructus uncinatis. *Hort. cliff.* 139. *Roy. lugdb.* 230.

Beta cretica, ſemine aculeato. *Bauh. pin.* 118. *prodr.* 57.

Beta cretica, ſemine ſpinoſo. *Bauh. hiſt. 2. p.* 962. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 383.

Stachelſaamiger Ampfer. W.

*Habitat in* Creta, ⊙ (v. v.)

29. RUMEX *tuberoſus.*

R. floribus dioicis, foliis lanceolato-ſagittatis; hamis patentibus. *Sp. pl.* 481.

Acetoſa tuberoſa radice. *Bauh. pin.* 114.

Oxalis tuberoſa. *Dod. pempt.* 649. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 384.

Knolliger Ampfer. W.

*Habitat in* Italia. 4

*Affinis nimium R. Acetoſae ac ſi ejus hybrida: ſed* Folia *hamis poſtice magis hiantia et Stipulae longio-*

*res. Radix omnino Filipendulae.* Caulis *erectus, simplex.*

30. RUMEX *multifidus.*

R. floribus dioicis, foliis haſtatis: auriculis palmatis. *Sp. pl.* 482. †

Acetoſa minor erecta lobis multifidis. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 164. *t.* 126.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 384.

Vielſpaltiger Ampfer. W.

*Habitat in alpibus* Calabriae, Hetruriae, Orientis. 4

31. RUMEX *Acetoſa.*

R. floribus dioicis, foliis oblongis ſagittatis. *Vir. cliff.* 32. *Hort. cliff.* 130. *Hort. upſ.* 89. *Fl. ſuec.* 295, 318. *Fl. lapp.* 130. *Mat. med.* 99. *Roy. lugdb.* 231. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 111. *Pollich. pæl. n.* 361. *Blackw. t.* 230. *Knorr. del.* 2. *t. A.* 13. *Hoffm. germ.* 129. *Roth. germ. I.* 162. *II.* 426.

Lapathum ſexubus ſeparatis, foliis ſagittatis, hamis retrorſum porrectis. *Hall. helv. n.* 1597.

Lapathum acetoſa. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 438.

Acetoſa pratenſis. *Bauh. pin.* 14. *Mill. dict. n.* 1.

β. Acetoſa pratenſis, flore albo. *Tournef. inſt.* 502.

γ. Oxalis criſpa. *Bauh. hiſt* 2. *p.* 990. *Tabern. ic.* 440.

δ. Acetoſa montana maxima. *Bauh. pin.* 114. *Scheuch. alp.* 129. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 890.

ε. Acetoſa montana, lato ari folio rotundo. *Bocc. muſ.* 165. *t.* 125. *et.* 126.

Lapathum ſexubus ſeparatis, foliis ſagittatis, hamis breviſſimis, recta divergentibus. *Hall. helv.* 1598. *ſeparata ſpecies.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 384.

Gemeiner Ampfer. W.

*Habitat in* Europae *paſcuis.* δ. ε. *in alpinis.* 4 (v. v.)

32. RUMEX *Acetoſella.*

R. floribus dioicis, foliis lanceolato-haſtatis. *Vir. cliff.* 32. *Hort cliff.* 139. *Fl. lapp.* 131. *Fl. ſuec.* 296, 319. *Roy. lugdb.* 231. *Gron. virg.* 153. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 110. *Pollich. pal. n.* 362. *Kniph. cent.* 3. *n.* 77. *Knorr. del.* 2. *t. A.* 14. *Blackw. t.* 307. *Hoffm. germ.* 130. *Roth. germ. I.* 162. *II.* 427.

Lapathum ſexubus ſeparatis, foliis ſagittatis, hamis acutis, recurvis. *Hall. helv. n.* 1596.

Oxalis ſ. Acetoſa minor. *Matth.* 448. *Hall.*

Oxalis minor. *Camer. epit.* 231.
Acetosa sagittata alpina. *Zanon. t.* 5. *Hall.*
Oxalis parva auriculata repens. *Bauh. hist.* 2. *p.* 292.
Acetosa arvensis lanceolata. *Bauh. pin.* 114.
Oxalis ovina. *Tabern. ic.* 440.

ε. Acetosa lanceolata angustifolia repens. *Bauh. pin.* 14. *prodr.* 55.
Oxalis minima repens 1. *Tabern. ic.* 441. *Gmel. l. c.*

ζ. Acetosa arvensis minima non lanceolata. *Bauh. pin.* 114.
Oxalis minima repens 2. *Tabern. ic.* 441. *Gmel.*

η. Acetosa minor erecta, lobis multifidis. *Bocc. mus.* 164. *t.* 126.
*Houttuyn, Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 386.
Kleiner Ampfer. W.
*Habitat in* Europae *pascuis et arvis arenosis.* 24 (v. v.)

33. RUMEX *aculeatus.*

R. floribus dioicis, foliis lanceolatis petiolatis, fructibus reflexis: valvulis ciliatis. *Sp. pl.* 482.
Acetosa cretica, semine aculeato. *Bauh. pin.* 114. *prodr.* 55. *t.* 55.
Oxalis minor aculeata candiae. *Bauh. hist.* 2. *p.* 991.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 387.
Gefranzter Ampfer. W.
*Habitat in* Creta, Hispania. 24

*Similis R. Acetosellae, sed* Folia *basi attenuata absque hamis.* Florum *femineorum interiores valvulae ciliatae aculeis minimis.*

34. RUMEX *luxurians.*

R. floribus dioicis, foliis cordato-hastatis, caulibus angulatis diffusis, valvulis exterioribus subulatis, interioribus orbiculatis. *Lin. suppl.* 212.
R. floribus dioicis foliis cordato-hastatis, caulibus decumbentibus angulatis. *Mant.* 64.
Acetosa fagopyri folio. *Bocc. mus.* 165. *t.* 126.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 387.
Wuchernder Ampfer. W.
*Habitat in alpibus* Bononiensibus. 24

Conf. *Pluk. Phyt.* 331. *f.* 2.

Radix *Filipendulae, tuberosa.* Caules (*in horto*) *pedales, sesquipedalesve, prostrati, copiosi, ramosi, pentagoni, striati.* Folia *Acetosae longiora, ambitu cordata hastata (figura Ari maculati), acidissima, mar-*

*gine purpurascenti, undulato, vix crenulato. Mihi non floruit.*

*Differt a* R. scutato *caule angulato, nec tereti; foliis cordato-hastatis, nec lanceolato-sagittatis* H. V.

Caulis *ramosissimus pedalis angulatus laevis diffusus.* Folia *alterna petiolata cordata hastata acuminata.* Bracteae *intrafoliaceae ferrugineae.* Panicula *maxima terminalis divaricata decomposita e racemis alternis.* Pedicelli *capillacei longitudine fructus.* Fructus *valvulis exterioribus subulatis brevioribus, interioribus orbiculatis laevibus.* Lin. suppl.

*Rumex spinosus Thunb. prod. 67. pertinet forte ad hanc speciem.* W.

## 35. RUMEX *arifolius.*

R. floribus dioicis, foliis omnibus petiolatis hastatis, auriculis simplicibus divaricatis, caule erecto. *Ait. Kew. 1. p. 487.*

R. caule laevi suffrutescente foliis cordato-hastatis serrulatis acutis, valvulis nudis integerrimis. *Lin. suppl. 212.*

Rumex abyssinicus. *Jacq. hort. 3. p. 48. t. 98.*

Aronblättriger Ampfer. W.

*Habitat in* Abyssinia. ♄

Caules *teretes fistulosi glaberrimi glauci parum ramosi.* Folia *longe petiolata triangularia basi cordata et subhastata serrulata acuta septemnervia venosa glaberrima sapore Rumicum.* Stipulae *vaginaceae lanceolatae glabrae oppositifoliae membranaceae.* Paniculae *terminales.* Semina *valvulis cordatis glaberrimis nudis integerrimis, calyce reflexo. In libera terra cultus suborgyalis evadit, foliis magnitudine R. alpini, in olla vero coarctatus et fruticosus.*

## 36. RUMEX *bipinnatus.*

R. floribus dioicis, foliis bipinnatis. *Lin. suppl. 211.*

Doppeltgefiederter Ampfer. W.

*Habitat in* Marocco. ♃

Caules *spithamaei adscendentes laeves.* Folia *cordata bipinnatifida, laciniis fere ad costam distinctis, singulis pinnatis s. dichotomis* Stipulae *membranaceae diaphanae albae* Racemus *terminalis compositus, racemulis simplicibus.* Calyx *obtusus.*

## 700. FLAGELLARIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 614.

*Cal.* 6-partitus. *Cor.* 0. *Bacca* 1-ſperma.

### 1. FLAGELLARIA *indica.*

Flagellaria. *Fl. zeyl.* 133. * *Amoen. acad.* 1. *p.* 398. *Oſb. it.* 276.
Palmiuncus laevis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 120. *t.* 59. *f.* 2.
Panambu-valli. *Rheed. mal.* 7. *p.* 99. *t.* 53. *Raj. ſuppl.* 573.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 398.
Indiſcher Peitſchenſtrauch. W.
*Habitat in* Iava, Malabaria, Zeylona, Guinea ♄ (v. ſ.)

Frutex *humanam altitudinem ſuperans.* Rami *diſtichi. Affinitas proxima Calami.* Folia *terminata cirrho ut in Glorioſa.*

## 701. SCHEUCHZERIA.

*Gen. pl. edit. Schreb. n.* 615.

*Cal.* 6-partitus. *Cor.* 0. *Styli* 0. *Capſ.* 3, inflatae, 1-ſpermae.

### 1. SCHEUCHZERIA *paluſtris.*

Scheuchzeria. *Fl. lapp.* 133. *t.* 10. *f.* 1. *Fl. ſuec.* 297, 320. *Roy. lugdb.* 45. *Hall. helv. n.* 1310. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 73. *Berg. viadr.* 67. *Fl. dan. t.* 76. *Pollich. pal. n.* 363. *Hoffm. germ.* 130. *Roth. germ. I.* 159. *II.* 419.
Iuncus floridus minor. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 43. *theatr.* 190. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 110. *f.* 2.
Iuncoidi affinis paluſtris. *Scheuch. gram.* 336.
Gramen junceum aquaticum, ſemine racemoſo. *Loeſ. pruſſ.* 114. *t.* 28.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 12. *p.* 631.
Sumpf Scheuchzeria. W.
*Habitat in* Lapponiae, Helvetiae, Germaniae, Sueciae *paludoſis.* 4 (v. v.)

Capſulae 3, 5, 6, *in quolibet flore*; *Semina* 1, 2, *rarius* 3 *in qualibet capſula reperiuntur.* *Pollich. l. c.*

## 702. TRIGLOCHIN.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 616.

*Cal.* 3-phyllus. *Petala* 3, calyciformia. *Stylus* 0. *Capſ.* baſi dehiſcens.

### 1. TRIGLOCHIN *paluſtre.*

T. capſulis trilocularibus laevibus linearibus baſi attenuatis. W.

T capſulis trilocularibus ſublinearibus. *Fl. ſuec.* 298. 321. *Act. ſtockh* 1742. *p.* 147. *t.* 6. *f.* 1. 2. 3. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 72. *Hall helv. n.* 1308. *Scop. carn. n.* 446. *Pollich. pal. n.* 364. *Leers. herb. n.* 272. *t.* 12. *f.* 5. *Flor. dan. t.* 490. *Hoffm. germ.* 130. *Roth. germ. I.* 158. *II.* 417.

T. fructu tenui. *Fl. lapp.* 134. *Roy. lugdb.* 44.

Gramen junceum ſpicatum ſ. Triglochin. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 80. *Tabernaem.* 224.

Calamagroſtis IV. *Dalech. hiſt.* 1006.

β. Iuncago maritima perennis, bulboſa radice. *Mich. gen.* 44. *Pollich. l. c. var.* β.

Iuncago maritima. *Barr. rar.* 55. *t.* 271. *Houttuyn. Lin. Pſl. Syſt.* 12. *p.* 633.

Gemeiner Dreyzack. W.

*Habitat in* Europae *inundatis uliginoſis.* ♂ (v. v.)

Radix *fibroſa.*

### 2. TRIGLOCHIN *bulboſum.*

T. capſulis trilocularibus laevibus linearibus apice attenuatis. W.

T. radice bulboſa fibris obtecta. *Mant.* 226. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 454. *Collect. ſuppl.* 102. *

Gramen triglochin bulboſum monomotapenſe. *Brey. faſc.* 4.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 12. *p.* 634.

Capiſcher Dreyzack. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24 (v. ſ.)

Radix *bulboſa, undique obnubilata ſetis in faſciculum caeſpitoſum congeſtis.* Scapus *vix ſemipedalis, nudus, hinc ſubcanaliculatus.* Folia *radicalia, filiformia, hinc ſubcanaliculata.*

*Flores et tota planta Tr. paluſtri ſimillima, ſed tota Herba, Flores et fructus minores.* Styli 3, *protracti et patentes, qui in T. paluſtri erecti et obſoleti.*

3. TRIGLOCHIN *maritimum.*

T. capſulis ſexlocularibus ſulcatis ovatis. W.

T. capſulis ſexlocularibus ovatis. *Fl. ſuec.* 299, 322. *Act. ſtockh.* 1742. *p.* 147. *t.* 6. *f.* 4. 5. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 72. *Scop. carn. n.* 447. *Pollich. pal. n.* 365. *Oed. dan. t.* 306. 238. *Hoffm. germ.* 130. *Roth. germ. I.* 159. *II.* 418.

T. fructu ſubrotundo. *Fl. lapp.* 135. *Roy. lugdb.* 45. *Gort. gelr.* 76.

Iuncago paluſtris et maritima perennis, fructu breviore quinquecapſulari. *Mich. gen.* 44.

Gramen ſpicatum alterum. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 82. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 12. *p.* 635.

Groſser Dreyzack. W.

*Habitat in* Europae *maritimis.* 24 (v. v.)

## *703. WURMBEA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 617.

*Cal.* o. *Cor.* 6-partita tubo hexangulato. *Filam.* fauci inſerta.

*1. WURMBEA *pumila.* W.

W. ſpica tri-ſ. quadriflora, tubo longitudine limbi. W.

Wurmbea capenſis *α*. *Thunb. Diſſ. nov. pl. gen.* 1. *p.* 19. *tab. fig. γ.*

Kleinſte Wurmbea. W.

*Habitat in arenoſis* Cap. b. ſpei. 24

Planta *uncialis.* Spica *foliis vix longior.* W.

*2. WURMBEA *campanulata.* W.

W. ſpica multiflora foliorum longitudine, tubo longitudine limbi campanulato. W.

Wurmbea capenſis *γ*. *Thunb. Diſſ. Nov. pl. gen.* 1. *p.* 19. *tab. fig. β.*

Wurmbea. *Lamarck. illuſt. gen. t.* 270. *f.* 1.

*β*. Melanthium ſpicatum. *Burm. cap.* 11. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 503. *t.* 85. *f.* 2.

Glockenblütige Wurmbea. W.

*Habitat in collibus arenoſis* Cap. b. ſpei. 24

Planta *digitalis et ultra.* Folia *ut in omnibus ſpeciebus tria lanceolata cucullata baſi ventricoſa, at anguſtiora quam in ſequenti et ſpicae longitudine.* Spica *floribus numeroſis obſita.* W.

3. WURMBEA *longiflora.* W.

W. ſpica multiflora foliis longiore, tubo limbo duplo longiore. W.

Wurmbea capenſis β. *Thunb. Diſſ. Nov. pl. gen.* 1. *p.* 19. *tab. fig. a.*

Wurmbea. *Lamarck. illuſt. gen. t.* 270. *f.* 2.

Melanthium (*monopetalum.*) corolla monopetala, foliis cucullatis lanceolatis. *Lin. ſuppl.* 231.*

Melanthium (*Wurmbeum*) foliis enſiformibus diſtichis, corolla connato-tubuloſa. *Thunb. prod.* 67.

Langblütige Wurmbea. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in collibus arenoſis prope* Groene Kloof *et alibi.* 2|.

Folia *multo latiora quam in praecedente.* Spica *baſi magis flexuoſa, floribus numeroſis magis diſtantibus.* Corollae *tubus longus anguſtus.* W.

*Illuſt. Thunberg olim pro novo genere Wurmbeam noſtram habuit, poſtea vero cum Melanthiis conjunxit; at praeſentia tubi corollae et corollae monopetalae in Liliaceis ſeparat genera affinia et optimum praebet characterem; hinc denuo Wurmbeam diſtinxi. Varietates hujus plantae a Thunbergio indicatae, ſunt ſpecies re vera diſtinctae. Varietatem β. ſpica ovata et floribus purpureis ob iconis defectum omiſi.* W.

## 704. MELANTHIUM.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 618.

*Cal.* o. *Cor.* 6-petala. *Filam.* ex elongatis unguibus corollae.

1. MELANTHIUM *virginicum.*

M. floribus paniculatis, petalis unguiculatis extus hirſutis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 488.

M. petalis unguiculatis. *Mill. dict. n.* 1.

M. foliis linearibus integerrimis longiſſimis, floribus paniculatis. *Gron. virg.* 59.

Aſphodelo affinis floridana, ramoſo caule, floribus ornithogali obſoletis. *Pluk. amalth.* 40. *t.* 434. *f.* 8.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 500.

Virginiſches Melanthium. W.

*Habitat in* Virginia. 2|.

An *dioica? Gron. virg.* 2. *p.* 55.

*Tres ſpecies affines deſcripſit Desrouſſeaux in Lam. encycl. 4. p. 26, quas ob characteres vacillantes omittere coactus ſum.* W.

2. MELANTHIUM *ſibiricum.*

M. floribus paniculatis, petalis ſeſſilibus acutis, foliis linearibus. W.

M. petalis ſeſſilibus. *Amoen. acad. 2. p. 349. t. 11.* * *Mill. dict. n. 2.*

Ornithogalum ſpicis florum longiſſimis ramoſis. *Gmel. ſib. 1. p. 45. t. 8.*

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 11. p. 501.*

Sibiriſches Melanthium. W.

*Habitat in* Sibiria. 4

*3. MELANTHIUM *laetum.*

M. racemo oblongo, petalis ſeſſilibus, foliis glabris lanceolato-linearibus, caulinis remotis. *Ait. Kew. 1. p. 488.*

Lanzettenblättriges Melanthium. W.

*Habitat in* America *boreali.* 4

4. MELANTHIUM *capenſe.*

M. floribus racemoſis, petalis punctatis, foliis lanceolatis cucullatis. W.

M. foliis lanceolatis cucullatis. *Thumb. prod. 67.*

M. petalis punctatis, foliis cucullatis. *Amoen. acad. 6. afr. 12.*

M. punctatum. *Mill. dict. n. 3.*

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 11. p. 502.*

Capſches Melanthium. W.

*Habitat ad* Cap. b ſpei. 4

Caulis *ſimpliciſſimus palmaris.* Folia *lanceolata vaginantia, vagina ſuperne dilatata, ſunt haec in caule quatuor, ſupremo et infimo minimo.* Racemus *terminalis.* Petala *ovalia ſubunguiculata punctata:* Stamina *receptaculo fere inſerta.* Styli *tres.* Amoen. acad.

5. MELANTHIUM *triquetrum.*

M. foliis triquetris glabris caule longioribus, floribus ſpicatis. *Lin. ſuppl. 213. Thumb. prod. 67.*

Hyacinthus ſtellatus ſpicatus, floribus incarnatis caule et folio orchidis. *Pluk. alm. p. 186. t. 195. f. 4?* W.

Dreyeckiges Melanthium. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

6. MELANTHIUM *ciliatum.*

M. petalis unguiculatis, foliis baſi cucullatis, enſifor-

mibus cartilagineo-ciliatis, floribus ſpicatis. *Lin. ſuppl.* 213.

M. foliis enſiformibus cucullatis, floribus ſpicatis, petalis unguiculatis. *Thunb. prod.* 67.

Gefranztes Melanthium. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

Folia *caule breviora.* Petala *alba lanceolata.*

*7. MELANTHIUM *junceum.*

M. foliis lineari-ſubulatis, ſuperioribus baſi dilatatis, ſpica flexuoſa, petalis unguiculatis. W.

M. foliis ſubulatis, radicali unica, ſcapo ad ſummitatem diphyllo, floribus ſpicatis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 451. *Collect. ſuppl.* 105. *

Simſenartiges Melanthium.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

*Variat floribus coeruleis, roſeis at albis.* W.

*8. MELANTHIUM *ſecundum.*

M. foliis linearibus, ſpica ſecunda, petalis unguiculatis. W.

M. (*ſecundum*) punctatum, foliis gramineis, floribus ſecundis ſeſſilibus ſpicatis, petalis unguiculatis. *Lamarck. encycl.* 4. *p.* 29. *t.* 269. *f.* 2. *

Einſeitigblütiges Melanthium. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

*9. MELANTHIUM *phalangioides.*

M. foliis linearibus canaliculatis, racemo multifloro, pedunculis flore longioribus, petalis ſeſſilibus. W.

M. (*phalangioides*) foliis linearibus, floribus pedicellatis racemoſis, petalis ovatis concavis ſeſſilibus. *Lamarck. encycl.* 4. *p.* 28. *

Anthericum (*ſubtrigynum*) filamentis glabris, ſcapo ſimplici foliofo. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 419. *Collect.* 3. *p.* 273. *

Zaunkrautartiges Melanthium. W.

*Habitat in* Carolina. 4

10. MELANTHIUM *indicum.*

M. petalis lineari-lanceolatis, foliis linearibus. *Mant.* 226.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* II. *p.* 503.

Indiſches Melanthium. W.

*Habitat in* Tranquebaria. *Koenig.* 4 (v. ſ.)

Radix *bulboſa.* Herba *ſtatura Ornithogali lutei.* Caulis *ſimplex, palmaris, erectus, laevis.* Folia *caulina* 3, *linearia, caule longiora.* Pedunculi *terminales ſae-*

*pius duo: altero unifloro, altero bifloro: Foliis floralibus duobus, latioribus, brevioribus.* Flores *foliis breviores, atropurpurei.* Petala *angusto-lanceolata.* Stamina *et* Pistilla *corollis breviora.* Capsula *triangularis laevis, magnitudine seminis Coffeae.*

Obs. *De filamentorum insertione nil novi.*

Folia *angusto-linearia.* Caulis *foliosus apice bifloris pedunculis longissimis.* Petala *angustissima linearia.* Antherae *subrotundae reniformes magnae.* Filamenta *brevissima basi petalorum inserta. Possideo varietatem vel forte speciem,* foliis *multo latioribus,* caule *unifloro,* petalis *lanceolatis convoluto-cuspidatis* antheris *minoribus.* W.

11. MELANTHIUM *viride.*

M. pedunculis unifloris cernuis. *Lin. suppl.* 213.
M. foliis ovato-lanceolatis, corollis reflexis. *Thunb. prod.* 67.
Grünes Melanthium. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei.

Caulis *semipedalis foliosus subpubescens.* Folia *alterna sessilia lanceolata palmaria erecta.* Pedunculi *alterni lateriflori filiformes uniflori longitudine foliorum.* Flores *cernui.* Petala 6 *angusto-lanceolata patentia purpurascentia, basi angustiore ex margine connivente flavo.* Stamina *brevia.* Styli *tres.*

12. MELANTHIUM *uniflorum.*

M. foliis lineari-lanceolatis caule subunifloro longioribus, petalis lanceolatis subunguiculatis. W.
M. floribus patulis pedunculatis, foliis lanceolato-linearibus. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 450. *Collect.* 4. *p.* 100. *
Einblütiges Melanthium. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. 24

Folia *intermedia caule longiora, infima et summa breviora.* Petala *externe rubicunda, interne flava ungue fuscescente.* W.

*13. MELANTHIUM *eucomoides.*

M. foliis oblongo-lanceolatis cucullatis, caule trifloro, petalis subhastatis unguiculatis. W.
M. foliis cucullatis, petalis impunctatis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 452. *Collect. suppl.* 104. *
Schopflilienartiges Melanthium. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. 24

Caulis *digitalis.* Folia *pedalia oblongo lanceolata*

*basi cucullata circiter quinque in caule.* Flores *tres pedunculati terminales magni foliorum vaginis paulo longiores.* Corolla *viridis.* Antherae *fuscae.* W.

*14. MELANTHIUM *pumilum.*

M. foliis lanceolatis basi barbatis, caule subtrifloro, petalis sessilibus. W.

M. pedunculis unifloris erectis, caule nullo. *Forst. Comm. goett.* 9. *p.* 30. *t.* 6. *

Kleinstes Melanthium. W.

*Habitat in* Tierra del Fuego. 4

Caulis *cespitosus brevis, foliis rigidis lanceolatis basi barbatis tectus.* Pedunculi 3 *f.* 4. Corolla *alba, petalis lanceolatis apice inflexo-cucullatis.* Styli *nulli.* Stigmata 3 *rarius* 6. W.

*Melanthium luteum Thunb. jap.* 152. *est planta dubia a Veratro luteo forte distincta, sed mihi ignota.* W.

## 705. MEDEOLA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 619.

*Cal.* 0. *Cor.* 6-partita, revoluta. *Bacca* 3-sperma.

1. MEDEOLA *virginica.*

M. foliis verticillatis, ramis inermibus. *Sp. pl.* 483. *Mill. dict. n.* 3.

M. foliis stellatis lanceolatis, fructu baccato. *Gron. virg.* 39. *

Lilium f. Martagon pusillum, floribus minutissimis herbaceis. *Pluk. alm.* 401. *t.* 328. *f.* 4.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 389.

Virginische Medeola. W.

*Habitat in* Virginia. 4

2. MEDEOLA *asparagoides.*

M. foliis alternis ovatis, basi subcordatis obliquis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 489.

M. foliis pinnatis: foliolis alternis. *Mant.* 370. *Mill. dict. n.* 1.

Dracaena (*medeoloides*) herbacea volubilis, foliis ovatis nervosis. *Lin. suppl.* 203.

Asparagus (*medeoloides*) herbaceus volubilis, foliis ovatis nervosis. *Thunb. prod.* 66.

Asparagus foliis ovato-lanceolatis solitariis. *Hort. cliff.* 122. *Roy. lugdb.* 29.

Asparagus africanus scandens, myrti folio. *Till. pis.* 16. *t.* 12. *f.* 1.

Laurus alexandrina ramosa, foliis e summitate caulium prodeuntibus. *Herm. lugdb.* 679. *t.* 631.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 390.

Spargelartige Medeola. W.

*Habitat in* Aethiopia. ♄ (v. s.)

Folia *pinnata, aut* ramulos *dicas, multis dubium.* Folia *alterna pinnata sunt, alioquin si ramulus esset folii, vestigium sub ramo exstaret.* Flores *penduli e pedicello unifloro sub basi singuli folioli.* Corolla *extus virescens* Petalis *linearibus, a medio totaliter reflexis.* Filamenta *basi contracta, petalis supra basin inserta, subulata, longitudine corollae.*

* 3. MEDEOLA *angustifolia.*

M. foliis alternis ovato-lanceolatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 490.

Medeola angustifolia. *Mill. dict. n.* 2.

Dracaena (*volubilis*) herbacea volubilis, foliis lanceolatis. *Lin. suppl.* 204?

Asparagus (*volubilis*) caule volubili, foliis lanceolatis. *Thunb. prod.* 66?

Asparagus africanus scandens myrti folio angustiore. *Till. pis.* 17. *t.* 12. *f.* 2.

Schmalblättrige Medeola. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 24

## 706. TRILLIUM.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 620.

*Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Bacca* 3-locularis.

1. TRILLIUM *cernuum.*

T. flore pedunculato cernuo. *Mill. dict. n.* 1.

Paris foliis ternis, flore pedunculato nutante. *Cold. noveb.* 81.

Solanum triphyllum, flore hexapetalo carneo. *Catesb. carol.* 1. *p.* 45.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 508.

Hängendes Dreyblatt. W.

*Habitat in* Carolina. 24

2. TRILLIUM *erectum.*

T. flore pedunculato erecto. *Mill. dict. n.* 2.

Paris foliis ternis, flore pedunculato erecto. *Amoen. acad.* 1. *p.* 154. *

Solanum triphyllum brasilianum. *Bauh. pin.* 167. *prodr.* 91. *Burs.* IX. 12.

Solanum triphyllum canadense. *Corn. canad.* 166. *t.* 167.

Solano congener triphyllum canadense. *Morif. hist.* 3. *p.* 552. *f.* 13. *t.* 3. *f.* 7.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 509.

Aufrechtes Dreyblatt. W.

*Habitat in* Virginia. 4

## 3. TRILLIUM *sessile.*

T. flore sessili erecto. *Mill. dict. n.* 3.

Paris foliis ternatis, flore sessili erecto. *Gron virg.* 44.

Solanum virginianum triphyllum, flore tripetalo atropurpureo in foliorum sinu, absque pediculo, sessili. *Pluk. alm.* 352. *t.* 111. *f.* 6.

Solanum triphyllum, flore hexapetalo: tribus petalis purpureis, caeteris viridibus reflexis. *Catesb. car.* 1. *p.* 50. *t.* 50.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 11. *p.* 510.

Sitzendes Dreyblatt. W.

*Habitat in* Virginia, Carolina. 4

# 707. COLCHICUM.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 621.

*Spatha.* *Cor.* 6-partita: tubo radicato. *Caps.* 3, connexae, inflatae.

## 1. COLCHICUM *autumnale.*

C. foliis planis lanceolatis erectis. *Hort. cliff.* 140. *Hort. upf.* 90. *Roy. lugdb.* 41. *Sauv. monsp.* 18. 19. *Mat. med.* 100. *Mill. dict. n.* 1. *Scop. carn. n.* 448. *Pollich. pal. n.* 366. *Blackw. t.* 566. *Kniph. cent.* 12. *n.* 30. *Knorr. del.* 1. *tab. Z.* 1. *Hoffm. germ.* 130. *Roth. germ.* 158. *II.* 416.

C. flore folia longe praecedente, petalis ovatis. *Hall. helv. n.* 1255.

C. commune. *Bauh. pin.* 67.

Colchicum. *Fuch. hist.* 356. 357. *Camer. epit.* 845. *Dodon. purg.* 371.

β. Colchium flore pleno. *Bauh. pin.* 67.

γ. C. vernum. *Bauh. pin.* R.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 511.
Herbſt Zeitloſe. W.
*Habitat in* Europae *ſucculentis.* 4 (v. v.)
Colch. *vernum petala et folia habet paulo anguſtiora, Hall.*

2. COLCHICUM *montanum.*
C. foliis linearibus patentiſſimis. *Sp. pl.* 485. *Mill. dict. n.* 2. *Allion pedem.* 1. *n.* 434. *t.* 74. *f.* 2.
C. foliis florem attingentibus, petalis linearibus. *Hall. helv. n.* 1256.
C. montanum anguſtifolium. *Bauh. pin.* 68.
C. montanum. *Cluſ. hiſp.* 266. *t.* 267. *hiſt.* 1. *p.* 200.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 517.
Berg Zeitloſe. W.
*Habitat in* Hiſpania, Helvetia. 4
Folia *una cum floribus autumno erumpunt.*

3. COLCHICUM *variegatum.*
C. foliis undulatis patentibus. *Hort. cliff.* 140. *Roy. lugdb.* 42. *Mill. dict. n.* 3.
C. chionenſe, floribus fritillariae inſtar teſſulatis, foliis undulatis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 341. *ſ.* 4. *t.* 3. *f.* 7.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 518.
Bunte Zeitloſe. W.
*Habitat in* Chio *inſula.* 4 (v. v.)

## 708. HELONIAS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 622.

*Cor.* 6-petala. *Cal.* 0. *Capſ.* 3-locularis.

1. HELONIAS *bullata.*
H. foliis lanceolato-enſiformibus nervoſis, bracteis lineari-lanceolatis. W.
H. foliis lanceolatis nervoſis. *Syſt. veg.* 349.
Veratrum racemo ſimpliciſſimo, corollis patentibus, ſtaminibus longioribus. *Miil. ic.* 181. *t.* 272.
Helonias, foliis radicalibus lanceolatis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 12. *t.* 1. *
Ephemerum phalangoides virginianum, floſculis arbuteis bullatis in ſpicam diſpoſitis. *Pluk. alm.* 155. *t.* 174. *f.* 5. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 606. *ſ.* 15. *t.* 2. *f.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* II. *p.* 520.
Glockenblütige Schwindblume. W.

*Habitat in* Penſylvaniae *paludoſis*. 4 (v. ſ.)

2. HELONIAS *borealis*. W.

H. foliis lineari-enſiformibus nervoſis, bracteis duplicatis membranaceis. W.

Anthericum (*calyculatum*) foliis enſiformibus, perianthiis trilobis, filamentis glabris, floribus trigynis. *Fl. ſuec.* 269, 288. *It. gotl.* 194, 221. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 75. *t.* 18. *f.* 2. *Mill. dict. n.* 10. *Oed. t.* 36. *Hoffm. germ.* 121.

Anthericum filamentis glabris. *Hall. helv. n.* 1205.

Anthericum Pſeudo-aſphodelus. *Iacq. vindb.* 233. *

Anthericum filamentis laevibus, perianthio trifido. *Hort. cliff.* 140. *Gron. virg.* 39.

Anthericum ſcapo nudo capitato, filamentis glabris. *Fl. lapp.* 139. *t.* 10. *f.* 3.

Scheuchzeria Pſeudo-Aſphodelus. *Scop. carn. n.* 445. *Roth. germ. I.* 159. *II.* 419.

Tofieldia paluſtris. *Hudſ. angl.* 157.

Heritieria anthericoides. *Schrank bavar. n.* 580.

Phalangium alpinum paluſtre iridis folio. *Segu. veron.* 2. *p.* 61. *t.* 14.

Pſeudo-aſphodelus alpinus. *Bauh. pin.* 29.

Pſeudaſphodelus. *Cluſ. pann.* 262.

Pſeudaſphodelus ſecundus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 198.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 402.

Nördliche Schwindblume. W.

*Habitat in alpibus* Lapponiae, Norvegiae, Helvetiae, Salisburgi, Sibiriae *inque paludibus profundis* Germaniae, Angliae. 4 (v. v.)

*Eſt re vera hujus generis, convenit et habitu cum praecedente, a qua petalis erectis nec baſi ventricoſis,* ſtylis *non cohaerentibus*, bractea *duplici, denique* foliis *longioribus et anguſtioribus differt. In alpibus Europae auſtralis et in paludibus flores ſunt racemoſi, in Lapponia et Norvegia vero tota planta eſt quadruplo minor, floribus capitatis.* W.

3. HELONIAS *aſphodeloides*.

H. foliis caulinis ſetaceis. *Sp. pl.* 485.

Aſphodelus minor albus. *Pluk. mant.* 29. *t.* 342. *f.* 3. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 521.

Affodilartige Schwindblume. W.

*Habitat in* Penſylvania. *Barthram.*

Caulis *ſimpliciſſimus, bipedalis.* Folia *alternata ſ-*

*ſpaꝛſa, lineari-ſetacea, erecta, laevia, margine ſcabra.* Racemus *terminalis, ſimplex, pedunculis flore longioribus.* Flores *albi.* *Simillima Aſphodelo, ſed Styli tres recurvati.*

*4. HELONIAS *pumila.* †

H. foliis lanceolatis enerviis ♂. ſpica capitata. W.

H. foliis lanceolatis enerviis. *Iacq. ic. rar. 2. t 453. Collect. 2. p. 260.* *

Niedrige Schwindblume. W.

*Habitat in* Carolina. 4

Caulis *digitalis valde folioſus.* Flores *albi parvi in ſpica denſa ovata. Eſt proprii forte generis planta quum germen inferum.* W.

# *HEXAGYNIA.*

## *709. WENDLANDIA. W.

*Androphylax Wendl. obſ. 37.*

*Cal.* 6-phyll. *Cor.* 6-petala. *Capſ.* 6, uniloculares monoſpermae.

### *1. WENDLANDIA *populifolia.* W.

Androphylax ſcandens. *Wendl. obſ. 38.* *

Pappelblättrige Wendlandie. W.

*Habitat in* Carolina. ♄ (v. ſ.)

Caulis *fruticoſus ſcandens, ramis teretibus, junioribus ſubpubeſcentibus ſtriatis.* Folia *alterna petiolata cordato-ovata, glanduloſo-mucronata, integerrima, nervoſo-venoſa, ſuperne glabra, ſubtus pubeſcentia.* Petioli *longi pubeſcentes.* Racemi *ſimplices petiolo dimidio breviores ſupra axillares.* Pedunculi, Bracteae *et* Calyx *externe pubeſcentes.* Flores *parvi albi.* W.

*Hoc genus in memoriam Clariſſimi J. C. Wendland, botanici acutiſſimi et autoris meritiſſimi dixi.* W.

## *710. DAMASONIUM.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 624.

*Spatha* 1-phylla 5-alata. *Cal.* ſuperus 3-partitus. *Cor.* 3-petala. *Bacca* 10-locul. polyſperma.

1. DAMASONIUM *indicum.* W.

Stratiotes (*aliſmoides*) foliis cordatis. *Sp. pl.* 754. *Fl. zeyl.* 223. *Forſk. deſcr.* 101.

Ottel-ambel. *Rheed. mal.* 11. *p.* 95. *t.* 46.

*Houttuyn Lin. Pfl.* Syſt. 7. *p.* 279.

Indiſches Damaſonium. W.

*Habitat in aquis* Indiae *orientalis.* 24 (v. ſ.)

Planta *acaulis.* Folia *omnia radicalia cordata petiolata integerrima nervoſa.* Scapus *uniflorus.* W.

# *POLYGYNIA.*

## 711. ALISMA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 625.

*Cal.* 3-phyllus. *Petala* 3. *Capſ.* plures monoſpermae.

1. ALISMA *Plantago.*

A. foliis ovatis acutis, fructibus obtuſe trigonis. *Oed. dan. t.* 561. *Scop. carn. n.* 449. *Pollich. pal. n.* 367. *Roth. germ. I.* 163. *II.* 428. *Hoffm. germ.* 131. *Kniph. cent.* 12. *n.* 4.

Damaſonium foliis ellipticis, lanceolatis, capitulo rotunde triquetro. *Hall. helv. n.* 1184.

Aliſma fructu obtuſo trigono. *Fl. lapp.* 138. *Fl. ſuec.* 300, 323. *Hort. cliff.* 241. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 77.

Plantago aquatica latifolia. *Bauh. pin.* 190.

Plantago aquatica. *Cam. epit.* 264. *Tabernaem.* 734. *Dodon. cer.* 267. *hiſt.* 606.

ß. Plantago aquatica anguſtifolia. *Bauh. pin.* 190. *Hall. Houttuyn Lin. Pfl.* Syſt. 6. *p.* 391.

Gemeiner Froſchlöffel. W.

*Habitat in* Europae *aquoſis et ad ripas fluviorum, lacuum.* 24 (v. v.)

*Variat in paludibus exsiccatis foliis minoribus angustioribus, et in aquis profundis fluentibus foliis linearibus.* W.

2. ALISMA *flava.*

A. foliis ovatis acutis, pedunculis umbellatis, fructibus globosis. *Sp. pl.* 486.

Damasonium maximum, plantaginis folio, flore flavescente, fructu globoso. *Plum. spec.* 7. *ic.* 115.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 393.

Gelber Froschlöffel. W.

*Habitat in* America *meridionali.* 4

*3. ALISMA *sagittifolia.* W.

A. foliis sagittatis, fructibus obovatis obtusis. W.

Pfeilblättriger Froschlöffel. W.

*Habitat in* Guinea. 4 (v. s.)

Folia *subrotundo-ovata basi sagittata, lobis acutis.* Scapus *foliis brevior floribus verticillatis.* Bracteae *lanceolatae.* Capsulae *obovatae obtusissimae glabrae.* Planta *ab omnibus hujus generis speciebus, et a Sagittaria obtusifolia distinctissima.* W.

4. ALISMA *Damasonium.*

A. foliis cordato-oblongis, floribus hexagynis, capsulis subulatis. *Sp. pl.* 486. *Pall. it.* 1. *p.* 16.

Alisma fructu sexcorni. *Hort. cliff.* 141. *Roy. lugdb.* 46. *Sauv. monsp.* 14.

Plantago aquatica stellata. *Bauh. pin.* 190.

Plantago aquatica minor altera. *Lob. ic.* 301.

Damasonium stellatum. *Dalech. hist.* 1058.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 393.

Sternförmiger Froschlöffel. W.

*Habitat in* Angliae, Galliae *aquosis; in* Sibiria. 4

5. ALISMA *cordifolia.*

A. foliis cordatis obtusis, floribus dodecandris, seminibus uncinato-muricatis. *Sp. pl.* 487. *Swartz. obs.* 139. *

A. foliis lunato-sagittatis venosis. *Brown. jam.* 204.

Damasonium ramosum, folio cordiformi. *Vaill. act.* 1719. *p.* 28.

Sagittaria virginiana, obtusiore lato folio, floribus minoribus albis. *Morif. hist.* 3. *p.* 618. *s.* 15. *t.* 4. *f.* 6.

Ranunculus aquaticus, asari foliis, ad nodos umbelliferus. *Plum. spec.* 7. *ic.* 234. *f.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 394.
Herzblättriger Froſchlöffel. W.
*Habitat in* America *auſtrali et ſeptentrionali.* 4.
*Media inter Aliſmas et Sagittarias.*

6. ALISMA *parnaſſifolia.*

A. foliis cordatis ſubrotundis acutis, capſulis ariſtatis. W.
A. foliis cordatis acutis, petiolis articulatis. *Mant.* 371.
*Baſſ. Act. bonon.* 1768. *Hoffm. germ.* 131.
A. peltata, foliis patulo-cordatis. *Tourell. pilat.* 140.
Ranunculus paluſtris fiore albo, graminis parnaſſi folio.
*Till. piſan.* 145. *t.* 46. *f.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 396.
Parnaſſienblättriger Froſchlöffel. W.
*Habitat in paludibus* Apenninorum *inque* Germania. 4 (v. v.)
Folia *longe petiolata ut in Parnaſſia paluſtri ſed majora acutiuſcula et nervoſa.* W.

*7. ALISMA *repens.*

A. foliis lanceolatis acutis trinerviis, petalis crenatis, caule decumbente radicante. W.
A. caulibus ſubrepentibus adſcendentibus, ad nodos inferiores radicoſis et folioſis, foliis lanceolatis petiolatis, verticillis ſimplicibus. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 510. *
A. caulibus repentibus, foliis lanceolatis petiolatis acutis.
*Cavan. ic.* 1. *p.* 41. *t.* 55. *
Kriechender Froſchlöffel. W.
*Habitat in humidis* Hiſpaniae *et* Africae *borealis.*
*Simillima ſequenti, ſed* foliis *lanceolatis acutis et* petalis *crenatis diſtincta.* W.

8. ALISMA *natans.*

A. foliis ovatis obtuſis, pedunculis ſolitariis. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 324. *Hoffm. germ.* 131. *Roth. germ. I.* 163. *II.* 429. *
A. foliis gramineis et ovatis, caule repente, umbella pauciflora. *Zinn. goett.* 112.
Damaſonium repens, potamogetonis rotundifolii folio. *Vaill. act.* 1719. *p.* 29. *t.* 4. *f.* 8.
Damaſonium radiculas emittens ex geniculis. *Vaill. pariſ.* 46.
Ranunculus paluſtris, foliis gramineis et ſubrotundis. *Petit. gen.* 47.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt* 6. *p.* 394.
Schwimmender Froſchlöffel. W.

*Habitat in* Galliae, Sueciae, Germaniae, Sibiriae (*Pall. it.* 1. *p.* 7.) *foſſis.* 2ℓ (v. v.)

Capſulae, *ſaepius* 8. Flores *nonnulli ex eadem ſpatha.*

*Secunda planta, quam ad A. plantaginem memoravit cl. Pollich, huc pertinet. Vid. ej. flor. pal. tom.* 3. *app. p.* 319. R.

9. ALISMA *ranunculoides.*

A. foliis lineari-lanceolatis, fructibus globoſo-ſquarroſis. *Flor. dan. t.* 122. *Weber. ſpicil. p.* 12. *Hoffm. germ.* 131. *Roth. germ. I.* 163. *II.* 430.

A. fructu globoſo undique echinato. *Hort. cliff.* 141. *It. gotl.* 298. *Fl. ſuec.* 301, 325. *Roy. lugdb.* 46. *Gort. gelr.* 77. *Sau. monſp.* 14.

Damaſonium anguſtiſſimo plantaginis folio. *Vaill. act.* 1719. *p.* 35.

Plantago aquatica humilis anguſtifolia. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 738. *Lob. ic.* 300.

Ranunculus aquaticus, plantaginis folio anguſtiſſimo. *T. Pet. gaz.* 41. *t.* 26. *f.* 12.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 395.

Ranunkelartiger Froſchlöffel. W.

*Habitat in* Gotlandiae, Belgii, Angliae, Galliae, Germaniae, *foſſis.* 2ℓ (v. ſ.)

10. ALISMA *ſubulata.*

A. foliis ſubulatis. *Sp. pl.* 487. *Gron. virg.* 153.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 395.

Pfriemförmiger Froſchlöffel. W.

*Habitat in* Virginia.

*Classis VII.*

# HEPTANDRIA.

## *MONOGYNIA.*

* *Flores completi.*

712. TRIENTALIS. *Cal.* 7-phyllus. *Cor.* 7-partita, plana. *Bacca* 1-locularis ficca.

713. DISANDRA. *Cal.* subseptempartita. *Cor.* rotata, subseptempartita. *Capf.* 2-locularis, polyfperma.

717. AESCULUS. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-petala, inaequalis. *Capf.* 3-locularis, 2-fperma.

718. PETROCARYA. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Drupa* carnofa. *Nux.* 2-locul.

716. PANCOVIA. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-petala crifpata. *Stam.* adfcendentia.

719. IONESIA. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* infundibuliformis. *Legumen.*

† *Pelargonium.*

** *Flores incompleti.*

714. PISONIA. *Cal.* campanulatus 5-fidus. *Cor.* 0. *Bacca* 1-fperma.

715. PETIVERIA. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 0. *Stylus* lateralis. *Sem.* 1.

720. DRACONTIUM. *Spatha* cymbiformis. *Spadix* tectus. *Cal.* 0. *Cor.* 5-petala. *Bacca.*

721. CALLA. *Spatha* ovata. *Spadix* tectus. *Cal.* 0. *Cor.* 0. *Bacca.*

---

Circumfciffam *Capfulam diximus, quae maturo fructu horizontaliter difcedit.*

Superus *Flos f. Calyx, cui germen fub receptaculo, vel cujus calyx abit in fructum fecundum Tournefortium.*

Inferus *Flos f. Calyx, cui germen fupra receptaculum, vel cujus Piftillum abit in fructum; ex mente Tournefortii.*

*Ergo* Fructus *inferus et* Flos *fuperus idem funt; ut ex oppofito* Fructus *fuperus et* Flos *inferus.*

722. HOUTTUYNIA. *Spatha* 4-phylla. *Spadix* tectus. *Cal.* o. *Cor.* o. *Capſ.* 3-locul?

## *DIGYNIA.*

723. LIMEUM. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala, aequalis. *Capſ.* 2-locularis, polyſperma.

## *TETRAGYNIA.*

724. ASTRANTHUS. *Cal.* o. *Cor.* hypocrateriformis 14-fida. *Sem.* 1.

725. SAURURUS. *Cal.* amentum. *Cor.* nulla. *Piſt.* 4. *Baccae* 4, monoſpermae.

## *HEPTAGYNIA.*

726. SEPTAS. *Cal.* 7-partitus. *Cor.* 7-petala. *Germina* 7. *Capſ.* 7.

† *Phytolacca ſtricta.*

# *MONOGYNIA.*

## 712. TRIENTALIS.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 626.

*Cal.* 7-phyllus. *Cor.* 7-partita, aequalis, plana. *Bacca* exſucca.

1. TRIENTALIS *europaea.*

T. foliis lanceolatis integerrimis. *Kalm. canad.* 2. *p.* 263. *Oed. dan.* 86. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 116. *Pall. it.* 2. *p.* 192. *Kniph. cent.* 4. *n.* 94.

T. foliis ſummis verticillatis. *Moench. haſſ. n.* 314.

Trientalis, *Fl. lapp.* 139. *Fl. ſuec.* 302, 326. *Roy. lugdb.* 438. *Hall. opuſc.* 123. *Kalm. it.* 2. *p.* 263.

Alſine alpina. *Swenkf. ſileſ.* 117.

Pyrola, alſines flore, europaea. *Bauh. pin.* 191. *prodr.* 101.

Pyrola, alſines flore, minor braſiliana. *Bauh. prodr.* 101. *t.* (*ſub Hermodactyli nomine*) 99. *Burſ. X.* 107. *Houttuyn. Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 397.

Europäiſche Trientalis. W.

*Habitat in* Europae *borealis ſylvis et juniperetis.* 4 (v. ſ.)

Stamina 5, 7, *ſaepius* 6 *cum totidem calycis laciniis.*

Pall. *l. c.* R.

## 713. DISANDRA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 627.

*Cal.* ſubſeptempartitus. *Cor.* rotata, ſeptempartita. *Capſ.* 2-locularis, polyſperma.

1. DISANDRA *proſtrata.*

D. proſtrata. *Lin. ſuppl.* 214.

Sibthorpia (*peregrina*) foliis reniformibus crenatis, pedunculis geminis. *Sp. pl.* 2. *p.* 880. *Amoen. acad.* 3. *p.* 22.

Planta. *Pluk. phyt.* 257.

2. Sibthorpia (*africana*) foliis orbiculatis integris crenatis, pedunculis ſolitariis. *Sp. pl.* 2. *p.* 880. *Amoen. acad.* 3. *p.* 22.

Chryſoplenii foliis planta aquatica, flore flavo pentapetalo. *Schaw. afr.* 149. *f.* 149.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 399.

Liegende Diſandra. W.

*Habitat in* Oriente *et inſula* Madera. 4 (v. v.)

Caules *pedales ſ. bipedales, proſtrati, teretes, pubeſcentes.* Folia *alterna, petiolata, reniformi-orbiculata, 3o-crenata, pubeſcentia.* Pedunculi *axillares, bini, rarius* 1 *ſ.* 3, *erecti, filiformes, uniflori, petiolis altiores.* Corollae *luteae.*

*An* Sibthorpia africana *vere diſtincta* ſpecies? *Floris partes omnium maxime numero inconſtantes: ſeptenarius numerus frequentiſſimus eſt; quinarius naturaliſſimus, ſed rariſſimus, certe in culta.*

## 714. PISONIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 1603.

*Cal.* campanulatus quinquefidus. *Cor.* o. *Bacca* 1-locularis monoſperma.

### 1. PISONIA *aculeata.*

P. ſpinis axillaribus horizontalibus, foliis ovatis utrinque attenuatis, corymbis axillaribus. W.

P. ſpinis axillaribus patentiſſimis. *Sp. pl.* 1511. *Iacq. amer.* 274. *

Piſonia. *Hort. cliff.* 457.

P. aſſurgens, ſarmento valido, foliis ovatis utrinque productis, ſpinis validis recurvis, racemis lateralibus. *Brown. jam.* 258.

P. aculeata, fructu glutinoſo et racemoſo. *Plum. gen.* 7. *ic.* 227. *f.* 1.

Rhamnus ſ. Lycium Fringego jamaicenſibus dictum. *Pluk. alm.* 318. *t.* 108. *f.* 2.

Paliuro affinis arbor ſpinoſa, flore herbaceo pentapetaloide, fructu ſicco nudo canaliculato lappaceo. *Sloan. jam.* 137. *hiſt.* 2. *p.* 25. *t.* 167. *Raj. dendr.* 95. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 2. *p.* 524.

Stachlſche Piſonie. W.

*Habitat in* America *meridionali.* ♄ (v. ſ. ſ. a.)

### *2. PISONIA *ſuboordata.*

P. inermis, foliis cordato-ſubrotundis, fructibus ſiccis ſubclavatis pentagonis, angulis apice muricatis. *Swartz. prod.* 60. *Fl. ind occid.* 2. *p.* 641. *

Herzblättrige Piſonie. W.

*Habitat in* Antigua, *inſulisque* St. Chriſtophori *et* Bartholomaei. ♄

### *3. PISONIA *nigricans.*

P. inermis, foliis ovatis acuminatis, floribus cymoſis

erectis, fructibus baccatis. *Swartz. prod.* 60. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 643. *

Pisonia (*inermis*) caule inermi. *Iacq. amer.* 275. *

Schwärzliche Pisonie. W.

*Habitat in* Iamaicae *et* Hispaniolae *sylvestribus montium.* ♄

*4. PISONIA *coccinea.*

P. inermis, foliis lanceolato-ovatis, pedunculis terminalibus laxis, floribus nutantibus, fructibus baccatis. *Swartz. prod.* 60. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 645. *

Rothbeerige Pisonie. W.

*Habitat in fruticetis* Hispaniolae. ♄

5. PISONIA *mitis.* †

P. inermis, foliis ovatis, floribus axillaribus. W.

P. caule inermi. *Sp. pl.* 1511.

P. malabarica non spinosa. *Amm. herb.* 582.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 2, *p.* 522.

Wehrlose Pisonie. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄.

Planta *valde obscura.* W.

## 715. PETIVERIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 623.

*Cal.* tetraphyllus. *Cor.* 0. *Stylus* lateralis. *Stigma* penicilliforme. *Sem.* 1, aristis quatuor reflexis apice instructum.

1. PETIVERIA *alliacea.*

P. floribus hexandris. *Hort. cliff.* 141. *Hort. upsl.* 91. *Act. holm.* 1744. *p.* 287. *t.* 7. *Trew. Ehr.* 33. *t.* 67. *Mat. med.* 100. *Mill. dict. n.* 1. *Kniph. cent.* 2. *n.* 53. *Swartz. obs.* 138. *

P. foliis oblongo-ovatis, spicis longioribus terminalibus. *Brown. jam.* 274.

Verbenae aut Scorodoniae affinis anomala, flore albido, calyce aspero allii odore. *Sloan. jam.* 64. *hist.* 1. *p.* 172. *Raj. suppl.* 287.

*β.* P. (*octandra*) floribus octandris. *Iacq. amer.* 201. *Mill. dict. n.* 2.

P. solani foliis, loculis spinosis. *Plum. gen.* 50. *ic.* 219. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 400, 401.

Knoblauchduftige Petiverie. W.

*Habitat in* Iamaicae *nemorosis aridis.* ♄ (v. v.)

## *716. PANCOVIA. W.

*Cal.* campanulatus 4-partitus. *Pet.* 4, unguiculata plicato-crispa dentata cucullata. *Stam.* adscendentia calyce longiora.

### *1. PANCOVIA *bijuga*. W.

Gefiederte Pancovie. W.

*Habitat in* Guinea. ♄ (v. s.)

Arbor *ramis teretibus, ramulis ferrugineo-pubescentibus.* Folia *alterna pari-pinnata, foliolis bijugis petiolatis coriaceis ellipticis apice, attenuatis, obtusis, integerrimis venosis glabris.* Petioli *juniorum pubescentes, adultiorum transversim rugosi.* Racemi *interfoliacei in ramis praeteriti anni breves simplices multiflori.* Flores *pedunculati cum pedunculis pubescentes.* Bracteae *ovatae obtusae pedunculis breviores dense pubescentes.* Calyx *campanulatus externe valde pubescens, ad basin usque quadripartitus, laciniis ovatis, binis parum longioribus.* Corolla *tetrapetala, petalis calyce parum brevioribus, receptaculo ad basin cujusque laciniae insertis unguiculatis;* lamina *dentata cucullata crispato-plicata.* Filamenta *septem subulata receptaculo inter binas lacinias calycis longiores inserta, calyce duplo longiora adscendentia a basi ad medium pilosa.* Antherae *oblongae incumbentes.* Neque pistillum *neque fructum vidi, loco pistilli observavi corpus depressoplanum ut videtur glandulosum. Celeberrimus Ifert, detector hujus plantae, stamina septem et pistillum unicum adnotavit in schedula specimini meo affixa; sed in floribus quatuor a me examinatis nullum aderat pistillum, forte arbor polygama. Dixi hoc genus in memoriam botanici suo tempore celebri D. Thomae Pancovii.* W.

## 717. AESCULUS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 628.

*Cal.* 1-phyllus, 4 s. 5-dentatus, ventricosus. *Cor.* 4 s. 5-petala, inaequaliter colorata, calyci inserta. *Capf.* 3-locularis.

### 1. AESCULUS *Hippocastanum.*

A. foliis digitatis septenis: corollis pentapetalis patulis. *Willd. arb.* 12. *

A. foliolis ſeptenis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 493.
A. floribus heptandris. *Hort. upſ.* 29 *Mill. dict. n.* 1. *et illuſtr. Du Roi. harbk.* 1. *p.* 34. *Knipth. cent.* 3. *n.* 3. *Roth. germ.* 353.
Aeſculus. *Hort. cliff.* 142. *Roy. lugdb.* 463.
Hippocaſtanum. *Hall. helv. n.* 1029. * * *
Caſtanea folio multifido. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 7. *Bauh. pin.* 419.
Caſtanea equina. *Raj. hiſt.* 683.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 438.
Gemeine Roſskaſtanie. W.
*Habitat in* Aſia *ſeptentrionaliore, unde in Europam* 1550. ♄ (v. v.)

## 2. AESCULUS *Pavia.*

A. foliis quinatis glabris inaequaliter dentatis, corollis tetrapetalis, petalorum conniventium unguibus longitudine calycis. *Willd. arb.* 12. *
A. foliis quinis, corollae laminis obovatis, unguibus longitudine calycis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 494.
A. floribus octandris. *Willich. obſ.* 73. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 41. *Wangenh. amer.* 56. * *Swartz. obſ.* 140. *
Pavia. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 260. *t.* 260. *Hort. angl.* 54. *t.* 19. *Hort. cliff.* 143. *Roy. lugdb.* 463. *Trew. ehret. t.* 15. *Mill. ie.* 198. *Duham. arb.* 2. *p.* 98.
Saamouna piſonis ſ. ſiliquifera braſilienſis arbor, digitatis foliis ſerratis, floribus teucrii purpureis. *Pluk. alm.* 326. *t.* 56. *f.* 4.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 444.
Rothe Roſskaſtanie. W.
*Habitat in* Carolina, Florida, Braſilia. ♄ (v. v.)
Flores *in utraque Hermaphroditos et Maſculos obſervarunt D. von Royen, Millerus. Huic calyx et* Corolla *ſanguinea.* Flores *umbellati.* Corolla 4-*petala, clauſa.*

## *3. AESCULUS *flava.*

A. foliis quinatis ſubtus ad coſtam pubeſcentibus aequaliter ſerrulatis, corolli- tetrapetalis, petalorum conniventium unguibus calyce longioribus. *Willd. arb.* 13. *
A. (*flava*) foliolis quinis, corollae laminis cordato-ſubrotundis, unguibus calyce duplo longioribus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 494.

A. (*lutea*) corollis heptandris luteis viſcoſis clauſis, foliis digitatis ovato-lanceolatis, ſerratis. *Wangenh. Act. Soc. Nat. Scrut. Berol.* 8. *p.* 133. *t.* 6. *
Gelbe Roſskaſtanie. W.
*Habitat in* Carolina *boreali.* ♄ (v. v.)

## *718. PETROCARYA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 629.

*Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 14, quorum 7 ſterilia. *Drupa* carnoſa fibroſa. *Nux* bilocularis, loculis monoſpermis.

### *1. PETROCARYA *montana.*

P. foliis ovatis acuminatis. W.
Parinari (*montana*) foliis ovatis acuminatis, magno fructu *Aubl. guj.* 1. *p.* 514. *t.* 204, 205. *
Berg Steinnuſs. W.
*Habitat in ſylvis interioris* Gujanae. ♄

### *2. PETROCARYA *campeſtris.*

P. foliis cordatis acuminatis. W.
Parinari (*campeſtris*) foliis cordatis acutis, fructu parvo. *Aubl. guj.* 1. *p.* 517. *t.* 206. *
Feld Steinnuſs. W.
*Habitat in ſylvis* Gujanae. ♄

*In binis hisce ſpeciebus ſunt* folia *alterna petiolata ſubtus albo-tomentoſa*, ſtipulae *lanceolatae oppoſitae caducae.* W.

## 719. IONESIA.

*Roxburgh Aſiat. Reſearch.* 4. *p.* 355.

*Cal.* 2-phyllus. *Cor.* infundibuliformis tubo clauſo carnoſo, limbo 4-fido. *Nectar.* annulus fauci tubi corollae inſertus ſtaminiferus. *Germen* pedicellatum. *Legumen* acinaciforme 4-8 ſpermum.

### *1. IONESIA *pinnata.*

Ioneſia. *Roxb. Aſiat. Reſearches* 4. *p.* 355. *
Asjogam. *Rheed. malab.* 5. *p.* 117. *t.* 59.
Gefiederte Ioneſie. W.
*Habitat in* India *orientali.* ♄

Arbor *mediocris*. Folia *alterna impari-pinnata, foliolis quadri-ſ. ſexjugis oblongo-lanceolatis glabris nitidis primis*. Flores *aurantii coloris cymoſi breviſſime pedunculati terminales et axillares*. Roxb.

## 720. DRACONTIUM.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 630.

*Spatha* cymbiformis. *Spadix* floribus denſe tectus. *Cal.* o. *Cor.* 5-petala. *Bacca* polyſperma.

### 1. DRACONTIUM *polyphyllum.*

D. foliis ſupradecompoſite-pedatis, laciniis pinnatifidis, ſcapo petiolis multo breviore. W.

D. ſcapo breviſſimo, petiolo radicato lacero, foliolis tripartitis, laciniis pinnatifidis. *Hort. cliff.* 434. * *Roy. lugdb.* 6. *Mill. dict. n.* 2.

Arum polyphyllum caule ſcabro punicante. *Herm. parad.* 93. *t.* 93.

Arum polyphyllum ſurinamenſe, caule atrorubente glabro et eleganter variegato. *Plük. alm.* 52. *t.* 149. *f.* 1. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 10. *p.* 150.

Vielblättrige Zehrwurz. W.

*Habitat* Surinami *et paſſim inter tropicos* Aſiae. 4

### 2. DRACONTIUM *ſpinoſum.*

D. foliis ſagittatis, pedunculis petiolisque aculeatis. *Fl. zeyl.* 328. *Mill. dict. n.* 3.

Arum zeylanicum ſpinoſum ſagittae foliis. *Herm. prod.* 75.

Arum minus zeylanicum ſagittae foliis. *Raj. ſuppl.* 575. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 10. *p.* 150.

Stachliche Zehrwurz. W.

*Habitat in* Zeylona. 4

### 3. DRACONTIUM *foetidum.*

D. foliis ſubrotundis concavis. *Cold. noveb.* 214. * *Kalm. it.* 3. *p.* 47. *Gron. virg.* 141.

Calla aquatilis, odore allii vehemente praedita. *Gron. virg.* 1. *p.* 186.*

Arum americanum betae folio. *Cateſb. car.* 2. *p.* 71. *t.* 71. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 10. *p.* 151.

Stinkende Zehrwurz. W.

*Habitat in* Virginiae, Carolinae *aquis*. 4

*An* Pothos *potius ſpecies*?

4. DRACONTIUM *camtchatcenſe.*

D. foliis lanceolatis, ſpatha membranacea colorata baſi convoluta. W.

D. foliis lanceolatis. *Amoen. acad.* 2. *p.* 360. *Mill. dict. n.* 4.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 10. *p.* 152.

Camtſchatiſche Zehrwurz. W.

*Habitat in* Sibiria. 4

Folia *ſpithamaea inferne attenuata in petiolos baſi dilatatos.* Spatha *lanceolata membranacea colorata, inferne convoluta.* Spadix *nudus.* Spica *ovata denſiſſima.*

*5. DRACONTIUM *lanceaefolium.*

D. foliis ovato-lanceolatis, ſpatha viridi plana. W.

D. foliis lanceolatis, ſpatha viridi ſpadicem multoties ſuperante. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 612. *Collect.* 4. *p.* 118. *

Lanzenblättrige Zehrwurz. W.

*Habitat ad* Caraccas *in arboribus paraſiticum.* 4

6. DRACONTIUM *pertuſum.*

D. caule ſcandente, foliis cordato-ovatis pertuſis. W.

D. foliis pertuſis caule ſcandente. *Mill. dict. n.* 1. *ic. t.* 296. *Iacq. hort. Schoenb.* 2. *p.* 29. *t.* 184. 185. *

Arum hederaceum amplis foliis perforatis. *Plum. amer.* 40. *t.* 56. 57.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 10. *p.* 152.

Durchlöcherte Zehrwurz. W.

*Habitat in* America *meridionali.* ♄ (v. v. ſ. ſ.)

## 721. CALLA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 1388.

*Spatha* plana. *Spadix* tectus floſculis. *Cal.* 0. *Cor.* 0. *Bacca* polyſperma.

1. CALLA *aethiopica.*

C. foliis ſagittato-cordatis, ſpatha cucullata, ſpadice ſuperne maſculo. *Hort. cliff.* 435. *Mill. dict. n.* 1. *Lederm. microſc.* 37. *t.* 18. 19.

Arum aethiopicum flore albo odorato moſchum olente. *Comm. hort.* 1. *p.* 95. *t.* 50.

Arum americanum ari vulgaris facie, foliis carnoſis. *Mich. flor.* 9. *t.* 9.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 10. *p.* 153.

Capſches Schlangenkraut. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24 (v. v.)

2. CALLA *paluſtris.*

C. foliis cordatis, ſpatha plana, ſpadice undique hermaphrodito. *Hort. cliff.* 456. *Fl. ſuec.* 744. 822. *Mill dict. n.* 2. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 1. *Fabr. helmſt.* 42. *Pollich. pal. n.* 865. *Fl. dan.* 422. *Hoffm. germ.* 321. *Roth. germ.* 1. 384.
C. foliis cordatis. *Fl. lapp.* 320.
Dracunculus paluſtris ſ. radice arundinacea. *Bauh. pin.* 195.
Dracunculus aquatilis. *Dod. pempt.* 330.
Provenzalia paluſtris. *Petit. gen.* 45.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 10. *p.* 154.
Gemeines Schlangenkraut. W.
*Habitat in* Europae *borealis paludibus.* 24 (v. v.)

3. CALLA *orientalis.* †

C. foliis ovatis. *Gron. orient.* 282. † *Mill. dict. n.* 3.
Arum minus orientale rotundioribus foliis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 544.
Arum Carſaami. *Rauw. it.* 115.
Orientaliſches Schlangenkraut. W.
*Habitat* Halepi *in montoſis.* 24

*Dubiam hanc plantam iterum propono, licet in noviſſimis ſyſtematis vegetabilium editionibus ſit omiſſa.* W.

## *722. HOUTTUYNIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 1389.

*Spatha* tetraphylla. *Spadix* floſculis tectus.
*Cal.* 0. *Cor.* 0. *Capſula?*

*1. HOUTTUYNIA *cordata.*

H. cordata. *Thumb. jap.* 234. *t.* 26. *
Herzblättrige Houttuynie. W.
*Habitat in* Japonia *inter* Miaco *et* Jedo *ubique in foſſis viarum et juxta villas vulgatiſſima.* 24
Caulis *ſimpliciſſimus erectus.* Folia *alterna petiolata cordata acuminata integerrima venoſa.* Stipula *ad petioli baſin lanceolata.* Pedunculus *petiolaris.* Spatha *inaequalis ſpadice longiore.* W.

# DIGYNIA.

## 723. LIMEUM.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 631.*

*Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5, aequalia. *Capſ.* globoſa, 2-locularis.

1. LIMEUM *africanum.*

L. foliis oblongis petiolatis. *Lin. ſuppl.* 214.

L. foliis ovato-lanceolatis ſubpetiolatis. *Thunb. prod.* 68.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 400.

Langliches Limeum. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24 (v. ſ.)

Statura *Corrigiolae ſ. Telephii.* Caules *proſtrati debiles, ſpithamaei, angulati, nudi, baſi perennantes.* Folia *alterna, remota, lineari-lanceolata, parva, ſubpetiolata.* Corymbi *terminales, ſolitarii, compoſiti, nudi, longius pedunculati.*

2. LIMEUM *capenſe.*

L. foliis ovatis ſeſſilibus. *Thunb. prod.* 68.

L. (*aphyllum*) foliis ovatis ſeſſilibus. *Lin. ſuppl.* 214.

Eyförmiges Limeum. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

*Videtur eſſe aphyllum.*

*3. LIMEUM *aethiopicum.*

L. foliis lineari-lanceolatis. *Thunb. prod.* 68.

Linienblättriges Limeum. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

# TETRAGYNIA.

## *724. ASTRANTHUS.

*Loureiro cochin. p.* 273.

*Cal.* 0. *Cor.* hypocrateriformis, limbo 14-fido. *Sem.* 1, parvum ſuperum.

*1. ASTRANTHUS *cochinchinenſis.*

A. cochinchinenſis. *Loureiro cochin.* 1. *p.* 274.

Cochinchineſiſche Sternblüte. W.

*Habitat in* Cochinchina. ♄

Arbor *mediocris, ramis paucis adſcendentibus.* Folia *ovata ſerrata lanuginoſa petiolata alterna.* Flos *pallidus duriuſculus, ſpicis longis ſimplicibus axillaribus.* Lour. l. c.

*Auctoritate Clariſſ. Swartz hoc genus aſſumſi, qui ſpecimen a Loureiro miſſum poſſidet, et diſtinctum genus eſſe, mihi in litteris ſcripſit.* W.

## 725. SAURURUS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 632.

*Cal.* amentum ſquamis 1-floris. *Cor.* 0. *Germ.* 4. *Baccae* 4, 1-ſpermae.

1. SAURURUS *cernuus.*

S. caule folioſo polyſtachio. *Syſt. veg.* 291.

S. foliis cordatis petiolatis, amentis ſolitariis recurvis. *Hort. upſ.* 91. *Sp. pl.* 2. *p.* 489. *Mill. dict. et illuſtr. Giſeck. ic. faſc.* 1. *n.* 7.

S. foliis profunde cordatis ovato-lanceolatis, ſpicis ſolitariis. *Hort. cliff.* 139. *Gron. virg.* 40. *Roy. lugdb.* 8. Serpentaria repens, floribus ſtamineis ſpicatis, bryoniae nigrae folio ampliore pingui. *Pluk. alm.* 343. *t.* 117. *f.* 3. 4. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 402.

Hängender Eydexenſchwanz. W.

*Habitat in* Virginia. 24 (v. v.)

Amenti *Squamae petiolatae, albae; at defloratae virescentes, pedicellis incurvatis ad rachin, germini incumbentibus.* Stamina *vix numerantur, niſi deflorato amento perſiſtentia.*

# *HEPTAGYNIA.*

## 726. SEPTAS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 633.

*Cal.* 7-partitus. *Petala* 7. *Germina* 7. *Capſ.* 7, polyſpermae.

1. SEPTAS *capenſis.*

Septas. *Amoen. acad.* 6. *afr.* 13. *

Craſſula (*Septas*) foliis connatis crenatis ſubrotundis, caule ſubaphyllo umbellifero. *Thunb. prod.* 57.

Doronici? ſpecies pumila, auriculae urſi folio glabro. *Pluk. mant.* 65. *t.* 340. *f.* 9.

Trientalis foliis ſubrotundis crenatis. *Roy. lugdb.* 538. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 404.

Capſcher Siebenling. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24 *Dav. v. Royen.* (v. ſ.)

## *Classis VIII.*

# OCTANDRIA.

## *MONOGYNIA.*

### * *Flores completi.*

743. MIMUSOPS. *Cor.* 8-petala. *Cal.* 8-phyllus, inferus. *Drupa.*

745. CUPANIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* 3-locularis, loculis monoſpermis. *Sem.* arillatum.

765. DIMOCARPUS. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-dentatus. *Baccae* 2, monoſpermae.

727. TROPAEOLUM. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-fidus, inferus, calcaratus. *Nuces* 3.

779. BAECKEA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-fidus, ſuperus. *Capſ.* 4-locularis.

747. EPHIELIS. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-partitus, *Capſ.* 1-locul. 2-ſperma.

748. MOLINAEA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-partitus. *Capſ.* 3-locul. 3-valvis.

742. HONCKENYA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Nectar.* ſtaminiformia! *Capſ.* echinata.

751. HAGENIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 2-phyll. *Nectar.* 5-phyllum.

766. MEMECYLON. *Cor.* 4-petala. *Cal.* integerrimus, ſuperus.

734. COMBRETUM. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 5-dentatus, ſuperus. *Sem.* 4.

738. ROXBURGHIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus inferus. *Antherae* nectario inſertae. *Capſ.* 2-valvis.

732. EPILOBIUM. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus tubuloſus ſuperus. *Capſ.* 4-locularis. *Sem.* comoſa.

731. GAURA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus tubuloſus ſuperus. *Nux* 1-ſperma.

---

Coma *dicitur lana pappiformis in ſeminibus pericarpio inclusis.*

Pappus *ergo tantum in plantis gymnoſpernis adeſt, eſt calycis ſpecies.* W.

730. OENOTHERA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus tubulosus superus. *Capsul.* 4-locul. *Anther.* lineares.

735. VIVIANNIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus inferus. *Nux* 1-sperma.

729. RHEXIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus. *Capsul.* 4-locularis supera. *Anth.* arcuatae.

728. OSBECKIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus. *Capsul.* 4-locularis infera. *Anth.* rostratae.

757. TETRATHECA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus. *Antherae* 4-loculares! *Capsul.* 2-locularis.

756. GRISLEA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-dentatus, inferus. *Capsul.* 1-locularis.

750. KOELREUTERIA. *Cor.* 4-petala nectario cylindrico. *Cal* 5-phyllus. *Capsul.* 3-locularis.

752. PERSOONIA. *Cor.* 4-petala nectario cylindrico. *Cal* 4-partitus. *Capsul.* 1-locul. polysperma.

753. GUAREA. *Cor.* 4-petala nectario cylindrico. *Cal.* 4-dentatus, inferus. *Capsul.* 4-locularis, 4-valvis. *Sem.* solitaria.

741. CORREA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-dentatus. *Capsul.* 4-locul. loculis 1-spermis.

753. ANTICHORUS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus, inferus. *Capsul.* 4-locul. 4-valvis polyspermia.

740. ALLOPHYLUS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus, inferus. *Stigma* 4-fidum.

739. ORNITROPHE. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus inferus. *Styl.* 2-fidus. *Baccae* 2, monospermae.

744. IAMBOLIFERA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-dentatus, inferus. *Filamenta* planiuscula. *Drupa.*

746. XYLOCARPUS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-dentatus inferus. *Nect.* 8-fidum. *Drupa* sicca.

757. XIMENIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus. *Nect.* 0. *Drupa* 1-sperma.

763. LAWSONIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus, inferus. *Bacca* 4-locularis.

749. MELICOCCA. *Cor.* 4-petala, refracta. *Cal.* 4-partitus. *Drupa* corticosa. *Stigm.* peltatum, anceps.

755. AMYRIS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-dentatus, inferus. *Bacca* 1-sperma.

764. MELICOPE. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-partitus. *Capsul.* 4, monospermae.

775. GNIDIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus corollifer. *Nux* monosperma.

758. FUCHSIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus corollif. *Bacca* 4-locularis, polyſperma.

754. HEDWIGIA. *Cor.* 4-fida. *Cal.* 4-dentatus. *Capſ.* tricocca.

760. MICHAUXIA. *Cor.* 8-partita. *Cal.* 16-partitus. *Capſ.* 8-locularis.

759. CHLORA. *Cor.* 8-fida. *Cal.* 8-phyllus, inferus. *Capſ.* 1-locul. 2-valvis, polyſperma.

768. VACCINIUM. *Cor.* 1-petala. *Cal.* 4-dentatus, ſuperus. *Filam.* receptaculi. *Bacca.*

769. MENZIESIA. *Cal.* repandus inferus. *Cor.* 1-petala. *Filam.* receptaculi. *Capſula.*

770. ERICA. *Cor.* 1-petala. *Cal.* 4-phyllus, inferus. *Filam.* receptaculi. *Capſula.*

† *Rizophora Mangle. Aeſculus Pavia. Monotropa Hypopithys Ruta graveolens. Iuſſiaeae nonnullae ſpecies. Portulaca quadrifida. Portulaca meridiana. Capparides duae. Duis octandra. Ammannia octandra. Fagara octandra. Melaſtomae nonnullae ſpecies. Trichilia pallida, acuminata. Gilibertia ovata, heterophylla. Elais. Cleome juncea.*

* * *Flores incompleti.*

771. OPHIRA. *Cal.* 0. *Involucr.* 2-valve triflorum. *Cor.* 4-petala ſupera. *Bacca* 1-locularis.

772. GRUBBIA. *Cal.* 0. *Involucr.* 2-phyll. triflorum. *Cor.* 4-petala infera.

767. BUGINVILLAEA. *Cal.* 0. *Cor.* tubuloſa ſubintegra. *Stam.* incluſa.

778. LACHNAEA. *Cal.* 4-fidus, corollinus, inaequalis. *Stam.* exſerta.

774. DIRCA. *Cal.* elimbis, corollinus, inaequalis. *Stam.* exſerta.

773. DAPHNE. *Cal.* 4-fidus, corollinus, aequalis. *Stam.* incluſa. *Drupa* pulpoſa monoſperma.

777. PASSERINA. *Cal.* 4-fidus, corollinus, aequalis. *Stam.* ſupra corollam.

776. STELLERA. *Cal.* 4-fidus, corollinus, aequalis. *Stam.* incluſa. *Nux.*

761. DODONAEA. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 0. *Capſ.* 3-locularis.

762. VALENTINIA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 0. *Capſ.* baccata 4-ſperma.

756. CEDROTA. *Cal.* 6-partitus. *Cor.* o.

† *Rivina octandra.* *Samyda nitida.* *Caſearia ſpinoſa, tomentoſa.*

## *D I G Y N I A.*

783. CODIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Involucrum* 4-phyllum.

782. WEINMANNIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Capſ.* 2-locularis, 2-roſtris.

784. MOEHRINGIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Capſ.* 1-locularis.

780. SCHMIEDELIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 2-phyllus. *Pericarp.* 2, pedicellata.

781. GALENIA. *Cor.* o. *Cal.* 4-fidus. *Capſ.* 2-locularis, 2-ſperma.

† *Chryſoſplenium.* *Polygonum penſylvanicum.*

## *T R I G Y N I A.*

788. SERIANA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Samarae* 3.

787. PAULLINIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* 3-locularis, 1-ſperma.

789. CARDIOSPERMUM. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Capſ.* 3-locul. 1-ſperma.

791. PONAEA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-partitus. *Capſ.* 3-locul. 3-ſperma.

790. SAPINDUS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Bacca* 3-*cocca*, 1-ſperma.

786. COCCOLOBA. *Cor.* o. *Cal.* 5-partitus. *Bacca* calycina, 1-ſperma.

785. POLYGONUM. *Cor.* o. *Cal.* 5-partitus. *Sem.* 1, nudum.

## *T E T R A G Y N I A.*

794. ADOXA. *Cor.* 4 ſ. 5-fida, ſupera. *Cal.* 2-phyllus. *Bacca* 4 ſ. 5-ſperma.

792. VEREA. *Cor.* 4-fida. *Cal.* 4-fidus. *Capſ.* 4, polyſpermae.

796. HALORAGIS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus. *Drupa* ſicca 4-loculàris.

795. ELATINE. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Capſ.* 4-locularis.

793. PARIS. *Cor.* 4-petala, ſubulata. *Cal.* 4-phyllus. *Bacca* 4-locularis.

797. FORSKOLEA. *Cor.* 8-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Sem.* 4.

† *Petiveria alliacea.* *Myriophyllum verticillatum.*

## *PENTAGYNIA.*

† *Cotyledon laciniata.*

## *OCTOGYNIA.*

† *Phytolacca octandra, ſtricta.*

---

Samara *eſt pericarpium mono-vel diſpermum, non dehiſcens, apice vel margine ala membranacea inſtructum.* W.

# *MONOGYNIA.*

## 727. TROPAEOLUM.

*Gen. pl. edit. Schreb. n.* 634.

*Cal.* 1-phyllus, calcaratus. *Petala* 4, inaequalia. *Nucès* 3, coriaceae.

### 1. TROPAEOLUM *minus.*

T. foliis peltatis subrepandis mucronatis, petalis acutis. W.
T. foliis integris, petalis acuminato-setaceis. *Hort. upsal.* 93. *Mill. dict. n.* 1. *Curt. mag.* 98.
T. foliis peltatis orbiculatis. *Hort. cliff.* 145.
Cardamindum minus et vulgare T. *Feuill. peruv.* 3. *p.* 14. *t.* 8.
Nasturtium indicum minus. *Bauh. pin.* 306.
Nasturtium indicum. *Lob. ic.* 516. *f.* 2, 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 406.
Kleine Capucinerkresse. W.
*Habitat in* Peru, Limae *innotuit* 1580. *per Dodonaeum.*
⊙ 4 (v. v.)

### 2. TROPAEOLUM *majus.*

T. foliis peltatis repandis, petalis obtusis. W.
T. foliis peltatis subquinquelobis, petalis obtusis. *Hort. upsal.* 93. *Mat. med.* 101. *Mill. dict. n.* 2. *Knorr. del.* 1. *tab. R.* 18. *Regn. bot.*
T. foliis peltatis orbiculatis. *Hort. cliff.* 143.
Cardamindum ampliori folio et majori flore. *T. Feuill. peruv.* 3. *p.* 14. *t.* 8.
Acriviola maxima odorata. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 244.
Viola inodora scandens, nasturtii sapore, maxima odorata. *Herm. lugdb.* 628. *t.* 629.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 407.
Grosse Capucinerkresse. W.
*Habitat in* Peru, *unde in Europam venit* 1684. *cura Bewerningii.* ⊙ 4 (v. v.)
*Flores ante crepusculum fulminant, observante E.C. Linnaea.*

### 3. TROPAEOLUM *hybridum.*

T. foliis subpeltatis quinquelobis, lobis obtusis subrepandis, petalis cuneatis apice dentatis. W.
T. foliis subpeltatis quinquelobis integerrimis, petalis

variantibus. *Mant.* 64. *Berg. act. holm.* 1765. *p.* 32. *t.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 408.
Baſtard Capucinerkreſſe.
*Habitat nullibi, a praecedente noviter orta Holmiae in Horto* Ehrenreich, *ſemine rarius, ſed ramis propaganda planta.* H. V.

Statura *Tropaeolorum reliquorum magnitudine reliquisque.* Folia *differunt, quae non peltata, ſed latius cuneata, nutantia, fere quinqueloba: lobis acutiuſculis, nuda, nervoſa, venoſa, petiolis triplo breviora, margine omni adſcendente, praeprimis laterali, qui cum oppoſita baſi coadunatus, uti ibi fere cucullatum euadat folium et omnium laeviſſime peltatum.* Nectarium *obtuſum.* Corolla *vix unquam determinata.*

## 4. TROPAEOLUM *peregrinum.*

T. foliis ſubpeltatis quinquelobo-palmatis ſubdentatis, petalis laciniatis. W.
T. foliis ſubpeltatis quinquelobis dentatis, petalis ciliato-laceris. *Mant.* 371.
T. petalis ſerrato-inciſis duobus maximis, tribus minimis. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 51. *t.* 68. *

Cardamindum quinquefolii folio, vulgo Malla. *Feuv. peruv.* 2. *p.* 756. *t.* 42.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 409.
Fremde Capucinerkreſſe. W.
*Habitat in* Peru. ⊙ (v. v.)

Folia *leviter peltata, profunde* 5 *fida: lacinia media* 3*-loba; proximis lobo unico exteriore.* Petala *vix calyce longiora, ciliato-multifida.* Calycis *tubulus craſſiuſculus, corolla multo longior.*

*Petala ſunt calyce longiora laciniata ciliata pallide flava.* W.

## *5. TROPAEOLUM *pentaphyllum.*

T. foliis quinatis, foliolis integerrimis acutis, petalis calyce brevioribus integerrimis acutis. W.
T. foliis digitato-quinatis foliolis ovalibus integris ſubpetiolatis, petalis omnibus ſeſſilibus brevibus acutis integerrimis. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 605. *t.* 277. *f.* 2. *
Fünfblättrige Capucinerkreſſe. W.
*Habitat ad* Monte Video *in* Bonaria.

## 728. OSBECKIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 635.

*Cal.* 4-fidus: Lobis fquama ciliari interftinctis. *Cor.* 4-petala. *Antherae* roftratae. *Capf.* 4-locularis, calycis tubo truncato cincta.

### 1. OSBECKIA *chinenfis.*

O. foliis feffilibus, calycibus glabris. W.

O. foliis feffilibus, pedunculis axillaribus trifloris bracteatis. *Lin. fuppl.* 215.

Ofbeckia. *Ofb. it.* 213. *t.* 2. *

*Houttuyn Lin. Pfl. Syft.* 3. *p.* 413.

Chinefifche Ofbeckie. W.

*Habitat in* China; *in honorem* Petr. Ofbeck, *Sueci, qui* 1751. *plantas* Chinae *et* Iavae *periculofo itinere adiit, legit, examinavit, defcripfit, communicavit.*

*Habitus Melaftomae.* Caulis *erectus, brachiatus, acute tetragonus.* Folia *anguflo-lanceolata, trinervia, oppofita, fcabra, fubfeffilia.* Flores *terminales aliquot feffiles, cincti foliis* 4 *flore longioribus patentibus.*

### 2. OSBECKIA *zeylanica.*

O. foliis petiolatis calycibus hifpidis. W.

O. foliis petiolatis, pedunculis axillaribus unifloris nudis. *Lin. fuppl.* 215.

Echinophora maderafpatana, fideritis non ferratis nervofis foliis, fructu capfulari caucalidis acumi[illegible]. *Pluk. alm.* 142. *t.* 173. *f.* 4.

Kadali maderafpatanum minus, capfulis pilofis. *Pluk. fuppl. app.* 236.

Zeylanifche Ofbeckie. W.

*Habitat in* Zeylona. (v. f.)

*Facies* O. chinenfis.

Folia *petiolata lineari-lanceolata acuta tenuiffime apice ferrata, ut tota planta ftrigofa.* Flores *terminales tres vel quatuor pedunculati, et in axillis folitarii pedunculati.* Calyx *fetis longis tectus.* W.

*Ofbeckiae a Rhexiis differre videntur germine infero, quum capfula Rhexiae calyce inclufa.* W.

## 729. RHEXIA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 636.

**Cal.** 5-fidus. *Pet.* 4, calyci inserta. *Antherae* declinatae. *Caps.* 4-locularis, intra ventrem calycis.

* *Foliis sessilibus.*

1. RHEXIA *virginica.*

R. foliis sessilibus lanceolatis trinerviis serrato-ciliatis, calycibus glanduloso-ciliatis. W.

R. foliis sessilibus serratis, calycibus glabris. *Gron. virg.* 41. *Mill. dict. n.* 1.

Alisanus vegetabilis carolinianus. *Pluk. amalth.* 8.

Lysimachia non papposa virginiana, tuberariae foliis hirsutis, flore tetrapetalo rubello. *Pluk. alm.* 235. *t.* 202. *f.* 8.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 410.

Virginische Rhexie. W.

*Habitat in* Virginia. 4. (v. s.)

Caulis *tetragonus angulis membranaceis.* Folia *opposita, sublanceolata, internodiis longiora, sessilia, trinervia, pilis vagis hispidiuscula, subserrata serraturis setaceis.* Pedunculus *terminalis, dichotomus.* Flores *solitarii ex dichotomia, subsessiles, petalis rubris; Antheris falcatis, luteis.*

2. RHEXIA *mariana.*

R. foliis sessilibus lanceolatis trinerviis villoso-ciliatis, calycibus stellato-pilosis. W.

R. foliis ciliatis. *Mill dict. n.* 2.

Lysimachia non papposa, terrae marianae, leptoneuros, flore tetrapetalo rubello, folio et caule hirsutie ferruginea hispidis. *Pluk. mant.* 123. *t.* 428. *f.* 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 411.

Marianische Rhexie. W.

*Habitat in* Marilandiae *pratis.* 4

*Calyx adspersus setis apice stellatis.*

*3. RHEXIA *trichotoma.* †

R. foliis sessilibus ovato-lanceolatis trinerviis villoso-ciliatis, pilis calycinis fasciculatis glandulosis. W.

R. floribus solitariis axillaribus terminalibusque, foliis sessilibus oppositis lanceolatis hirsutis. *Vahl. symb.* 2. *p.* 48.*

R. caule inferne trichotomo, apicibus dichotomis filiformibus, floribus solitariis subsessilibus. *Rottb. pl. surinamens. p.* 9. *tab.* 5. *

Aestige Rhexie. W.

*Habitat* Surinami. ♄

*4. RHEXIA *bivalvis.*

R. decandra, foliis sessilibus glabris ovatis obtusis trinervia, capsula bivalvi. W.

R. glabra, decandra, foliis oblongis sessilibus obscure crenatis obtusis, pedunculis terminalibus unifloris. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 38. *

Melastoma (*bivalvis*) caule alato, foliis ovatis obtusis trinervis sessilibus. *Aubl. guj.* 1. *p.* 404. *t.* 155. *f.* 4. *

Zweyklappige Rhexie. W.

*Habitat in pratis paludosis* Gujanae. ⊙

*5. RHEXIA *trivalvis.*

R. decandra, foliis sessilibus glabris lineari-lanceolatis acutis, obsolete trinerviis, capsula trivalvi. W.

R. glabra, decandra, foliis lineari-lanceolatis sessilibus supra punctatis integerrimis, pedunculis unifloris. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 39. *

Melastoma (*trivalvis*) foliis linearibus acutis, capsula trivalvi. *Aubl. guj.* 1. *p.* 406. *t.* 155. *f.* 6. *

Dreyklappige Rhexie. W.

*Habitat in pratis paludosis* Gujanae. ⊙

6. RHEXIA *Jussiaeoides.*

R. foliis alternis costatis margine scabris. *Lin. suppl.* 215.

Jussieuaartige Rhexie. W.

*Habitat in* Surinamo. *C. G. Dalberg.* ♄

Frutex *pubescens uti pedunculi et fructus quadripedalis.* Folia *alterna subsessilia confertiuscula lanceolata vix digitalia, magis secunda, margine scabra ex minutissimis serraturis costata, nervis subtus prominulis.* Flores *axillares solitarii pedunculati vix foliorum longitudine flavi.* Perianthium *medium fere superum quadripartitum lanceolatum acutum patens persistens.* Petala *quatuor subovata calyce duplo longiora sessilia.* Filamenta *octo breviora.* Antherae *incumbentes lineares longitudine calycis s. filamentis longiores.* Germen *inferum longitudine calycis prominulum.* Stylus *cylindricus longitudine staminum.* Stigma *recutitum verrucosum.* Capsula *obovata tetragona longitudine caly-*

*cis, apice inter calycem laminulis quatuor, quadriloculari*s. Semina *numerosa parva. Singulare quod stigma nudum verrucosum indivisum ovatum, quasi margine quadridentato cinctum, quodque capsula intra calycem prominens, quasi quatuor laminis adglutinatis notata. Affinis Epilobiis et Oenotheris, sed absque calyce tubuloso.*

* * *Foliis petiolatis.*

*7. RHEXIA *hypericoides.* W.

R. decandra, villosissima, foliis ovatis acutis integerrimis brevissimis petiolatis, septemnerviis, panicula terminali. W.

Melastoma (*villosa*) foliis sessilibus ovatis acutis, floribus corymbosis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 428. *t.* 168.

Wollige Rhexie. W.

*Habitat in pratis humidis* Cajennae. ⊙

*Facies Hyperici montani.* W.

8. RHEXIA *glutinosa.*

R. foliis ovatis trinerviis laevibus, floribus thyrsoideis.

*Lin. fil. suppl.* 240.

Icon. *Mutis. amer. v.* 1. *t.* 6.

Klebrige Rhexie. W.

*Habitat* in nova Granada. ♄

*Arbuscula frondosa Melastomis similis, ramulis articulatis alternatim canaliculatis.* Folia *opposita petiolata confertiuscula elliptica integerrima trinervia pollicaria laevia.* Flores *subthyrsoidei, vix foliis longiores pedunculati.* Calyx *monophyllus campanulatus quadrifidus patulus.* Capsula *infera quadripartita s. quadriloc*ularis *calyce brevior obtusa, loculis se distinguentibus, polysperma. Summitates ramulorum et calyces glutinosi.*

9. RHEXIA *Acisanthera.*

R. foliis petiolatis ellipticis obtusis crenatis, floribus axillaribus solitariis pedunculatis alternis. W.

R. floribus alternis axillaribus pedunculatis quinquefidis. *Amoen. acad.* 5. *p.* 396. *

Acisanthera erecta ramosa, ramulis quadratis, foliolis trinerviis ovatis crenatis oppositis, floribus singularibus. *Brown. jam.* 217. *t.* 22. *f.* 1.

*Houttuyn. Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 412.

Winkelblütige Rhexie. W.
*Habitat in* Jamaica.

*10. RHEXIA *glomerata.*
R. foliis petiolatis ovatis integerrimis trinerviis villosis, floribus terminalibus glomeratis. W.
R. caule ramosissimo hirsuto, floribus glomeratis pedunculatis, calycibus hirsutissimis. *Roettb. pl. surinamens. p.* 8. *t.* 4.*
Gedrengtblütige Rhexie. W.
*Habitat in* Surinami *pratis depressis.*

*11. RHEXIA *longifolia.*
R. pilosa, decandra, foliis lanceolatis integerrimis quinquenerviis, pedunculis axillaribus terminalibusque dichotomis foliis brevioribus. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 59.*
Langblättrige Rhexie.
*Habitat in* America *meridionali.*

*12. RHEXIA *aspera.*
R. decandra, foliis petiolatis ovatis quinquenerviis, calyce squamoso-bracteato. W.
Tibouchina aspera. *Aubl. guj.* 1. *p.* 446. *t.* 177.*
Scharfe Rhexie. W.
*Habitat in aridis* Gujanae. ♄
Rami, petioli *foliorum* nervi *et* margines *sunt muricati asperi.* Calyx *squamis adpressis imbricatis tectus.* Pedunculi *uniflori axillares solitarii, et terni in ramorum apice.* W.

*13. RHEXIA *inconstans.*
R. foliis ovatis hispidis, setis adpressis, subtus incanis trinerviis, pedunculis terminalibus subunifloris. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 37.*
Osbeckia (*ornata*) foliis petiolatis, floribus terminalibus umbellulatis decandris. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 647.*
Melastoma (*ornata*) foliis trinerviis integris rigidis supra hispidis, setis adpressis subtus incanis, umbellis quadrifidis terminalibus paucifloris, capsulis hispidis. *Swartz prod.* 69.
Unbeständige Rhexie. W.
*Habitat in summo monte* Montanfery *insulae* St. Christophori, *inque cacumine vulcani supra lavam muscis obtectam insulae* Montserrat. ♄
*Numerus staminum valde inconstans.* W.

*14. RHEXIA *latifolia.*

R. foliis petiolatis subrotundis acutis quinquenerviis hirsutis, pedunculis terminalibus unifloris. W.
R. folio amplo subrotundo villoso, flore violaceo. *Aubl. guian.* 1. *p.* 336. *t.* 129. *f.* 2.
Breitblättrige Rhexie. W.
*Habitat in pratis* Gujanae.

*15. RHEXIA *villosa.*

R. foliis petiolatis subrotundo-ovatis acutis quinquenerviis villosis, floribus geminis terminalibus subsessilibus. W.
R. foliis subrotundis, caulibus decumbentibus. *Aubl. guian.* 1. *p.* 334. *t.* 129. *f.* 1.*
Haarige Rhexie. W.
*Habitat in pratis* Gujanae.

*16. RHEXIA *aquatica.*

R. foliis oppositis cordatis crenulatis hirsutiusculis, paniculis terminalibus trichotomis, ramulis filiformibus patentissimis. *Swartz. Fl. ind. occid.* 2. *p.* 650. *
Melastoma (*aquatica*) foliis quinquenerviis cordatis acutis crenulatis superne hirtis subtus laevibus, paniculis terminalibus trichotomis diffusis. *Swartz. prod.* 37.
Melastoma (*aquatica*) foliis cordatis crenatis supra hirsutis ferrugineis subtus laevibus, floribus albis paniculatis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 430. *tab.* 169. *
Waſſer Rhexie. W.
*Habitat in inundatis* Cajennae, Surinami, Jamaicae, Dominicae. ♄

*17. RHEXIA *uniflora.*

R. foliis petiolatis ovatis serratis, floribus axillaribus solitariis decandris, caule dichotomo. *Vahl. symbol.* 2. *p.* 48. *
Einblütige Rhexie. W.
*Habitat in* Cajenna.

Caulis *herbaceus ex quatuor alis decurrentibus tetragonus pilis apice glandulosis adspersus, viscosus.* Folia *seminuncularia obscure trinervia, margine e pilis glandulosis ciliata serrata, suprema angustiora sublanceolata.* Calyces *pilosi.* Petala *lanceolata.* Capsulae *bilobae magnitudine seminis Coriandri.* Vahl. l. c.

## 730. OENOTHERA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 637.

*Cal.* 4-fidus tubulosus. *Petala* 4. *Capſ.* 4-locularis 4-valvis cylindrica, infera. *Sem.* nuda.

### 1. OENOTHERA *biennis.*

O. foliis ovato-lanceolatis planis, caule muricato-villoso, ſtaminibus corolla brevioribus. W.

O. foliis ovato-lanceolatis planis, caule muricato-villoso. *Virid. cliff.* 33. *Hort upſ.* 94. *Gron. virg.* 254. *Roy. lugdb.* 251. *Gort. geld.* 78. *Kalm. it.* 3. *p.* 509 *Hall. helv. n.* 994. *Mill. ic. t.* 89. *f.* 2. *Oed. dan.* 446. *Pollich. pul. n.* 368. *Kniph. cent.* 1. *n.* 67. *Roth. germ. I.* 168. *II.* 439. *Hoffm. germ.* 132.

O. foliis ovato-lanceolatis denticulatis, floribus lateralibus in ſummo caulis. *Hort. cliff.* 144.

Onagra biennis. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 451.

Lyſimachia lutea cornuculata. *Bauh. pin.* 245. 516 * *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 271. *ſ.* 3. *t.* 11. *f.* 7.

Hyoſcyamus virginianus. *Alp. exot.* 325. *t.* 324.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 413.

Gemeine Nachtkerze. W.

*Habitat in* Virginia, *unde* 1614, *nunc vulgaris Europae.* ♂ (v. v.)

### *2. OENOTHERA *grandiflora.*

O. foliis ovato-lanceolatis, ſtaminibus declinatis, caule fruticoſo. *Ait. Kew.* 2. *p.* 2.

Groſsblütige Nachtkerze. W.

*Habitat in* America *borcali.* ♂ (v.v.)

Caulis, folia *et* germina *glabra.* Corolla *flava maxima petalis vix retuſis.* Stamina *declinata.* W.

### 3. OENOTHERA *parviflora.*

O. foliis ovato-lanceolatis planis, caule laevi ſubvilloſo, ſtaminibus corolla longioribus. W.

O. foliis ovato-lanceolatis planis, caule laevi ſubvilloſo. *Sp. pl.* 492.

O. foliis lanceolatis dentatis, caule hiſpido. *Mill. ic.* 189. *f.* 1.

O. foliis lanceolatis, capſulis ventricoſo-conicis. *Zinn. goett.* 199.

*Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 414.

Kleinblütige Nachtkerze. W.
*Habitat in* America *septentrionali.* ♂ (v. v.)

*Fructus apex coronatus margine octifido, nec quadrifido, uti O. biennis, cui simillima.* Caulis *ruber, scaber.* Folia *repando-subdentata, minus mollia.* Calyx *tubo suo quadruplo brevior, infra apicem denticulo notatus, hinc ante explicationem mucrones in hac distantes.* Petalorum *latera distantia, dimidio minora praecedentis petalis.* Capsulae *quadrivalves.*

4. OENOTHERA *muricata.*

O. foliis lanceolatis planis, caule purpurascente muricato, staminibus longitudine corollae. W.

O. foliis lanceolatis planis, caule purpurascente muricato. *Syst. Veg.* 296. *Murray. nov. Comment. Goett. VI. p.* 24. *t.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 415.
Weichstachliche Nachtkerze. W.
*Habitat in* Canada. ⊙ ♂ (v. v.)

Similis *parviflorae, sed* Fructus *os non* 8*-fidum.* Caulis *puncta rubra sparsa.*

5. OENOTHERA *longiflora.*

O. foliis denticulatis, caulibus simplicibus pilosis. petalis distantibus bilobis. *Iacq. hort. t.* 172. *Curt. mag.* 365.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 415.
Langblütige Nachtkerze. W.
*Habitat in agro* Bonariensi. ⊙ ♂. H. V. (v. v.)

Folia radicalia *numerosa, lato-lanceolata, denticulata, pubescentia costa alba, oblique nervosa.* Caules *saepius* 5, *enati infra folia radicalia, simplicissimi, adscendentes, hirti, virides pilis longis patulis albis.* Caulis *centralis serius excrescit.* Folia caulina *ovato-oblonga, denticulata, sessilia, radicalibus similia.* Flores *axillares superiorum foliorum, germine calyceque pilosis.* Calyx *tubo insigniter elongato, limbo suo triplo longior.* Petala 4, *flava, obcordata, biloba, magnitudine* O. biennis, *si non majora, lateribus distantia: altero die rubra.* Fructus *similes* O. biennis, *sed longior, inferne angustior, ore connivente minus scabro.*

*Differt ab* O. biennis, *quae foliis caulinis submidis, subpetiolatis; Caule erecto; Ramis lateralibus, vix manifeste pilosis; Petalis approximatis, vix emar-*

*ginatis nec bifidis; Calycis tubo vix laciniis duplo longiore.*

- - - - *ab* O. molliſſima *Caule non ramoſo; Foliis latioribus, nec molliter pubeſcentibus.*

- - - - *ab* O. parviflora *Caule non rubro; Floribus majoribus.*

6. OENOTHERA *molliſſima.*

O. foliis lanceolatis undulatis. *Vir. cliff.* 33. *Gron. virg.* 42. *Roy. lugdb.* 251. *Mill. dict. n.* 4. *Kniph. cent.* 4. *n.* 57.

O. foliis lineari-lanceolatis dentatis, floribus e medio caule. *Hort. upſ.* 144.

Onagra bonarienſis villoſa, flore mutabili. *Dill. elth.* 297. *t.* 219. *f.* 286.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 417.

Weichblättrige Nachtkerze. W.

*Habitat in agro* Bonarienſi. ⊙ (v. v.)

*7. OENOTHERA *nocturna.*

O. foliis lanceolatis repando-dentatis pubeſcentibus, caule tereti pubeſcente. W.

O. foliis lanceolatis dentato-ſerratis planis, caule laevi ſubvilloſo ramoſo. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 455. *Collect.* 3. *p.* 205.*

Capiſche Nachtkerze. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ⊙ (v. v.)

Caulis *teres ramoſus pubeſcens.* Folia *lanceolata utrinque attenuata, remotè denticulata pubeſcentia.* Corolla *magnitudine praecedentis, petalis rotundatis obtuſis flavis,* Petala *marceſcentia ſunt rubicunda.* W.

*8. OENOTHERA *villoſa.* †

O. foliis lanceolatis villoſis, caule angulato hirſuto. *Thunb. prod.* 175.

Haarige Nachtkerze. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

*Neſcio an ſit a praecedente diverſa, ſed folia in O. noctura ſunt pubeſcentia nec villoſa, caulis laevis nec ſulcatus.* W.

*9. OENOTHERA *odorata.*

O. foliis lineari-lanceolatis denticulatis undulatis pubeſcentibus glaucis, caule hirto. W.

O. foliis lineari-lanceolatis ſubdentatis undulatis, caule villoſo ſuffruticoſo. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 456. *Collect. ſuppl.* 107.*

Wohlriechende Nachtkerze. W.
*Habitat ad* Champion river *in* Patagonia. 4 (v. v.)
Caulis *teres hirtus.* Folia *breviſſime petiolata ſubſeſſilia lineari-lanceolata glauca r gida undulata utrinque pubeſcentia.* Flores *magnitudine O. longiſlorae flavi.* Cälycis *tubus petalorum longitudine, laciniae obtuſae ſub apice mucronatae.* Petala *obcordata.* W.

10. OENOTHERA *ſinuata.*
O. foliis dentato-ſinuatis, capſulis priſmaticis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 3.
O. foliis dentato-ſinuatis, caulis apice nutante. *Syſt. Veg.* 296. *Murray. in Nov. Comm. Goett. V. p.* 44. *t.* 9. *
Oenothera repanda. *Medicus in Act. palat.* 3. *p.* 198. *tab.* 8.
O. (*laciniata*): Caulis ſeſquipedalis, glabra: folia pinnatifido-laciniata; flores flavi; annua; caroliniana. *Hill. hort. Kewenſ.* 172. *Veget. Syſt. vol.* 12. *append. t.* 10.
Lyſimachia corniculata maritima, ſinuatis et pubeſcentibus foliis, virginiana. *Pluk. alm.* 235. *t.* 203. *f.* 33. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 418.
Ausgeſchweifte Nachtkerze. W.
*Habitat in* Virginia. ⊙ (v. v.)
Caulis *ſimplex, teres, pedalis, erectus, apice nutans, junior piboſus, ſenior glabriuſculus:* Rami *alterni.* Folia *alterna, ſeſſilia, lato-lanceolata, nuda, obliqua, dentato-ſinuata lateribus magis baſin propius.* Flores *axillares, ſeſſiles, ſolitarii, piloſi calyce et germine.* Calyx *acutus, ſub apice mucronatus, tubo adſcendens.* Germen *ante antheſin declinatum.* Corolla *Petalis 4, flavis, obcordatis, longitudine foliorum calycis.* Capſula *cylindrica, quadrangularis angulis planis, truncata, apice profunde excavato quadrifido: lobis emarginatis; quadrivalvis.*
Dormit *noctu foliis ſuperioribus excavatis.*

*11. OENOTHERA *tetraptera.*
O. foliis lanceolatis baſi pinnatifido-dentatis, capſulis pedicellatis obovatis quadrialatis. W.
O. foliis alternis ſubpinnatis criſpis, flore mutabili, fructu tetraptero. *Cavan. ic.* 3. *p.* 40. *t.* 279. *
Vierflügliche Nachtkerze. W.
*Habitat in* Sotoluca, Novae Hiſpaniae. 4 (v. v.)

Folia *lanceolata petiolata basi ad medium usque pinnatifida.* Flores *pedunculati maximi fere hujus generis candidi, post florescentiam purpurei.* Calycis *tubus superne dilatatus.* Petala *levissime obcordata.* Capsula *hirta pedunculo superne incrassato suffulta subrotundo-obovata quadrialata hirta.* W.

*12. OENOTHERA *fruticosa.*

O. foliis lanceolatis subdentatis acutis, capsulis pedicellatis oblongo-clavatis angulatis. W.

O. foliis lanceolatis subdentatis, capsulis pedicellatis acutangulis, racemo pedunculato. *Sp. pl.* 492. *Curt. mag.* 332.

O. foliis lanceolatis, floribus terminalibus paniculatis. *Gou. hort.* 193.

O. florum calyce monophyllo, hinc tantum aperto. *Gron. virg.* 42.

Onagra angustifolia, caule rubro, flore minore. *Tournef. inst.* 392.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 418.

Staudige Nachtkerze. W.

*Habitat in* Virginia. 4 (v. v.)

Calyx *purpurascens, tetraphyllus, sed rumpitur altero saepius et unico latere.* Flores *parvi, albi.* (*lutei. W.*) Tubus *filiformis, angustissimus.* Capsula *angulis 4 acutis compressis.* Folia *rarius denticulata.*

15. OENOTHERA *pumila.*

O. foliis lanceolatis integerrimis obtusis, capsulis subpedicellatis elliptico-obovatis angulatis. W.

O. foliis lanceolatis obtusis glabris subpetiolatis, caulibus prostratis, capsulis acutangulis. *Sp. pl.* 493. *Curt. mag.* 355.

O. foliis radicalibus ovatis, caulinis lanceolatis obtusis, capsulis ovatis obtusis. *Mill. dict. t.* 188.

Lysimachia siliquosa glabra minor mariana, angustioribus foliis. *Plük. mant.* 123.

Lysimachia marilandica parva, foliis angustis acutis. *Raj. suppl.* 416.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 419.

Niedrige Nachtkerze. W.

*Habitat in* America *septentrionali.* 4 (v. v.)

Caulis *palmaris, herbaceus, teres, flexuosus, divaricatissimus.* Folia *elliptico-lanceolata, integerrima.* Flores *axillares, solitarii, erecti, subsessiles.* Petala

*lutea, obcordata, lineata.* Capſulae *obovatae, obtuſae octangulares, angulis quatuor latioribus compreſſis quadrivalvis.* Radix *perennis.*

* 14. OENOTHERA *roſea.*

O. foliis ovatis utrinque attenuatis dentatis, inferioribus lyratis, capſulis pedicellatis oblongo-obovatis angulatis. W.

O. foliis ovatis dentatis, inferioribus lyratis, capſulis clavatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 3.

Roſenrothe Nachtkerze. W.

*Habitat in* Peru. 4 (v. v.)

Petala *obtuſa rubra.* W.

15. OENOTHERA *purpurea.*

O. foliis glauceſcentibus glabris lanceolatis integerrimis utrinque attenuatis obtuſis, capſulis ſeſſilibus ovatis angulatis. W.

O. (*purpurea*) foliis ovato-lanceolatis glauceſcentibus integerrimis, capſulis ſeſſilibus, ſtigmate atropurpureo. *Curt. mag.* 352.

Oenothera humilis. *Dom ind. hort. cantab.* 41.

Purpurfarbene Nachtkerze. W.

*Habitat in* America *boreali ad latus occidentale.* ⊙ (v. v.)

Caulis *ſemipedalis teres glaber.* Folia *glauco-viridia glabra integerrima.* Flores *magnitudine et colore Epilobii hirſuti.* Calycis *tubus corolla brevior.* Petala *obtuſa non emarginata ſubundulata.* Capſulae *ſeſſiles ovatae ſulcato-angulatae.* W.

*Diſtinguitur tribus notis characteriſticis, nempe:* foliis *glaucis*, floribus *purpureis et* ſtigmate *atropurpureo*, Curtis l. c.

## 731. GAURA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 638.

*Cal.* 4-fidus, tubuloſus. *Cor.* 4-petala adſcendens verſus latus ſuperius. *Nux* infera, 1-ſperma, 4-angula.

1. GAURA *biennis.*

G. foliis lanceolatis dentatis, petalis obovatis adſcendentibus patulis, ſtylis ſtaminibusque deflexis, caule herbaceo. W.

Gaura. *Amoen. acad.* 3. *p.* 26. *Act. holmenſ.* 1756. *p.*

222. *t.* 8. * *Giseck. ic. fasc.* 1. *n.* 8. *Mill. dict. n.* 1. *Curt. mag.* 389.

Lysimachia Chamaenerio similis floridana, foliis nigris punctis, capsulis carinatis in ramulorum cymis. *Pluk. amalth.* 159. *t.* 428. *f.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 404.

Krautartige Prachtkerze. W.

*Habitat in* Virginia, Pensylvania. ♂ (v. v.)

*2. GAURA *fruticosa.*

G. foliis lineari-lanceolatis denticulatis, petalis obovato-lanceolatis adscendentibus adpressis, stylis staminibusque rectis, caule fruticoso. W.

G. caule fruticoso. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 457. *Collect.* 1. *p.* 142. *

Strauchartige Prachtkerze. W.

*Habitat in* America *meridionali.* ♄

*Simillima praecedenti sed exceptis notis indicatis, adhuc* foliis *angustioribus*, floribus, *decies fere minoribus et* glabritie *distinctissima. Convenit vero fructibus ovatis subsessilibus.* W.

*3. GAURA *mutabilis.*

G. foliis ovatis dentatis, petalis ovatis acutis cruciatim patentibus, stylis staminibusque rectis, caule fruticoso. W.

G. (*mutabilis*) foliis sessilibus alternis serratis, petalis orbiculato-acutis. *Cavan. ic. rar.* 3. *p.* 30. *t.* 258. *

Oenothera (*anomala*) caule fruticoso, foliis ovato-lanceolatis dentatis, floribus Oenotherae, fructibus Gaurae. *Curt. mag.* 388.

Bastard Prachtkerze. W.

*Habitat in* Nova Hispania. ♄ (v. v.)

Caulis *fruticosus teres pubescens.* Folia *brevissime petiolata pilosiuscula ovata dentata acuta, apice mucronata.* Corolla *flava ut in Oenotheris cruciatim patens, nec petalis unilateralibus.* Fructus *ellipticus utrinque attenuatus levissime sulcatus. Gauris hanc plantam nec Oenotheris adsociavi, quum primarius hujus generis character consistat in fructu, nec in petalorum situ. Differt enim Gaura ab Oenotheris fructu, ut Oenothera ab Epilobiis semine.* W.

## 732. EPILOBIUM.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 639.

*Cal.* 4-fidus tubulosus. *Petala* 4. *Capſ.* oblonga infera. *Sem.* comosa.

* *Staminibus declinatis.*

### 1. EPILOBIUM *angustifolium.*

**E.** foliis sparsis lineari-lanceolatis integerrimis **venosis,** floribus inaequalibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 4.

**E.** foliis sparsis lineari-lanceolatis, floribus inaequalibus. *Oed. dan.* 289. *Gmel. sib.* 3. *p.* 164. *Reyg. ged.* 1. *p.* 107. *n.* 1. *Pollich. pal. n.* 369. *Gun. norv. n.* 57. *Knoph. cent.* 11. *n.* 41. *Hoffm. germ.* 132. *Roth. germ. I.* 166. *II.* 433.

**E.** (*spicatum*) foliis alternis lanceolatis glabris transversim nervosis, pedunculis ebracteatis, spica pyramidata. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 370.

**E.** flore difformi, foliis lanceolatis, transversim nervosis. *Hall. helv. n.* 1000.

Chamaenerion angustifolium. *Scop. ed.* 2. *n.* 455.

Epilobium floribus difformibus, pistillo declinato. *Fl. suec.* 304, 327.

**E.** foliis lanceolatis integerrimis. *Fl. lapp.* 146. *Hort. cliff.* 154. *Roy. lugdb.* 250.

Lysimachia Chamaenerion dicta angustifolia. *Bauh. pin.* 245.

β. Lysimachia Chamaenerion dicta latifolia. *Bauh. pin.* 245.

Epilobium latifolium. *Schmidt. bohem. n.* 372.

*Houttuyn Lin. Ifl. Syſt.* 6. *p.* 421.

Schmalblättriges Weidenröslein. W.

*Habitat in* Europa *boreali.* 4 (v. v.)

### *2. EPILOBIUM *angustissimum.*

**E.** foliis sparsis linearibus oblolete denticulatis **aveniis,** petalis aequalibus integerrimis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 5. *Curt. mag.* 76.

Epilobium angustissimum. *Web. dec. pl. minus cognit. p.* 3.

**E.** (*rosmarinifolium*) floribus inaequalibus, staminibus pistilloque declinatis, foliis erectis sparsis lineari-angustissimis, apice calloso-mucronatis. *Haenke in Iacq. Collect.* 2. *p.* 50. * *Hoffm. germ.* 134.

E. (*angustifolium*) foliis sparsis linearibus enerviis, pedunculis unibracteatis. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 370. *

E. (*Halleri*) foliis sparsis linearibus integerrimis, floribus inaequalibus. *Retz. prod. scand. ed.* 2. *n.* 458.

Epilobium Dodonaei. *Allion. pedem. n.* 1016.

E. flore difformi foliis linearibus. *Hall. helv. n.* 1001.

Epilobium angustifolium γ. *Sp. pl.* 494.

Chamaenerion alpinum angustifolium, flore purpureo. *Scheuchz. it.* 1. *p.* 33. 4. *p.* 332. *Tournef. inst.* 302.

Chamaenerion Gesneri sive Delphinium buccinum Dioscoridis. *Lobel. ic.* 343.

Lysimachia siliquosa speciosa angustifolia. *Bauk. hist.* 2. *p.* 907.

Lysimachia Chamaenerion dicta alpina. *Bauh. pin.* 245. *prodr.* 116. *Moris. hist.* 2. *p.* 270. *s.* 3. *t.* 11. *f.* 2.

Pseudolysimachium purpureum minus. *Dod. pempt.* 65.

Rosmarinblättriges Weidenröslein. W.

*Habitat in* Groenlandia, *inque alpibus* Helvetiae, Sabaudiae, Galliae, Austriae, Carnioliae. 4 (v. s.)

## 5. EPILOBIUM *latifolium.*

E. foliis alternis oppositisque lanceolato-ovatis subintegerrimis pubescentibus aveniis, floribus inaequalibus. W.

E. foliis alternis lanceolato-ovatis, floribus inaequalibus. *Gmel. sib.* 3. *p* 164. *n.* 34. *Flor. dan. t.* 565. *Gunn. norv. n.* 1066.

È. (*frigidum*) foliis oppositis alternisque lanceolatis subdentatis glabris, floribus axillaribus solitariis. *Retz. prod. Scand. ed.* 2. *n.* 459.

Epilobium corymbosum *Act. Haf.* 10. *p.* 440. *t.* 8. *f.* 23. *Houttuyn Lin. Syst.* 6. *p.* 422.

Breitblättriges Weidenröslein. W.

*Habitat in* Sibiria, Norvegia, Islandia *et* Groenlandia. 4 (v. s.)

*Differt a praecedentibus floribus duplo majoribus, foliis lanceolato-ovatis, alternis nec sparsis, utrinque laevissimo tomento mollissimis. Haec et prima differunt a sequentibus in non paucis: his enim* Flores *inaequales petalis integris;* Stamina *basi conniventia ad Stylum;* Pistillum *declinatum;* Folia *alterna;* Folia *erumpentia revoluta contra ac in reliquis.*

*E. latifolium a nonnullis Botanicis in Germania observatum, est E. angustifolii varietas.* W.

** *Staminibus erectis regularibus, petalis bifidis.*

4. EPILOBIUM *hirsutum.*

E. foliis oppositis alternisque subamplexicaulibus ovato-lanceolatis serratis glabriusculis venis hirsutis, caule ramosissimo hirsuto. W.

E. foliis oppositis lanceolatis serratis decurrenti-amplexicaulibus. *Hort. cliff.* 145. *Fl. suec.* 305, 328. *Gron. virg.* 154. *Roy. lugdb.* 261. *Fl. dan.* 326, *Gmel. sib.* 3. *p.* 165. *Pollich. pal. n.* 370. *Kniph. cent.* 5. *n.* 28.

Epilobium grandiflorum. *Hoffm. germ.* 133. *Roth. germ. I.* 167. *II.* 434. *Allion. pedem. n.* 1018.

Epilobium ramosum. *Hudf. angl.* 162.

Epilobium amplexicaule. *Lamarck encycl.* 2. *p.* 371.

E. foliis semiamplexicaulibus, lanceolatis, hirsutis. *Hall. helv. n.* 995.

Chamaenerion hirsutum. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 452.

Lysimachia siliquosa hirsuta, magno flore. *Bauh. pin.* 245. *Horiſ. hiſt.* 2. *p.* 270. *t.* 11. *f.* 3.

Lysimachia purpurea. *Fuchs. hist.* 491.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 423.

Grosblutiges Weidenröslein. W.

*Habitat in* Europae *humidiusculis.* 4 (v. v.)

*Planta subhirsuta. Foliorum basis media altior lateralibus.*

5. EPILOBIUM *pubescens.*

E. foliis oppositis alternisque subsessilibus lanceolatis denticulatis utrinque pubescentibus, caule simplici villoso. W.

E. (*pubescens*) foliis lanceolatis subpetiolatis pubescentibus, caule villoso simplicissimo. *Roth. germ. I.* 167. *II.* 435.

E. (*villosum*) foliis oblongo-lanceolatis dentatis pubescentibus, caule tereti villoso. *Ait. Kew.* 2. *p* 5.

Chamaenerion (*parviflorum*) foliis oppositis lanceolatis serratis cauleque villosis. *Schreb. spicil. p.* 146. *Hoffm. germ.* 133. *Retz prod. scand. ed.* 2. *n.* 461.

E. (*molle*) foliis oppositis subpetiolatis lanceolatis denticulatis mollissimis villoso-pubescentibus. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 371.

Epilobium hirsutum. *Hudſ. angl.* 161. *Allion. pedem. n.* 1017.

Epilobium hirsutum 3. *Sp. pl.* 494.

Lysimachia siliquosa hirsuta parvo flore. *Bauh. pin.* 245.

*prod.* 116. *Fl. dan. t.* 347. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 270. *ſ.* 3. *t.* 11. *f.* 4.
Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta flore minore. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 906.
Lyſimachia ſiliquoſa 2. *Tabern.* 355.
Behaartes Weidenröslein. W.
*Habitat ad foſſas inque pratis* Europae. 4 (v. v.)

*6. EPILOBIUM *villoſum.*
E. foliis alternis lanceolatis ſerratis hirſutis. *Thunb. prod.* 75.
Capſches Weidenröslein. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

7. EPILOBIUM *montanum.*
E. foliis oppoſitis ovatis dentatis. *Fl. lapp.* 147. *Fl. ſuec.* 306, 329. *Hort. cliff.* 145. *Roy. lugdb.* 251. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 165. *Gunn. norv. n.* 56. *Pollich. pal. n.* 371. *Knoph. cent.* 11. *n.* 42. *Hoffm. germ.* 135.
E. foliis ovato-lanceolatis, glabris, dentatis. *Hall. helv. n.* 996.
Chamaenerion montanum. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 453.
Lyſimachia ſiliquoſa glabra major. *Bauh. pin.* 24.
Pſeudo-Lyſimachium purpureum primum. *Dod. pempt.* 85.
β. Lyſimachia ramoſa glabra, Violae ſurrectae foliis ſplendentibus. *Bocc. muſ.* 32. *t.* 16. *ex Hall.*
γ. Chamaenerion (*roſeum*) foliis oppoſitis alternisque ovato-lanceolatis, petiolis ſerratis glabris. *Schreb. ſpicil.* 147. *Retz. obſ.* 1. *p.* 16. *Hoffm. germ.* 133. *Roth. germ. I.* 168. *II.* 438.
δ. E. (*alpeſtre*) foliis oppoſitis alternisve ovatis denticulatis ſubſeſſilibus glabris, caule ſimpliciſſimo obtuſangulo, floribus axillaribus ſubſeſſilibus, capſulis utrinque attenuatis tetragonis. *Schmidt. bohem. n.* 377. *
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 424.
Berg Weidenröslein. W.
*Habitat in* Europae *montoſis.* ♂ (v. v.)
*Caulis molliſſimus. Folia glabra.*
Variat *foliis ternis et quaternis.* R.

*8. EPILOBIUM *glabellum.*
E. foliis oblongis dentatis obtuſis, imis oppoſitis, caule teretiuſculo erecto. *Forſt. prod. n.* 160.
Glattes Weidenröslein. W.

*Habitat in* Nova Zeelandia.

*9. EPILOBIUM *rotundifolium.*

E. foliis oppositis subrotundis denticulatis. *Forst. prod. n.* 161.

Rundblättriges Weidenröslein. W.

*Habitat in* Nova Zeelandia.

10. EPILOBIUM *tetragonum.*

E. foliis lanceolatis denticulatis, imis oppositis, caule tetragono. *Sauv. monsp.* 75. *Pollich. pal. n.* 372. *Knipb. cent.* II. *n.* 43. *Fl. dan. t.* 1029. *Hoffm. germ. I.* 167. *II.* 436.

E. foliis lanceolatis, glabris, dentatis. *Hall. helv. n.* 997.

Chamaenerion tetragonum. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 454.

Lysimachia siliquosa glabra minor. *Bauh. pin.* 303. *Raj. hist.* 801.

Lysimachia minor. *Tabern. ic.* 184.

β. Chamaenerion (*obscurum*) foliis oppositis alternisque lanceolatis glabris serratis basi decurrentibus. *Schreb. spicil.* 147. * *Hoffm. germ.* 134. *Roth. germ. I.* 168. *II.* 438.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 425.

Vierkantiges Weidenröslein. W.

*Habitat in* Europa. 24 (v. s.)

*Folia tenera macula livida. Summitas, adhuc tenella, nutans.* Stigma *certissime integerrimum. Willich. obs.* 69. *Moench.* R.

11. EPILOBIUM *palustre.*

E. foliis oppositis lanceolatis integerrimis, petalis emarginatis, caule erecto. *Fl. suec.* 307, 330. * *Pollich. pal. n.* 373. *Hoffm. germ.* 133. *Roth. germ. I.* 167. *II.* 437.

E. foliis glabris ellipticis, integerrimis. *Hall. helv. n.* 998.

E. foliis linearibus. *Fl. lapp.* 149. *Roy. lugdb.* 251.

E. glabrum angustifolium. *Dill. giss. p.* 128. R.

Chamaenerion palustre. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 456.

Lysimachia siliquosa glabra angustifolia. *Bauh. pin.* 245.

Lysimachia siliquosa minor. *Tabernaem. p.* 856. R.

β. Epilobium foliis lanceolatis, ramose florens. *Fl. lapp.* 148.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 426.

Sumpf Weidenröslein. W.

*Habitat in* Europae *humidiusculis. β. in alpibus.* 4 (v. v.)
*In hoc et tetragono* Stigma *crassiusculum clavatum, apice subquadrifidum.* Leers. *n.* 288.

12. EPILOBIUM *alpinum.*

E. foliis oppositis ovato-lanceolatis integerrimis, filiquis sessilibus, caule repente. *Flor. dan. t.* 522.
E. foliis ovalibus: superioribus attenuatis. *Fl. suec.* 308, 331.
E. foliis ovato-oblongis integerrimis. *Fl. lapp.* 150.
E. foliis glabris ovatis. *Hall. helv. n.* 999.
Chamaenerion alpinum, alsines foliis. *Scheuch. alp.* 132. 332.
Lysimachia siliquosa nana, prunellae foliis. *Bocc. mus.* 2. *p.* 161. *t.* 108.
*Houttuyn. Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 426.
Alpen Weidenröslein. W.
*Habitat in alpibus* Helveticis, Lapponicis, *in* Dania. 4 (v. s.)
*Repens est, primo vere florens germinibus sessilibus. Dubitat Hallerus, an Bocconis synonymon huc?* li.

## 735. ANTICHORUS.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 640.

*Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Capf.* supera, subulata, 4-locularis, 4-valvis. *Sem.* plurima.

1. ANTICHORUS *depressus.*

A. depressus. *Mant.* 64. *Lin. fil. fasc. p.* 3. *t.* 2.* *Vahl. symb.* 1. *p.* 27.
Iussiaea (*edulis*) caulibus prostratis, foliis longe petiolatis ovatis margine plicato serrato, floribus tetrapetalis octandris. *Forsk. descr.* 210.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 247.
Liegender Antichorus. W.
*Habitat in* Arabia. ☉
Corchoro *affinis, pusilla, procumbens planta.* Caules *terrae adpressi, teretes, palmares, alterne ramosi.* Folia *alterna, petiolata, ovalia, grosse serrata, glabra, subplicata.* Stipulae *subulatae.* Flores *axillares, bini, oppositi, brevissime pedunculati, lutei.* Pedunculi *crassiusculi:* Bracteis 2, *lateris superioris.* Fructus *cernui, arcte sub caule reflexi.* li. v.

## 734. COMBRETUM.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 641.

*Cal.* 4-dentatus, campanulatus, ſuperus. *Cor.* 4-petala, calyci inſerta. *Stamina* longiſſima. *Sem.* 1, quadrangulare: angulis membranaceis.

### 1. COMBRETUM *laxum.*

C. foliis oppoſitis, racemis laxis ebracteatis, calycibus interne villoſis. W.

C. ſpicis laxis. *Loeſl. it.* 308. *Swartz. obſ.* 143. *

C. foliis oppoſitis; ſpicis laxis ſimplicibus. *Iacq. amer.* 104. *

Gaura fruticoſa ſcandens, foliis oppoſitis. *Loeſl. it.* 248. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 406.

Schlaffblütiger Langfaden. W.

*Habitat in* America *meridionali.* 24

### 2. COMBRETUM *ſecundum.*

C. foliis oppoſitis, racemis ſecundis ebracteatis, calycibus glaberis. W.

C. ſpicis ſecundis. *Iacq. amer.* 103. *t.* 176. *f.* 30. *Swartz. obſ.* 144.

Combretum laxum. *Aubl. guj.* 1. *p.* 351. *t.* 137. *

*Houttuyn Lin. Iſl. Syſt.* 3. *p.* 407.

Einleitiger Langfaden. W.

*Habitat in fruticetis* Carthagenae. ♄

### *3. COMBRETUM *purpureum.*

C. foliis oppoſitis ovatis acutis, racemis ſecundis bracteatis, bracteis pedunculo brevioribus, floribus decandris. W.

C. (*purpureum*) foliis ovato-oblongis calycibusque nudis, ſpicis ſimplicibus ſecundis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 51. *

C. (*coccineum*) floribus decandris, ſpicis laxis paniculatis. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 727. *

Criſtaria coccinea. *Sonnerat it.* 2. *p.* 247. 140.

Rother Langfaden. W.

*Habitat in* Madagaſcar. ♄

Folia *ovata acuta.* Bracteae *lineari-lanceolatae pedunculis multo breviores.* W.

### *4. COMBRETUM *decandrum.*

C. foliis oppoſitis oblongis acuminatis, racemis laxis bra-

cteatis, bracteis flore longioribus, floribus decandris distichis.

Combretum decandrum. *Roxb. corom.* 1. *p.* 43. *t.* 59. *

Zehnfädiger Langfaden. W.

*Habitat in montosis sylvaticis* Indiae *orientalis.* ♄

Folia *oblonga acuminata.* Racemi *paniculati.* Flores *albi bracteis lanceolatis breviores.* Stamina *alternatim breviora corolla paulo longiora.* W.

*5. COMBRETUM *alternifolium.* †

C. foliis alternis, floribus decandris. *Iacq. amer.* 104. *

Wechselblättriger Langfaden. W.

*Habitat in* Carthagena. ♄

Rami *seniores aculeati.* Iacq. l. c.

## *735. VITMANNIA.

*Vahl symb.* 3. *p.* 51.

*Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-petala. *Nect.* squama ad basin filamentorum. *Nux* semilunata compressa monosperma.

*1. VITMANNIA *elliptica.*

V. elliptica. *Vahl. symb.* 3. *p.* 51. *t.* 60. *

Samandura. *Fl. zeyl.* 433. (*excluso synonymo Rheedi.*)

Samadera. *Gaert. sem.* 2. *p.* 352. *t.* 156. *f.* 3.

Elliptische Vitmannie. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄

Arbor *ramulis teretibus.* Folia *alterna petiolata elliptica acuta integerrima venosa glabra.* Flores *umbellati in ramorum apice ad foliorum axillas.* W.

## 736. GRISLEA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 642.

*Cal.* 4-fidus. *Petala* 4, ex incisuris calycis. *Filam.* longissima, adscendentia. *Caps.* globosa, supera, 1-locularis, polysperma.

1. GRISLEA *secunda.*

G. foliis petiolatis glabris, corymbis axillaribus secundis. W.

Grislea. *Hort. cliff.* 146. *Loefl. it.* 245. *

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 408.

Einſeitigblütige Griſlea. W.
*Habitat in* America *calidiore.* ♄

2. GRISLEA *tomentoſa.*

G. foliis ſeſſilibus ſubtus tomentoſis, corymbis axillaribus patulis. W.
Griſlea tomentoſa. *Roxb. corom.* 1. *p.* 29. *t.* 31. *
Lythrum (*fruticoſum*) foliis oppoſitis ſubtus tomentoſis, floribus decandris, corollis calyce, calyceque genitalibus brevioribus. *Sp. pl.* 641.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 7. *p.* 16.
Filzige Grislea. W.
*Habitat in collibus* Indiae *et* Chinae. ♄

Frutex *cortice lacero.* Folia *oppoſita ſeſſilia lanceolata integerrima ſubtus ſubtomentoſa.*

## *737. TETRATHECA.

*Smith. Nov. Holl.* 1. *p.* 5.

*Cal.* 4-fidus inferus. *Cor.* tetrapetàla. *Antherae* 4-loculares. *Capſ.* 2-locularis 2-valvis, valvulis medio ſeptiferis. *Sem.* ſubbina.

### *1. TETRATHECA *juncea.*

T. glabra, foliis alternis lanceolatis, caule acutangulo, ramis elongatis nudiuſculis. *Smith. Nov. Holl.* 1. *p.* 5. *t.* 2. *
Simſenartige Tetratheca. W.
*Habitat in* Nova Hollandia.

*Planta ſpecioſa, varians petalis roſeis et albis.* W

## *738. ROXBURGHIA.

*Roxb. corom.* 1. *p.* 29.

*Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Nectar.* foliola 4 lanceolata, medio petalorum inſerta, conniventia. *Antherae* geminae e baſi folii nectarii dependentes. *Capſ.* unilocul. bivalvis polyſperma. *Sem.* receptaculo ſpongioſo inſerta.

### *1. ROXBURGHIA *glorioſoides.*

R. glorioſoides. *Roxb. corom.* 1. *p.* 29. *t.* 32. *

Prachtlilienartige Roxburghie. W.
*Habitat ad radices montium* Indiae *orientalis.* 4
Planta *singularis medium inter Liliaceas et Asclepiadeas tenens.* Radix *tuberosa fusiformis.* Caulis *herbaceus scandens sulcatus.* Rami *alterni.* Folia *opposita petiolata cordata acuminata integerrima nervosa glabra.* Pedunculi *biflori axillares.* Bracteae *binae lanceolatae ad pedunculi divisionem.* Calyx *flavus corolla major.* Petala *purpurea.* W.

## *739. ORNITROPHE.

*Juss. gen. ed. Ust. p.* 274.

*Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-petala. *Stylus* 2-fidus. *Germen* didymum. *Baccae* 2, monospermae.

### *1. ORNITROPHE *integrifolia.* W.

O. foliis ternatis, foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, racemis subsimplicibus. W.
Ornitrophe. *Lamarck illust. t.* 309 *f.* 1.
Ganzblättriger Vogelpfeffer. W.
*Habitat in insula* Borbonia. ♄

### *2. ORNITROPHE *serrata.*

O. foliis ternatis scabris, foliolis petiolatis ovatis acuminatis serratis, racemis simplicibus. W.
Ornitrophe serrata. *Roxb. corom.* 1. *p.* 44. *t.* 61.
Gesägter Vogelpfeffer. W.
*Habitat in montosis* Indiae *orientalis.* ♄ (v. v.)

### 3. ORNITROPHE *Cobbe.*

O. foliis ternatis, foliolis petiolatis ovatis acutis serratis, subtus pubescentibus, racemis simplicibus, pedunculo tomentoso. W.
Rhus (*Cobbe*) foliis ternatis, foliolis ovatis acuminatis serratis, pedunculis tomentosis. *Sp. pl.* 382.
Rhois trifoliatae frutex salwaccensis, floribus juliformibus. *Pet. mus.* 678. *Raj. dendr.* 58.
Frutex trifolius spicatus, producens baccas nigras. *Burm. zeyl.* 101.
Kobbae. *Fl. zeyl.* 441.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 401.
Zeylanischer Vogelpfeffer. W.
*Habitat in* Zeylona. ♄ (v. s.)
Frutex *facie Rhois africanae.* Folia *alterna longis*

*petiolis, ternata aut quinato-digitata, foliolis herbaceis magnis ovatis acutis argute ſerratis.* Spicae *ſimplices raro ramoſae, ex alis: floſculis infinitis minimis, pedicellis minimis propriis adfixis.* Fl. zeyl.

*Poſſideo ſpecimen ſub nomine Rhois Cobbe a Koenigio miſſum, qui contendit eandem eſſe plantam, quod deſcribam.* Ramuli *teretes tomentoſi.* Folia *ternata, foliolis petiolatis ovatis acutis, nec acuminatis, ſerrata.* Folia *juniora ſunt ſubtus tomentoſa, adultiora vero pube mollt tecta.* Racemi *ſimplices indiviſi, pedunculo communi denſe tomentoſo.* W.

*Molago-Maram Rheed. mal. 5. p. 49. t. 25. huic affinis ſed racemis ramoſis diſtincta, a ſequenti etiam differre videtur, licet inflorescentia conveniat.* W.

4. ORNITROPHE *Cominia.*

O. foliis ternatis, foliolis petiolatis oblongis utrinque attenuatis ſubtus pubeſcentibus, racemis compoſitis. W.

Schmidelia (*Cominia*) foliis ternatis, foliolis petiolatis, racemis compoſitis. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 667. *

Allophylus (*Cominia*) foliis ternatis floribus paniculatis. *Swartz. prod.* 62.

Rhus (*Cominia*) foliis ternatis, foliolis petiolatis ovatis remotiſſime ſerratis ſubtus tomentoſis. *Amoen. acad.* 5. *p.* 395.

Toxicodendron arboreum. *Mill. dict. n.* 8.

Cominia arborea, foliis undulatis pinnato-ternatis, floribus minimis, racemis terminalibus. *Brown. jam.* 205.

Baccifera indica trifolia, fructu rotundo monopyreno. *Sloan. jam.* 170. *hiſt.* 2. *p.* 100. *t.* 208. *f.* 1. *Raj. hiſt.* 1593.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 404.

Riſpenblütiger Vogelpfeffer. W.

*Habitat in montoſis* Jamaicae *occidentalis.* ♄

*5. ORNITROPHE *occidentalis.*

O. foliis ternatis, foliolis ſubſeſſilibus, racemis ſimplicibus.

Schmidelia occidentalis. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 665. *

Allophylus racemoſus. *Swartz prod.* 62.

Weſtindiſcher Vogelpfeffer. W.

*Habitat in frutetis montoſis* Hiſpaniolae. ♄

Frutex 9-10 *pedalis ramoſus erectus.* Rami *tereti-*

*uſculi glabri.* Folia *ternata, foliolis ſubſeſſilibus approximatis, lateralibus baſi obliquis, oblongis baſi attenuatis, apice acuminatis venoſis glabris, ſubtus leviter tomentoſis.* Racemi *ſimplices longitudine petiolorum.* Flores *polygami, hermaphroditi et maſculi in diverſis fruticibus albi, parvi.* Swartz. l. c.

*6. ORNITROPHE *rigida.*

O. foliis ſimplicibus denticulato-ſpinoſis, floribus racemoſis.

Schmiedelia rigida. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 663. *

Allophylus rigidus. *Swartz prod.* 62.

Steifblättriger Vogelpfeffer. W.

*Habitat rarius in collibus montoſis aridis* Hiſpaniolae. ♄

*Ornitrophe diſtinguitur a Schmidelia ſtylo ſimplici bifido, quum Schmidelia ſtylis duobus bifidis gaudeat.* W.

## 740. ALLOPHYLUS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 643.

*Cal.* 4-phyllus: foliolis orbiculatis; oppoſitis minoribus. *Petala* 4, calyce minora. *Germen* didymum. *Stigma* 4-fidum.

1. ALLOPHYLUS *zeylanicus.*

A. zeylanicus. *Sp. pl.* 496.

Allophylus. *Fl. zeyl.* 140.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 1. *p.* 452.

Zeyloniſcher Allophylus. W.

*Habitat in* Zeylona. ♄

Arbor *Perſeae facie.* Rami *teretes.* Folia *ovalia acuminata ſpithamaea integerrima glabra venoſa alterna petiolata.* Racemi *ex alis parvi breviſſimi.* Fl. zeyl.

*Planta adhuc obſcura Ornitrophis et Schmideliae affinis.* W.

## *741. CORREA.

*Andrews. rep. bot.* 18.

*Cal.* campanulat. 4-dentatus. *Cor.* 4-petala, petali apice reflexis. *Capſ.* 4-locul. 4-valvis, loculis monoſpermis.

*1. CORREA *alba.*

Correa (*alba*) foliis ſubrotundis ſupra tomentoſis, ſubtus

lanigeris, floribus terminalibus quaternis albidis. *Andrews. repos. bot. p.* 18. *t.* 18. *

Weisse Correa. W.

*Habitat in* Nova Hollandia. ♄

Frutex *quadri-seu quinquepedalis, ramis oppositis teretibus.* Folia *opposita petiolata obovato-subrotunda integerrima venosa tomentoso-pubescentia, subtus villoso-tomentosa.* Flores *albi in umbella simplici terminali quadriflora collecti.* Pedunculus *communis vix ullus, proprii brevissimi.* W.

## *742. HONCKENYA. W.

*Willd. in Usteri delect. 2. p.* 200.

*Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Nectar.* staminiformia. *Caps.* echinata 5-locul. 5-valvis polysperma. *Sem.* arillata.

### *1. HONCKENYA *ficifolia.* W.

H. ficifolia. *Willd. in Usteri delect. 2. p.* 201. *tab.* 4. *

Feigenblättrige Honckenye. W.

*Habitat in* Guinea. ♄ (v. s.)

Caulis *lignosus, fruticosus vel arboreus, tomento fusco brevi tectus, teres ramosus.* Folia *alterna subtus tomento fulvo tecta, summa spathulato-oblonga obtusa dentata, inferiora tri-vel quinqueloba dentata, lobis obtusis.* Flores *terminales terni coeruleo-violacei. Valde affinis Aubletiae sed capsulae forma, nectariis staminiformibus, seminibusque arillatis diversa.* W.

## 743. MIMUSOPS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 644.

*Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Nectar.* 16-phyllum. *Drupa* acuminata.

### 1. MIMUSOPS *Elengi.*

M. foliis alternis ovatis acuminatis. W.

M. foliis alternis remotis. *Fl. zeyl.* 138. * *Roxb. corom.* 1. *p.* 15. *t.* 14. *

M. foliis alternis remotis acuminatis, stylis corollae longitudine. *Lamarck. encycl.* 4. *p.* 176. *t.* 500. *

Prunus malabarica fructu calyculato. *Iiaj. hiſt.* 1564. *Burm. ind.* 68. R.
Arbor zeylanica, floribus odoratis, faciem humanam quodammodo referentibus. *Burm zeyl.* 27. R.
Flos cuſpidum. *Rumph. amb.* 2. *p.* 189. *t.* 63.
Kauki indorum. *Pluk. alm.* 203. *Breyn. cent.* 20. *t.* 8.
Elengi. *Rheed. mal.* 1. *p.* 34. *t.* 20.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 457.
Spitzblättrige Spitzenblume. W.
*Habitat in* India. ♄ (v. f.)

*2. MIMUSOPS *hexandra.*
M. foliis alternis obovatis emarginatis, floribus hexandris. W.
Mimuſops hexandra. *Roxb. corom.* 1. *p.* 16. *t.* 15. *
Sechsfädige Spitzenblume. W.
*Habitat in montibus* Circarſienſibus Indiae. ♄

3. MIMUSOPS *Kauki.*
M. foliis alternis in apice ramorum confertis oblongis obtuſiſſimis. W.
M. foliis confertis. *Fl. zeyl.* 137. * *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 27.
M. (*obtuſifolia*) foliis alternis remotis obtuſis, ſtylis corolla longioribus. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 177. *
Binectaria. *Forſk. deſcr.* 82.
Metroſideros macaſſarenſis. *Rumph. amb.* 3. *p.* 19. *t.* 8. *Burm. ind.* 86.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 460.
Stumpfblättrige Spitzenblume. W.
*Habitat in* India. ♄ (v. f.)

4. MIMUSOPS *Imbricaria.*
M. foliis alternis in apice ramorum confertis, ovatis obtuſis retuſis, fructibus polyſpermis. W.
Imbricaria. *Juſſ. gen. ed. Uſteri p.* 169. *Lamarck illuſt. t.* 300.
Vielſaamige Spitzenblume. W.
*Habitat in inſula* Borbonia. ♄

## 744. IAMBOLIFERA.

*Gen. pl. ed. Reichardi n.* 513.

*Cal.* 4-dentatus. *Cor.* 4-petala. infundibulif.
*Filam.* planiuſcula. *Stigma* ſimplex.

1. IAMBOLIFERA *pedunculata.*
I. pedunculata. *Sp. pl.* 497. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 52. *t.* 61. *
*Dryand. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 232. *

Iambolifera. *Fl. zeyl.* 139.
Geſtielte Jambolane. W.
*Habitat in* India. ♄

Panicula *et* Flores *ad Myrtum accedunt.*

Arbor *ramis teretibus alternis.* Folia *oppoſita petiolata ovata acuta integerrima venoſa.* Panicula *corymboſa longe pedunculata divaricata multiflora axillaris foliis brevior.* W.

## 745. CUPANIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 645.

*Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala apice cucullata. *Styl.* 3-fidus. *Capſ.* 3-locularis 3-valvis, loculis ſubmonoſpermis. *Sem.* arillata.

* 1. CUPANIA *tomentoſa.*

C. foliis pinnatis, foliolis obovatis retuſis, inferne ferrugineo-tomentoſis. *Swartz. prod.* 61. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 657.
Trigonis tomentoſa. *Iacq. amer.* 102.
Filzige Cupanie. W.
*Habitat in montoſis ſylvaticis* Hiſpaniolae. ♄

2. CUPANIA *glabra.*

C. foliis pinnatis, foliolis ovatis obtuſis crenatis glabris. *Swartz. prod.* 61. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 659.
C. arborea, foliis oblongis crenato-ſerratis diſtiche et alternatim ſitis, racemis laxis propendentibus. *Brown. jam.* 178.
Cupania americana. *Sp. pl.* 290?
C. caſtaniae folio, fructu ſericeo et ramoſo. *Plum. gen.* 45. *ic.* 110?
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 4. *p.* 530.
Glatte Cupanie. W.
*Habitat in montoſis* Jamaicae, Hiſpaniolae. ♄
*Adhuc incertum eſt, an Linnaei et Plumieri planta ad hanc vel ad praecedentem pertineat.* W.

* 3. CUPANIA *Saponarioides.*

C. foliis pinnatis, foliolis oblongis attenuatis integerrimis, ſubtus ſcabris pubeſcentibus. *Swartz prod.* 62. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 661.

Seifenbaumartige Cupanie. W.
*Habitat in* India *occidentali.* ♄

## *746. XYLOCARPUS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 646.

*Cal.* 4-dentatus. *Cor.* 4-petala. *Nectar.* 8-fidum. *Filam.* nectario inserta. *Drupa* exsucca magna 4-s. 5-sulcata. *Nuces* 8-10, diformes.

*1. XYLOCARPUS *Granatum.*

X. Granatum. *Koenig Naturf.* 20. *p.* 2. *
Granatum littoreum. *Rumph. amb.* 3. *p.* 92. *tab.* 61.
Cadul gaha. *Cingalens.*
Candalanga. *Tamul.*
Indische Holzfrucht. W.
*Habitat in* India *orientali, in sylvis coenosis ad maris littora inter Rhizophoras.* ♄

Arbor *variae magnitudinis, saepius grandis, interdum fruticosa.* Truncus *erectus cortice fisso durofusco-castaneo tectus, mediocris.* Frons *oblonga, interdum subgloboso opaca.* Rami *majores sparsi, minores saepius oppositi, cortice cinereo-fusco tecti numerosi.* Folia *opposita patentia petiolata oblongo-clavata rotundata vel interdum oblonga acuta integerrima, pagina superiori vix convexa, glabra, nitida, obscure viridia, inferiori venosa, nervo magis prominulo rigidiusculo, foliis pomorum parum majora.* Petioli *patentes parum curvati teretiusculi subrugosi castanei breves.* Racemi *ad ramos sparsi, interdum axillares, erectiusculi pedunculati ovato-oblongi parvi foliis breviores, partiales oppositi, terminales saepius trichotomi parentissimi.* Pedunculi *teretes glabri tenaces colorati rubri nudi.* Pedicelli *flore breviores.* Koenig l. c.

## *747. EPHIELIS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 647.

*Cal.* 5-part. *Cor.* 5-petala. *Nectar.* squamae 10, binae singulo pàtalo insertae. *Caps.* 1-locul. 2-valvis disperma.

*1. EPHIELIS *fraxinea.* W.

Mataiba gujanensis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 331. *t.* 128. *

Eſchenblättriger Kronenbaum.
*Habitat in ſylvis* Gujanae *interioris.* ♄
Arbor 50-60 *pedalis.* Folia *alterna abrupte pinnata bi-tri-ſeu quadrijuga, foliolis petiolatis ovatis acuminatis integerrimis glabris.* Paniculae *ramoſae divaricatae terminales et axillares foliis longiores.* Flores *parvi albi.* W.

## *748. MOLINAEA.

*Iuſſ. Gen. ed. Uſteri.* 275.

**Cal.** 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Filam.* baſi villoſa. *Stylus* 0. *Capſ.* 3-locul. 5-valvis, loculis monoſpermis.

### *1. MOLINAEA *laevis.* W.

M. foliis pinnatis bijugis, corymbis paniculatis, fructibus obovato-truncatis triquetris. W.
Molinaea. *Lamarck. illuſt. gen. t.* 305. *f.* 1.
Glatte Molinäa. W.
*Habitat in inſula* Borbonia. ♄
Folia *abrupte pinnata, pinnulis oblongis obtuſis baſi attenuatis integerrimis bijugis.* Panicula *axillaris e corymbis parvis compoſita.* Capſulae *obovatae apice truncatae, triquetro-alatae.* W.

### *2. MOLINAEA *caneſcens.*

M. foliis pinnatis bijugis, racemis paniculatis, fructibus ovatis. W.
Molinaea caneſcens. *Roxb. corom.* 1. *p.* 43. *t.* 60. *
Graue Molinäa. W.
*Habitat in* montoſis Indiae *orientalis.* ♄
Cortex *ramorum cinereus ſcaber.* Folia *abrupte pinnata, pinnulis ellipticis acutiuſculis integerrimis bijugis.* Panicula *axillaris e racemis longis compoſita, foliis brevior.* Capſula *ovata trifulcata, non alata.* W.

### *3. MOLINAEA *alterniſolia.* W.

M. foliis pinnatis, foliolis alternis retuſis, panicula coarctata. W.
Molinaea. *Lamarck. illuſt. gen. t.* 305. *f.* 2.
Wechſelblättrige Molinea. W.
*Habitat in inſula* Borbonia. ♄
Folia *pinnata e foliolis octo obovato-oblongis leviſſime retuſis integerrimis petiolatis compoſita.* Pani-

cula *axillaris foliis brevior coarctata et corymbis parvis composita.* W.

*Genus Molinaea proxime ad Cupaniam accedit, sed stylo nullo et seminibus non arillatis diversum.* W.

## 749. MELICOCCA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 648.

*Cal.* 4-partitus. *Petala* 4, reflexa infra calycem. *Stigma* subpeltatum. *Drupa* corticosa.

### 1. MELICOCCA *bijuga.*

M. bijuga. *Sp. pl.* 495. *Swartz obs.* 146. *

Melicoccus bijugatus. *Jacq. amer.* 108. *t.* 72.

Melicoccus foliis ut plurimum bijugatis ovatis, per pennas alatas dispositis. *Browne jam.* 210.

Nux americana foliis alatis bifidis. *Comm. hort.* 1. *p.* 183. *t.* 94.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 466.

Gefiederte Honigfrucht. W.

*Habitat in* America *meridionali.* ♄

*Obnoxia Cocco hesperidum prae reliquis, ut Sapindus, cui simillima.*

## *750. KOELREUTERIA.

*Laxmann Act. petrop.* 16. *p.* 561.

*Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 4-petala irregularis. *Nect.* squamae 4, bifidae. *Caps.* 3-locularis, loculis dispermis.

### 1. KOELREUTERIA *paniculata.*

K. paniculata. *Laxmann Nov. Comment. petrop.* 16. *p.* 561. *t.* 18. * *Ait. Kew.* 2. *p.* 7. *Willd. arb.* 163. *

Koelreuteria paullinoides. *Herit. sert. angl.* 18. *t.* 19.

Sapindus (*chinensis*) foliis pinnatis, foliolis laciniatis. *Syst. veg.* 315. *Lin. suppl.* 228.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 503.

Rispentragende Koelreuterie. W.

*Habitat in* China. ♄ (v. v.)

Folia *alterna in pari-pinnata.* Foliola *petiolata oblongo-ovata laciniato-dentata basi cuneata, apice*

*obtusa utrinque glabra.* Panicula *axillaris angusta.* Flores *flavi.* W.

## 751. HAGENIA.

*Lam. illust. gen. t.* 311.

*Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 5-petala plana. *Nect.* foliola 5, petalis quadruplo breviora. *Capsula?*

*1. HAGENIA *abyssinica.* †

Cusso vel Banksia abyssinica. *Bruce itin. 5. p. 73.* * *cum icone. Editio germanica 5. p. 81. t. 22. 23.* *

Abyssinische Hagenie. W.

*Habitat in* Abyssinia. ♄

Arbor *ramis annulatis.* Folia *in ramorum apice conferta, interrupte pinnata cum impari, foliolis ovato-lanceolatis sessilibus argute serratis.* Petioli *basi dilatata.* Panicula *nutans flexuosa.* Flores *purpurascentes.* W.

## 752. PERSOONIA. W.

*Carapa Aubl. guj. 2. p. 22.*

*Cal.* 4-partitus. *Pet.* 4. *Nectar.* cylindricum octodentatum antheras gerens. *Capsul.* unilocularis quadrivalvis. *Nuces* difformes angulatae numerosae.

1. PERSOONIA *guareoides.*

Carapa gujanensis. *Aubl. guj. 2. p. 32. t. 387. Lamarck. illust. gen. t. 301.*

Guareaartige Persoonie. W.

*Habitat in* Gujanae *sylvis.* ♄

Arbor *simillima Guareae sed fructu abunde distincta.* Folia *alterna abrupte pinnata, foliolis multijugis integerrimis lanceolatis acuminatis petiolatis.* Panicula *ut in Guarea.* W.

*Dixi hoc genus in honorem C. H. Persoon, summi mycologi.* W.

## 753. GUAREA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 649.

*Cal.* 4-dentatus. *Petala* 4. *Nectar.* cylindricum, ore Antheras gerens. *Capſ.* 4-locularis, 4-valvis. *Sem.* ſolitaria.

1. GUAREA *trichilioides.*

G. trichilioides. *Mant.* 228. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 366. *t.* 210. * *Swartz obſ.* 146. *

Trichilia Guara. *Sp. pl.* 2. *p.* 551.

Melia (*Gaura*) floribus octandris. *Iacq. amer.* 126. *t.* 176. *f.* 37.

Elutheria arborea, foliis majoribus ovatis oppoſitis, petiolis brevibus ſubtumidis ganglionoſis. *Brown. jam.* 369.

Lauro affinis arbor, foliis latioribus ex adverſo ſitis, ligno moſchum olente. *Sloan. cat.* 137. *hiſt.* 2. *t.* 170. *f.* 1.

Guidonia, nucis juglandis foliis, major. *Plum. gen.* 4. *ic.* 147. *f* 2.

Iito. *Marcgr. braſ.* 169. *Piſ. braſ.* 79. *t.* 80.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 1. *p.* 450.

Trichiliartige Guarea. W.

*Habitat in* Braſilia *aliisque* Indiae *occidentalis locis.* ♄ (v. ſ.)

Flores *racemoſi.*

## *754. HEDWIGIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 1747.

*Cal.* 4-dentatus. *Cor.* tubuloſa quadriſida. *Capſ.* tricocca trilocularis. *Nuces* ſolitariae quolibet loculo.

*1. HEDWIGIA *balſamifera.*

H. balſamifera. *Swartz. prod.* 62. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 672. *

Bois cochon. *Nicolſon Hiſt. St. Doming. p.* 169.

Balſamiſche Hedwigie. W.

*Habitat in ſylvis montium* Hiſpaniolae *occidentalis.* ♄

Arbor *excelſa, cortice albido-cinereo.* Folia *alterna pedalia pinnata, foliolis oppoſitis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis glabris.* Racemi *termina-*

*les et axillares foliis breviores compositi erecti stricti.* Flores *subconferti parvi albidi.* Swartz. l. c.

## 755. AMYRIS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 650.

*Cal.* 4-dentatus. *Petala.* 4, oblonga. *Stigma* tetragonum. *Bacca* drupacea.

*1. AMYRIS *polygama.*

A. foliis simplicibus lanceolatis integerrimis, racemis simplicibus axillaribus numerosis. W.

A. (*polygama*) caule arboreo, foliis simplicibus sparsis lanceolato-ovatis integerrimis. *Cavan. ic.* 3. *p.* 20. *t.* 239. *

Geschlechtänderner Balsamstrauch. W.

*Habitat in* Chili. ♄

Arbor *polygama interdum mere mascula vel feminea. Variat interdum* calyce 5-*dentato*, petalis 5 *et* staminibus *decem.* W.

2. AMYRIS *Elemifera.*

A. foliis ternatis quinato-pinnatisque subtus tomentosis. *Mat. med.* 101.

Elemifera foliis ternatis. *Hort. cliff.* 486.

Cornus racemosa trifolia et quinquefolia. *Plum. ic.* 100.

Iccicariba. *Marcgr. bras.* 98.

Frutex trifolius resinosus, floribus tetrapetalis albis racemosis. *Catesb. car.* 2. *p.* 33. *t.* 33. *f.* 3.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 469.

Elemi Balsamstrauch. W.

*Habitat in* Carolina. ♄

3. AMYRIS *sylvatica.*

A. foliis ternatis crenatis acutis. *Iacq. amer.* 107.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 471.

Wald Balsamstrauch. W.

*Habitat* Carthagenae *copiose, in sylvis umbrosis maritimis, Augusto florens.* ♄

4. AMYRIS *maritima.*

A. foliis ternatis crenulatis obtusis. *Iacq. amer.* 107. *Swartz. obs.* 148.

A. fruticosus minor, foliis orbiculatis venosis pinnato-ternatis, racemis terminalibus. *Brown. jam.* 209.

Baccifera trifolia racemosa, flosculis albis tetrapetalis,

fructu nigro monopyreno foetido. *Sloan. cat.* 170. *hiſt.* 2. *p.* 101. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 60.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 1. *p.* 472.
Meerſtrands Balſamſtrauch. W.
*Habitat in* America. ♄ (v. ſ.)
*An praecedentis varietas?*
*An A. ſylvatica diſtincta ſpecies? Variat enim maritima pro differentia loci et ſoli magnitudine omnium partium.* Swartz. l. c.

*5. AMYRIS *Kataf.*
A. foliis ternatis, apice ſerratis, pedunculis confertis bifidis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 28.
A. (*Kataf*) foliis ternatis apice ſerratis, pedunculis dichotomis. *Forſk. deſcr.* 80. *
Arabiſcher Balſamſtrauch. W.
*Habitat in* Arabia. ♄ (v. ſ.)
*A. ſylvatica et maritima differunt ab hac:* foliis *nitidis crenatis, paniculа terminali brachiata.* Vahl. l. c.

6. AMYRIS *gileadenſis.*
A. foliis ternatis integerrimis, pedunculis unifloris lateralibus. *Mant.* 65. *diſs. de Opobalſ.* 1764. * *Amoen. acad.* 7. *p.* 55. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 28. *t.* 11.
A. Opobalſamum. *Forskoehl. deſcript. pl. flor. aegypt. p.* 79.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 1. *p.* 473.
Gileadiſcher Balſamſtrauch. W.
*Habitat in* Arabia *felice.* ♄ *Forskoehl.*

7. AMYRIS *Opobalſamum.*
A. foliis pinnatis: foliolis ſeſſilibus. *Amoen. acad.* 7. *p.* 68. *Mat. med.* 101.
Opobalſamum. *Geoffr. mat. med.* 473.
Balſamum. *Bell. ic.* 110. *Alp. aegypt.* 48. *t.* 60.
Baleſſan, *Bruce itin.* 5. *p.* 16. *cum icone. Editio germanica* 5. *p.* 28. *t.* 2. 3. *
β. Balſamea meccanenſis. *Gleditſch. Act. Soc. Naturaeſcrut. Berol.* 3. *p.* 127. *t.* 3. *f.* 2. *
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 1. *p.* 473.
Meccaſcher Balſamſtrauch. W.
*Habitat in* Arabia. ♄
*A. gileadenſis, Opobalſamum et Balſamea meccanenſis ſunt forte non diſtinctae ſpecies ſed varietates ab aetate vel ſolo ortae. In A. Opobalſamo depinxit Bruce folia pinnata et ternata, in Balſamea vero fo-*

*lia sunt bipinnata. Multa vegetabilia habent in juventute folia magis composita. Mimosae omnes simplicifoliae gaudent primo anno foliis bipinnatis, Gleditschia triacanthos profert in juventute folia bipinnata, ut multa alia taceam vegetabilia, eodem modo variantia.* W.

*8. AMYRIS *enneandra.*

A. foliis ternatis pinnatisque, foliolis petiolatis ovatis acuminatis basi attenuatis reticulato-venosis, paniculis axillaribus et terminalibus racemosis. W.

Icica (*enneandra*) foliis ternatis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 345. *t.* 134. *

Neunfädiger Balsamstrauch. W.

*Habitat in sylvis* Gujanae. ♄

*9. AMYRIS *heterophylla.*

A. foliis ternatis pinnatisque, foliolis petiolatis ovatis acuminatis simpliciter venosis, racemis axillaribus et terminalibus. W.

Icica (*Araconchini*) balsamifera, foliis ternatis quinatis. *Aubl. guj.* 1 *p.* 343. *t.* 133. *

Verschiedenblättriger Balsamstrauch. W.

*Habitat in sylvis* Gujanae. ♄

*10. AMYRIS *gujanensis.*

A. foliis pinnatis, foliolis quinis petiolatis oblongis acuminatis, pedunculis congestis axillaribus. W.

Icica (*gujanensis*) floribus caespitosis supra et ad axillas foliorum. *Aubl. guj.* 1. *p.* 340. *t.* 131. *

Fünfblättriger Balsamstrauch. W.

*Habitat ad maris littora, in sylvis* Gujanae. ♄

*Forte varietas sequentis.* W.

11. AMYRIS *ambrosiaca.*

A. foliis pinnatis, foliolis septenis petiolatis oblongis acuminatis, pedunculis multifloris subcorymbosis axillaribus. W.

A. foliis pinnatis petiolatis, paniculis confertis axillaribus. *Lin. suppl.* 216.

Icica (*heptaphylla*) foliis pinnato-septenis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 337. *t.* 130.

Icica Brasilienfibus. *Marcg. bras. p.* 98. *Pis. bras. p.* 59?

Terpentinboom. *Surinam.*

Wohlriechender Balsamstrauch. W.

*Habitat in* Gujanae *sylvis ad maris littora.* ♄

Arbor *alta.* Folia *alterna pinnata, foliolis* 5 *s.* 6.

*ovato-oblongis acutis glabris.* Petioli *basi gibbi.* Flores *albo-flavescentes.* Perianthium *minimum quadridentatum.* Petala 4 *lanceolata acuta erecta, apice patula.* Filamenta 8 *erecta filiformia calyce dimidio breviora tubo inserta.* Antherae *oblongae luteae.* Germen *superum subglobosum.* Stylus *cylindricus.* Stigma *capitatum depressum tetragonum.* Fructus *ovatus obliquus quadrilocularis Lauri similis.* Nucleus *cortice fragili quadrilocularis s. ossicula 4 pulpa viscosa obvoluta.* Arbor *tota odoratissima, detruncata fundit balsamum album odoratissimum, cujus usus est in Dysenteria, pro dosi drachma una in vino rubro.* Fructus *ruber, pulpa viscosa odore et sapore balsamico, quae indurescit in Resinam griseam ad suffimenta utilem.*

*Rouelle apud Aubletium demonstrat Resine de Coumier ex hac arbore ortam et credit ambram griseam succum resinosum hujus, qui per terram colatus tandem aqua marina in Ambram transformatur. Eadem etiam Rumphius in Herbario amboinensi v. 2. p. 164. Hoc confirmare videtur sententiam antiquorum. Dioscorides et Plinius jam suo tempore existimarunt, Ambram gummi aut resinam arboris aliquo modo mutatam esse.*

*12. AMYRIS *decandra.*

A. foliis pinnatis, foliolis peticlatis quinis oblongis utrinque acuminatis, paniculis axillaribus divaricatis. W.

Icica (*decandra*) foliis pinnato-quinatis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 346. *t.* 135. *

Zehntadiger Balsamstrauch. W.

*Habitat in sylvis maritimis* Gujanae. ♄

*13. AMYRIS *altissima.*

A. foliis pinnatis, foliolis septenis petiolatis oblongo-obovatis acuminatis, racemo simplici axillari. W.

Icica (*altissima*) foliis ampliſſimis impari-pinnatis, fructu racemoso. *Aubl. guj.* 1. *p.* 342. *t.* 132. *

Höchster Balsamstrauch. W.

*Habitat in sylvis* Gujanae. ♄

14. AMYRIS *toxifera.*

A. foliis pinnatis: foliolis petiolatis septenis ovatis acuminatis, panicula axillari elongata. W.

A. foliis pinnatis: foliolis petiolatis planis. *Sp. pl.* 469.

Elemifera foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 486.

Toxicodendron foliis alatis, fructu purpureo pyriformi

ſparſo. *Catesb. car.* 1. *p.* 40. *t.* 40. *Seeligm. av. ic.* 2. *t.* 80.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 481.
Giftiger Balſamſtrauch. W.
*Habitat in* Carolina. ♄ (v. ſ.)

15. AMYRIS *Protium.*

A. foliis pinnatis, foliolis petiolatis quinis oblongis acutis undulatis, racemis axillaribus. W.
A. foliis pinnatis: foliolis petiolatis undulatis. *Mant.* 65.
Protium javanicum. *Burm. ind.* 88.
Tingulong. *Rumph. amb.* 7. *p.* 54. *t.* 23. *f.* 1.
Oſtindiſcher Balſamſtrauch. W.
*Habitat in* India *orientali.* ♄
Folia *oppoſita, pinnata: foliolis* 5 *ſ.* 7, *glabris, petiolatis, laurinis.* Florum panicula *multiplex.* Calyx *ſubquadridentatus, obtuſus, perſiſtens.* Petala 4, *ſeſſilia, ovata, acuminata.* Nectarium *e receptaculo marginato cingente* Germen *intra ſtamina.* Antherae *oblongae, quaſi ex* 4 *connatae.* Filamenta 8, *ſubulata, petalis breviora.* Germen *ovatum.* Stylus *cylindricus longitudine ſtaminum.* Stigma *ſimplex.*

*16. AMYRIS *dentata.* W.

A. foliis pinnatis, foliolis petiolatis novenis ovatis acuminatis dentatis, racemis axillaribus. W.
Gezähnter Balſamſtrauch. W.
*Habitat in* India *orientali.* ♄ (v. ſ.)
*Ab omnibus foliis pinnatis margine dentato diſtincta.* Folia *ovata acuminata emarginata remote dentata punctis reſinoſis diaphanis inſtructa.* Racemi *ſimplices axillares.* Pedunculi *uniflori valde elongati.* W.

*17. AMYRIS *aniſata.* W.

A. foliis pinnatis, foliolis petiolatis tredecimis ovato-lanceolatis obſolete dentatis inaequalibus, paniculis axillaribus. W.
Guineiſcher Balſamſtrauch. W.
*Habitat in* Guinea. ♄ (v. ſ.)
*Similis praecedenti, ſed diſtinctiſſima:* foliolis *numeroſioribus ovato-lanceolatis baſi inaequalibus vix manifeſte dentatis,* et paniculis *corymboſis, pedunculis multifloris.* W.

*18. AMYRIS *zeylanica.*

A. foliis pinnatis petiolatis glabris; racemis interruptis

axillaribus, floribus involucratis hexandris. *Retz. obs. 4. p. 25.*

Zeylanischer Balsamstrauch. W.

*Habitat in* Zeylona. ♄

19. AMYRIS *balsamifera.*

A. foliis bijugis. *Sp. pl.* 496. *Swartz obs.* 149.*

A. arboreus, foliis bijugatis ovatis glabris, racemis laxis terminalibis. *Brown. jam.* 208.

Lucinium arbor tiliae foliis minoribus, americanum. *Pluk. alm.* 227. *t.* 201. *f.* 3.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 482.

Vierblättriger Balsamstrauch. W.

*Habitat in* Jamaica. ♄

*Species ulterius examinanda, rara arbor in sylvis et mihi non visa.* Swartz l. c.

*Omnes Amyridis species, quas siccas examinavi, gaudent filamentis nectario, licet minutissimo, glanduloso insertis. Icicae differunt tantum glandula maxima annulari, hinc ab Amyride non sunt separandae. Cum genere Trichilia vero neque nectario neque fructu conveniunt.* W.

## *756. CEDROTA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 660.

*Cal.* 6-partitus, laciniis concavis. *Cor.* 0. *Germen* glandula cinctum.

*1. CEDROTA *longifolia.* W.

Aniba guianensis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 327. *t.* 126.*

Langblättrige Cedrota. W.

*Habitat in sylvis desertis* Guianae. ♄

Arbor *excelsa.* Folia *opposita petiolata longe lanceolata acuminata integerrima reticulato-venosa glabra.* Panicula *axillaris.* Flores *parvi virides.* W.

## 757. XIMENIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 651.

*Cal.* 4-fidus. *Petala* 4, pilosa, revoluta. *Drupa* monosperma.

1. XIMENIA *americana.*

X. foliis oblongis, pedunculis multifloris. *Hort. cliff.* 193. *Swartz obs.* 149.*

X. multiflora. *Iacq. amer.* 106. *t.* 177. *f.* 31. *Mill. dict. n.* 1.
X. aculeata, flore villoso, fructu luteo. *Plum. gen.* 6. *ic.* 261. *f.* 1.
Heymassoli spinosa. *Aubl. guj.* 1. *p.* 324. *t.* 125. *
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 453.
Americanische Ximerlie. W.
*Habitat in* America. ♄

Folia *ovato-oblonga, alterna, integerrima, petiolata.* Spina *ad singulam foliorum axillam.* Racemus *multiflorus, inter spinam et ramum.* *An* Stamina 7?

* 2. XIMENIA *elliptica.*
X. caule inermi, foliis elliptico-lanceolatis, pedunculis multifloris. *Forst. prod. n.* 162.
Elliptische Ximenie. W.
*Habitat in* Nova Caledonia. ♄

3. XIMENIA *inermis.*
X. foliis ovatis, pedunculis unifloris. *Sp. pl.* 497.
Amyris arborescens, foliis ovatis glabris: vetustioribus confertis, petiolis submarginatis, floribus solitariis. *Brown. jam.* 209.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 455.
Unbewaffnete Ximenie. W.
*Habitat in* Jamaica. ♄.

## 758. FUCHSIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 652.

*Cal.* 4-partitus coloratus corollifer. *Cor.* 4-petala. *Bacca* infera, 4-locularis, polysperma.

1. FUCHSIA *triphylla.* †
F. racemo terminali, pedunculis unifloris, foliis ternis integerrimis. W.
F. pedunculis unifloris. *Mill. dict. n.* 1.
F. (*racemosa*) caule herbaceo simplici, foliis ternis lanceolatis sessilibus, floribus racemosis. *Lamarck encycl.* 2. *p.* 599.
F. triphylla, flore coccineo. *Plum. gen.* 14. *t.* 135. *f.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 429.
Traubenblütige Fuchsie. W.
*Habitat in* America *meridionali.*

Caulis *herbaceus, simplicissimus.* Folia *terna, lanceolata, sessilia.* Racemus *terminalis, erectus.*

*2. FUCHSIA *coccinea.*

F. pedunculis unifloris axillaribus, foliis ternis ferratis. *Willd. in Ufteri Annalen* 3. *Stück. p.* 37. *t.* 6. *

F. (*coccinea*) foliis oppofitis ovatis denticulatis, petalis obovatis obtufis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 8.

F. (*magellanica*) caule fruticofo, foliis oppofitis ternis alternisque, pedunculis unifloris axillaribus, petalis retufis. *Lamarck encycl.* 2. *p.* 560. *

Thilco. *Feuill. peruv.* 3. *p.* 64. *t.* 47.

Scharlachrothe Fuchfie. W.

*Habitat in* Chili, *usque ad fretum* Magellanicum. ♄ (v. v.)

3. FUCHSIA *excorticata.*

F. pedunculis axillaribus unifloris, foliis ovatis alternis. *Lin. fuppl.* 217.

F. (*excorticata*) foliis alternis ovatis longe petiolatis, pedunculis unifloris axillaribus, petalis lanceolatis. *Lamarck encycl.* 2. *p.* 560.

Skinnera excorticata. *Forft. prod. n.* 163.

Rindenlofe Fuchfie. W.

*Habitat in* Nova Zeelandia. ♄

Arbor *glaberrima.* Folia *alterna longe petiolata ovata fubtus canefcentia tenuiffime ferrata.* Pedunculi *axillares folitarii uniflori.* Flores *penduli majores.* Germen *inferum oblongum.* Corolla *monopetala infundibuliformis.* Tubus *bafi globofus poftea cylindricus in limbum.* Limbus *octofidus, laciniae quatuor alternae lanceolatae patentes, quatuor alternae triplo minores erectae.*

Laciniae *minores nunc pro nihilo habentur potius petala et* corolla *calyx, ut ex icone Forfteri patet.* W.

4. FUCHSIA *multiflora.* †

F. pedunculis multifloris. *Mutis.*

*Houttuyn Lin. Pft. Syft.* 6. *p.* 429.

Vielblütige Fuchfie. W.

*Habitat in* America.

## 759. CHLORA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 653.

*Cal.* 8-phyllus. *Cor.* 1-petala, 8-fida. *Capf.* 1-locularis, 2-valvis, polyfperma.

1. CHLORA *perfoliata.*

C. foliis perfoliatis. *Syft. veg.* 299.

Gentiana (*perfoliata*) corollis octofidis, foliis perfoliatis. *Sp. pl.* 2. *p.* 335. *Loefl. hifp. p.* 35. *Pollich. pal. n.* 262. *Mill. dict. n.* 10. *Scop. carn. n.* 299. *Sabatti hort.* 1. *t.* 100. *Hoffm. germ.* 134. *Roth. germ. I.* 168. *II.* 440.

Gentiana foliis radicalibus ovatis, caulinis triangularibus perfoliatis, floribus octofidis. *Hall. helv. n.* 649.

Blackftonia. *Hudfon. angl.* 146.

Gentiana caule dichotomo, foliis connatis, corollis octifidis. *Hort. cliff.* 81. *et* 496. *Roy. lugdb.* 433. *Dalib. parif.* 82. *Sauv. monfp.* 136. *Loefl. it.* 133. *

Centaurium luteum perfoliatum. *Bauh pin.* 278. *Morif. hift.* 2. *p.* 565. *t.* 5. *f.* 26. *f.* 1, 2. *Camer. epit.* 427.

Centaurium parvum, flore luteo. *Cluf. hift.* 2. *p.* 180.

Chlora. *Reneal. fpec.* 80. *t.* 76.

β. Centaurium pufillum luteum. *Bauh. pin.* 278.

Centaurium novum. *Col. ecphr.* 2. *p.* 78.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syft.* 6. *p.* 430.

Durchwachfene Chlora. W.

*Habitat in* Helvetia, Anglia, Gallia, Hifpania, Germania, Oriente. ⊙ (v. f.)

2. CHLORA *quadrifolia.*

C. foliis quaternis. *Syft. veg.* 299.

Gentiana quadrifolia. *Spec. pl.* 2. *p.* 1673.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syft.* 6. *p.* 430.

Vierblättrige Chlora. W.

*Habitat in* Europa *auftrali Cl. Alftroemer.*

*Planta* Matre *Chlora perfoliata*, Patre *Lino quadrifolio.* Caulis *fimplex, fpithamaeus, fubtetragonus, articulatus.* Folia *verticillato-quaterna, linearia, verfus apicem paullo latiora, obtufiufcula, longitudine articulorum.* Pedunculi *terminales, quinque: quinto intermedio; fingulis in medio bracteae* 2, *oppofitae.*

3. CHLORA *dodecandra.*

C. foliis oppofitis. *Syft. veg.* 299.

Chironia floribus duodecimfidis. *Sp. pl.* 2. *p.* 273.

Gentiana floribus duodecim-petalis, foliis diftinctis. *Gron. virg.* 27.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syft.* 6. *p.* 431.

Zwölffädige Chlora. W.

*Habitat in* Virginia.

4. CHLORA *feffilis.* W.

C. acaulis, floribus quadrifidis. W.

Gentiana (*ſeſſilis*) corollis quadrifidis, floribus acaulibus, foliis ovatis. *Sp. pl.* 335.
Gentianoides flore luteo. *Feuill. peruv.* 3. *p.* 20. *t.* 14.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 5. *p.* 868.
Sitzende Chlora. W.
*Habitat in* Chili.

## 5. CHLORA *imperfoliata.*

C. corollis ſexfidis. *Lin. ſuppl.* 218.
Undurchwachſene Chlora. W.
*Habitat in extrema* Italia. ⊙

Caulis *herbaceus ſimpliciſſimus erectus tetragonus laevis palmaris, articulis foliis longioribus.* Folia *oppoſita ſeſſilia ſubamplexicaulia ovata laevia acuta.* Flos *pedunculatus terminalis flavus foliomajor.* Calyx *monophyllus campanulatus longitudine corollae, ultra medium bifidus patulus perſiſtens, laciniis lanceolatis.* Corolla *monopetala hypocrateriformis.* Tubus *brevis patulus.* Limbus *longior ſexfidus, laciniis ovalibus.* Filamenta *ſex ſubulata tubo impoſita eoque paulo longiora.* Antherae *ſubrotundae.* Germen *oblongum.* Styli *duo conglutinati.* Stigmata *obtuſa. Genus dubium ignoto etiamnum fructu. Facies Chlorae, ſed differt calyce ad baſin diviſo, nec laciniis linearibus, corolla ſexfida, ſtylis duobus conglutinatis.*

## *760. MICHAUXIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 1769.

*Cal.* 16-partitus. *Cor.* rotata 8-partita. *Nect.* 8-valve ſtaminiferum. *Capſ.* 8-locularis polyſperma.

## *1. MICHAUXIA *campanuloides.*

M. campanuloides. *Ait. Kew.* 2. *p.* 8. *Herit. monograph. cum icone.*
Minuartia. *Adanſ. famil.* 2. *p.* 134. *Juſſ. gen. edit. Uſt.* 183.
Campanula foliis radicalibus dentato-pinnatis, caulinis cordatis ſeſſilibus. *Gron. virg.* 19.
Campanula peregrina maxima laciniatis foliis. *Moriſ. hiſt.* 2. *ſ.* 5. *p.* 460. *t.* 3. *f.* 31.
Viola mariana laciniatis foliis peregrina. *Bauh. pin.* 94.

Medium Dioſcoridis Rauwolfio. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 805. *Raj. hiſt.* 2. *p.* 732.
Medium Dioſcoridis vel Mindium Rhazis. *Rauw. it.* 284. *t.* 35. *Dalech. hiſt. app.* 33.
Glockenblumenartige Michauxie. W.
*Habitat in* Syria, Libano. ♂
Folia *lanceolata laciniato-dentata criſpa, caulina amplexicaulia alterna.* Caulis *ſimplex paniculatus.* Flores *nutantes magni albi.* W.

## 761. DODONAEA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 654.

*Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 0. *Capſ.* 3-locularis, trialata. *Sem.* bina.

### 1. DODONAEA *viſcoſa.*

D. foliis oblongis obtuſis baſi anguſtatis viſcoſis. W.
D. foliis oblongis. *Lin. ſuppl.* 218. *Swartz obſ.* 151.
Dodonaea. *Hort. cliff.* 144. *Fl. zeyl.* 141. * *Roy. lugdb.* 206. *Iacq. amer.* 109. *Fabr. helmſt.* 2. *p.* 430. *Trew. ehret* 12. *t.* 9.
Ptelea viſcoſa. *Sp. pl.* 2. *p.* 173. *Mill. dict. n.* 2.
Triopteris erecta fruticoſa, foliis oblongis acuminatis, ramulis gracilibus. *Brown. jam.* 191. *t.* 18. *f.* 1.
Aceri ſ. Paliuro affinis, anguſto oblongo liguſtri folio, flore tetrapetalo herbaceo. *Sloan. jam.* 138. *hiſt.* 2. *p.* 27. *t.* 162. *f.* 3. *Raj. dendr.* 94.
Cariophyllaſter litoreus. *Rumph. amb.* 4. *p.* 110. *t.* 50.
Carpinus viſcoſa, ſalicis folio integro oblongo. *Burm. zeyl.* 55. *t.* 23.
Arbuſcula viſcoſa, elaeagni foliis laete virentibus, americana tricoccos. *Pluk. phyt.* 185. *t.* 447. *f.* 5.
Staphylodendron foliis lauri anguſtis. *Plum. ic.* 247. *f.* 2.
Thlaſpidioides arboreſcens fructu racemoſo. *Barrer. acquin.* 109.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 1. *p.* 447.
Klebrige Dodonaea. W
*Habitat in* Indiis *locis arenoſis.* ♄ (v. ſ.)
Ramuli *viſcoſi tetragoni*, rami *vero teretes.* W.

### * 2. DODONAEA *triquetra.*

D. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis glaberrimis, ramis laevibus triquetris. W.

D. (*triquetra*) caule fruticoso triquetro glabro, foliis alternis lanceolatis glabris, floribus cymosis axillaribus. *Wendl. obs.* 44.
Dreykantige Dodonaea. W.
*Habitat in* Nova Hollandia. ♄ (v. s.)

3. DODONAEA *angustifolia.*
D. foliis linearibus margine revolutis. W.
D. foliis linearibus. *Lin. suppl.* 218. *Thumb. prod.* 77. *Swartz obs.* 150. *
Schmalblättrige Dodonaea. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei, *in* India *australi inque montibus frigidioribus* Jamaicae. ♄ (v. s.)
*Similis D. viscosae, sed* folia *lanceolato-linearia.*
Fructificatio *polygama.*

## *762. VALENTINIA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 1748.

*Cal.* 5-partitus coloratus patens. *Cor.* nulla. *Caps.* baccata tetrasperma pulposa.

*1. VALENTINIA *ilicifolia.*
V. ilicifolia. *Swartz prod.* 63. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 689. *
Malpighia aquifolii amplioribus foliis. *Plum. ic.* 167. *f.* 2.
Ilex folio agrifolii americana. *Pluk. alm.* 197. *t.* 196. *f.* 5.
Hülsenblättrige Valentinie. W.
*Habitat in sterilissimis petrosis* Hispaniolae *versus oceanum, inque* Cuba *circa* Havanam. ♄
Frutex *bi-s. tripedalis ramosus.* Folia *alterna ovato-lanceolata sesquipollicaria margine unduluto-spinosa glabra rigidissima.* Flores *terminales subumbellati coccinei.* Swartz. l. c.

## 763. LAWSONIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 655.

*Cal.* 4-fidus. *Petala* 4. *Stamina* 4 parium. *Caps.* 4-locularis, polysperma.

1. LAWSONIA *inermis.*
L. inermis, foliis subsessilibus ovatis utrinque acutis. *Lin. suppl.* 219.
L. ramis inermibus. *Fl. zeyl.* 135. *Gron. orient.* 47. *Mat. med.* 102. *Mill. dict. n.* 1.

L. (*alba*) foliis feſſilibus ovatis utrinque acutis, petalis albis patentibus. *Lamarck encycl.* 2. *p.* 101. *

Liguſtrum aegyptiacum. *Alp. aegypt.* 47.

Liguſtrum aegyptiacum latifolium. *Bauh. pin.* 476.

Alhenna ſ. Henna arabum. *Walth. hort.* 3. *t.* 4.

Alcanna arabum. *Bell. itin.* 35.

Cyprus, Henna, Alcanna. *Rauw. itin.* 60. *t.* 60.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 409.

Echte Alkanna. W.

*Habitat in* India, Aegypto. ♄ (v. ſ.)

*Affinis maxime L. ſpinoſae; ut forte cultura mitior facta.*

*Figura Rauwolfii rudis at bona.* W.

* 2. LAWSONIA *purpurea.*

L. foliis ſubſeſſilibus lanceolatis, floribus corymboſis terminalibus. W.

L. (*purpurea*) foliis ſubſeſſilibus lanceolatis, petalis erectis purpureo-coeruleis. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 102. *

Poutalesje. *Rheed. mal.* 4. *p.* 117. *t.* 57.

Langblättrige Alkanna. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄

Folia *lanceolata multo longiora, nec baſi attenuata.* Flores *corymboſi terminales nec ut in praecedenti racemoſi ex omnibus axillis et apice caulis.* W.

3. LAWSONIA *Acronychia.*

L. inermis, foliis longe petiolatis cuneiformibus. *Lin. ſuppl.* 219. *Forſt. prod. n.* 165.

Acronychia laevis. *Forſt. gen. n.* 27.

Südſee Alkanna. W.

*Habitat in* Nova Caledonia. ♄

*Differt a L. inermi*: foliis *longe petiolatis ad inſertionem ſubarticulatis*, calyce *omnium minimo*, petalis *non planis ovatis, ſed linearibus, apice unguе reflexo.*

4. LAWSONIA *ſpinoſa.*

L. ramis ſpinoſis. *Fl. zeyl.* 134. *Haſſelq. it.* 464. * *Mill. dict. n.* 2.

Rhamnus malabaricus. Mail anſchi. *Pluk. alm.* 38. 220. *f.* 1.

Cyprus. *Rumph. amb.* 4. *p.* 42. *t.* 17.

Mail-anſchi. *Rheed. mal.* 1. *p.* 73. *t.* 40.

*Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 411.

Dornige Alkanna. W.

*Habitat in* India. ♄ (v. ſ.)

## *764. MELICOPE.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 656.

*Cal.* 4-partit. *Cor.* 4-petala. *Nect.* glandulae 4 didymae germina cingentes. *Capſ.* 4 monoſpermae.

### *1. MELICOPE *ternata.*

M. ternata. *Forſt. prod. n.* 166. *Forſt. gen. n.* 28.
Entoganum laevigatum. *Gaert. ſem.* 1. *p.* 331. *t.* 69. *f.* 6
Dreyblättrige Melicope. W.
*Habitat in* Nova Zeelandia. ♄

## 765. DIMOCARPUS.

*Loureiro cochin. p.* 286.

*Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Baccae* 2, monoſpermae. *Semen* magnum.

### *1. DIMOCARPUS *Litchi.*

D. (*Litchi*) foliis pinnatis, baccis cordatis ſquamoſis. *Loureiro cochin. p.* 287. *

Euphoria. *Juſſ. gen. ed Uſteri p.* 274.
Scytalia chinenſis. *Gaert. ſem.* 1. *p.* 197. *t.* 42. *f.* 3. *Schreb. gen. pl. n.* 671.
Litſea chinenſis. *Lamarck encycl.* 3. *p.* 550. *
Litchi chinenſis. *Sonnerat. itin.* 2. *p.* 180. *t.* 129. * *Du Halde chin.* 2. *p.* 144. *c. icone.*
Laetji. *Obſ. itin.* 192. 204.
Sapindus (*edulis*) inermis, foliis pinnatis, foliolis lanceolato-oblongis, rachi ſimplici, fructibus muricatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 36. *Vahl ſymb.* 3. *p.* 55. *
Liſchia ſive Liſchion indiae orientalis. *Zanon. hiſt.* 147. *t.* 108.
Eßbare Zwillingspflaume. W.
*Habitat in* China, Tunquin *et* Cochinchina. ♄

*Clariſſ. Loureiro quatuor hujus generis ſpecies enumeravit, quae forte tantum varietates ſunt.* W.

## *766. MEMECYLON.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 657.*

*Cal.* superus fundo striato, margine integerrimo. *Cor.* 1-petala. *Antherae* insertae lateri apicis filamenti. *Bacca* coronata calyce cylindrico.

### 1. MEMECYLON *capitellatum.*

M. foliis ovatis petiolatis, umbellis capitatis axillaribus subsessilibus. W.

M. foliis ovatis. *Fl. zeyl.* 136.

M. foliis ovatis supra nitidis, umbellis axillaribus brevissimis subcapitatis. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 86. *t.* 284. *f.* 1. *

Cornus sylvestris, foliis croceum colorem tingentibus, flosculis ad foliorum alas globosis. *Burm. zeyl.* 76. *t.* 30.

Crocus sylvestris zeylanicus s. Arbor Walikakaha. *Herm. zeyl.* 7. *Burm. ind.* 78. R.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 487.

Knopfförmiger Safranbaum. W.

*Habitat in* Zeylona. ♄ (v. s.)

### *2. MEMECYLON *tinctorium.*

M. foliis oblongo-ovatis petiolatis, corymbis axillaribus. W.

Memecylon tinctorium. *Koenig.*

M. (*ramiflorum*) foliis ovatis, paniculis congestis brevissimis lateralibus. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 86. *

Färbender Safranbaum. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄ (v. s.)

Folia *flavo-viridia.* Corymbi *parvi axillares et laterales. Distinctissima a praecedente, licet habitu sit similis. Samara laeta ab hac valde diversa.* W.

### *3. MEMECYLON *grande.* †

M. foliis acuminatis. *Retz. obs.* 4. *p.* 26.

Grosser Safranbaum. W.

*Habitat in* Indla *orientali.* ♄

Arbor *grandis.* Rami *teretes.* Folia *opposita integerrima semipedalia ovata longe acuminata.* Pedunculi *axillares alterni quadri-s. quinquefidi, pedicellis multifloris.* Antherae *incumbentes omnes curvatae, an ab exsiccatione?* Retz. l. c.

### *4. MEMECYLON *cordatum*.

M. foliis cordatis subsessilibus, umbellis compositis axillaribus pedunculatis. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 87. *t.* 284. *f.* 2. *

β. foliis minoribus amplexicaulibus fructu globoso. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 87.

Herzblättriger Safranbaum. W.

*Habitat* α. *in insula* Mauritii, β. *in* India *orientali*. ♄

## *767. BUGINVILLAEA.

*Juss. gen. ed. Usteri p.* 102.

*Cal.* o. *Cor.* infera tubulosa, 4-dentata. *Stam.* receptaculo inserta. *Fructus* monospermus.

### *1. BUGINVILLAEA *spectabilis*.

Buginvillaea. *Lamarck illust. gen. t.* 294.

Ansehnliche Buginvillaea. W.

*Habitat in* Brasilia. ♄

Frutex *aculeatus, aculeis recurvis supra axillaribus.* Folia *alterna petiolata subrotundo-ovata acuminata integerrima venosa.* Panicula *terminalis, pedunculis trifloris.* Flos *tubulosus costae mediae bracteae subrotundae insertus.* Corolla *minor bractea.* W.

## 768. VACCINIUM.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 658.

*Cal.* superus. *Cor.* 1-petala. *Filam.* receptaculo inserta. *Bacca* 4-locularis, polysperma.

* *Foliis annotinis s. deciduis.*

### 1. VACCINIUM *Myrtillus*.

V. pedunculis unifloris, foliis serratis ovatis deciduis, caule angulato. *Fl. lapp.* 143. *Fl. suec.* 313, 333. *Mat. med.* 103. *Hort. cliff.* 148. *Roy. lugd.* 239. *Gmel. sib.* 3. *p.* 136. *Du Roi harbk.* 2. *p.* 471. *Scop. carn. n.* 458. *Pollich. pal. n.* 374. *Hoffm. germ.* 134. *Roth. germ. I.* 169. *II.* 440. *Kniph. cent.* 8. *n.* 97. *Blackw. t.* 463. *Duham. arb.* 2. *t.* 107. *Willd. arb.* 397. *Knorr. del.* 1. *Tab. S.* 18. *n.* 1.

V. foliis venoſis, ovato-lanceolatis ſerratis, caule anguloſo. *Hall. helv. n.* 1020.
Vitis idaea foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. *Bauh. pin.* 470.
Myrtillus germanica et Vitis idaea. *Dalech. hiſt.* 191, 192.
Myrtillus. *Matth.* 231. *Camer. epit.* 135.
Vaccinia nigra. *Dodon. pempt.* 768.
β. Vaccinium foliis oblongis crenatis fructu albo. *Rupp. ien.* 52. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 136. *n.* 9. R.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 413.
Gemeine Heidelbeere. W.
*Habitat in* Europae *ſylvis umbroſis.* ♄ (v. v.)
Filamenta *decem. Pollich. l. c.* 8 *et* 10 *numerat Moench. haſſ. n.* 322.

*2. VACCINIUM *pallidum.*
V. racemis bracteatis, corollis cylindraceo-campanulatis, foliis ovatis acutis ſerrulatis glabris decidnis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 10.
Bleiche Heidelbeere. W.
*Habitat in* America *boreali.* ♄

*3. VACCINIUM *hirtum.*
V. pedunculis unifloris, foliis ovatis ſerratis, ramis teretibus divaricatis. *Thumb. jap.* 155.
Haarige Heidelbeere. W.
*Habitat in* Iaponia. ♄
Frutex *ramoſiſſimus.* Ramuli *filiformes rugoſi apice villoſi.* Folia *alterna annua ſubſeſſilia ovata acuta ſerrata villoſa, ſubtus pallidiora patentia inaequalia unguicularia.* Corolla *campanulata, laciniis revolutis.* Antherae *corolla breviores.* Thunb. l. c.

4. VACCINIUM *ſtamineum.*
V. pedunculis ſolitariis nudis unifloris, antheris corolla longioribus, foliis oblongo-ovatis acutis integerrimis, ſubtus ſubglaucis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 10.
V. pedunculis ſolitariis unifloris, antheris corolla longioribus, foliis oblongis integerrimis. *Sp. pl.* 498.
V. ſtaminibus corolla longioribus. *Gron. virg.* 43.
Vitis idaea americana, longiori mucronato folio et crenato, floribus urceolatis racemoſis. *Pluk. alm.* 331. *t.* 339. *f.* 3.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 414.
Langfädige Heidelbeere. W.

*Habitat in* America *ſeptentrionali.* ♄ (v. ſ.)

*Frutex.* Folia *oblonga, integerrima.* Pedunculi *axillares, ſolitarii, uniflori, filiformes, corolla longiores.* Corollae *quinquefidae campanulato-patentes.* Antherae 10. Stylus *flore longior.*

5. VACCINIUM *uliginoſum.*

V. pedunculis unifloris, foliis integerrimis obovatis obtuſis laevibus. *Iacq. vind.* 239. *Oed. dan.* 231. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 137. *n.* 10. *Du Roi harbk.* 2. *p.* 473. *Pollich. pal. n.* 375. *Kniph. cent.* 9. *n.* 96. *Hoffm. germ.* 135. *Roth. germ. I.* 169. *II.* 441. *Willd. arb.* 397. *

V. foliis integerrimis, ovatis, venoſis. *Hall. helv. n.* 1021.

V. foliis ovalibus integerrimis deciduis. *Fl. ſuec.* 312, 332.

V. foliis annuis integerrimis. *Fl. lapp.* 142.

Vitis idaea foliis ſubrotundis exalbidis. *Bauh. pin.* 470.

Vitis idaea Geſneri major. *Camer. hort.* 182.

Vitis idaea 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 61. *t.* 62.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 415.

Rauſch Heidelbeere. W.

*Habitat in* Sueciae *borealibus et alpinis, uliginoſis.* ♄ (v. v.)

Folia *tenella baſi ciliata.*

6. VACCINIUM *album.*

V. pedunculis ſimplicibus, foliis integerrimis ovatis ſubtus tomentoſis. *Sp. pl.* 499.

*Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 416.

Weiſse Heidelbeere. W.

*Habitat in* Penſylvania. *Kalm.* ♄

*Frutex.* Folia *ovata, ſubtus tomentoſa.* Flores *duo vel tres ad apices ramorum: pedunculis aggregatis breviſſimis, nudis.*

7. VACCINIUM *mucronatum.*

V. pedunculis ſimpliciſſimis unifloris, foliis ovatis mucronatis glabris integerrimis. *Sp. pl.* 499.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 416.

Spitzige Heidelblume. W.

*Habitat in* America *ſeptentrionali. Kalm.* ♄

Frutex *Ramis teretibus, glaucis.* Folia *elliptica, utrinque glabra, integerrima, mucronata, petiolis canaliculatis inſidentia.* Pedunculi *uniflori, foliis paulo breviores.*

*8. VACCINIUM *diffusum.*
V. pedunculis solitariis nudis unifloris, foliis ovatis acutis obsolete serratis villosiusculis. *Ait. Kew. 2. p.* 11.
Ausgebreitete Heidelbeere. W.
*Habitat in* Carolina *australi.* ♄

*9. VACCINIUM *angustifolium.*
V. pedunculis solitariis unifloris, foliis elliptico-lanceolatis glabris obsolete serrulatis. *Ait. Kew. 2. p.* 11.
Schmalblättrige Heidelbeere. W.
*Habitat in* Terra nova *et* Labrador. ♄

10. VACCINIUM *corymbosum.*
V. floribus corymbosis ovatis, foliis oblongis acuminatis integerrimis. *Sp. pl.* 499.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 3. p.* 417.
Doldentraubige Heidelbeere. W.
*Habitat in* America *septentrionali. Kalm.* ♄
*Frutex.* Folia *oblonga, acuta, nervis subtus villosis.* Corymbi *ex gemmaceo involucro, sessiles.* Corollae *cylindraceo-ovatae, longiores, quam in reliquis. Stamina decem.*

*11. VACCINIUM *bracteatum.*
V. racemis foliatis, foliis serratis acutis. *Thunb. jap.* 156.*
Beblätterte Heidelbeere. W.
*Habitat in* Japonia. ♄
Folia *alterna brevissime petiolata ovata acuta serrata, margine revoluta, venosa utrinque glabra pollicaria, racemorum lanceolata serrata lineam longa.* Flores *racemosi secundi.* Pedunculi *vix semilineam longi.* Bracteae *in medio pedunculi binae setaceae longitudine pedunculi.* Corolla *cylindrica alba.* Thunb. l. c.

*12. VACCINIUM *ciliatum.*
V. racemis foliatis, foliis ovatis integerrimis hispidis. *Thunb. jap.* 156 *
Gefranzte Heidelbeere. W.
*Habitat in* Japonia. ♄
Rami *alterni erecti villosi.* Folia *ramea sparsa ovata acuta integerrima hispida inaequalia pollicaria et bipollicaria; racemorum lanceolata glabra semiunguicularia.* Flores *racemosi secundi.* Corolla *rubra.* Thunb. l. c.

*13. VACCINIUM *fuscatum.*
V. racemis nudiusculis, corollis cylindrico-ovatis, caly-

cibus acutis, foliis ellipticis acutis integerrimis, venis subtus villosiusculis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 11.

Bräunliche Heidelbeere. W.

*Habitat in* America *boreali.* ♄ (v. s.)

14. VACCINIUM *frondosum.*

V. racemis bracteatis, pedicellis bracteolatis, corollis subcampanulatis, foliis obovato-oblongis integerrimis deciduis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 11.

V. racemis filiformibus foliosis oblongis integerrimis. *Sp. pl.* 499.

V. foliis ovatis integris deciduis, racemis foliosis. *Gron. virg.* 155. *

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 417.

Blattreiche Heidelbeere. W.

*Habitat in* America *septentrionali.* ♄ (v. v.)

*Frutex.* Folia *oblonga*, *integerrima.* Racemi *infra folia*, *bracteis oblongis parvis.* Pedunculi *partiales bracteis longiores*, *instructi bracteolis duabus filiformibus.* Corolla *ovato-campanulata.* Stamina 10.

*15. VACCINIUM *venustum.*

V. racemis bracteatis, pedicellis bracteolatis, corollis subcampanulatis, foliis ellipticis integerrimis deciduis glabris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 11.

Rothzweigigte Heidelbeere. W.

*Habitat in* America *boreali.* ♄ (v. s.)

16. VACCINIUM *ligustrinum.*

V. racemis nudis, caule fruticoso, foliis crenulatis oblongis. *Sp. pl.* 500.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 418.

Ligusterblättrige Heidelbeere. W.

*Habitat in* Pensylvania. *Kalm.* ♄

Flores *in Racemis alternis, numerosis, destitutis bracteis, s. foliolis, qua nota facile distinguitur.*

*17. VACCINIUM *resinosum.*

V. racemis bracteatis, corollis ovatis, foliis ellipticis acutiusculis integerrimis deciduis, atomis resinosis irroratis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 12.

Andromeda (*baccata*) foliis lanceolatis integerrimis acutis glabris viscidis, floribus racemosis, baccis decaspermis. *Wangenh. amer.* 11. *t.* 30. *f.* 69. *

Harzige Heidelbeere. W.

*Habitat in* America *boreali.* ♄ (v. s.)

*18. VACCINIUM *amoenum.*

V. racemis bracteatis, corollis subcylindraceis, foliis ellipticis subserrulatis deciduis, venis subtus villosiusculis. *Ait. Kew. 2. p. 12.*

Breitblättrige Heidelbeere. W.

*Habitat in* America *boreali.* ♄ (v. s.)

*19. VACCINIUM *virgatum.*

V. racemis sessilibus, corollis subcylindraceis, foliis oblongo-ellipticis serrulatis deciduis utrinque glabris, ramis floriferis elongatis. *Ait. Kew. 2. p. 12.*

Ruthenförmige Heidelbeere. W.

*Habitat in* America *boreali.* ♄

*20. VACCINIUM *tenellum.*

V. racemis bracteatis sessilibus, corollis ovato-cylindraceis, foliis oblongo-ellipticis subcuneiformibus serrulatis deciduis subglabris. *Ait. Kew. 2. p. 12.*

Gegelblättrige Heidelbeere. W.

*Habitat in* America *boreali.* ♄ (v. s.)

21. VACCINIUM *Arctostaphylos.*

V. floribus racemosis, foliis crenulatis ovatis acutis caule arboreo. *Sp. pl. 500.*

Vitis idaea orientalis maxima, cerasi folio, flore variegato. *Tournef. cor. 42. it. 2. p. 293. t. 293.*

β. Vitis idaea cappadocia maxima, mespili folio, flore variegato. *Tournef. cor. 42.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst 3. p. 418.*

Orientalische Heidelbeere. W.

*Habitat in* Cappadocia *et* Madera. ♄ (v. s.)

Racemi *foliis longiores, infra folia siti, foliolis ovatis instructi.*

** *Foliis sempervirentibus.*

*22. VACCINIUM *meridionale.*

V. foliis ovato-oblongis acutis serratis perennantibus planis lucidis, racemis terminalibus erectis, corollis prismaticis. *Ait. Kew. 2. p. 13.*

V. floribus racemosis, foliis ovatis crenato-serratis sempervirentibus, caule arboreo. *Swartz prod. 62. Fl. ind. occid. 2. p. 676.*

Westindische Heidelbeere. W.

*Habitat in montibus altissimis coeruleis* Jamaicae *australis.* ♄

Corollae *rarius quinquefidae.* Fructus *V. Vitis*

*idaeae sapidus. Similis V. Arctostaphylo, sed in illo: folia annua*, racemi*fliosi, et* flores *variegati.* Swartz. l. c.

23. VACCINIUM *cereum.*

V. pedunculis solitariis unifloris, corollis quinquangularibus ovatis, foliis ovato-subrotundis serratis. *Forst. prod. n.* 167.

Andromeda (*cerea*) pedunculis axillaribus solitariis diphyllis unifloris, foliis alternis ovatis serratis. *Lin. suppl.* 238.

Taheitische Heidelbeere. W.

*Habitat in insula* Taheiti. ♄ (v. s.)

Folia *breve petiolata.* Corolla *campanulata.* Antherae *oblongae luteae dorso bicornes.*

24. VACCINIUM *Vitis idaea.*

V. racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis subtus punctatis. *Oed. dan.* 40. *Mat. med. p.* 103. *Mill. dict. n.* 2. *Gunn. norv. n.* 109. *Du Roi harbk.* 2. *p.* 475. *Scop. carn. n.* 459. *Pollich. pal. n.* 376. *Roth. germ. I.* 169. *II.* 441. *Kniph. cent.* 9. *n.* 95. *Knorr. del.* 1. *t. S.* 18. *n.* 2. *Hoffm. germ* 135.

V. foliis perennantibus, ovatis, subtus punctatis, oris contractis. *Hall. helv.* 1022.

V. foliis obverse ovatis perennantibus. *Fl. lapp.* 145. *Fl. suec.* 314, 334. *Hort. cliff.* 148. *Roy. lugdb.* 239. *Gort. gelr.* 81.

Vitis idaea foliis subrotundis non crenatis, baccis rubris. *Bauh. pin.* 470. *Du Ham. arb.* 7.

Vitis idaea buxeis nec deciduis foliis. *Clus. pann.* 77. R.

Vitis idaea rubra. *Camer. epit.* 136. R.

Vaccinia rubra. *Dodon. p.* 770.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 419.

Rothe Heidelbeere. W.

*Habitat in* Europae *frigidioris sylvis macris.* ♄ (v. v.)

25. VACCINIUM *Oxycoccus.*

V. foliis integerrimis revolutis ovatis caulibus repentibus filiformibus nudis. *Oed. dan.* 80. *Mill. dict n.* 5. *Scop. carn. n.* 457. *Gunn. norv. n.* 72. *Pollich. pal. n.* 377. *Blackw. t.* 593. *Hoffm. germ.* 135.

V. caule prostrato, foliis ovato lanceolatis, acutis, flore quadripartito. *Hall. helv. n.* 1203.

V. ramis filiformibus repentibus, foliis ovatis perennantibus. *Fl. lapp.* 145.

V. ramis filiformibus, foliis ovatis perennantibus, pedunculis simplicibus stipula duplici. *Fl. suec* 315, 355.
Schollera Oxycoccos. *Roth. germ. I.* 170. *II.* 442.
Oxycoccus s. Vaccinia palustris. *Bauh. hist.* 1. *P.* 1. *p.* 525. *Tournef. inst. app.* 655. R.
Vitis idaea palustris. *Bauh. pin.* 471.
Vaccinia palustria. *Dod. pempt.* 770. *Lob. ic.* 109.
Oxycoccos *Cordi hist.* 2. *p.* 146. b. R.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 421.
Moos Heidelbeere. W.
*Habitat in* Europae *paludibus sphagno repletis.* ♄ (v.v.)
*Racemus brevissimus, pedunculis longissimis: bracteis* 2 *alternis; Corolla revoluta.*

26. VACCINIUM *hispidulum.* †
V. foliis integerrimis revolutis ovatis, caulibus repentibus filiformibus hispidis. *Kalm. it.* 3. *p.* 37.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3 *p.* 422.
Borstige Heidelbeere. W.
*Habitat in* Americae *septentrionalis paludosis.* ♄
*Structura antecedentis, sed majora omnia, et Caulis squamis setaceis imbricatus.*

*27. VACCINIUM *macrocarpon.*
V. foliis integerrimis ovali-oblongis obtusis planis, caulibus repentibus filiformibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 13. *t.* 7.
Vaccinium hispidulum. *Wangenh. amer.* 108. *t.* 30. *f.* 67.*
Vitis idaea palustris americana oblongis splendentibus foliis, fructu grandiore rubro plurimis intus acinis referto! *Pluk. alm.* 392. *t.* 326. *f.* 6. *mala.*
Vitis idaea palustris virginiana, fructu majore. *Raj. hist.* 685.
Grofsfrüchtige Heidelbeere. W.
*Habitat in paludibus turfosis* Americae *borealis.* ♄ (v.s.)

## *769. MENZIESIA.

*Smith. ic. inedit.* 56.

*Cal.* monophyllus repandus. *Cor.* monopetala. *Filam.* receptaculo inserta. *Capf.* supera quadrilocularis, dissepimenta e marginibus inflexis valvularum.

*1. MENZIESIA *ferruginea.*
M. ferruginea. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 56. *t.* 56.*

Braune Menziëſie. W.
*Habitat in* Americae *borealis tractu occidentali.* ♄
Frutex *habitu Vaccinii.* Folia *in ramis terminalia alterna conferta petiolata obovato-lanceolata ferrulato-ciliata piloſa.* Flores *axillares ferruginei nutantes.* Pedunculi *multiflori glanduloſo-hiſpidi.* W.

## 770. ERICA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 659.

*Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-fida. *Filam.* receptaculo inſerta. *Antherae* biſidae. *Capſ.* 4-locularis. *Diſſepimenta* e valvularum margine.

### " *Ariſtatae foliis oppoſitis.*

1. ERICA *glutinoſa.*

E. antheris ariſtatis piſtilloque incluſis, corollis globoſo-ovatis, foliis oppoſitis ſparſisque ciliato-glandulosis linearibus. W.

E. (*glutinoſa*) ariſtata, foliis oppoſitis ſparſisque linearibus ciliato-glandulosis. *Thunb. Diſſ. de Erica n.* 48. * *Thunb. prod.* 72. *Berg. cap.* 99. *Icon. horti Kewenſ. t.* 17.

Andromeda (*droſeroides*) racemis ſecundis, foliis linearibus piloſis viſcidis. *Mant.* 239.
Chamaeciſtus roris ſolis foliis. *Petiv. muſ.* 22. *t.* 161.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 569.
Sonnenthauartige Heide. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in planitie montis* Tabularis. ♄ (v. ſ.)
Caulis *ſuffruticoſus ramoſus.* Folia *alterna ſubſeſſilia linearia obtuſa canaliculata erectiuſcula, extus undique ſparſe piloſa, ciliata ſetulis apice glanduloſo-viſcidis.* Racemi *terminales ſolitarii.* Pedunculi *purpuraſcentes.* Flores *nutantes.* Calyx *ſcarioſus ovatus concavus parvus.* Corolla *ovata violacea collo atro-purpureo, limbo minuto albo obtuſo.* Antherae *exſertae biſeos ariſtis duobus ſetaceis.* Folia *Droſerae ciſtiflorae.*

2. ERICA *lutea.*

E. antheris ariſtatis ſtyloque incluſis, corollis oblongo-

ovatis, floribus terminalibus, foliis linearibus trigonis glabris oppositis, ramis deflexis. W.

E. aristata, foliis oppositis lineari-trigonis glabris. *Thunb. Diss. n.* 49. * *Thunb. prod.* 72. *Berg. cap.* 115.

E. antheris aristatis, corollis ovatis acuminatis, floribus congestis, foliis oppositis linearibus. *Mant.* 234.

E. antheris aristatis inclusis, corolla lutea cylindrica basi inflata glabra, stylo incluso, floribus terminalibus vel axillaribus umbellatis erectis, foliis oppositis linearitrigonis obtusis adpressis, margine subdentato glabro, *Wendland Erica. p.* 13.*t.* 4. *

E. antheris muticis inclusis, corollis ovato-acuminatis luteis, foliis oppositis adpressis triquetris. *Andrews Erica.* *

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 425.

Gelbe Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. Spei. ♄ (v. s.)

Caulis *ramis angustis.* (*Facies qualitercunque E. imbricatae.*) Folia *opposita linearia appressa fere imbricata.* Calyx *lanceolatus rotundatus colorato-flavescens, corolla dimidio brevior, arctus.* Corolla *ovato-oblonga subrostrata lutea.* Antherae *inclusae aristatae.* Stylus *inclusus.* Stigma *truncatum tetragonum echinatum.*

Corollae *laciniae inaequales.* Antherae *aristatae nec muticae.* W.

* —*foliis ternis.*

3. ERICA *paniculata.*

E. aristata, foliis ternis trigonis glabris, floribus lateralibus aggregatis, caule erecto. *Thunb. prod.* 72.

E. antheris bifidis inclusis, corollis campanulatis subumbellatis, foliis quaternis linearibus laevibus. *Sp. pl.* 508.

E. tenuifolia flosculis suave rubentibus. *Pluk. alm.* 136. *t.* 279. *f.* 2.

E africana angustissimis foliis, flosculis in capitulum congestis. *Seb. mus.* 2. *p.* 46. *t.* 44. *f.* 4.

Rispenartige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. Spei. ♄

4. ERICA *depressa.*

E. antheris aristatis inclusis, corollis campanulatis, stylo incluso, floribus raris, foliis ternis, caule depresso. *Mant.* 230.

E. aristata, foliis ternis oblongis glabris, floribus subracemosis, caule decumbente. *Thunb. Diss. n.* 50. *t.* 6. *f.* 3. * *Thunb. prod.* 72.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 428.

Liegende Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei *in lateribus rupium et planitie montis* Tabularis. ♄

Caules *procumbentes copiosi palmares.* Folia *terna lanceolata obtusiuscula laevia carinata.* Flores *sparsi solitarii.* Calyx *scariosus lanceolatus acutus corolla dimidio brevior.* Corolla *campanulata obtusa rubra laevis.* Antherae *biaristatae inclusae brevissimae.* Stylus *inclusus.* Stigma *obtusum.*

## 5. ERICA *Halicacaba.*

E. antheris aristatis, stylo incluso, corollis campanulato-ovatis inflatis, floribus terminalibus solitariis, foliis ternis linearibus trigonis. W.

E. aristata, foliis ternis lanceolatis glabris, floribus solitariis, caule decumbente. *Thunb. Diss. n.* 51. * *Thunb. prod.* 72.

E. antheris aristatis, corollis ovatis inflatis, stylo incluso, foliis ternis, floribus solitariis. *Syst. veg.* 301. *Icon. horti Kewens. t.* 2.

E. antheris bifidis inclusis, corollis inflatis maximis, foliis ternis linearibus laevibus. *Amoen. acad.* 6. *afr.* 15. * *Sp. pl.* 507.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 426.

Judenkirschartige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei *in rupibus praeruptis lateris occidentalis montis* Tabularis. ♄ (v. s.)

Frutex *altus, ramis purpurascentibus, ramulis subtomentosis albis.* Folia *terna confertissima laevia margine scabra.* Pedunculi *foliis breviores.* Corolla *purpurascens glabra, ab omnibus distincta, magnitudine glandis quernae.*

## 6. ERICA *Monsoniana.*

E. antheris aristatis inclusis, stylo incluso, corollis oblongo-ovatis, calyce duplici colorato, floribus terminalibus subsolitariis, foliis ternis oblongis obtusis. W.

E. aristata, foliis ternis ovatis glabris, floribus solitariis, caule erecto. *Thunb. Diss. n.* 52. *t.* 1. *f.* 2. * *Thunb. prod.* 72.

E. foliis ternis stylo incluso, corolla oblonga inflata, ca-

lyce calyculato, floribus terminalibus ramulorum obtusorum. *Lin. suppl.* 223. *Icon. horti Kewens. t.* 7. Monsonsche Heide. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei *in montibus* Hottentots-Holland. ♄ (v. s.)
*Rarissima et Ericarum speciosissima*, floribus *magnis albis*, staminibus *aristatis*.
Folia *in ramis adultioribus oblonga vel elliptica, in ramulis junioribus linearia acuta, in omnibus margo est hispidiusculus.* Flores *candidi in ramulorum apice solitarii vel terni.* Calycis *foliola oblonga apice reflexa candida longitudine dimidii corollae.* Bracteae *quatuor ejusdem formae et coloris calycem ad dimidium tegunt.* W.

* 7. ERICA *discolor.*
E. antheris aristatis inclusis, stylo exserto, corollis tubuloso-clavatis, calyce duplici, floribus terminalibus ternis, foliis ternis glabris. W.
E. (*discolor*) antheris aristatis inclusis, stylo exserto, corollis tubulosis semicylindraceis, foliis ternis. *Andrews Erica.* *
Verschiedenfarbige Heide. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)
Folia *brevia patentia glabra.* Flores *in ramulorum apice tres plerumque pedunculati.* Calyx *duplex, laciniis lanceolatis.* Corolla *longe tubulosa pallide purpurea apice virescens.* W.

* 8. ERICA *densifolia.* W.
E. antheris aristatis inclusis, stylo exserto, corollis tubuloso-clavatis pubescentibus, floribus axillaribus, foliis ternis oblongis imbricatis. W.
Dichtblättrige Heide. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)
Folia *brevia terna petiolata lineari-oblonga margine scabriuscula ceterum glabra adpresso-imbricata, sulco longitudinali exarata.* Flores *purpurei magni axillares.* Corolla *pubescens. Habitu a reliquis distincta. Accepi hanc speciem e collectione plantarum in Capite bonae spei facta, et a me emta.* W.

* 9. ERICA *cruenta.*
E. antheris aristatis inclusis, stylo exserto, corollis tubulosis incurvis, calyce simplici glanduloso-dentato, flo-

ribus axillaribus verticillatis, foliis ternis margine ſcabris. W.

E. antheris ariſtatis, corollis cylindraceis incurvis, ſtylo exſerto, calycibus ſubulatis baſi dilatatis, bracteis remotis, foliis glabris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 16. *Icon. horti Kewenſ. t.* 13.

E. antheris ariſtatis incluſis, ſtylo exſerto, corollis tubuloſis ſubcylindraceis, foliis ternis. *Andrews Erica.* * Dunkelrothe Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Rami *teretes glabri.* Ramuli *pubeſcentes.* Folia *terna petiolata lineari-ſubulata ſulco exarata patentia glabra ſemiuncialia.* Petioli *adpreſſi, vix ſemilineares.* Flores *axillares.* Pedunculi *vix ſemiunciales interdum bi-vel trifidi.* Bracteae *tres ſubulatae triquetrae.* Calycis *foliola e tota baſi ſubulata carinata glabra bilinearia.* Corolla *intenſe punicea cylindracea uncialis, parum incurva, glabra, ſubpellucida, ſuperne parum ventricoſa, ore quadrifido;* laciniae *latae acutiuſculae ſuberectae.* Filamenta *albida.* Antherae *incluſae oblongae brunneae bifidae ariſtatae.* Ariſtae *ſubulato-capillares longitudine antherarum.* Stylus *corolla paulo longior rubicundus.* Stigma *exſertum incraſſatum atropurpureum.* Ait. l. c.

10. ERICA *nigrita.*

E. antheris ariſtatis, corollis campanulatis, ſtylo incluſo, calycibus imbricatis trifloris ſeſſilibus. *Mant.* 65. *Burm. prod.* 11.

E. ariſtata, foliis ternis oblongis glabris, floribus ternis, bracteis acutis imbricatis. *Thunb. Diſſ. n.* 53.* *Thunb. prod.* 72.

E. (*laricina*) antheris ſubexſtantibus, corollis campanulatis, calycibus albidis laxis, foliis ternis nitidis patentibus. *Berg. cap.* 94.*

E. africana folio corios minore, flore albo. *Seba muſ.* 2. *p.* 11. *t.* 9 *f.* 7.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 430.

Lerchenbaumblättrige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in ſummitate montis* Diaboli. ♄ (v. ſ.)

Folia *terna ſubtriquetra glabra brevia patula.* Bracteae 3 *facie calycis.* Flores *terminales albi.* Antherae *convexae obtuſae nigrae.*

Corollae *laciniae ſunt ſaepius reflexae et tunc ſtamina videntur exſerta.* W.

*11. ERICA *phyllicoides.* W.

E. antheris ariſtatis incluſis, ſtylo incluſo, corollis campanulatis calyce parum longioribus, floribus axillaribus nutantibus, foliis ternis ſexfariam imbricatis. W.

Phylicaartige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

*Affinis E. ſexfariae ſed characteribus indicatis abunde diverſa. Habitus totius plantae eſt Phylicae ericoidis.* Folia *glabra lineari-trigona terna ſexfariam imbricata.* Flores *axillares ſub ramorum apice cernui.* Pedunculi *ſolitarii vel gemini longitudine floris.* Calyx *coloratus longitudine fere corollae foliolis carinatis.* Bracteae 3 *concolores e calyce remotae in medio pedunculi colorati.* Corolla *campanulata ſtaminibus ſtyloque longior.* W.

12. ERICA *regerminans.*

E. antheris ariſtatis, corollis ovatis, ſtylo incluſo, calycibus acutis, floribus racemoſis. *Mant.* 252.

E. ariſtata, foliis ternis linearibus glabris, floribus racemoſis, caule erecto. *Thunb. diſſ. n.* 54. * *Thunb. prod.* 72.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 426.

Sproſſende Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

Caulis *fruteſcens determinate ramoſus, ramis junceis,* Folia *terna lineari-ſubulata acuminata laevia patula.* Flores *racemoſi ſecundi nutantes:* Pedunculis *longitudine floris, incarnatis:* Bracteis *remotis minutis coloratis.* Calyx *coloratus ruber lanceolatus minimus.* Corolla *ovato-globoſa rubra, ore obtuſo.* Antherae *ariſtatae, corolla paulo breviores.* Stylus *incluſus longitudine corollae.* Stigma *ſubcapitatum.* Ramus *ſpicam continuat.*

13. ERICA *urceolaris.*

E. antheris ariſtatis, corollis ovato-conicis villoſis, ſtylo incluſo, calycibus lanceolatis, floribus umbellatis, foliis ternis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 15. *Icon. horti Kewenſ. t.* 16.

E. ariſtata, foliis ternis lanceolatis ſubtus tomentoſis, floribus ſubracemoſis villoſis. *Thunb. Diſſ. n.* 55. * *Thunb. prod.* 72. *Berg. cap.* 107.

E. (*pentaphylla*) antheris ariſtatis, corollis campanulatis, ſtylo incluſo, foliis ternis, floribus pubeſcentibus. *Syſt. veg.* 302.

E. (*pentaphylla*) antheris bifidis incluſis, corollis ovatis acutis, foliis quinis laevibus. *Sp. pl.* 506.

E. africana fruteſcens, juniperi folio, flore urceolari breviſſimo. *Seba muſ.* 1. *p.* 32. *t.* 21. *f.* 2.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 430.

Becherförmige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in montibus* Rode Sand *prope rivos infra* Winterhoek *et prope* Puspas Rivier. ♄ (v. ſ.)

* 14. ERICA *marifolia.*

E. antheris ariſtatis, corollis ovato-conicis, ſtylo mediocri, foliis ternis ovatis pubeſcentibus ſubtus albidis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 15. *Icon. horti Kewenſ. t.* 14.

E. ariſtata, foliis ternis ovatis ſubtus tomentoſis, floribus ſubumbellatis, caule erecto. *Thumb. prod.* 73.

Gamanderblättrige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Rami *piloſi.* Folia *petiolata ſubrotundo-ovata obtuſa pubeſcentia, ſubtus alba.* Flores *umbellati in ramorum apice.* Stamina *incluſa.* W.

15. ERICA *planifolia.*

E. antheris ariſtatis exſertis, corollis campanulatis, foliis ternis quaternisve ovatis acutis glanduloſo-ciliatis. W.

E. antheris ariſtatis, corollis campanulatis, ſtylo exſerto, foliis ternis patentiſſimis. *Berg. cap.* 100.

E. antheris bifidis incluſis, corollis campanulatis, foliis quaternis ciliatis patentibus. *Sp. pl.* 502.

E. ariſtata, foliis ternis ovatis ciliatis, floribus axillaribus, caule decumbente. *Thunb. Diſſ. n.* 60. * *Thunb. prod.* 73.

E. (*thymifolia*) antheris ariſtatis exſertis, corolla ſubcampanulata violacea glabra, ſtylo exſerto, calyce ovato ciliato, floribus racemoſis, foliis quaternis ovatis ciliatis, caule piloſo, pilis apice glanduloſis. *Wendl. obſ. p.* 48.

E. africana hirſuta thymi foliis ternis. *Pluk. mant.* 69. *t.* 347. *f.* 1.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 431.

Flachblättrige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Rami *pilosi, pilis apice glanduliferis.* Folia *plerumque terna, saepius quaterna petiolata, ovata acuta glabra subtus pallida, margine ciliata, ciliis apice glandulosis distantibus.* Calyces *et* pedunculi *eodem modo pilosi.* W.

* 16. ERICA *hirta.*

E. aristata, foliis ternis linearibus hispidis, floribus umbellatis, calyce scabro rudi. *Thumb. Diss. n.* 56. *t.* 2. *f.* 3. * *Thumb. prod.* 72.

Rauhe Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei *in* Paardeberg. ♄

Corollae *globosae subvillosae longe pedunculatae.* W.

* 17. ERICA *bicolor.*

E. aristata, foliis ternis ovatis scabris, floribus ternis cernuis glabris, calyce villoso colorato. *Thumb. Diss. n.* 57. * *Thumb. prod.* 72.

Zweyfarbige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei *in montibus* Franschе Hoek. ♄

Folia *terna ovata obtusa scabra tenuissime villosa.* Flores *in ramis et ramulis terminales saepius terni mutantes glabri.* Corolla *campanulata.* Antherae *subexsertae.* Thunb. l. c.

18. ERICA *articularis.*

E. antheris aristatis inclusis, corollis globosis calyce colorato multo minoribus, foliis ternis linearibus margine membranaceis. W.

E. aristata, foliis ternis ovatis glabris, floribus racemosis, caule erecto. *Thumb. Diss. n.* 58. * *Thumb. prod.* 72.

E. antheris bifidis inclusis, corollis campanulatis calyce colorato brevioribus, foliis ternis linearibus laevibus appressis. *Mant.* 65.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 439.

Grofskelchige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)

*Frutex.* Folia *linearia adpressa glabra, longitudine internodiorum.* Flores *racemosi pedunculati.* Bracteae *solitariae et binae calycis facie et colore.* Calyx *ovatus laevis incarnatus.* Corolla *campanulata alba.* Stamina *corolla breviora.* Antherae *fuscae bipartitae.* Stylus *atropurpureus.* Stigma *apice coerulescens.*

19. ERICA *viridipurpurea.*

E. antheris aristatis, corollis campanulatis, stylo incluso, foliis ternis, floribus sparsis. *Syst. veg.* 301.

E. (*virescens*) aristata, foliis ternis lanceolatis glabris, floribus racemosis secundis. *Thunb. Diss. n.* 59.
E. foliis lanceolatis oppositis imbricatis, floribus uno versu racemosis. *Hort. cliff.* 148. *Sauv. monsp.* 170.
E. major, floribus ex herbaceo purpureis. *Bauh. pin.* 485.
E. corios folio 3. *Clus. hist.* 1. *p.* 42.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 429.
Grünlichrothe Heide. W.
*Habitat in* Lusitania. ♄
Variat *foliis quaternis.*

20. ERICA *pubescens.*

E. antheris aristatis stylo incluso, corollis ovatis pubescentibus, foliis ternis quaternisve hirtis, caule piloso. W.
E. aristata, foliis ternis quaternisque linearibus scabris, floribus umbellatis pilosis. *Thunb. Diss. n.* 61.* *Thunb. prod.* 73.
E. antheris bifidis inclusis, corollis subovatis pubescentibus, foliis quaternis linearibus hirtis. *Sp. pl.* 506.
β. E. (*parviflora*) antheris bifidis inclusis, corollis subrotundis longitudine calycis, foliis quaternis ciliatis. *Sp. pl.* 506.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 535.
Behaarte Heide. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei *in collibus infra montem* Tabularem. ♄ (v. s.)

*——*foliis quaternis.*

21. ERICA *persoluta.*

E. antheris aristatis, stylo incluso, corollis campanulatis, calyce colorato, foliolis ovatis ciliatis, floribus terminalibus umbellatis, foliis ternis quaternisve linearibus glabris patentibus, ramulis pubescentibus. W.
E. aristata, foliis ternis quaternisque trigonis glabris, floribus umbellatis calyce ciliato. *Thunb. Diss. n.* 62.* *Thunb. prod.* 73.
E. antheris aristatis, corollis campanulatis, stylo incluso, calycibus ciliatis, foliis quaternis. *Mant.* 230.
E. (*subdivaricata*) antheris stylisque inclusis, corollis subcampanulatis aggregatis subsessilibus, foliis quaternis obtusis, ramulis divaricato-erectis. *Berg. cap.* 114.*
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 434.

Ausgebreitete Heide. W.
*Habitat in campis arenosis* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)
Caulis *fruticosus laeviusculus*: Ramis *pubescentibus*. Folia *quaterna linearia obtusa erecta subtus canaliculata longitudine articulorum hispida aut subscabra*. Flores *umbellati, dispersi in summis ramulis*. Calyx *minutissimus* (*si probe advertas*) *ciliatus* Corolla *campanulata obtusa*. Antherae *basi biaristatae inclusae*. Stylus *longitudine corollae*. Stigma *capitatum*.

*22. ERICA *gracilis*.
E. antheris aristatis, stylo exserto, corollis campanulatis, calyce colorato, foliolis linearibus glabris, floribus terminalibus umbellatis, foliis quaternis linearibus glabris adpressis, caule glaberrimo. W.
E. (*gracilis*) antheris aristatis inclusis, corolla alba subcampanulata glabra, stylo exserto, floribus dispersis vel terminalibus umbellatis, foliis quaternis linearibus brevibus glabris nitidis. *Wendl. obs.* 47.*
Schlanke Heide. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. v.)

*23. ERICA *strigosa*.
E. antheris aristatis, stylo exserto, corollis campanulatis, calycis foliolis linearibus ciliatis, floribus terminalibus umbellatis nutantibus, foliis quaternis linearibus erectis hirtis, ramulis pilosis. W.
E. antheris aristatis, corollis campanulatis glabris, stylo exserto, foliis quaternis pubescentibus ciliatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 17.
Striegliche Heide. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)
*Rami villosiusculi*. Folia *quaterna petiolata linearia acuta patentia villosiuscula, pilis longis raris apice glandulosis ciliata trilinearia*. Petioli *semilineares*. Flores *in ultimis ramulis axillares*. Pedunculi *sesquilineares*. Bracteae *tres lineares minutae caducae*. Calycis *foliola lanceolata villosa adpressa lineam longa*. Corolla *campanulata pallide rubens glabra, calyce fere duplo longior*: tubus *parum ventricosus*; limbi *laciniae obtusae erectae*. Filamenta *alba, calyce paulo breviora*. Antherae *inclusae oblongae nigricantes bipartitae, biaristatae*: aristae *subulatae breves parum divaricatae*. Stylus *corolla paulo longior virescens*. Stigma *incrassatum convexum nigro-purpureum*. Ait. l. c.

24. ERICA *caffra.*

E. antheris ariſtatis, corollis ovatis, ſtylo exſerto, foliis quaternis pubeſcentibus, floribus congeſtis. *Syſt. veg.* 303.

E. antheris bicornibus incluſis, corollis ſubovatis mediocribus ſolitariis, foliis ternis, caule arboreo. *Sp. pl.* 502.

E. foliis lineari-ſubulatis ternis, corollis ovatis, calycibus acutis patulis. *Hort. cliff.* 148.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 437.

Caffersche Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Magnitudine *Juniperi.*

25. ERICA *arborea.*

E. antheris ariſtatis, ſtylo exſerto, corollis campanulato-globoſis, floribus terminalibus umbellatis, foliis ternis quaternisque linearibus ſcabriuſculis, ramulis villoſis. W.

E. antheris ariſtatis, corollis campanulatis, ſtylo exſerto, foliis ternis, ramulis incanis. *Syſt. veg.* 302. *Mill. dict. n.* 5.

E. ramis erectis tomentoſis, foliis peranguſtis acutis confertis flores ſuperantibus. *Hall. helv. n.* 1074.

E. erecta foliis quaternis, floribus ſpicato-racemoſis. *Sauv. monſp.* 170. 46.

E. foliis aceroſis linearibus patentiſſimis, corollis ovatis, ſtaminibus brevibus. *Hort. cliff.* 47. *Roy. lugdb.* 442.

E. maxima alba. *Bauh. pin.* 485.

E. coris folio 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 4.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 432.

Baumartige Heide. W.

*Habitat in* Europa *auſtrali.* ♄ (v. v.)

Flores *Convallariae albi.* Caules *albidi.*

*26. ERICA *ſtricta.*

E. antheris ariſtatis, ſtylo incluſo, corollis ovatis, floribus terminalibus umbellatis, foliis quaternis linearibus glabris horizontalibus. W.

Erica ſtricta. *Donn. Catal. hort. Cantab. p.* 45.

Steife Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Rami *et ramuli glaberrimi.* Folia *quaterna petiolata linearia utrinque plana obtuſa glabra horizontaliter patentia.* Pedunculi *quatuor vel quinque in ramulorum apice colorati glabri bracteis* 2 *ſ.* 3 *ſuffulti linea-*

*ribus.* Calyx *viridis glaber*, *foliolis oblongo-ovatis obtusis.* Corolla *rubra ovata*, *laciniis limbi ovatis reflexis.* Stamina *corolla duplo breviora.* Stylus *inclusus.* W.

*27. ERICA *florida.*

E. antheris aristatis, stylo incluso, corollis globosis, calyce villoso reflexo, floribus terminalibus umbellatis, foliis quaternis linearibus pilosis. W.

E. aristata, foliis quaternis lanceolatis hirsutis, floribus umbellatis, calyce villoso reflexo. *Thunb. Diss. n.* 64. *t.* 6. *f.* 1. * *Thunb. prod.* 73.

Vollblutige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)

28. ERICA *mucosa.*

E. antheris aristatis, stylo incluso, corollis globosis mucosis; pedunculis ternis terminalibus flore longioribus, foliis quaternis linearibus margine cartilagineo serratis. W.

E. antheris aristatis inclusis, corollis globosis mucosis fasciculatis cernuo-patentibus terminalibus, foliis quaternis. *Andrews Erica.* *

E. antheris aristatis, corollis subglobosis mucosis, stylo incluso, foliis ternis. *Mant.* 232. *Icon. horti Kewens. t.* 15.

E. (*ferrea*) antheris stylisque inclusis, corollis globosis umbellatis, umbellis paucis, foliis quaternis linearibus obtusis imbricatis. *Berg. cap.* 112. *

E. cristata, foliis ternis ovatis serratis glabris, floribus umbellatis viscosis, calyce ovato colorato. *Thunb. Diss. n.* 76. * *Thunb. prod.* 73.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 427.

Schleimige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei *inter urbem et* Bay falso. ♄ (v. s.)

Caulis *frutescens determinate ramosus, lineis albis subulatis decurrentibus sub cicatricibus foliorum.* Folia *terna linearia laevia appressa interstitiis vix longiora.* Flores *terminales subumbellati*: Pedunculis *longitudine florum*: Bracteis *linearibus minutis remotis.* Calyx *scariosus mucosus, corolla paulo brevior, ovatus acutus.* Corolla *subglobosa mucosa obtusa.* Antherae *aristatae ovatae breves.* Stylus *brevis cylindricus.* Stigma *nudum.*

29. ERICA *pilulifera.*

E. ariſtata, foliis quaternis linearibus ciliatis, floribus umbellatis, calyce naviculari apice ciliato glabro. *Thunb. Diſſ. n.* 65. * *Thunb. prod.* 73.

E. antheris ariſtatis, corollis campanulatis, ſtylo incluſo, foliis ternis, floribus umbellatis. *Syſt. veg.* 301. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3 *p.* 429.

Pillentragende Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in montibus verſus* Bay falſo. ♄

Corollae *globoſo-campanulatae.*

*30. ERICA *amoena.*

E. antheris ariſtatis, ſtylo incluſo, corollis campanulatis, calyce colorato villoſo, floribus axillaribus verticillatis, foliis quaternis linearibus imbricatis villoſis. W.

E. (*amoena*) antheris ariſtatis incluſis, corolla campanulata rubra glabra, ſtylis incluſis, calyce colorato villoſo, bractea pedunculo longiore, floribus verticillatis, foliis quaternis linearibus villoſis imbricatis. *Wendl. obſ.* 48.

Angenehme Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

31. ERICA *Tetralix.*

E. antheris ariſtatis, corollis ovatis, ſtylo incluſo, foliis quaternis ciliatis, floribus capitatis. *Oed. dan. t.* 81. *Fabr. helm.* 240. *Hoffm. germ.* 135. *Roth. germ. I.* 170. *II.* 444.

E. ariſtata, foliis quaternis oblongis ciliatis ſubtus tomentoſis, floribus umbellatis, calyce ciliato tomentoſo. *Thunb. Diſſ. n.* 66. *

E. foliis ſubulatis ciliatis quaternis, corollis globoſo-ovatis terminalibus confertis. *Hort. cliff.* 148. *Fl. ſuec.* 310. 337. *Roy. lugdb.* 442.

E. ex rubro-nigricans ſcoparia. *Bauh. pin.* 486.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 555.

Sumpf Heide. W.

*Habitat in* Europae *borealis paludibus ceſpitoſis.* ♄ (v. v.)

*Bis in anno floret.*

*Clariſſimi Viri Smith et Gaertner differentiam inter Ericas et Andromedas in diſſepimentorum capſulae ſitu quaerunt; ſed haec ſpecies gaudet diſſepimento valvulis contrario; an ergo potius Andromedis adnumeranda?* W.

*32. ERICA *inflata.*

E. ariſtata, foliis quaternis linearibus glabris, floribus umbellatis ventricoſis, calyce ſubulato glabro. *Thunb. Diſſ. n.* 67. *t.* 2. *f.* 2. * *Thunb. prod.* 73.

Aufgeblaſene Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

Folia *glabra.* Flores *umbellati cernui.* Pedunculi *villoſi.* Corolla *ventricoſa inflata obtuſa pallide ſanguinea glabra ſubpollicaris.* Antherae *ariſtatae ſtylusque incluſus.* Thunb. l. c.

*33. ERICA *gilva.*

E. antheris ariſtatis, ſtylo incluſo, corollis cylindraceis, calycinis foliolis membranaceis, floribus axillaribus verticillatis, foliis quaternis linearibus glabris cartilagineo-mucronatis. W.

E. (*gilva*) antheris ariſtatis incluſis bicornibus, corolla cylindrica inflata, ſtylis incluſis, calycibus ovatis margine ſcarioſo, floribus verticillatis racemoſis, foliis quaternis et ultra acuminatis ſubtrigonis mucronatis glabris. *Wendl. obſ.* 48.

Fahlgelbe Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Corolla *magna cylindracea ſordide flaveſcens, apice anguſtata vireſcens, laciniis limbi ſubrotundis obtuſis breviſſimis.* W.

*Ab affinibus* foliis *confertiſſimis cartilagineo-mucronatis ut et* corollae *forma diſtincta.* W.

34. ERICA *abietina.*

E. antheris ariſtatis, ſtylo incluſo, corollis cylindricis, floribus verticillatis nutantibus, foliis quaternis linearibus adpreſſis. W.

E. antheris ariſtatis, corollis groſſis, ſtylo incluſo, foliis quaternis, floribus ſeſſilibus. *Syſt. veg.* 302.

E. foliis ſubulatis glabris quinis pluribusque verticillatis, floribus longiſſimis terminalibus confertis. *Hort. cliff.* 148.

E. antheris ſtylisque incluſis, corollis ventricoſo-cylindricis magnis verticillatis pedicellatis nutantibus, foliis quaternis glabris. *Berg. cap.* 105. *

E. folio juniperi, floribus purpureis oblongis. *Buxb. cent.* 4. *p.* 25. *t.* 41. 42. *optima.*

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 435.

Tannenartige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Corollae *cylindricae foliis duplo longiores.*
*E. abietina Thunbergii mihi videtur dubia.* W.

*35. ERICA *verticillata.*
E. antheris aristatis, stylo incluso, corollis cylindricis supra basin constrictis, floribus pendulis verticillatis, foliis quaternis patentibus. W.
E. antheris aristatis inclusis, corollis pollicaribus cernuis ventricoso-cylindricis saturate rubris, pedunculis longissimis, foliis quaternis. *Andrews Erica.* *
Wirtelblütige Heide. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)
*Distinctissima:* corolla *coccinea supra basin constricta, qua nota primo intuitu distinguitur.* W.

*36. ERICA *Pattersonia.*
E. antheris aristatis, stylo exserto, corolla tubuloso-clavata, floribus horizontalibus terminalibus, foliis quaternis quinisve linearibus glabris, junioribus confertissimis. W.
E. (*Pattersonia*) antheris aristatis inclusis, foliis quaternis, floribus axillaribus e foliis emergentibus cylindricis luteis. *Andrews Erica.* *
E. antheris aristatis inclusis, corolla lutea tubulosa glabra, stylo incluso, floribus terminalibus ramulorum et axillaribus, in medio caulis pyramidalibus erectis, foliis quinis confertis subulatis subfiliformibus glabris. *Wendl. Erica p.* 15. *t.* 5. *
Pattersonsche Heide. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)
Rami *glabri.* Folia *quaterna vel quina linearia glabra mucronata arcuata, in ramis junioribus confertissima.* Flores *solitarii vel bini in ramulorum brevissimorum apice.* Calycis *foliola lanceolato-subulata glabra bracteis quatuor lineari-subulatis cincta.* Corolla *flava tubulosa subclavata, laciniis limbi ovatis obtusis patulis.* Antherae *bipartitae fuscae basi aristatae inclusae.* Stylus *subexsertus.* W.

* - - - *foliis senis.*

37. ERICA *mammosa.*
E. antheris aristatis, stylo incluso, corollis clavato-cylindraceis, floribus umbellatis foliis subsenis linearibus reflexis. W.
D. aristata, foliis senis lanceolatis glabris, floribus um-

bellatis, calyce ſubulato glabro. *Thunb. Diſſ. n.* 69.* *Thunb. prod.* 73.

E. antheris ariſtatis, corollis groſſis, ſtylo exſerto, foliis quaternis. *Mant.* 234.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 436.

Zitzenförmige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei ♄ (v. ſ.)

Caulis *frutex rigidulus, lineis albis ſubulatis a cicatriculis foliorum decurrentibus.* Folia *quaterna ſubulata conferta margine ſcabriuſcula.* Flores *ſubcapitati pollicares.* Pedunculi *breviſſimi purpurei.* Bracteis *minimis remotis.* Calyx *coloratus ſanguineus ovatus breviſſimus.* Corolla (*E. cerinthoidis*) *ovato-cylindrica ſanguinea longiſſima, ore obtuſo.* Antherae *biariſtatae corolla longiores.* Stigma *turbinatum quadrangulare.*

Antherae *et* ſtylus *incluſus in ſpecimine meo, etiam Clariſſ. Thunberg idem obſervavit.* l. c. W.

38. ERICA *empetrifolia.*

E. antheris ariſtatis, ſtylo exſerto, corollis campanulatis, floribus verticillatis, foliis ſenis linearibus piloſis. W.

E. ariſtata, foliis ſenis oblongis ciliatis, floribus verticillatis, calyce ciliato. *Thunb. Diſſ. n.* 70.* *Thunb. prod.* 73.

E. antheris ariſtatis, corollis ovatis, foliis quaternis, floribus ſeſſilibus lateralibus. *Berg. cap.* 28.

E. antheris bifidis incluſis, corollis ovatis ſubſeſſilibus, foliis quinis obtuſis ciliatis. *Sp. pl.* 507.

E. africana coridis folio piloſo, floſculis minutiſſimis purpureis inter ramulos diſperſis. *Pluk. mant.* 68.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 442.

Rauſchbeerblättrige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in montibus verſus* Bay falſo. ♄ (v. ſ.)

Folia *ſparſa, ut Lycopodii, quaſi ſpiraliter, unde numerus eorum difficilis.*

39. ERICA *ſpicata.*

E. antheris ariſtatis, ſtylo exſerto, corollis tubuloſo-clavatis, floribus in ramorum apice verticillatis, foliis quaternis ſenisve linearibus glabris. W.

E. ariſtata, foliis ſenis lanceolatis glabris, floribus verticillatis, calyce petiolato integro. *Thunb. Diſſ. n.* 71. *tab.* 4. *f.* 3.* *Thunb. prod.* 73.

E. antheris ariſtatis incluſis, floribus pluribus denſe ſpi-

catis ſubterminalibus, foliis ſubſenis. *Andrews Erica.**

E. (*ſeſſiliflora*) antheris ariſtatis, foliis quaternis, ſtylo exſerto, ſpica floribus ſeſſilibus deflexis oblongis. *Lin. ſuppl.* 222.

Aehrenblütige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in montibus inter* Nordhoek *et* Bay falſo, ♄ (v. v.)

Frutex *fuſcus ſcaber determinate ramoſus rigidulus, facie Pini ſylveſtris minoris.* Folia *quaterna confertiſſima linearia acuta ſaturate viridia.* Spica *terminalis undique ambiens oblonga.* Flores *ſeſſiles imbricati latiuſculi.* Corollae *foliis longiores clavatae obtuſae ſaepius cernuae.* Stamina *non exſerta.* Stigma *parum exſertum.*

Folia *quaterna et ſena in eodem frutice.* Flores *non ſeſſiles ſed pedunculo brevi inſtructi:* Corolla *albida apice vireſcens.* W.

* - - - - *foliis octonis.*

40. ERICA *octophylla.*

E. antheris ariſtatis, ſtylo incluſo, corollis cylindraceis ventricoſis, floribus umbellato-capitatis, foliis linearibus octonis truncatis. W.

E. ariſtata, foliis octonis linearibus truncatis ſquarroſis, floribus umbellatis. *Thunb. Diſſ. n.* 72. *t.* 5. *f.* 1.* *Thunb. prod.* 73.

E. (*faſcicularis*) antheris ariſtatis, corollis groſſis, ſtylo incluſo, floribus faſciculatis, foliis pluribus linearibus truncatis. *Lin. ſuppl.* 219.

Achtblättrige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in montibus* Hottentots Holland. ♄

Caulis *fruticoſus erectus compoſitus bipedalis.* Folia *conferta ſparſa, ut vix pateat quot e regione, linearia fere filiformia pollicaria laevia, baſi capillaria, erecto-patula, apice fere glandulata.* Flores *in faſciculo terminali faſtigiato.* Calyx *brevior quadripartitus linearis erectus.* Corolla *groſſa cylindrica purpurea, ore quadrifido luteo erecto.* Antherae *ariſtatae longitudine corollae.* Stylus *longitudine ſtaminum.*

*41. ERICA *faſcicularis.*

E. antheris ariſtatis, ſtylo exſerto, corollis cylindricis

clavatis, floribus numerosis verticillatis horizontalibus, foliis octonis linearibus glanduloso-denticulatis. W.

Erica fascicularis. *Icon horti Kewens. t.* 6.

E. (*coronata*) antheris aristatis inclusis, foliis octonis tremulantibus obtusis scabrosis, corollis speciosissimis verticillatis confertis cylindrico-clavatis. *Andrews Erica.* *

Kronenblütige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)

Rami *glabri.* Folia *octona linearia confertissima arcuata margine glanduloso-denticulata glabra, longe petiolata.* Flores *numerosi* 15-24 *sub apice ramorum formant verticillum, sunt pedunculati et horizontaliter siti.* Calycis *foliola lanceolata viridia glabra.* Pedunculi *bracteis binis distantibus linearibus instructi.* Corolla *plus quam uncialis tubulosa clavata sanguinea apice viridis;* laciniis *ovatis acutiusculis conniventibus.* Antherae *fuscae biaristatae inclusae.* Stylus *viridis exsertus.* Stigma *fuscescens.* W.

** 1. *Cristatae foliis sparsis.*

*42. ERICA *obliqua.*

E. antheris cristatis, stylo incluso, corollis ovatis viscosis, floribus terminalibus umbellatis, foliis suboppositis sparsis linearibus arcuatis truncatis. W.

E. cristata, foliis oblique sparsis linearibus truncatis glabris. *Thunb. Diss. n.* 73. *t.* 1. *f.* 3. * *Thunb. prod.* 73. *Icon. horti Kewens. t.* 3.

Schiefblättrige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei *in montibus* Hottentots-Holland. ♄ (v. s.)

Pedunculi *flore longiores colorati viscidi, bracteis binis linearibus instructi.* Folia *sunt plerumque opposita, saepius quaterna, interdum vero subalterna.* W.

** 2. *foliis oppositis.*

43. ERICA *vulgaris.*

E. antheris cristatis, stylo exserto, corollis campanulatis, calycibus duplicatis, floribus racemosis secundis, foliis oppositis sessilibus sagittatis. W.

E. cristata, foliis oppositis sagittatis. *Thunb. Diss. n.* 74. *

E. antheris ariſtatis, corollis campanulatis ſubaequalibus, calycibus duplicatis, foliis oppoſitis ſagittatis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 120. *n.* 20. *Gunn. norv. n.* 15. *Scop. carn. n.* 460. *Pollich. pal. n.* 378. *Fl. dan. t.* 627. *Kniph. cent.* 11. *n.* 44. *Hoffm. germ.* 135. *Roth. germ. I.* 170. *II.* 443.

E. foliis imis ſimplicibus adpreſſis, floralibus calcaratis. *Hall. helv. n.* 1012.

E. foliis quadrifariam imbricatis triquetris glabris erectis, corollis inaequalibus calyce brevioribus. *Hort. cliff.* 146. *Fl. ſuec.* 308. 336. *Roy. lugdb.* 442.

E. vulgaris glabra. *Bauh. pin.* 485. *Fl. lapp.* 141.

β. E. myricae folio hirſuto. *Bauh. pin.* 485.

E. vulgaris hirſuta. *Raj. angl.* 3. *p.* 471.

γ. E. vulgaris glabra, flore albo. *Rupp. jen.* 90.

δ. E. glabra foliis ſquarroſis. W.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 424.

Gemeine Heide. W.

*Habitat in* Europae *campeſtribus ſterilibus frequens*, δ. *in alpibus locis udis.* ♄ (v. v.)

### * * 3. *foliis ternis.*

## 44. ERICA *gnaphalodes.*

E. antheris criſtatis, corollis ovatis tectis, ſtylo incluſo, foliis ternis, ſtigmate quadripartito. *Berg. cap.* 119.

E. criſtata, foliis ternis ovatis integris glabris, floribus ternis glabris, calyce bracteisque navicularibus coloratis. *Thunb. Diſſ. n.* 75. * *Thunb. prod.* 74.

E. antheris bifidis incluſis, corollis globoſis ternis, calycibus duplicibus obtuſis. *Sp. pl.* 508.

E. africana tenuifolia unedonis flore. *Pluk. mant.* 68. *t.* 346. *f.* 11.

Erica pulchella. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 427. *t.* 23. *f.* 1.

*Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 438.

Ruhrkrautartige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in collibus arenoſis.* ♄ (v. ſ.)

## 45. ERICA *corifolia.*

E. antheris criſtatis, corollis ovatis, ſtylo incluſo, calycibus turbinatis, foliis ternis, floribus umbellatis. *Berg. cap.* 108.

E. criſtata, foliis ternis lanceolatis integris glabris, flori-

bus umbellatis glabris, calyce naviculari inflato. *Thunb. Diss. n.* 77. * *Thunb. prod.* 74.

E. antheris bifidis inclusis, corollis ovatis, calycibus planis, bracteis coloratis, foliis ternis glabris. *Sp. pl.* 507.

E. antheris bifidis exsertis, corollis globosis mediocribus, pedunculis triphyllis, foliis quaternis. *Syst. nat.* 2. *p.* 355.

E. africana glabra fruticosa coris folio, arbuti flore dilute purpureo. *Seb. mus.* 1. *p.* 32. *t.* 21. *f.* 3.

E. capensis coridis folio, flore rubello. *Pet. gaz.* 7. *t.* 3. *f.* 7.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 438.

Erdkieferblättrige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei *in campo sabuloso infra* Taffelberg *et* Sternberg. ♄ (v. s.)

Caulis *fruticosus compositus.* Folia *terna linearia glabra.* Flores *terminales s. umbellulae sessiles.* Bracteae *in singulo pedunculo tres alternae ovatae purpureae, magnitudine et facie folioli calycini.* Calyx *patens, foliolis ovatis purpureis.* Corolla *ovata purpurea.* Stigma *capitatum.*

## 46. ERICA *calycina.*

E. antheris cristatis, stylo incluso, corollis ovatis magnitudine calycis colorati patentis, foliis ternis adpressis. W.

E. cristata, foliis ternis ovatis integris glabris, floribus umbellatis glabris, calyce naviculari truncato cuspidato. *Thunb. Diss. n.* 78. * *Thunb. prod.* 74.

E. antheris cristatis, corollis ovatis, stylo incluso, calycibus patentissimis rotatis, foliis ternis. *Syst. veg.* 303.

E. antheris cristatis inclusis, foliis ternis, ramis filiformibus, corollis minutis urceoliformibus, calycis foliolis corolla longioribus, pedunculis longissimis. *Andrews Erica.* *

Erica gnaphalodes. *Berg. cap.* 119.

E. antheris bifidis inclusis, corollis subovatis calyces coloratos aequantibus, foliis ternis laevibus. *Sp. p.* 507.

E. africana humilis, flore albo urceolari coris folio, calyce amplo. *Seb. mus.* 2. *p.* 13. *t.* 11. *f.* 7.

*Houttuyn Lin. Pfl.* Syst. 1. *p.* 439.

Bedeckte Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei *in summitate montis* Tabularis. ♄ (v. s.)

Folia *triquetra.* Bracteae *alternae.* Calyx *obtusus.*

47. ERICA *triflora.*

E. antheris cristatis, stylo incluso, corollis globosis magnitudine calycis colorati adpressi, floribus ternis terminalibus, foliis ternis, caule hirsuto. W.

E. cristata, foliis ternis subulatis glabris, floribus subternis, calyce ovato aequante, caule hispido. *Thunb. Diss. n.* 79. *t.* 5. *f.* 2. * *Thunb. prod.* 74.

E. antheris cristatis, corollis globoso-campanulatis, stylo incluso, foliis ternis, floribus terminalibus. *Syst. veg.* 303.

β. Erica triflora aristata. *Wendl. obs.* 47. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 437.

Dreyblumige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei *in summitate montis* Diaboli. ♄ (v. v.)

Rami *et* Pedunculi *tomentosi.* Corollae *longitudine calycis.*

*Varietas* β. *differt tantum a vulgari:* antheris *aristatis hispidis*, foliis *et* floribus *minoribus et* habitu *confertiori.* Wendl. l. c.

48. ERICA *scoparia.*

E. cristata, foliis ternis linearibus integris glabris, floribus umbellatis, calyce ovato brevi, caule hispido. *Thunb. Diss. n.* 80. *

E. antheris aristatis, corollis campanulatis, stigmate exserto peltato, foliis ternis. *Syst. veg.* 302.

E. antheris bicornibus inclusis, corollis campanulatis longioribus, foliis ternis patentibus, ramis albis. *Sp. pl.* 502.

E. erecta, foliis ternis, floribus ad alas sessilibus verticillatis. *Sauv. monsp.* 170.

E. major scoparia, foliis deciduis. *Bauh. pin.* 485.

E. scoparia, flosculis herbaceis. *Lob. ic.* 2. *p.* 215. *Sauv. monsp.* 46.

E. coris folio IV. *Clus. hist.* 1. *p.* 42.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 431.

Besenförmige Heide. W.

*Habitat* Monspelii, *in* Hispania, Europa *australi.* ♄

Folia *brevi diffluunt.*

49. ERICA *Bergiana.*

E. cristata, foliis ternis lanceolatis scabris, floribus subter-

nis, calyce reflexo ciliato. *Thunb. Diff. n.* 81. *Thunb. prod.* 74.

E. antheris ariſtatis, corollis campanulatis, ſtylo incluſo, calycibus reflexis, foliis ternis. *Mant.* 235.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 428.

Bergiusſche Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in* Roode Sands Kloof. ♄

Frutex *bipedalis pubeſcens.* Folia *terna linearia ſubciliata erecta.* Flores *terminales ramulorum ſubſolitarii, breviſſime pedunculati.* Calyx *tetraphyllus lanceolatus acutus, corolla triplo brevior patens ſ. reflexus.* Corolla *campanulata* (*Convallariae majalis*) *purpurea obtuſa.* Stamina *corolla breviora.* Antherae *ariſtatae.* Piſtillum *longitudine corollae.* Stigma *ſubcapitatum.*

*50. ERICA *formoſa.*

E. criſtata, foliis ternis ovatis integris glabris, floribus umbellatis ſulcatis, calyce patenti integro. *Thunb. Diff. n.* 82. *t.* 5. *f.* 3. * *Thunb. prod.* 74.

Zierliche Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

Folia *parva oblonga obtuſa patentia.* Flores *in ramulis terminales bini, terni, raro plures, cernui.* Corolla *albida globoſa ſtriata.* Antherae *purpureae* ſtylusque *incluſus.* Thunb. l. c.

*51. ERICA *rubens.*

E. criſtata, foliis ternis linearibus integris glabris, floribus umbellatis globoſis, calyce lanceolato brevi, ramis glabris. *Thunb. Diff. n.* 83. * *Thunb. prod.* 74.

Roethliche Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

Calycis *foliola lanceolata adpreſſa ſupra plana, ſubtus convexa ſulco longitudinali viridi-purpuraſcentia breviſſima.* Corolla *globoſa ſanguinea magnitudine piperis.* Antherae *criſtatae* ſtylusque *incluſus.* Thunb. l. c.

*52. ERICA *incarnata.*

E. criſtata, foliis ternis ovatis integris glabris, floribus umbellatis ovatis, calyce integro, ramis villoſis. *Thunb. Diff. n.* 84. * *Thunb. prod.* 74.

Fleiſchfarbene Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Calycis *foliola lanceolata integra glabra adpreſſa pur-*

*purea, corolla quadruplo breviora.* Corolla *oblonga campanulata alba ſemiunguicularis.* Antherae *criſtatae incluſae.* Stylus *longitudine corollae, vix exſertus, ſtigmate obtuſo.* Thunb. l. c.

53. ERICA *cinerea.*

E. antheris criſtatis, corollis ovatis, ſtylo ſubexſerto, foliis ternis, ſtigmate capitato. *Oed. dan. t.* 38.

E. criſtata, foliis ternis lanceolatis integris glabris, floribus umbellatis ovatis, calyce ferrulato, ramis villoſis. *Thunb. Diſſ. n.* 85. *

E. antheris bicornibus incluſis, corollis ovatis racemoſis, foliis ternis glabris linearibus. *Sp. pl.* 501. *Mill. dict. n.* 3.

Erica humilis. *Necker gallob.* 182.

E. foliis linearibus ternis, floribus globoſo-oblongis laxe ſpicatis. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 110.

E. foliis acerosis glabris ternis, corollis oblongo-ovatis, ſtaminibus longioribus verticillato-racemoſis. *Loeſl. it.* 137. *

E. humilis, cortice cinereo arbuti flore. *Bauh. pin.* 486.

E. coris folio 6. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 47.

β. Erica ternis per intervalla ramulis. *Bauh. pin.* 486.

E. coris folio 5. *Cluſ. hiſt.* 1. *p* 43.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 440.

Graue Heide. W.

*Habitat in* Europa *media, inque* Oriente. ♄ (v. v.)

Flores *coeruleſcentes.*

54. ERICA *auſtralis.*

E. antheris criſtatis, corollis cylindricis, ſtylo exſerto, foliis ternis patentibus. *Syſt. veg.* 303.

E. criſtata, foliis ternis linearibus ferrulatis glabris, floribus terminali-ſubſeſſilibus, bracteis imbricatis. *Thunb. Diſſ. n.* 86. *

E. antheris criſtatis incluſis, corollis cylindricis, calycibus duplicatis, foliis quaternis patentibus. *Mant.* 231.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 441.

Südliche Heide. W.

*Habitat in* Hiſpania. ♄ (v. f.)

Caulis *frutex erectus rigidus cinereus.* Folia *quaterna linearia obtuſa margine ſcabriuſcula patentia.* Flores *terminales* ♀ *ſ.* 3, *ſubſeſſiles.* Calyx *rudis acutus carinatus imbricatus bracteis ſimilibus.* Corolla *cylindrica vix clavata obtuſa calyce triplo longior.* La-

ciniae *corollae caneſcentes.* Antherae *biariſtatae criſtatae incluſae bifidae.* Stylus *exſertus.* Stigma *capitatum.*

** 4. *foliis quaternis.*

55. ERICA *ramentacea.*

E. antheris criſtatis, ſtylo incluſo, corollis globoſis, floribus umbellatis, foliis quaternis linearibus trigonis patentibus glabris. W.

E. antheris criſtatis incluſis, corollis globoſis, umbellis confertis rubro-purpureis, pedunculis longiſſimis coloratis, foliis quaternis. *Andrews Erica.* *

E. criſtata, foliis quaternis trigonis integris, floribus umbellatis, calyce lanceolato brevi. *Thunb. Diſſ. n.* 87.* *Thunb. prod.* 74.

E. antheris criſtatis incluſis, corolla purpurea globoſa, ore aperto obtuſo glabro, ſtylo incluſo, floribus ramulorum terminalibus umbellatis erectis et cernuis, foliis quaternis lineari-filiformibus glabris erectis ſubimbricatis. *Wendl. Erica: p.* 17. *t.* 6. *

E. antheris ariſtatis, corollis globoſis, ſtylo incluſo, ſtigmate duplicato, foliis quaternis ſetaceis. *Mant.* 65.

E. (*multumbellifera*) antheris ſtylisque incluſis, corollis globoſis umbellatis, umbellis frequentibus, foliis quaternis ſubulatis glabris adpreſſis. *Berg. cap.* 110.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 433.

Splittrige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Rami *filiformes ramentacei longi ferruginei.* Folia *anguſtiſſima quaterna erecta adpreſſa.* Flores *umbellati.* Calyx *corolla brevior viridis.* Corollae *globoſae purpureae.* Antherae *cornubus* 2 *ciliatis, introrſum mucronatae, lateribus ovato-dehiſcentes.* Stylus *purpureus.* Stigma *duplex, inferius ſubrotundum, ſuperius quadrifidum.*

*Huc pertinent ſecundum Illuſtr. Thunberg: Erica pilulifera et granulata Linnaei.* W.

*56. ERICA *quadriflora.* W.

E. antheris criſtatis, ſtylo incluſo, corollis globoſis, calyce reflexo ciliato, umbellis terminalibus ſubquadrifloris, foliis quaternis linearibus ciliatis, caule piloſo. W.

Vierblütige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Rami *teretes piloſi.* Folia *quaterna linearia margine revoluta ciliata.* Flores *purpurei in apice omnium ramulorum umbellati; umbellis plerumque quadrifloris, interdum, praecipue inferne trifloris.* Pedunculi *filiformes florum longitudine piloſi, bracteis binis coloratis linearibus ciliatis ſuffulti.* Calyx *coloratus, foliolis apice viridibus lanceolatis reflexis ciliatis.* Corolla *globoſa, laciniis limbi obtuſis erectis.* Stamina *corolla breviora.* Antherae *fuſcae appendicibus binis lanceolatis planis tenuiſſime ciliatis inſtructae.* Germen *atropurpureum.* Stylus *ſtaminibus parum longior incluſus atropurpureus.* Stigma *capitatum vireſcens.* W.

*57. ERICA *lateralis.* W.

E. antheris criſtatis, corollis globoſo-campanulatis, calycibus adpreſſis ciliatis, floribus terminalibus et axillaribus ſecundis, foliis quaternis glabris horizontalibus. W.

* Einſeitige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Folia *quaterna aceroſa lineari-trigona obtuſiuſcula glabra horizontaliter patentia.* Flores *ſecundi ad ramorum apices axillares numeroſi purpurei.* Stamina *incluſa.* Stylus *longitudine corollae.* W.

*58. ERICA *margaritacea.*

E. antheris criſtatis, ſtylo exſerto, corollis globoſo-campanulatis, floribus terminalibus ſubumbellatis, foliis quaternis lineari-trigonis glabris erectis. W.

E. antheris criſtatis, corollis urceolato-capitatis, ſtylo mediocri. *Ait. Kew.* 2. *p.* 20.

E. criſtata, foliis quaternis trigonis integris, floribus umbellatis campanulatis, calyce trigono ſubaequante. *Thunb. prod.* 74.

Perlenartige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

Flores *terminales* 4-8 *e ſupremis axillis.* Pedunculi *filiformes foliis breviores.* Bracteae 3 *lineares.* Calycis *foliola e lata baſi ſubulata carinata; carina ſulco exarata, laevia ſesquilinearia.* Corolla *alba:* tubus *urceolatus calyce paulo longior:* limbi *laciniae obtuſae patulae.* Filamenta *alba tubo breviora, apice inflexa.* Antherae *ovatae compreſſae brunneae bipartitae criſtatae:* laminae *oblongae acutae extus inciſo-ſerratae albae, longitudine antherarum.* Germen *ſuperne octo-*

*noduloſum rubicundum.* Stylus *longitudine corollae albicans.* Stigma *capitatum, ſubtus planum, ſupra convexum ſubquadrilobum.* Ait. l. c.

59. ERICA *baccans.*

E. antheris criſtatis, ſtylo incluſo, corollis globoſis calycis colorati magnitudine, floribus umbellatis terminalibus, foliis quaternis lineari-trigonis margine cartilagineis glabris imbricatis. W.

E. antheris criſtatis incluſis, foliis quaternis rigidis glaucis, corollis globoſis umbellatis, calycibusque purpureis. *Andrews Erica.* *

E. criſtata foliis quaternis linearibus ſerrulatis, floribus umbellatis, calyce ovato aequante. *Thunb. Diſſ. n.* 88. * *Thunb. prod.* 74.

E. antheris criſtatis, corollis globoſo-campanulatis tectis, ſtylo incluſo, foliis ternis imbricatis. *Mant.* 233.

E. africana glabra fruticoſa arbuti flore. *Seba. muſ.* 1. *p.* 32. *t.* 21. *f.* 3.

*Hattuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 438.

Beerenförmige Heide. W.

*Habitat in collibus arenoſis* Cap. b. ſpei ♄ (v. v.)

Caulis *erectus ramoſus.* Folia *terna linearia obtuſiuſcula margine ſcabra imbricata internodiis longiora:* Petiolis *albis.* Flores *terminales ſubterni nutantes, magnitudine piſi.* Pedunculi *purpurei:* Bracteis *alternis remotis incarnatis.* Calyx *coloratus incarnatus lanceatus longitudine corollae carinatus inflexus.* Corolla *campanulato-ſubgloboſa obtuſa rubra.* Antherae *muticae breviſſimae criſtatae flavicantes.* Stylus *cylindricus brevis.* Stigma *capitatum.*

*60. ERICA *pendula.*

E. antheris criſtatis, ſtylo incluſo, corollis ovatis, umbellis multifloris terminalibus, foliis quaternis quinisve glabris oblongis margine revolutis, ramis pendulis. W.

E. (*pendula*) antheris criſtatis incluſis, corolla urceolata glabra, ſtylo incluſo, calyce bracteato, floribus terminaibus umbellatis cernuis, foliis quaternis ſaepe quinioblongis obtuſis integris glabris. *Wendland. obſ.* 48.

Hängende Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Rami *penduli glabri.* Folia *quaterna vel quina lineari oblonga petiolata margine revoluta obtuſa gla-*

*bra erecta.* Flores *in ramulorum apice plerumque novem pedunculati nutantes umbellati.* Pedunculi *colorati tenuiſſime pubeſcentes bracteis binis ſub calyce inſtructi.* Calycis *foliola lanceolata obtuſa viridia.* Corolla *ovata.* Antherae ſtylus*que incluſus.* W.

61. ERICA *phyſodes.*

E. criſtata, foliis quaternis linearibus, floribus umbellatis viſcoſis, calyce ovato brevi. *Thunb. Diſſ.* 89. * *Thunb. prod.* 74.

E. antheris criſtatis, corollis ovatis inflatis, ſtylo incluſo, foliis quaternis, floribus ſubſolitariis. *Syſt. veg.* 304.

E. ſtylis ſubexſertis, corollis ovatis majuſculis in ramulis terminalibus ſubternis, foliis quaternis linearibus glabris. *Berg. cap.* 101.

E. antheris bifidis incluſis. corollis ovatis inflatis glabris, foliis quaternis linearibus glabris obtuſis. *Sp. pl.* 506. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 442.

Aufgeblaſene Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in planitie montis* Tabularis. ♄ (v.ſ.)

Folia *patula lato-linearia carinata.* Calyx *ovatus glaber coloratus corolla triplo brevior.* Corollae *magnitudine piſi viſcidae.*

62. ERICA *cernua.*

E. criſtata, foliis quaternis ovatis ciliatis, floribus capitatis, calyce ciliato. *Thunb. Diſſ. n.* 90. * *Thunb. prod.* 74.

E. foliis quaternis, ſtylo incluſo, corolla ovata, calyce ciliato, floribus octonis cernuis. *Lin. ſuppl.* 222.

Erica cernua. *Montin Act. upſ.* 2. *p.* 291. *t.* 9. *f.* 3 *mala.*

Gebeugte Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in* Koude Bockeveld. ♄

63. ERICA *retorta.*

E. antheris ſubcriſtatis, foliis quaternis recurvis, corollis ovato-oblongis, ſtylo mediocri. *Lin. ſuppl.* 220.

E. criſtata, foliis quaternis ovatis ſerrulatis ſquarroſis, floribus umbellatis viſcoſis. *Thunb. Diſſ. n.* 91. * *Thunb. prod.* 75.

E. antheris muticis incluſis, floribus umbellatis, corollis conicis, foliis quaternis ciliatis ſeta terminatis. *Montin Act. holm.* 1774. *p.* 297. *t.* 7. *

E. antheris muticis incluſis, foliis quaternis retorts apice

setaceis, margine ciliatis, floribus umbellatis viscosis carneis ampullaceis. *Andrews Erica.* *

Krumblättrige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei *in montibus* Hottentots-Holland. ♄ (v. s.)

Caulis *frutescens scabriusculus determinate ramosus.* Folia *quaternâ oblongo-ovata recurvata setula terminata, supra convexa glabra lucida.* Flores *terminales corymbosi subsessiles.* Calyx *coloratus ruber lanceolatus, arista terminali.* Corolla *longa ovato-oblonga inflata viscida.* Faux *globosa.* Limbus *quadripartitus acuminatus brevis.* Filamenta *linearia membranacea.* Antherae *intra faucem oblongae acuminatae, basi lanatae vix cristatae muticae.* Germen *oblongum.* Stylus *filiformis.* Stigma *obtusum antheris paulo longius.*

*** † *Muticae foliis alternis.*

64. ERICA *Daboecia.*

E. antheris muticis, stylo incluso, corollis campanulatis, floribus racemosis, foliis alternis ovatis subtus tomentosis. W.

E. mutica, foliis alternis subtus tomentosis. *Thunb. Diss. n.* 1. *

E. racemo terminali, foliis alternis subtus tomentosis. *Sp. pl.* 509. *Hudson. angl.* 166.

Andromeda (*Daboecia*) racemis secundis, floribus quadrifidis ovatis, foliis alternis lanceolatis revolutis. *Syst. nat.* 300.

E. cantabrica flore maximo foliis myrti subtus incanis. *Tournef. inst.* 603.

Erica f. Daboecia hibernis. *Raj. dendr.* 98.

E. hibernica, foliis myrti pilosis subtus incanis. *Petiv. gaz.* 42. *t.* 27. *f.* 4.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 568.

Irrländische Heide. W.

*Habitat in* Hiberniae Gallo vidia *in montibus* Mayo *solo cespitoso.* ♄ (v. v.)

Racemus *terminalis simplex*: Floribus *alternis secundis*: Pedicellis *unifloris subviscidis, subtus* Bractea *lineari.* Calyx 4-*phyllus subulatus erectus purpurascens corolla quadruplo brevior deciduus.* Corolla *violacea cylindrico-ovalis, ore parum coarctato* 4-*fido, laciniis reflexis.* Stamina 8, *filamentis albis.* Antherae *longitudine filamentorum vix corolla breviores fuscae*

*sagittatae muticae, apice truncatae foraminibus duobus.* Stylus *filiformis longitudine corollae.* Stigma *obtusum subquadrifidum.*

* * * †† *foliis oppositis.*

65. ERICA *tenuifolia.*

E. antheris muticis inclusis, corollis calyceque sanguineis, foliis oppositis. *Syst. veg.* 304.

E. mutica, foliis oppositis lanceolatis glabris, floribus ternis, calyce colorato. *Thunb. Diss. n.* 2. * *Thunb. prod.* 69.

E. antheris stylisque inclusis, corollis ovatis aggregatis subsessilibus terminalibus calyce brevioribus, foliis oppositis. *Berg. cap.* 116. *

E. antheris bifidis inclusis, corollis ovatis calyces coloratos aequantibus, foliis oppositis linearibus appressis. *Sp. pl.* 507.

E. africana corios folio minore. *Seb. mus.* 2. *p.* 11. *t.* 9. *f.* 8.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 443.

Dünnblättrige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄

* * * ††† *foliis ternis.*

66. ERICA *albens.*

E. antheris muticis inclusis, corollis ovatis oblongis acutis, racemis secundis, foliis ternis. *Mant.* 231.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 444.

Weissliche Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)

Caulis *frutescens, ramis determinatis virgatis.* Folia *terna linearia triquetra erecta laevia, internodiis longiora acutiuscula.* Flores *subspicati secundi albi:* Pedunculi *bracteis lanceolatis albis.* Calyx *scariosus albus ovatus acuminatus corolla dimidio brevior.* Corolla *oblongo-ovata alba ventre hyalino:* Limbo *quadripartito angustato acuto infundibuliformi.* Antherae *muticae bifidae obtusae breves.* Stylus *corolla brevior.* Stigma *obtusum.*

*67. ERICA *bracteata.*

E. mutica, foliis ternis lanceolatis glabris, floribus umbellatis bracteis petiolatis coloratis obvallatis. *Thunb. Diss. n.* 3. * *Thunb. prod.* 69.

Beblätterte Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in montibus* Platte Kloof. ♄

Flore *terminales umbellati rubri, bracteis obvallati.* Bracteae *petiolatae ovatae acuminatae carinatae glabrae, exteriores margine, interiores totae ſanguineae.* Antherae *muticae* ſtylusque *incluſus.* Thunb. l. c.

## 68. ERICA *Thunbergii.*

E. antheris muticis mediocribus, corollis planis, tubo globoſo, ſtylo exſerto, foliis ternis. *Lin. ſuppl.* 220.

E. mutica, foliis ternis linearibus glabris, floribus umbellatis, corollae tubo globoſo, limbo campanulato. *Thunb. Diſſ. n.* 4. * *Thunb. prod.* 69.

Erica Thunbergii. *Montin. Act. upſ.* 2. *p.* 290. *t.* 9. *f.* 2. *mala.*

Thunbergſche Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in* Konde Bookeveld. ♄

Caulis *rufeſcens teres rarius ramoſus.* Folia *terna linearia laevia ſeſſilia acuta fere appreſſa.* Flores *terminales pedunculati.* Bracteae *duae alternae ſcarioſae lanceolatae.* Calyx *laevis, foliolis ovatis ſcarioſis acutis flavis.* Corollae *tubus ſubglobоſus.* Limbus *quadripartitus longitudine calycis: laciniis ovatis acutis patentibus.* Antherae *extra faucem eminentes purpureae bifidae, baſi interiore gibbae.* Stylus *ſtaminibus longior.* Stigma *ſimplex obtuſum.*

## 69. ERICA *tetragona.*

E. mutica, foliis ternis lanceolatis ciliatis, floribus racemoſis ſecundis tetragonis. *Thunb. Diſſ. n.* 5. *t.* 4. *f.* 2. * *Thunb. prod.* 69.

E. foliis ternis, ſtylo incluſo, corolla tetragona oblonga, calyce lineari, floribus racemoſis ſecundis. *Lin. ſuppl.* 223.

Viereckige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

Flores *lutei* E. *luteae ſed longiores.*

## 70. ERICA *umbellata.*

E. antheris muticis exſertis, corollis campanulatis, ſtylo exſerto, foliis ternis acerоſis. *Syſt. veg.* 306.

E. mutica, foliis ternis trigonis ciliatis, floribus umbellatis campanulatis, caule erecto. *Thunb. Diſſ. n.* 6.*

E. antheris bicornibus exſertis, corollis globoſis umbellatis, foliis ternis acerоſis glabris. *Sp. pl.* 501. *Icon. horti Kewenſ. t.* 5.

E. foliis acerosis glabris ternis, corollis ovatis staminibus brevioribus terminalibus. *Loesl. it.* 138.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 454.
Doldenblütige Heide. W.
*Habitat in* Lusitania. ♄ (v. s.)

Antherae *basi gibboso-caudatae.* Corollae *coerulescentes.*

71. ERICA *nudiflora.*

E. antheris muticis exsertis, corollis cylindricis, stylo exserto, foliis ternis, ramis tomentosis. *Mant.* 249. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 57. *t.* 57. *
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 453.
Nacktblütige Heide. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄

Caulis *tomentosus determinate ramosus flexuosus.* Folia *terna linearia, subtus sulco exarata erecta laevia, tenellis basi ciliatis.* Flores *sparsi per ramos copiosi.* Pedicelli *capillares longitudine corollae.* Calyx *simplex subulatus laevis omnium minimus.* Corolla *cylindrica longitudine folii obtusiuscula.* Antherae *exsertae obovatae muticae.* Stylus *exsertus capillaris.* Stigma *obtusum.*

*Simillima E. racemosae sed differt:* foliis *ternis glabris*, calyce *glabro.* W.

*72. ERICA *petiolata.*

E. antheris muticis exsertis, stylo exserto, corollis campanulatis calyce colorato bracteato parum longioribus, floribus ternis terminalibus, foliis ternis lanceolatis glabris. W.
E. mutica, foliis ternis lanceolatis glabris, floribus umbellatis campanulatis, caule decumbente. *Thunb. Diss. n.* 7. *t.* 6. *f.* 2. * *Thunb. prod.* 69.
Gestielte Heide. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei *in summitate montis* Tabularis. ♄ (v. s.)

73. ERICA *Bryanthia.*

E. antheris muticis, stylo exserto, corolla campanulata, floribus racemosis corymbosis, foliis ternis oblongis obtusis. W.
E. mutica, foliis ternis ovatis ciliatis, floribus paniculatis, caule decumbente. *Thunb. Diss. n.* 8. *
Andromeda (*Bryantha*) floribus corymbosis, foliis ellip-

ticis, caule proſtrato. *Mant.* 238. *Pall. roſſ.* 2. *p.* 57. *t.* 74. *f.* 1. *

Bryanthus repens ſerpillifolio, flore roſeo. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 153. *tab.* 57. *fig* 3.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 367.

Moos Heide. W.

*Habitat in* Sibiria *ad portum* Ochotenſem, *in* Camtſchatca *et in inſula* Beringii *cum Empetro et Aluſcis in rupibus.* ♄

Planta *denſis caeſpitibus uti Serpillum provenit.* Antherae *dorſo filamentorum perpendiculariter adhaerentes.* Pedunculi *multiflori.*

*74. ERICA *Stelleriana.*

E. antheris muticis incluſis, ſtylo incluſo, corollis campanulatis, floribus terminalibus geminis, foliis ſubternis oblongo-linearibus obtuſis. W.

Andromeda (*Stelleriana* floribus terminalibus ſubſeſſilibus cernuis, foliis ellipticis confertis. *Pallas roſſ.* 2. *p.* 58. *t.* 74. *f.* 2. *

Stellerſche Heide. W.

*Habitat in* Camtſchatca. ♄

*Simillima praecedenti, at* flores *cernui majores gemini rubicundi,* folia *latiora et ut videtur terna vel oppoſita.* W.

*75. ERICA *fucata.*

E. mutica, foliis ternis lanceolatis glabris, floribus racemoſis ſecundis globoſis, ramis glabris. *Thunb. Diſſ. n.* 9. *

Geſchminkte Heide. W.

*Habitat* - - - - ♄ (v. v.)

Flores *racemoſi ſecundi globoſi albo-virentes.* Antherae *muticae ſtylusque incluſus. Variat* ramis *erectis et inflexis.* Thunb. l. c.

*76. ERICA *axillaris.*

E. mutica, foliis ternis trigonis glabris, floribus racemoſis globoſis, ramis tomentoſis. *Thunb. Diſſ. n.* 10. *
*Thunb. prod.* 69.

Winkelblütige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

Flores *in axillis foliorum ſolitarii pedunculati globoſi minuti.* Antherae *muticae,* ſtylus*que incluſus.* Thunb. l. c.

77. ERICA *imbricata.*

E. antheris muticis exſertis, corollis campanulatis, ca-

lycibus imbricatis, ſtylo exſerto, foliis ternis. *Syſt. veg.* 306.

E. mutica, foliis ternis oblongis ſerratis, floribus umbellatis, bracteis imbricatis, antheris exſertis. *Thunb. Diſſ. n.* 11. *Thunb. prod.* 69.

E. antheris ſtylisque incluſis, corollis oblongis, ramulis lateralibus frequentiſſimis breviſſimis ſterilibus quinquefariam imbricatis. *Berg. cap.* 117.

E. antheris bifidis exſertis, calycibus duplicatis coloratis acutis, corolla longioribus, foliis ternis laevibus. *Sp. pl.* 503.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 454.

Schuppige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in collibus arenoſis.* ♄

*78. ERICA *ſexfaria.*

E. antheris muticis exſertis, ſtylo exſerto, corollis campanulatis calyce colorato imbricato brevioribus, floribus ternis terminalibus, foliis ternis lineari-trigonis glabris ſexfariam imbricatis. W.

Erica ſexfaria. *Icon. horti Kewenſis t.* 11.

Sechsreihige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Tota *glabra.* Folia *craſſiuſcula linearia trigona, margine cartilaginea, terna, patentiuſcula ſexfariam poſita.* Flores *in ramorum apice tres breviſſime pedunculati albi.* Calycis *foliola ſubrotunda acutiuſcula concava corolla campanulata majora, et bracteis quatuor concoloribus oblongo-ſubrotundis carinatis ad medium usque tecta.* Filamenta *rubicunda.* Antherae *fuſcae muticae calyce longiores.* Stylus *antheris longior rubicundus.* Stigma *quadridentatum.* W.

79. ERICA *melanthera.*

E. antheris muticis mediocribus, corollis campanulatis calyce colorato longioribus, ſtylo exſerto, foliis ternis. *Mant.* 232.

E. mutica, foliis ternis trigonis glabris, floribus umbellatis, bracteis ovatis laxis antheris incluſis. *Thunb. Diſſ. n.* 12. * *Thunb. prod.* 69.

Schwarzſtaubbeutliche Heide. W.

*Habitat in campis ſabuloſis* Cap. b. ſpei. ♄

Caulis *fruticoſus flexilis.* Folia *terna linearia obtuſa laevia patula.* Flores *terminales ſubumbellati confertim ſparſi ſubnutantes.* Pedunculi *longitudine co-*

*rollae purpuraſcentes*: Bracteis *lanceolatis alternis coloratis.* Calyx *coloratus ſanguineus obovatus latior quam longus, apice carinatus mucrone.* Corolla *campanulato-hypocrateriformis ſanguinea.* Tubus *longitudine calycis*: Limbus *patens tubo fere longior, laciniis ſubrotundo-ovatis.* Antherae *muticae bifidae atrae, longitudine limbi corollae* (*adeoque exſertae.*) Stylus *exſertus corolla duplo longior ſetaceus.* Stigma *obtuſum ſubtetragonum.*

80. ERICA *leucanthera.*

E. mutica, foliis ternis trigonis glabris, floribus umbellatis, antheris exſertis albis. *Thunb. Diſſ. n.* 13.* *Thunb. prod.* 69.

E. foliis ternis, ſtylo exſerto, corolla campanulata, calyce albo, floribus ternis, ſtaminibus muticis exſertis. *Lin. ſuppl.* 223.

Weiſsſtaubbeutlige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

*Singularis* corolla *alba et* antheris *muticis exſertis albis.*

*81. ERICA *taxifolia.*

E. antheris muticis incluſis, corolla ovata calyce colorato tecta, floribus umbellato-corymboſis, foliis linearitrigonis margine cartilagineis. W.

Erica taxifolia. *Icon. horti Kewenſ. t.* 19.

E. antheris muticis incluſis, corolla cylindrica rubra, limbo patente, ſtylis incluſis, calyce colorato ovato bracteato, foliis ternis trigonis mucronatis glabris, floribus axillaribus et terminalibus umbellatis. *Wendl. obſ.* 44.

Taxusblättrige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Caulis *determinate ramoſus, ramis valde cicatriſatis.* Folia *linearia longa trigona glabra cartilagineo-marginata et mucronata.* Flores *in ramorum apice numeroſi corymboſo-umbellati.* Pedunculi *colorati tenuiſſime ciliati*: bracteis *binis coloratis lanceolatis inſtructi.* Calycis *foliola ſubrotundo-ovata purpurea, mucronata, ciliata, apice carinata, longitudine fere corollae.* Corolla *ovata, tubo carneo, laciniis limbi purpureis ovatis acutis.* Stamina *tubo corollae breviora.* Filamenta *alba.* Antherae *flavae ovatae muticae*

*bipartitae obtusae.* Germen *atropurpureum.* Stylus *purpureus longitudine staminum.* Stigma *obtusum.* W.

82. ERICA *spumosa.*

E. antheris muticis inclusis, corollis ternis calyce communi obtectis, stylo exserto, foliis ternis. *Syst. veg.* 304. *Berg. cap.* 103. *

E. mutica, foliis ternis trigonis glabris, floribus capitatis, bracteis imbricatis. *Thunb. Diss. n.* 14. * *Thunb. prod.* 70.

Erica loeflingiosa. *Berg. cap.* 102.

E. antheris bifidis inclusis, calycibus trifloris, squamis inflexis, foliis ternis laevibus. *Amoen. acad.* 6. *afr.* 14. *Sp. pl.* 508.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 444.

Schaumige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei *in planitie montis* Tabularis. ♄ (v. s.)

Calyx *imbricatus sanguineus.* Corollae *campanulatae flavicantes.* Stylus *longissimus nutans.*

83. ERICA *capitata.*

E. antheris muticis inclusis, corolla globoso-campanulata calyce lanato tecta, floribus sessilibus, foliis ternis linearibus obtusis villosis. W.

E. antheris muticis mediocribus, corollis tectis calyce lanato, foliis ternis, floribus sessilibus. *Syst. veg.* 304.

E. antheris bifidis exsertis, corollis globosis, calycibus lanatis coloratis, foliis ternis hirtis. *Sp. pl.* 504. *Berg. cap.* 94.

E. carnea promont. bonae spei, foliis et floribus villosis. *Petiv. gaz.* 5. *t.* 2. *f.* 10.

E. africana calyce lanuginoso ex viridi luteo, floribus concoloribus exiguis lanugine obsitis. *Seba. mus.* 1. *p.* 30. *t.* 20. *f.* 1. *bona.*

E. capitata nodiflora, globulis lanugine ex flavo-virescente obductis. *Raj. dendr.* 98.

*Houttuyn Lin. Pfl.* Syst. 3. *p.* 445.

Kopfförmige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. v.)

Corolla *semiquadrifida obtusa, calyce non longior.* Antherae *in meis inclusae.* Stylus *exsertus.*

Flores *sessiles in ramulorum apice magnitudine Pisi majoris.* Calyx *foliolis subrotundo-ovatis lanugine flavescente dense obsitis, magnitudine corollae.* Co-

rollae *solitariae vel binae in calyce; tubo globoso tenuissime albo-villoso; limbo glabro erecto; laciniis subrotundis obtusis rectis.* Antherae *stylusque inclusus. A sequente distinctissima, qua cum conjunxit Illustriss. Thunberg.* W.

84. ERICA *Bruniades.*

E. antheris muticis exsertis, corolla campanulata calyce lanato tecta, floribus umbellatis, foliis ternis linearibus obtusis pubescentibus. W.

E. antheris muticis exsertis, corollis tectis calyce lanato, stylo exserto, foliis ternis, floribus sparsis. *Syst. veg.* 306.

E. antheris bifidis exsertis, corollis globosis calyce lanato tectis, foliis ternis subciliatis patentibus. *Sp. pl.* 504.

E. (*capitata*) mutica, foliis ternis ovatis hirsutis, floribus umbellatis, calycibus lanatis. *Thunb. Diss. n.* 15.* *Thunb. prop.* 70.

E. promont. b. spei floribus albidis, staminibus rubris. *Petiv. gaz.* 5. *t.* 2. *f.* 9.

Eriocephalus bruniades ericaeformis monomotapensis capitulis globulorum instar interius cavis et densa lanugine tectis. *Pluk. mant.* 69. *t.* 347. *f.* 9. *optima.*

Frutex africanus aromaticus. *Seb. mus.* 2. *p.* 64. *t.* 63. *f.* 7.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 453.

Wollköpfige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)

Calyx *alba lana obductus tegit totam corollam subtruncatam.*

Folia *minus pilosa quam in praecedente et breviora.* Flores *minores, magnitudine seminis Coriandri, umbellati.* Umbellae *tri-quinqueflorae.* Pedunculi *longitudine floris albo-lanati.* Calyx *lana alba tectus.* Corolla *campanulata magnitudine calycis glabra vel vix manifeste pubescens.* Antherae *exsertae.* Stylus *longissime exsertus.* W.

85. ERICA *Passerina.*

E. mutica, foliis ternis ovatis glabris, floribus subsolitariis, calycibus tomentosis. *Thunb. Diss. n.* 16.* *Thunb. prod.* 70.

E. foliis oppositis, corollis campanulatis, antheris inclusis muticis, pistillo exserto. *Lin. suppl.* 221.

Vogelkopfartige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

Flores *ſolitarii terminales pedunculati.* Pedunculi *albo-tomentoſi floribus fere longiores.* Calyx *campanulatus obtuſiuſculus quadripartitus: foliolis ovatis.* Corolla *campanulata calyce duplo major.* Filamenta *omnium breviſſima.* Antherae *muticae.* Germen *albotomentoſum.* Stylus *exſertus.* Stigma *ſubcapitatum. Herba Paſſerinae Ericoidis, et nulla nota, ab illius diſtinguenda, ut Paſſerina Ericoides tota eſt herba Ericae floribus Paſſerinae.*

*86. ERICA *totta.*

E. mutica, foliis ternis oblongis hiſpidis, floribus ternis, calycibus ciliatis. *Thunb. Diſſ. n.* 17. * *Thunb. prod.* 70.

Hottentotten Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

Rami *hiſpidi.* Folia *patenti-reflexa hiſpida, lineam longa.* Flores *in ultimis ramulis terminales ſolitarii 2 ſ. 3 breviſſime pedunculati cernui albidi.* Calycis *foliola ovata ciliata albida corolla breviora.* Bracteae *ad baſin calycis ovatae albae calyciformes.* Antherae *muticae ſtylusque incluſus.* Thunb. l. c.

87. ERICA *abſynthioides.*

E. antheris muticis incluſis, corollis ovato-campanulatis, ſtylo exſerto, ſtigmate infundibuliformi, foliis ternis. *Syſt. veg.* 304.

E. antheris bifidis incluſis, corollis ſubrotundis, foliis ternis linearibus ſubpubeſcentibus. *Mant.* 66.

E. (*virgata*) ſtigmatibus quadrilobis exſertis, corollis globoſo-campanulatis numeroſis ſecundis, ramis virgatis, foliis ternis hirſutis. *Berg. cap.* 97.

E. (*virgata*) mutica, foliis ternis oblongis ſcabris, floribus ternis globoſis, calycibus integris, ſtylo exſerto. *Thunb. Diſſ. n.* 18. * *Thunb. prod.* 70.

E. africana tenuifolia unedonis flore, foliis longioribus canali appreſſis. *Pluk. mant.* 68. *t.* 347. *f.* 14.

*Houttuyn Lin. Iſl. Syſt.* 3. *p.* 446.

Wermuthartige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in monte* Tabulari *et in dumis verſus* Bay falſo. ♄

Frutex *ſtatura abſynthii paniculatus caule rufo*; Ramis *ternis.* Folia *terna linearia extus gibba ſubhirſuta.* Flores *terminales ramulorum.* Coroliae *pallidae.*

Antherae *atropurpureae bifidae intra os corollae.* Stigma *eminens purpureum quadrifidum.*

88. ERICA *ciliaris.*

E. antheris muticis inclusis, corollis ovatis grossis, stylo exserto, foliis ternis, racemis secundis. *Syst. veg.* 504.

E. mutica, foliis ternis ovatis ciliatis, floribus axillaribus campanulatis, calycibus ciliatis. *Thunb. Diss. n.* 19.*

E. antheris simplicibus inclusis, corollis ovatis irregularibus, floribus terno-racemosis, foliis ternis ciliatis. *Sp. pl.* 503. *Mill. dict. n.* 4.

E. foliis ovatis ciliatis ternis, corollis ovatis apice tubulosis irregularibus verticillato-racemosis. *Loefl. it.* 138.*

E. hirsuta anglica. *Bauh. pin.* 502.
Erica XII. *Clus. hist.* 1. *p.* 46.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 447.
Gefranzte Heide. W.
*Habitat in* Lusitania. ♄ (v. v.)

Planta *suffruticosa bipedalis.* Folia *terna patentissima sessilia ovata acuta margine reflexa ciliata.* Corolla *magna ovata ore contracto inaequali.*

89. ERICA *coerulea.*

E. antheris muticis inclusis, stylo incluso, corollis ovatis, pedunculis terminalibus quaternis quinisque flore nutante multo longioribus, foliis ternis linearibus obtusis cartilagineo-denticulatis. W.

Andromeda (*coerulea*) pedunculis aggregatis, corollis ovatis, foliis sparsis linearibus obtusis planis. *Sp. pl.* 563. *Gmel. sib.* 4. *p.* 121.

Andromeda taxifolia. *Pall. voss.* 2. *p.* 54. *t.* 72. *f.* 2.*

Andromeda foliis linearibus obtusis sparsis. *Fl. lapp.* 165. *t.* 1. *f.* 5. *ed. Smith. p.* 133. *t.* 1. *f.* 5. *Fl. suec.* 335, 354. *Hort. cliff.* 163.

Andromeda rarior norvegica. Burser. *Amoen. acad.* 1. *p.* 332. *Fl. dan. t.* 57.

E. folio abietis, flore arbuti. *Buxb. cent.* 4. *p.* 26. *t.* 53.

E. foliis acerosis glabris imbricatis, floribus campaniformibus basi ventricosis, antheris bifidis inclusis. *Gmel. sib.* 4. *p.* 131. *t.* 57. *f.* 2.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 565.
Blaue Heide. W.

*Habitat in alpibus* Norvegiae, Lapponiae, *inque* Sibiria. ♄ (v. f.)

Pedunculi *et* calyces *glandulis pedicellatis tecti.* W.

90. ERICA *hispidula.*

E. antheris muticis inclusis, corollis subrotundis, foliis subternis ovatis acutis ciliatis, caule hispido. *Lin. suppl.* 222.

E. (*hispida*) mutica, foliis ternis ovatis integris, floribus umbellatis globosis, calycibus integris. *Thunb. Diss. n.* 20.* *Thunb. prod.* 70.

Feinhaarige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei *in planitie montis* Tabularis. ♄ (v. f.)

Caules *decumbentes semipedales strigosi et pilosi.* Folia *ovata acuta subciliata subsessilia horizontalia patula laevia.* Flores *parvi campanulati, versus terram flexi rarius sparsi.* Antherae *inclusae.* Stylus *corolla longior.*

91. ERICA *Petiverii.*

E. antheris muticis exsertis, corollis cylindraceis, calycinis foliolis subrotundis mucronatis bracteatis, floribus pedunculatis solitariis terminalibus, foliis ternis squarroso-patentibus. W.

E. antheris muticis longissimis exsertis, corollis acutis, stylo exserto, calycibus imbricatis, foliis ternis. *Mant.* 235.

E. mutica, foliis ternis linearibus glabris, floribus terminalibus solitariis cylindricis, bracteis imbricatis. *Thunb. Diss. n.* 21. * *Thunb. prod.* 70.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 453.

Petiversche Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄

Frutex *fuscus.* Rami *tecti ramulis ternis confertis brevissimis pubescentibus, obtectis foliis squarrosis.* Folia *terna conferta subulata subtrigona margine subscabra apicem versus patula s. exstantia.* Flores *solitarii terminales ramulorum cernui, pedunculo brevi pubescenti.* Calyx *subcartilagineus angulatus imbricatus, bracteis similibus ternis brevioribus.* Corolla *cylindrica foliis triplo longior, ore quadrifido acuto, lutea.* Antherae *lineares corolla duplo longiores apice bifidae, absque manifestis filamentis.* Stylus *filiformis exsertus staminibus longior.* Stigma *simplex.*

Obſ. *Similis E. Plukenetii, ſed* Calyx *duplex*: Corollae *luteae, acute quadrifidae*; Folia *ſquarroſo-imbricata nec diſtantia.*

*92. ERICA *Banksii.*

E. antheris muticis exſertis, corolla cylindrica limbo revoluto, calycinis foliolis coloratis oblongis obtuſis bracteatis, floribus ſeſſilibus geminatis terminalibus, foliis ternis linearibus glabris erectis. W.

E. (*Banksia*) antheris muticis exſertis, attenuatis in filamenta plana, corolla cylindrica viridi-lutea, caule decumbente ſubſpithamaeo, foliis ternis. *Andrews Erica.* *

Banksische Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

Caulis *decumbens ramoſus.* Folia *terna conferta erecta linear i-trigona acuta.* Flores *in ramulorum apice bini vel ſolitarii ſeſſiles.* Calycis *foliola viridi lutea oblonga obtuſa; bracteis concoloribus tecta.* Corolla *viridi-lutea cylindrica calyce duplo longior, baſi ſubventricoſa, laciniis revolutis.* Antherae *bifidae ſenſim in filamenta dilatatae exſertae flavo-fuſceſcentes.* Stylus *viridis ſtaminibus longior.* Stigma *viride capitatum.* W.

*95. ERICA *Sebana.*

E. antheris muticis exſertis, corolla clavata incurvata, calycinis foliolis ſcariosis oblongis obtuſis bracteatis, floribus ternis terminalibus, foliis ternis linearibus ſquarroſo-patentibus. W.

Erica Sebana. *Donn index horti cantab.* 45. *Icon. horti Kewenſ. t.* 10.

E. (*Plukenetii*) antheris exſertis, corollis lateralibus cylindricis nutantibus, ramulis lateralibus frequentiſſimis breviſſimis ſterilibus. *Berg. cap.* 91. *deſcriptio nec ſynonyma.*

E. africana anguſtifolia glabra, floribus longis tubuloſis dependentibus coccineis cum longiſſimis filamentis ſeu apicibus concoloribus. *Raj. dendr.* 98. *Seba muſ.* 1. *p.* 52. *t.* 21. *f.* 4.

Sebaſche Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Flores *terni breviſſime pedunculati in apice ramulorum breviſſimorum.* Calyx *ſcarioſus: foliolis oblongis obtuſis carinatis, bracteis concoloribus tectis.* Corolla

*purpurea clavata calyce duplo longior incurvata, laciniis limbi obtusis rectis.* Antherae *longissimae exsertae bifidae.* Stylus *longitudine staminum.* W.

*94. ERICA *monadelphia.*

E. antheris muticis exsertis, corolla cylindrico-ovata, calycinis foliolis coloratis oblongis obtusis bracteatis, floribus ternis terminalibus, foliis ternis linearibus obtusis adpresso-erectis. W.

E. antheris muticis exsertis, attenuatis in filamenta plana, corolla conica sanguinea, oris laciniis erectis adpressis, foliis ternis. *Andrews' Erica.* *

Verwachsenfädige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. Spei. ♄ (v. s.)

*A praecedentibus* corollae *figura*, foliis *obtusis in ramis junioribus arcte adpressis*, calyce *colorato sanguineo et aliis notis distinctissima.* Filamenta *sunt dilatata et margine leviter cohaerentes.* W.

95. ERICA *Plukenetii.*

E. antheris muticis longissimis exsertis, corollis cylindricis, stylo exserto, calycibus simplicibus, foliis ternis. *Syst. veg.* 395.

E. mutica, foliis ternis linearibus glabris, floribus racemosis cylindricis, bracteis remotis. *Thunb. Diss. n.* 22. * *Thunb. prod.* 70.

E. antheris bifidis exsertis, corollis subcylindricis subtruncatis longioribus calycibus simplicibus, foliis ternis linearibus. *Sp. pl.* 504.

Erica Plukenetiana. *Icon. horti Kewens. t.* 9.

Chamaepithys aethiopica, foliis laete virentibus, flore oblongo phoeniceo plusquam eleganti. *Pluk. mant.* 45. *t.* 344. *f.* 3. *Seba mus.* 2. *t.* 25. *f.* 5.

α. E. (*Plukenetii pinifolia*) antheris muticis exsertis corolla subduplo longioribus, corolla cylindrica inflata atropurpurea glabra stylo exserto, floribus ramulis racemosis solitariis secundis cernuis, foliis ternis subulatis inflexis glabris confertis. *Wendl. obs.* 45. *Wendl. Erica p.* 9. *t.* 2. *

β. E. (*Plukenetii interrupta*) antheris muticis tertia parte exsertis, corolla cylindrica carnea glabra, stylo exserto, floribus racemosis solitariis secundis cernuis, foliis ternis longis linearibus acuminatis inflexis glabris interruptis. *Wendl. obs.* 46.

γ. E. (*Plukenetii inflata*) antheris muticis exsertis corol-

la duplo longioribus, corolla atropurpurea ventricosa obtusa glabra, stylo exserto, floribus racemosis solitariis secundis cernuis, foliis ternis linearibus subcapillaribus erectis confertis glabris. *Wendl. obs.* 46.

δ. E. (*Plukenetii conferta*) antheris muticis tertia parte exsertis, corolla cylindrica carnea glabra, stylo exserto, floribus racemosis solitariis secundis cernuis, foliis ternis linearibus subcapillaribus erectis confertis glabris. *Wendl. obs.* 46.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 3. p.* 452.

Plukenetsche Heide. W.

*Habitat in collibus arenosis* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)

Folia *terna linearia conferta.* Flores *pedunculati nutantes.* Calyx *corolla dimidio brevior subulatus carinatus.* Corolla *cylindrica longa ore obsolete quadrifido.* Stamina *fere membranacea linearia obtusa corolla duplo longiora.*

Obs. *Similis E. Petiveri sed* calyx *simplex.* Corollae *obsolete quadrifidae rubrae.*

*96. ERICA *versicolor.*

E. antheris muticis subexsertis, corollis clavato-tubulosis glabris, floribus pedunculatis terminalibus, foliis ternis linearibus ciliatis. W.

E. antheris muticis subinclusis, stylo exserto, corollis subcylindraceis costatis varie coloratis, foliis ternis. *Andrews Erica.* *

Bunte Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)

Corollae *tubus aurantiaco-sanguineus superne flavus, laciniis limbi viridibus.* Ramuli *apice* 3-*s. quadriflori.* W.

*97. ERICA *perspicua.*

E. antheris muticis inclusis, corollis tubulosis villosis, floribus sessilibus terminalibus solitariis, foliis ternis linearibus ciliatis. W.

E. (*perspicua*) antheris muticis inclusis, corolla alba perspicua cylindrica clavata pubescente, stylis inclusis, calyce margine ciliari, floribus in ramulis terminalibus solitariis subsessilibus pyramidatis, foliis ternis linearibus brevibus pubescentibus confertis. *Wendl. obs.* 45. *Wendl. Erica p.* 7. *t.* 1. *

Durchscheinende Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)

Caulis *ramulis breviſſimis numeroſis obſitus.* Flore *in omnibus fere ramulis ad apicem ſeſſiles.* Calyx *breviſſimus viridis bracteatus.* Corolla *albido-diaphana.* W.

*98. ERICA *Aitoni.*

E. antheris muticis inclusis, corolla hypocrateriformi floribus umbellatis, foliis ternis linearibus patenti-erectis. W.

E. (*Aitonia*) antheris basi bicornibus inclusis, corollis longissimis viscosis sulcatis sesquipollicaribus, laciniis maximis cordatis, foliis ternis. *Andrews Erica.**

Jasminblütige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄

*Ab omnibus hucusque notis Ericae speciebus corolla peculiari distinctissima, quae figura et magnitudine exacte eadem ac illa Jasmini officinalis.* Tubus *sanguineus striatus viscosus.* Limbus *albus amplus planus, laciniis ovatis acutis apice reflexis.* W.

*** †††† *foliis quaternis pluribusve.*

*99. ERICA *cephalotes.*

E. antheris muticis inclusis, stylo exserto, corollis tubuloso-clavatis, calycibus pubescentibus, floribus capitato-verticillatis, foliis senis linearibus W.

E. mutica, foliis senis lanceolatis, floribus verticillato-capitatis clavatis. *Thunb. Diss. n. 23.* * *Thunb. prod. 70.*

Straussblütige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)

Corolla *purpurea.* W.

*100. ERICA *pulchella.*

E. antheris muticis inclusis, stylo exserto, corollis tubuloso-campanulatis, calycibus glabris, floribus axillaribus verticillatis, foliis senis linearibus. W.

E. mutica, foliis senis lanceolatis, floribus axillaribus tubuloso-campanulatis. *Thunb. Diss. n. 24. t. 4. f. 1.** *Thunb. prod. 70.*

Schöne Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)

Corolla *purpurea tenuissime pubescens.* W.

*101. ERICA *longifolia.*

E. antheris muticis inclusis, stylo incluso, corollis pubescentibus tubuloso-clavatis, floribus axillaribus ver-

ticillatis, foliis subdenis linearibus margine cartilagineis scabris. W.

Erica longifolia. *Donn ind. hort. cantab. p.* 42. *Icon. horti Kewens. t.* 4.

E. (*pinea*) antheris muticis inclusis, corolla alba clavata villosa viscosa, stylo incluso, floribus verticillatis recurvis, foliis senis et ultra, linear-lanceolatis curvatis subpilosis confertis. *Wendl. Erica p.* 11. *t.* 3. *,

Langblättrige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)

*Simillima sequenti, at differt*: foliis *denis longioribus* corollis *clavatis evidenter costatis*, stylo*que incluso*. *Ab E. pinea distincta* corolla *pubescente recta nec curvata*, foliis*que denis*. W.

*Variat foliis denis et octonis*. W.

*102. ERICA *vestita*.

E. antheris muticis inclusis, stylo exserto, corollis pubescentibus tubulosis curvatis, floribus axillaribus verticillatis, foliis senis adpressis linearibus margine cartilagineis scabris. W.

E. mutica, foliis senis linearibus secundis, floribus axillaribus clavatis villosis. *Thunb. Diss. n.* 25. * *Thunb. prod.* 70.

α. E. (*vestita alba*) antheris muticis subinclusis, foliis senis tremulantibus linearibus confertis attenuatis in petiolos capillares, floribus clavatis albidis. *Andrews Erica.* *

β. E. (*vestita purpurea*) antheris muticis subexsertis, foliis senis linearibus tremulantibus attenuatis in petiolos capillares seminunguiculares, floribus axillaribus clavatis purpureis. *Andrews Erica.* *

Bekleidete Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)

*103. ERICA *pinea*.

E. antheris muticis inclusis, stylo incluso, corollis glabris clavato-curvatis, floribus axillaribus verticillatis, foliis senis linear-lanceolatis. W.

E. mutica, foliis senis linear-lanceolatis, floribus verticillatis clavatis glabris. *Thunb. Diss. n.* 26. * *Thunb. prod.* 70.

Fichtenartige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄

Folia *sena unguicularia*. Calycis *foliola basi latiora*

*dein lineari-subulata glabra corolla triplo breviora.* Corolla *clavata curvata alba glabra obtusa pollicaris.* Antherae *muticae minutae purpureae subinclusae.* Stylus *vix exsertus.* Thunb. l. c.

* 104. ERICA *Leea.*

E. antheris muticis inclusis, stylo exserto, corollis glabris tubuloso-clavatis subtetragonis, floribus axillaribus verticillatis, foliis senis rigidis. W.

E. antheris muticis subinclusis, corollis costatis quadratis subpollicaribus luteo-aurantiis, quatuor quinqueve pendulis, foliis senis maximis rigidis. *Andrews Erica.* *

Leesche Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄

105. ERICA *coccinea.*

E. antheris inclusis, stylo exserto, corolla tubuloso-clavata pubescente, calycibus villosis, floribus axillaribus verticillatis, foliis senis linearibus, basi margine glandulosis, subpubescentibus. W.

E. mutica, foliis senis lanceolatis, floribus racemosis clavatis villosis. *Thunb. Diss. n.* 27. * *Thunb. prod.* 70.

E. antheris muticis subinclusis, corollis clavatis grossis, stylo incluso, calycibus hirsutis, foliis quaternis. *Syst. veg.* 305.

E. antheris bifidis exsertis, corollis clavatis quadrifidis, calycibus imbricatis, foliis ternis glabris. *Sp. pl.* 505.

E. africana angustifolia, floribus oblongis tubulosis dependentibus coccineis, cum longissimis filamentis concoloribus. *Raj. dendr.* 98. *Seb. mus.* 1. *p.* 32. *t.* 21. *f.* 4.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 448.

Hochrothe Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei *in collibus infra montem* Tabularem *et versus* Bay falso. ♄ (v. s.)

Corollae *pubescentes.* Flores *copiosi.*

Folia *tenuissime pubescentia, superiora basin versus margine glandulis instructa.* Calyx *bracteis binis ad basin cinctus villosus.* Stylus *in specimine meo est vera exsertus.* W.

* 106. ERICA *purpurea.*

E. antheris muticis exsertis, stylo exserto, corolla tubulosa glabra, floribus axillaribus verticillatis, foliis senis linearibus. W.

E. antheris muticis exſertis, corollis verticillatis tubulo-ſis, a baſi incurvata ſenſim ampliatis, foliis ſubſenis. *Andrews Erica.* *

Purpurfarbene Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

Calyx *glaber bracteis binis ad baſin cinctus.* Corolla *tubuloſa parum ſuperne dilatata, limbo plano.* W.

*107. ERICA *concinna.*

E. antheris muticis inclusis, corollis cylindricis baſi atte-nuatis, floribus terminalibus umbellatis, foliis ſubſe-nis glabris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 23.

Nette Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

Rami *glabri.* Folia *ramorum ſena, ramulorum qua-terna, petiolata erecta aceroſa glabra quadrilinearia.* Petioli *glabri vix ſemilineares.* Flores *terminales um-bellati: umbellae* 3-6 *florae.* Pedunculi *filiformes pi-loſiuſculi bilineares.* Bracteae 3 *ſubulatae ciliatae ca-lyci adpreſſae.* Calycis *foliola e lata baſi ſubulata ci-liata dorſo ſulco exarata bilinearia.* Corolla *carnea extus villoſiuſcula cylindracea vix uncialis craſſitie penuae gallinae.* Filamenta *glabra tubo corollae paulo breviora.* Antherae *oblongae baſi acuminatae, apice ad medium bipartitae, ubi filamentis affixae muticae brunneae incluſae.* Germen *turbinatum ſupra conca-vum, margine crenulato.* Stylus *rubicundus longitu-dine ſtaminum.* Stigma *ſubcapitatum atrorubens.*

108. ERICA *grandiflora.*

E. antheris muticis exſertis, corollis cylindraceis ſubin-curvis glabris, ſtylo elongato, floribus axillaribus pe-dunculatis, foliis ſubſenis aceroſis glabris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 25. *Icon. horti Kewenſ. t.* 8. *Curt. mag.* 189.

E. foliis quaternis ſtylo exſerto, corolla cylindrica, calyce ſimplici, floribus lateralibus ſubcurvatis. *Lin. ſuppl.* 223.

E. mutica, foliis quaternis linearibus glabris, floribus racemoſis clavatis glabris. *Thunb. Diſſ. n.* 28. *Thunb. prod.* 70.

β. E. (*exſurgens*) antheris muticis exſertis, foliis quater-nis mucronatis apicibus reflexis, corollis clavato-cy-lindraceis verticillatis aurantiis. *Andrews Erica.* *

Groſsblütige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Folia *in ſpeciminibus meis glabra.* Flos *omnium maximus aurantio-flavus latere ſuperiore coccineus.* W.

*109. ERICA *cylindrica.*

E. mutica, foliis quaternis trigonis glabris, floribus terminalibus cylindricis glabris. *Thunb. Diſſ. n.* 29. * *Thunb. prod.* 70.

Cylindriſche Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

Folia *imbricata lineam longa.* Flores *in ultimis ramulis terminales ſubſolitarii erecti.* Calycis *foliola carinata ſubulata glabra corolla triplo breviora.* Corolla *cylindrica alba glabra ſemipollicaris.* Antherae *muticae* ſtylus*que incluſus.*

110. ERICA *curviflora.*

E. antheris muticis, corollis curvato-clavatis glabris, floribus ſolitariis terminalibus, foliis quaternis lineari-trigonis glabris. W.

E. mutica, foliis quaternis trigonis glabris, floribus terminalibus ſolitariis curvatis clavatis glabris. *Thunb. Diſſ. n.* 30. * *Thunb. prod.* 71.

E antheris muticis incluſis, corollis clavatis groſſis, ſtylo incluſo, foliis quaternis glabris. *Syſt. veg.* 305.

E. antheris bifidis exſertis, corollis clavato-cylindricis curvis ſolitariis, foliis ternis glabris. *Sp. pl.* 505.

E. africana fruteſcens. *Seb. muſ.* 2. *t.* 19. *f.* 5.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 448.

Krummblütige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *rivulorum latera prope* Drakenſtein. ♄ (v. ſ.)

Corolla *ſanguinea glabra.* Folia *glabra.* W.

*111. ERICA *ſimpliciflora.*

E. antheris muticis exſertis, corollis tubuloſo-clavatis rectis, floribus terminalibus ſolitariis ſeſſilibus, foliis quaternis lineari-trigonis glabris. W.

Erica ſimplicifolia. *Lonn. catal. hort. cantab.* 45.

Einzelnblütige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

Rami *piloſi undique ramulis breviſſimis obſiti.* Folia *quaterna lineari-trigona glaberrima.* Flores *ſolitarii ſeſſiles in omnibus ramulorum apicibus.* Corolla *tubuloſo-clavata recta nec curvata flavo purpuraſcens longa.* Stamina *exſerta.* Stylus *longitudine ſtaminum.* W.

112. ERICA *tubiflora.*

E. antheris muticis inclusis, stylo exserto, corollis tubulosis pubescentibus, floribus terminalibus solitariis sessilibus, foliis quaternis lineari-trigouis pubescentibus. W.

E. antheris muticis inclusis, corollis clavatis grossis, stylo incluso, foliis quaternis subciliatis. *Syst. veg* 305.

E. mutica, foliis quaternis trigoni, ciliatis, floribus terminalibus solitariis curvatis clavatis hirsutis. *Thunb. Diss. n.* 31. * *Thunb. prod.* 71.

E. antheris bifidis inclusis, corollis clavato-cylindricis incurvatis pubescentibus acutis, foliis quaternis ciliatis. *Sp. pl.* 505.

E. foliis linearibus quaternis oppositis villosis, corollis longissimis solitariis. *Hort. cliff.* 148.

E. africana frutescens. *Seb. mus.* 2. *t.* 19. *f.* 5.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 448.

Roehrenblütige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei *prope* Drakenstein. ♄ (v. s.)

Corollae *pubescentes laciniis lanceolatis.* Stylus *vix exsertus.*

*113. ERICA *lanata.*

E. antheris muticis inclusis, stylo exserto, corollis tubuloso-clavatis pubescentibus, floribus terminalibus subsolitariis, foliis quaternis linearibus villosis imbricatis erectis. W.

E. (*lanata*) antheris muticis inclusis, corolla miniata curvata clavata villosa, stylo exserto, floribus terminalibus singulis ternisve, foliis quaternis subimbricatis linearibus brevibus obtusis lanatis plurimis. *Wendl. obs.* 45.

Wollige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)

*Simillima praecedenti, sed diversa:* foliis *dimidio brevioribus latioribus obtusis planis villosioribus et imbricatis*, floribus *saepius ternis in ramorum apice*, calycibus *majoribus*, *foliolis oblongo-lanceolatis obtusis multo latioribus*, corolla *magis curvata breviore.* W.

114. ERICA *procera.*

E. antheris muticis inclusis, stylo exserto, corollis tubulosis basi ventricosis, floribus subsolitariis terminalibus, foliis quaternis lineari-trigonis pubescentibus erectis. W.

E. (*procera*) antheris muticis inclusis, corolla aurantiaca tubulosa basi inflata hirsuta, stylis exsertis, floribus pyramidatis subsolitariis terminalibus sessilibus, foliis quaternis linearibus erectis subpubescentibus. *Wendl. obs.* 45.

Hohe Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)

*Differt a praecedente:* foliis *pubescentibus nec villosis, lineari-trigonis nec planis,* calyce *bracteis binis cincto,* corolla *basi ventricosa. Diversa ab E. tubiflora:* foliis *erectis nec patentiusculis, minus pilosis,* calyce *non foliolis numerosis involuto, laciniis corollae obtusissimis et habitu.* W.

*115. ERICA *conspicua.*

E. antheris muticis subinclusis, corollis cylindricis curvis longissimis pilosis, limbo revoluto, stylo exserto, foliis quaternis glabris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 22. *Icon. horti Kewens. t.* 12.

Langblütige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)

Caulis *pubescens.* Folia *lineari-triquetra glabra acutiuscula.* Flores *in ramulorum apice solitarii vel terni brevissime pedunculati.* Calycis *foliola ovata obtusa.* Corolla *flava longe tubulosa incurva pubescens, laciniis obtusissimis reflexis.* Antherae *exsertae.* Stylus *longissimus.* W.

*116. ERICA *glandulosa.*

E. mutica, foliis quaternis linearibus glanduloso-pilosis, floribus clavatis glabris, calycibus hispidis. *Thunb. Diss. n.* 32. *Thunb. prod.* 71.

Drülige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄

Folia *quaterna linearia obtusa supra plana, subtus profunde sulcata, pilis glandulosis hispida imbricata lineam longa.* Calycis *foliola ovata brevissima, pilis glanduloso-capitatis viscidis hispida.* Corolla *cylindrico-clavata sanguinea glabra pollicaris.* Antherae *muticae inclusae.* Stylus *stigmate capitato. Differt facile a congeneribus* pilis *glanduloso-capitatis et viscidis.* Thunb. l. c.

*117. ERICA *transparens.*

E. mutica, foliis quaternis trigonis ciliatis, floribus terminali-subsolitariis. *Thunb. prod.* 71.

Erica cerinthoides γ. *Thumb. Diss. n.* 33.
Durchlichtige Heide. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄
*Distincta ab E. perspicua*, foliorum *numero et* corollis *glabris.* Corolla *ceterum alba diaphana.* W.

118. ERICA *cerinthoides.*

E. antheris muticis inclusis, stylo incluso, corollis tubuloso-clavatis piloso-viscosis, floribus verticillatis nutantibus, foliis quaternis lincaribus reflexis villoso-glandulosis. W.
E. antheris muticis inclusis, corollis clavatis grossis, stigmate incluso cruciato, foliis quaternis. *Syst. veg.* 305.
E. mutica, foliis quaternis oblongis ciliato-serratis, floribus cylindricis villosis, calycibus serratis. *Thumb. Diss. n.* 33. * *Thumb. prod.* 71.
E. antheris bifidis inclusis, corollis subclavatis hirtis, floribus aggregatis sessilibus, foliis quaternis ciliatis. *Sp. pl.* 505.
E. africana flore purpureo. *Barth. act.* 2. *p.* 57.
E. coris folio hispido cerinthoides africana. *Breyn. cent.* 25. *t.* 33. *Seb. mus.* 2. *p.* 22. *f.* 4. *et tab.* 34. *f.* 6.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 449.
Wachsblumenartige Heide. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei *in collibus infra* Tafelberg *et* Sternberg. ♄ (v. s.)
Flores *subcapitati pubescentes.* Calyx *quasi duplicatus.*

119. ERICA *Sparrmanni.*

E. antheris muticis inclusis, stylo exserto, corollis tubulosis strigoso villosis, calyce lanato, floribus sessilibus quaternis, foliis quaternis oblongis ciliatis imbricatis. W.
E. mutica, foliis quaternis oblongis ciliato-serratis, floribus campanulatis calycibusque strigosis. *Thumb. Diss. n.* 33. * *Thumb. prod.* 71.
E. foliis quaternis imbricatis ciliatis, capitulis quadrifloris, corollis tubulosis strigoso-hispi .., antheris muticis. *Lin. suppl.* 219. *Act. holm.* 1778. *p.* 24. *t.* 2.*
Sparrmannische Heide. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei *in montibus* Longe Kloof. ♄
*Singularis est capitulis florum semper divisis in flores quatuor.* Capitulum *antequam flores elongantur globosum echinatum instar Achyranthidis apparet, ex*

*patentiſſimis luteis ſetis foliorum involucri et calycis.* Corolla *hirſutiſſimae, ore quadrifido, laciniis breviſſimis.*

120. ERICA *Maſſoni.*

E. antheris muticis incluſis, corollis cylindricis groſſis, floribus capitatis, foliis octofariis imbricatis pubeſcentibus. *Lin. ſuppl.* 221. *Icon. horti Kewenſ. t.* 20. *Curt. mag.* 356.

E. mutica, foliis quaternis oblongis ſerratis villoſis, floribus cylindricis villoſis. *Thunb. Diſſ. n.* 35. *t.* 3. *f.* 2.* *Thunb. prod.* 71.

E. antheris muticis incluſis, corollis ſubcylindricis viſcoſis ſpecioſiſſimis tricoloratis, foliis ſubquaternis pilis longis veſtititis. *Andrews Erica.**

Maſſonſche Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in montibus* Hottentots-Holland. ♄ (v. ſ.)

Caules *fruteſcentes filiformes foliis undique tecti.* Folia *quaterna octofariam imbricata breviſſima elliptica conferta obtuſa ciliata, unde villoſa apparent.* Flores *in capitulo terminali ſeſſili.* Calyx *brevior linearis piloſus.* Corolla *cylindrica groſſa, ore quadrifido erecto acutiuſculo.* Antherae *muticae corolla breviores.* Piſtillum *longitudine ſtaminum.*

*121. ERICA *ventricoſa.*

E. antheris muticis incluſis, ſtylo incluſo, corollis oblongo-ovatis, floribus terminalibus umbellatis, foliis quaternis linearibus ciliatis. W.

E. mutica, foliis quaternis trigonis ciliatis, floribus ventricoſis glabris. *Thunb. Diſſ. n.* 36. *t.* 1. *f.* 1. *Thunb. prod.* 71. *Curt mag.* 350.

E. antheris baſi bicornibus incluſis, corollis oblongo-ovatis ventricoſis glabris, foliis quaternis ciliatis. *Andrews Erica.**

Bauchige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

*122. ERICA *ampullacea.*

E. antheris muticis incluſis, ſtylo exſerto, corollis ſtriatis baſi globoſo-ovatis, ſuperne cylindraceis, floribus terminalibus umbellatis, foliis quaternis linearibus ciliatis reflexis. W.

E. (*ampullacea*) foliis ciliatis mucronatis, bracteis colo-

ratis, floribus umbellatis subquaternis erecto-patentibus, stylo exserto. *Curt. mag.* 303. *
Blasenförmige Heide. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄
Corolla *pallide purpurea lineis saturatioribus longitudinalibus, basi globoso-ovata, superne valde elongata et angustata cylindracea, limbo patente, laciniis obtusis. Differt a praecedente:* foliis *duplo brevioribus reflexis,* corollae *forma et striis,* calyce *colorato* bracteis*que ad pedunculorum basin coloratis brevibus.* W.

123. ERICA *fastigiata.*

E. antheris muticis inclusis, corollis hypocrateriformibus fasciculatis, stylo incluso, foliis quaternis. *Syst. veg.* 305. *Burm. prod.* 11.

E. mutica, foliis quaternis trigonis glabris, floribus capitatis, calycibus integris. *Thunb. Diss. n.* 37. *Thunb. prod.* 71.

E. antheris muticis inclusis, corollis hypocrateriformibus fasciculatis, foliis quaternis linearibus scabris. *Mant.* 66. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 450.
Gipfelblütige Heide. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei *in* Platte Kloof, Franssche Hoek *et montibus* Hottentots-Holland. ♄ (v. v.)
Fruticulus *ramis laevibus quadrifariam stria exaratis.* Folia *quaterna linearia acuminata triquetra laevia, margine scabra erecta, longitudine internodiorum, at summa longiora.* Flores *fasciculati fastigiati terminales.* Calyx *foliis similis.* Corolla *tubo cylindrico patulo foliis paulo longiore.* Limbus *quadripartitus planus, subtus ruber, supra albus, laciniis subcordatis.* Stamina *capillaria corolla breviora.* Antherae *vix emarginatae.*

*124. ERICA *incurva.*

E. antheris muticis exsertis, stylo exserto, corollis campanulatis, floribus terminalibus capitatis, foliis quaternis incurvis ciliatis. W.

E. antheris muticis exsertis, corolla purpurea ovata minima glabra, stylo exserto, floribus terminalibus capitatis involucratis, foliis quaternis densis linearibus pubescentibus incurvis. *Wendl. obs.* 47.
Krummblättrige Heide. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)

*Habitu accedit ad E. empetrifoliam ſed longe diverſa* foliis *linearibus incurvis quaternis longe ciliatis*, floribus *denſe capitatis*, antheris *muticis*. W.

*125. ERICA *globoſa*. W.

E. antheris muticis incluſis, ſtylo exſerto, corollis campanulatis, calycibus imbricatis, floribus terminalibus globoſo-capitatis, foliis quaternis linearibus cartilagineo-dentatis, apice calloſis. W.

Kuglichblütige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Folia *quaterna petiolata horizontaliter patentia linearia apice calloſa, margine cartilaginea globoſo-dentata.* Flores *ſex ad octo in ramulorum apice ſeſſiles et capitati.* Calycis *foliola alba longitudine tubi corollae oblonga acuta margine tenuiſſime ſubciliata.* Bracteae *concolores longitudine calycis.* Corolla *ut in ſicco ſpecimine videtur rubra, campanulata profunde quadrifida, laciniis rectis acutis.* Stamina *corolla brevia.* Stylus *longitudine laciniarum corollae.* W.

126. ERICA *comoſa.*

E. antheris muticis incluſis, corollis ovato-oblongis, ſtylo incluſo, foliis quaternis, floribus congeſtis. *Mant.* 234.

E. mutica, foliis quaternis trigonis glabris, floribus capitatis, calycibus ciliatis. *Thunb. Diſſ. n.* 38. *Thunb. prod.* 71. *Icon. horti Kew. t.* 18.

Erica transparens. *Berg. cap.* 108.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 451.

Buſchige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in ſummitate montis* Tabularis *et in* Platte Kloof. ♄ (v. ſ.)

Caulis *ramis ſupra flores congeſtis.* Folia *quaterna linearia obtuſiuſcula erecta.* Flores *congeſti infra caulis apicem.* Calyx *ſcarioſus ſubdiaphanus obtuſiuſculus erectus.* Corolla *ovato-cylindrica:* Limbo *plano acutiuſculo.* Antherae *muticae incluſae breviſſimae.* Stylus *incluſus.* Stigma *capitatum.*

Obſ. Corollae *figura ſimilis E. albentis.*

127. ERICA *denticulata.*

E. antheris muticis incluſis, ſtylo incluſo, corollis ovatis, calycinis foliolis membranaceis ciliato-dentatis, floribus terminalibus ſeſſilibus, foliis quaternis linearitrigonis glabris. W.

E. antheris muticis incluſis, corollis ovato-infundibu-

liformibus, ſtylo incluſo, calycibus denticulatis, foliis quaternis. *Mant.* 229.

E. (*dentata*) mutica, foliis quaternis trigonis glabris, floribus capitatis, calycibus ſerratis. *Thunb. Diſſ. n.* 39. * *Thunb. prod.* 71.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 450.

Gezahnelte Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Caules *diſtorti E. vulgaris.* Folia *quaterna conferta patentiuſcula ſubteretia laevia.* Flores *ſubfaſciculati terminales.* Calyx *duplicatus: foliolis ſerratodenticulatis.* Corolla (*tubus oblongo-ovatus*) *ſubinfundibuliformis.* Laciniis *ovatis obtuſis patentibus.* Antherae *muticae corolla non longiores fere incluſae.* Stylus *incluſus.* Stigma *obtuſum.*

* 128. ERICA *Muſcari.*

E. antheris muticis incluſis, ſtylo incluſo, corollis ovatis ſubtetragonis, calycinis foliolis lanceolatis integerrimis, floribus terminalibus ſeſſilibus, foliis quaternis lineari-trigonis glabris. W.

E. antheris muticis incluſis, corollis oblongo-ovatis obtuſe tetragonis, foliis quaternis. *Andrews Erica.* *

Wohlriechende Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Rami *glabri omnes apice floriferi.* Corollae *pallide flavae limbo reflexo, ſubtetragonae*, antheris ſtyliſque *incluſis.* W.

129. ERICA *viſcaria.*

E. antheris muticis incluſis, ſtylo incluſo, corollis campanulatis glutinoſis, calycibus foliaceis ciliatis, floribus ſubracemoſis, foliis quaternis linearibus glabris. W.

E. antheris muticis inclusis, corollis campanulatis glutinoſis, ſtylo incluſo, foliis quaternis, floribus racemoſis. *Mant* 231. *Icon. horti Kewenſ. t.* 1.

E. mutica, foliis quaternis trigonis glabris, floribus racemoſis campanulatis, calyce rudi ciliato. *Thunb. Diſſ. n.* 40. * *Thunb. prod.* 71.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 451.

Klebrige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

*Caulis fruticoſus determinate ramoſus.* Folia *quaterna linearia erecta acuta interſtitiis longiora margine ſcabra.* Flores *racemoſi.* Bracteis *calycinis ruditus*

*approximatis.* Calyx *rudis ſubulatus corolla dimidio brevior.* Corolla *campanulata valde mucoſa purpuraſcens ſemiquadrifida: laciniis erectis acutis.* Antherae *muticae bifidae extrorſum cavitate dehiſcentes breviſſimae.* Stylus *corolla brevior ſtaminibus duplo longior purpureus.* Stigma *capitatum quadrilobum.* Germen *hirſutum.*

*Variat foliis quaternis et ſenis.* W.

*130. ERICA *pyramidalis.*

E. antheris muticis incluſis, ſtylo exſerto, corollis hiſpidis campanulato-infundibuliformibus, floribus umbellatis, foliis quaternis lineari-triquetris pubeſcentibus. W.

E. (*pyramidalis*) antheris muticis incluſis, corollis infundibuliformibus quaternis, ſtylo ſubexſerto, foliis quaternis pubeſcentibus. *Ait. Kew.* 3. *p.* 491. *Curt. mag.* 366.*

Pyramidenförmige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Rami *teretes pubeſcentes.* Folia *quaterna linearitriquetra pubeſcentia tenuia.* Flores *rubri in apice ramulorum plerumque terni pedunculati recti.* Calycis *foliola colorata apice viridia lanceolata brevia.* Corolla *campanulato-infundibuliformis pilis breviſſimis tecta, laciniis limbi longis ovatis acutis rectis.* Stamina *longitudine corollae.* Stylus *exſertus.* W.

131. ERICA *mediterranea.*

E. antheris muticis exſertis, ſtylo exſerto, corollis cylindraceo-campanulatis, floribus axillaribus, pedunculis flore brevioribus, foliis quaternis linearibus glabris. W.

E. antheris muticis exſertis, corollis ovatis, ſtylo exſerto, foliis quaternis patentibus, floribus ſparſis. *Mant.* 229.

E. mutica, foliis quaternis linearibus glabris, floribus racemoſis campanulatis, calyce colorato integro lanceolato. *Thunb. Diſſ. n.* 41. *

E. maxima purpuraſcens longioribus foliis. *Bauh. pin.* 485.

E. foliis corios quaternis, flore purpuraſcente. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 356.

E. corios folio II. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 42.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 457.

Mittelländiſche Heide. W.

*Habitat in* Europa *auſtrali.* ♄ (v. v.)

Caulis *ramis albicantibus angulatis.* Folia *quaterna laevia patentia* (*rarius quina*). Flores *laterales ſparſi.*

Calyx *ſimplex coloratus lanceolatus acutus, corolla dimidio brevior.* Corolla *ovata.* Antherae *exſertae muticae.* Stylus *exſertus corolla duplo longior.* Stigma *ſimpliciſſimum.*

132. ERICA *multiflora.*

E. antheris muticis exſertis, ſtylo exſerto, corollis campanulatis, floribus axillaribus, pedunculo longitudine floris, foliis quinis linearibus glabris W.

E. mutica, foliis quinis linearibus glabris, floribus racemoſis ſubcampanulatis, calyce colorato integro ovato. *Thunb. Diſſ. n.* 42. *

E. antheris muticis exſertis, corollis cylindricis, ſtylo exſerto, foliis quinis, floribus ſparſis. *Syſt. veg.* 307.

E. antheris ſimplicibus bifidis exſertis, corollis cylindricis, foliis quinis patentibus. *Sp. pl.* 503.

E. foliis corios multiflora. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 356. *Raj. angl.* 3. *p.* 471. *

E. maxima purpuraſcens longioribus foliis. *Bauh. pin.* 485.

E. juniperifolia denſe fruticans narbonenſis. *Lob. hiſt.* 620. *Garid. aix.* 160. *t.* 32. *Sauv. monſp.* 46.

β. *longipedunculata* pedunculis flore duplo longioribus.

Erica multiflora longipedicellata. *Wendl. obſ.* 47.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 456.

Vielblütige Heide. W.

*Habitat in* Anglia, G. Narbonenſi, Oriente. ♄ (v. v.)

Caulis *altitudine humana.* Folia *quaterna ſ. quina patentia obtuſa baſi gibba.* Flores *purpuraſcentes.*

*Differt praecipue a praecedente,* foliis *latioribus,* pedunculis *longitudine floris,* corolla *breviore urceolato-campanulata,* calycinis *foliolis ovatis minoribus ſaepius margine tenuiſſime ciliatis.* W.

133. ERICA *herbacea.*

E. antheris muticis exſertis, ſtylo exſerto, corollis tubuloſo-campanulatis, floribus axillaribus ſecundis, foliis quaternis linearibus glabris. W.

E. antheris muticis exſertis, corollis oblongis, ſtylo exſerto, foliis quaternis, floribus ſecundis. *Syſt. veg.* 306.

E. mutica, foliis quaternis linearibus glabris, floribus racemoſis ſecundis. *Thunb. Diſſ. n.* 43. *

E. foliis patentibus quaternis acutis caducis, flore calyce longiore, antheris eminentibus. *Hall. helv. n.* 1013.

E. procumbens herbacea. *Bauh. pin.* 486.

E. corios folio VIII. *Cluſ. hiſt.* 1, *p.* 44.

β. Erica carnea. *Sp. pl.* 504. *Scop. carn. n.* 461.
E. antheris ſimplicibus exſertis, corollis ovatis ſublongioribus, foliis quaternis triangularibus patentibus glabris. *Jacq. auſtr. t.* 32.
E. procumbens, ternis foliis carnea. *Bauh. pin.* 468.
E. coris folio IX. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 44.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 456.
Krautartige Heide. W.
*Habitat in* Europa *auſtraliori.* ♄ (v. v.)
*E. α. hyemalis eſt planta β. vernalis ſ. junior flores perficiens.* Hall. l. c.
*Differt a binis praecedentibus* corollae *forma*, calyce *adpreſſo, nec patente, multo longiore*, floribus *ſecundis.* W.

134. ERICA *purpuraſcens.*
E. antheris muticis exſertis, corollis campanulatis, ſtylo exſerto, foliis quaternis, floribus ſparſis. *Syſt. veg.* 306.
E. mutica, foliis quaternis quinisque glabris, floribus ſparſis campanulatis, caule decumbente. *Thunb. Diſſ. n.* 44.*
E. foliis in ſummitate quinis, caule procumbente. *Sp. pl.* 503. *Segu. veron.* 280.
E. procumbens dilute purpurea. *Bauh. pin.* 486. *Raj. hiſt.* 1715.
E. foliis corios, flore purpureo dilutioris coloris. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 358.
E. coris folio VII. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 43.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 455.
Italiäniſche Heide. W.
*Habitat in* Europa *auſtrali.* ♄
Calyx *ſubulatus.* Corolla *cylindrica.* Antherae *profunde bifidae.* Folia *terna ſ. quaterna, at in ſummis ramulis quina obſervante Seguiero.*

135. ERICA *vagans.*
E. antheris muticis exſertis, corollis campanulatis, ſtylo exſerto, foliis quaternis, floribus ſolitariis. *Syſt. veg.* 306.
E. mutica, foliis quaternis quinisque glabris, floribus ſparſis campanulatis, caule erecto. *Thunb. Diſſ. n.* 45.*
E. antheris muticis exſertis, floribus campanulatis ſolitariis, foliis quaternis patulis. *Mant.* 230.
Zerſtreutſtielige Heide. W.
*Habitat in* Africa, *etiam* Toloſae. ♄
Caulis (*Empetri*) *fruticoſus, ſcabriuſculus.* Ramis *ultimis albidis divaricatis.* Folia *quaterna, rarius*

*quina linearia obtusiuscula laeviuscula, s. scabriuscula, subtus convexa canaliculataque breviuscula conferta:* Flores *ad latera ramulorum sparsi pedunculati solitarii.* Calyx *coloratus erectus concavus brevissimus.* Corolla *campanulata obtusa.* Antherae *ecaudatae exsertae bipartitae.* Stylus *exsertus.* Stigma *simplex.*

*Similis E. herbaceae, cui* Ramuli *laeves;* Folia *acuta;* Corollae *ovatae acutiusculae;* Calyces *patentes longitudine dimidiae corollae;* Antherae *lineares acutae duplo longiores, nec basi gibbae.*

156. ERICA *cubica.*

E. antheris muticis inclusis, corollis campanulatis acutis, stylo incluso, calycibus tetragonis, foliis quaternis patentibus. *Syst. veg.* 305. *Mant.* 233.

E. mutica, foliis quinis trigonis incurvis glabris, floribus umbellatis globosis, calyce colorato carinato. *Thunb. Diss. n.* 46. * *Thunb. prod.* 72.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 450.

Würfelblütige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)

Caulis *fruticosus determinate ramosus.* Folia *quaterna patentia linearia acuta, internodiis longiora, subincurva; petiolis albis.* Flores *terminales corymbosi.* Pedunculi *subtomentosi, medio* Bracteis *setaceis.* Calyx *scariosus tetragonus, foliolis obcordatis scariosis complicatis carinatis, apice inflexo rudi.* Corolla *campanulata semiquadrifida acuta purpurea (basi pallida), calyce duplo longior.* Antherae *muticae apice bicornes acuminataeque brevissimae.* Stylus *longitudine corollae.* Stigma *obtusum.*

*137. ERICA *racemosa.*

E. mutica, foliis quaternis lanceolatis villosis, floribus racemosis globosis, calycibus tomentosis. *Thunb. Diss. n.* 47. *t.* 5. *f.* 1. *Thunb. prod.* 72.

Traubenblütige Heide. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄

Caulis *erectus pedalis et ultra.* Rami *verticillati et elongati divaricato-erecti pubescentes.* Ramuli *verticillati breves, per intervalla sparsi, villosi.* Folia *quaterna lanceolata obtusa, supra plana, laeviuscula, subtus sulcata hispida, patentia, lineam longa.* Flores *in ramulis racemosi subnutantes incarnati.* Racemi *subdistichi pollicares usque digitales.* Pedunculi *ca-*

*pillares villoſi cernui, corollae longitudine.* Calycis *foliola ovata obtuſa incano-tomentoſa, adpreſſa breviſſima.* Corolla *ſubgloboſa, ore patulo obtuſo.* Antherae *muticae exſertae brunneae.* Stylus *exſertus ſtaminibus longior*, ſtigmate *capitato.* *Differt ab E. purpuraſcente:* caule *erecto; ab E. vagante:* foliis *piloſis; ab E. mediterranea:* foliis *piloſis*, corolla*que globoſa; ab E. hirta:* floribus *racemoſis.* Thunb. Diſſ. l.c.

## 771. OPHIRA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 662.

*Involucr.* 2-valve, 3-florum. *Cor.* 4-petala, ſupera. *Bacca* 1-locularis.

1. OPHIRA *ſtricta.*

O. ſtricta. *Mant.* 229. *Lamarck. illuſt. gen. t.* 293. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 458.

Gerade Ophira. W.

*Habitat in* Africa. *D. Burmann.* ♄

Frutex *erectus.* Folia *oppoſita, ovato-linearia.* Flores *laterales, ſeſſiles.*

*Similitudo multa cum* Grubba Bergii, *cui Germen ſuperum et Stigma ſimplex erit.*

## *772. GRUBBIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 663.

*Involucr.* 2-valve triflorum. *Cor.* 4-petala. infera. *Stigma* ſimplex.

*1. GRUBBIA *roſmarinifolia.*

G. roſmarinifolia. *Berg. cap.* 90. *t.* 2. *f.* 3. *Act. holm.* 1767. *p.* 33. *t.* 2. * *Thunb. prod.* 75.

---

Clavis *Ericae* 1. Antherae *ariſtatae aut muticae.*
2. Antherae *incluſae aut exſertae.*
3. Folia *oppoſita* 2. 3, 4, *plurave.*
4. Stigma *incluſum aut exſertum.*
5. Corollae *figura.*

*Diſſ de* Erica. *Upſal* 1770 *de his omnibus.*

*Differt Erica ab Andromeda non ſolo ſtaminum numero, ſed capſulae ſtructura; in Ericis enim valvularum margo inflexus format diſſepimenta, in Andromedis vero diſſepimenta valvulis ſunt contraria.* W.

Chamelaea africana rosmarini foliis rarioribus, floribus ex foliorum alis erumpentibus. *Herm. afr.* 6.
Rosmarinblättrige Grubbie. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄

Rami *oppositi ramulosi.* Folia *linearia obtusiuscula, margine revoluto, semiunguicularia, supra viridia, punctis minutissimis elevatis scabra, subtus glauca, opposita, internodiis longiora patentia.* Flores *axillares conglomerati albo-hirsuti sessiles.* Berg. l. c.

## 773. DAPHNE.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 664.

*Cal.* o. *Cor.* 4-fida, corollacea, marcescens, *Stamina* includens. *Drupa* 1-sperma.

### * *Floribus lateralibus.*

### 1. DAPHNE *Mezereum.*

D. floribus sessilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis. *Mat. med. p.* 103. *Oed. dan. t.* 268. *Gmel. sib.* 3. *p.* 26. *Mill. dict. n.* 2. *Gunn. norv. n.* 22. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 210. *Pollich. pal. n.* 370. *Pall. it.* 2. *p.* 225. *Roth. germ. I.* 171. *II.* 445. *Willd. arb.* 98. *Ludw. ect. t.* 63. *Knoph. cent.* 1. *t.* 23. *Knorr. del.* 1. *t. K.* 6. *Blackw. t.* 582. *Hoffm. germ.* 156.
Thymelaea spica cylindrica, superne foliosa. *Hall. helv. n.* 1024.
Daphne floribus sessilibus infra folia elliptico-lanceolata. *Fl. lapp.* 140. *Fl. suec.* 311, 338. *Hort. cliff.* 147. *Roy. lugdb.* 201.
Thymelaea Mezereum. *Scop. carn.* 2. *n.* 462.
Laureola folio deciduo, flore purpureo, officinis Laureola femina. *Bauh. pin.* 462.
Daphnoides. *Cam. epit.* 937.
Chamelaea germanica. *Dod. purg.* 130.
Daphnoides flore purpureo. *Tragi.* 59. 1074. R.
β. Thymelaea lauri folio deciduo, flore albido, fructu flavescente. *Du Hamel. arb.* 4. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 213. R.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 459.
Gemeiner Seidelbast. W.
*Habitat in* Europae *borealis sylvis.* ♄ (v. v.)
Flores *bini, terni, quaterni.* R.

2. DAPHNE *Thymelaea.*

D. floribus ſeſſilibus axillaribus, foliis lanceolatis, ramis ſimpliciſſimis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 28. *

D. floribus ſeſſilibus axillaribus, foliis lanceolatis, caulibus ſimpliciſſimis. *Mill. dict. n.* 3. *Ger. prov. t.* 17. *f.* 2.

D. floribus ſeſſilibus axillaribus aggregatis, limbo acuto, foliis lanceolatis glaucis utrinque glabris. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 419. *

D. floribus tetrandris ſecundum caules ſimpliciſſimos. *Sauv. monſp.* 56.

Thymelaea foliis polygalae glabris. *Bauh. pin.* 463.

Thymelaea alpina glabra, floſculis ſubluteis ad foliorum ortum ſeſſilibus. *Pluk. alm.* 366. *t.* 229 *f.* 2.

Sanamanda viridis vel glabra. *Bauh. prodr.* 160.

Sanamunda glabra. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 592.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 463.

Aſtloſer Seidelbaſt. W.

*Habitat in* Hiſpania et Monſpelii *in Horto Dei.* ♄ (v. ſ.)

*D. dioica differt*: caule *ramoſiſſimo*, ramis *verrucoſis*, foliis *confertioribus brevioribus, verſus apicem latioribus, nec utrinque anguſtatis.* Vahl. l. c.

3. DAPHNE *dioica.*

D. floribus axillaribus geminis, foliis lineari-lanceolatis. *Lin. ſuppl.* 223. (*excluſis ſynonymis*) *Gouan. illuſt.* 27. *t.* 17. *f.* 1.

D. floribus ſeſſilibus axillaribus ſubgeminatis, foliis lineari-lanceolatis obtuſiuſculis glabris confertis. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 419. *

Kurzblättriger Seidelbaſt. W.

*Habitat in* Pyrenaeis *locis apricis.* ♄

Frutex *pedalis ramoſus rigens, cortice ſuberoſo cicatricibus exaſperato.* Folia *conferta imbricata glabra lineari-lanceolata.* Flores *axillares bini albo-flaveſcentes quadrifidi acuti, tubo ventricoſo, dioici.*

*4. DAPHNE *calycina.*

D. floribus axillaribus ſolitariis calyculatis, foliis lineari-lanceolatis glabris, caulibus proſtratis. *La Payr. Mem. p.* 2. *t.* 15. *Lamarck. encyclop.* 3. *p.* 420. *t.* 290. *f.* 3. *

Thymelaea pyrenaica juniperifolia, ramulis ſurrectis. *Tournef. inſt.* 594?

Wachholderblättriger Seidelbaſt. W.

*Habitat in* Pyrenaeis. ♄ (v. ſ.)

Folia *lineari-subulata glaberrima.* Flores *viridi-flavescentes basi bracteis binis oblongis obtusis calyciformibus obvallati.* W.

5. DAPHNE *pubescens.*

D. floribus sessilibus lateralibus aggregatis, foliis lanceolato-linearibus, caule pubescente. *Mant.* 66.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 463.
Behaarter Seidelbast. W.
*Habitat in* Austria. *D. Iacquin.* ♄

Caules *basi pubescentes, simplices, pubescentes.* Folia *alterna, remota, lineari-lanceolata, nudiuscula, anima, submucronata.* Flores *axillares, sessiles, angusti, quinque vel pauciores, tubo filiformi, pubescente, foliis breviores. Diversa videtur a* D. Thymelaea.

*6. DAPHNE *vermiculata.*

D. floribus sessilibus lateralibus solitariis glabris, foliis lineari-lanceolatis villosis. *Vahl. symb.* 1. *p.* 28. *
Sanamunda vermiculata. *Barr. ic.* 231.
Arragonischer Seidelbast. W.
*Habitat in* Arragonia. ♄

7. DAPHNE *villosa.*

D. floribus sessilibus lateralibus solitariis, foliis lanceolatis planis ciliatis pilosis confertis. *Sp. pl.* 510.
Thymelaea villosa minor lusitanica, polygoni folio. *Tournef. inst.* 594.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 464.
Wolliger Seidelbast. W.
*Habitat in* Lusitania, Hispania. *Alstroemer.* ♄

Frutex *ramis alternis.* Folia *polygoni, lanceolata, vix petiolata, utrinque pilis albis remotis: pauciori-bus in pagina superiore, pluribus ad margines. Ex alis rudimenta plurima foliosa ramulorum, unde quasi verticillata.* Flores *angusti, parvi, foliis breviores.*

8. DAPHNE *Tarton-raira.*

D. floribus sessilibus lateralibus aggregatis, basi squamis imbricatis, foliis obovatis nervosis sericeis. *Vahl. symb.* 3. *p.* 53. *
D. floribus sessilibus aggregatis axillaribus, foliis ovatis utrinque pubescentibus nervosis. *Gron. orient.* 125. *Mill. dict. n.* 4.
Thymelaea foliis candicantibus et serici instar mollibus. *Bauh. pin.* 463.

Tarton-Raire galloprovinciae monſpelienſium. *Lob. ic.* 371.
Sanamunda argentata latifolia. *Barr. ic.* 221.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 465.
Silberblättriger Seidelbaſt. W.
*Habitat in* Galloprovincia. ♄

*9. DAPHNE *nitida.*
D. floribus lateralibus aggregatis ſeſſilibus baſi nudis, foliis lineari-oblongis ſericeis enerviis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 53. *
Thymelaea ſeu Tartonraira lini foliis argenteis. *Tournef. cor.* 41?
Glänzender Seidelbaſt. W.
*Habitat in montibus calcareis* Tuneti. ♄

10. DAPHNE *alpina.*
D. floribus ſeſſilibus aggregatis lateralibus, foliis lanceolatis obtuſiuſculis, ſubtus tomentoſis. *Mill. dict. n.* 5. *Gouan. illuſtr.* 27. *Willd. arb* 99. *
D. floribus ſeſſilibus aggregatis ſublateralibus, foliis lanceolatis obtuſiuſculis, junioribus hirſutis. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 421. *
Thymelaea foliis ellipticis calveſcentibus, floribus aggregatis, ſeſſilibus, hirſutis. *Hall. helv. n.* 1026.
Thymelaea cantabrica juniperifolia, ramulis procumbentibus. *Tournef. inſt.* 595.
Thymelaea floribus inter folia, folio utrinque hirſuto. *Hall. helv.* 187. *Sauv. monſp.* 57.
*ß.* Chamelaea ſabaudica, folio utrinque incano, flore albo. *Raj. hiſt.* 1588.
Thymelaea, incana, mezerei folio et facie, furculis admodum fragilibus. *Pluk. alm.* 366. *t.* 229. *f.* 3.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 466.
Alpen Seidelbaſt. W.
*Habitat in alpibus* Helvetiae, Genevae, Italiae, Auſtriae. ♄ (v. v.)

11. DAPHNE *Laureola.*
D. racemis axillaribus quinquefloris, foliis lanceolatis glabris. *Mat. med.* 104. *Mill. dict. n.* 1. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 213. *Willich. obſ.* 11. *Iacq. auſtr. t.* 183. *Hoffm. germ.* 136. *Willd. arb.* 100. *
Thymelaea foliis perennantibus, ellipticis, floribus ex alis nutantibus. *Hall. helv. n.* 1025.
Thymelaea Laureola. *Scop. carn.* 2. *n.* 463.

Daphne racemis lateralibus, foliis lanceolatis integris. *Hort. cliff.* 147. *Hort. upſ.* 94. *Sauv. monſp.* 57.
Thymelaea lauri folio ſempervirens ſ. Laureola mas. *Tournef. inſt. Du Ham. arb.* 1.
Laureola ſempervirens, flore viridi, quibusdam Laureola mas. *Bauh. pin.* 662.
Laureola. *Dod. pempt.* 365. *Blackw. t.* 62.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 466.
Immergrüner Seidelbaſt. W.
*Habitat in* Anglia, Helveria, Gallia, Baldo. ♄ (v. v.)

Racemi *axillares, laterales, nutantes, bracteis concavis, alternis, absque floribus in ſuis albis.* Flores 5, *terminales racemi, in umbellulam congeſti.* Flores *triſtes colore, odore, tempore.*

12. DAPHNE *pontica.*
D. pedunculis lateralibus bifloris, foliis lanceolato-ovatis. *Sp. pl.* 511. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 54.
Thymelaea pontica, citrei foliis. *Tournef. itin.* 3. *p.* 180. *t.* 180.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 468.
Pontiſcher Seidelbaſt. W.
*Habitat in* Ponto. ♄

13. DAPHNE *pendula.*
D. capitulis lateralibus pedunculatis involucratis nutantibus, foliis lanceolato-ellipticis alternis glabris. *Smith. ic. inedit.* 1. *p.* 34. *t.* 34. *
Scopolia compoſita. *Lin. ſuppl.* 409.
Hängender Seidelbaſt. W.
*Habitat in* Iava. ♄

Arbor *ramis teretibus glabris, apice foliatis, infra folia floriferis.* Folia *alterna breve petiolata oblonga utrinque acuminata integerrima venoſa glaberrima longitudine digiti.* Stipulae *nullae.* Pedunculi *in axillis foliorum poſt eorum caſum ſolitarii nutantes filiformes.* Involucrum *multiflorum diphyllum.*

** *Floribus ſpicatis ſ. racemoſis.*

* 14. DAPHNE *Lagetto.*
D. ſpicis paniculatis terminalibus, foliis ovatis acutis. *Swartz. prod.* 63. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 680. *
Lagetta lintearia. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 363. *t.* 289.
Frutex foliis majoribus cordatis nitidis, petiolis pollicaribus inſidentibus. *Brown. jam.* 371. *t.* 31. *f.* 5.

Laurifolia arbor folio latiore longo mucronato laevi ſplendente, cortice interiore in telas plurimas linearum aemulas extenſili. *Sloan. jam.* 137. *hiſt.* 2. *p.* 22. *t.* 168. *f.* 1. 2. 3. *t.* 169. *f.* 1.
Arbor americana ſindophoros laurifolia. *Pluk. alm.* 41.
Lorbeerblättriger Seidelbaſt. ♄
*Habitat in montibus excelſis* Jamaicae, Hiſpaniolae. ♄

*15. DAPHNE *polyſtachya.* W.
D. ſpicis axillaribus binis ternisve, foliis ovatis acuminatis integerrimis. W.
Cansjera (*malabarica*) racemulis axillaribus ſubfaſciculatis, foliis alternis ovato-acutis, caule ſarmentoſo. *Lamarck encycl.* 3. *p.* 418. *t.* 289. *f.* 1.*
Tsjereu-Caniram. *Rheed. mal.* 7. *p.* 3. *t.* 2.
Vielähriger Seidelbaſt. W.
*Habitat in* India *orientali.* ♄
*Hujus et ſequentis flores ſunt tetrandri.*

*16. DAPHNE *monoſtachya.* W.
D. ſpicis axillaribus ſolitariis, foliis ovato-lanceolatis integerrimis. W.
Cansjera malabarica β. *Lam. encycl.* 3. *p.* 418. *t.* 289. *f.* 2.*
Scheru-Valli-Caniram. *Rheed. mal.* 7. *p.* 7. *t.* 4.
Einähriger Seidelbaſt. W.
*Habitat in* India *orientali.* ♄

*17. DAPHNE *tinifolia.*
D. racemis compoſitis erectis, floribus terminalibus confertis, foliis oblongis. *Swartz. prod.* 63. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 683.*
Laurus foliis ovatis planis integerrimis, pedunculis racemoſis, floribus in capitulum collectis. *Mill. dict.*
Arbor cortice fiſſo, foliis oblongis, racemis terminalibus umbellulatis. *Brown. jam.* 372. *n.* 19.
Traubenblütiger Seidelbaſt. W.
*Habitat in montibus excelſis* Iamaicae *auſtralis.* ♄

18. DAPHNE *Gnidium.*
D. racemis terminalibus paniculatis, foliis lineari-lanceolatis acuminato-cuſpidatis. W.
D. panicula terminali, foliis lineari-lanceolatis acuminatis. *Sp. pl.* 511. *Mill. dict. n.* 7.
D. foliis lanceolatis baſi anguſtioribus, racemo nudo terminali. *Sauv. monſp.* 56.
D. floribus racemoſis, foliis lineari-lanceolatis acuminatis integris. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 427.

Thymelaea foliis lini. *Bauh. pin.* 463.
Thymelaea. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 87. *Camer. epit.* 974.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 469.
Riſpenblütiger Seidelbaſt. W.
*Habitat in* Hiſpania, Italia, G. Narbonenſi. ♄ (v. ſ.)

* * * *Floribus terminalibus aggregatis.*

19. DAPHNE *indica.*

D. capitulo terminali pedunculato, foliis oppoſitis oblongo-ovatis glabris. *Oſb. it.* 246.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 468.
Indiſcher Seidelbaſt. W.
*Habitat in* China. ♄

Frutex *parvus*. Folia *oppoſita, oblongo-ovata, integerrima, glabra*. Pedunculus *terminalis, breviſſimus, apice gerens flores* 6 *ad* 8 *ſeſſiles.*

20. DAPHNE *foetida.*

D. glabra, floribus terminalibus congeſtis ſeſſilibus, foliis oppoſitis petiolatis ovato-oblongis acutis. *Lin. ſuppl.* 223. *Forſt. prod. n.* 168.
Stinkender Seidelbaſt. W.
*Habitat in inſula* Taheiti. ♄

*Hanc diſtinguit Forſter, ſed an diſtincta a D. indica?*

21. DAPHNE *rotundifolia.*

D. hirſuta, floribus terminalibus congeſtis ſeſſilibus, foliis oppoſitis ellipticis ſubpetiolatis obtuſis glabris. *Lin. ſuppl.* 223. *Forſt. prod. n.* 169.
Rundblättriger Seidelbaſt. W.
*Habitat in inſula* Namoka. ♄

Rami *tomentoſi cani.*

*22. DAPHNE *odora.*

D. capitulo terminali ſubſeſſili multifloro, foliis ſparſis oblongo-lanceolatis glabris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 26.
D. floribus aggregatis ſeſſilibus terminalibus, foliis ovatis alternis glabris. *Thunb. jap.* 159. * *Banks icones Kaempf. t.* 16.
Wohlriechender Seidelbaſt. W.
*Habitat i.* China, Japonia. ♄ (v. v.)

*23. DAPHNE *occidentalis.*

D. pedunculis axillaribus, floribus terminalibus umbellulatis dioicis, foliis alternis lanceolatis glabris. *Swartz prod.* 63. *Fl. in occid.* 2. *p.* 685. *
Weſtindiſcher Seidelbaſt. W.

*Habitat in montibus altis* Jamaicae *auſtralis.* ♄

24. DAPHNE *Cneorum.*

D. floribus faſciculatis terminalibus ſeſſilibus, foliis lanceolatis rudis mucronatis. *Pollich. pal. n.* 380. *t.* 1. *f.* 4. *Gouan. illuſtr.* 27. *Hoffm. germ.* 136. *Roth. germ. I.* 171. *II.* 446. *Willd. arb.* 100.*

Thymelaea foliis glabris linearibus ariſtatis, floribus ſeſſilibus umbellatis. *Hall. helv. n.* 1027.

Thymelaea minor ſ. Daphnoides alpinum. *Geſn. faſc.* 5. *t.* 3. *f.* 6.

Daphne humifuſa, foliis oblongis flores ſeſſiles terminales ſubcingentibus. *Sauv. monſp.* 57. *Duham. arb.* 2. *t.* 94.

Thymelaea alpina linifolia humilior, flore odoratiſſimo. *Tournef. Scheuchz. alp.* 4. *p.* 141. R.

Thymelaeae affinis facie externa. *Bauh. pin.* 463.

Cneorum. *Matth. hiſt.* 46. *Cluſ. hiſt.* 89.

Thymelaea minor. *Cord. hiſt.* 189.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 468.

Wohlriechender Seidelbaſt. W.

*Habitat in* Helvetia, Hungaria, Pyrenaeis, Baldo, Germania, Gallia. ♄ (v. v.)

Caules *humifuſi.* Folia *amma, glabra.* Flores *congeſti, foliis cincti, ſuaveolentes, ſupra rubri.* Bis *quotannis floret.* Scop.

Variat *floribus albis. Cluſ. hiſt.* R.

*25. DAPHNE *altaica.*

D. floribus terminalibus ſubſeſſilibus, foliis oppoſitis oblongo-lanceolatis obtuſis baſi anguſtatis glabris. W.

D. floribus faſciculatis terminalibus ſeſſilibus, foliis oblongo-ovatis glabris. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 55. *t.* 35.*

Sibiriſcher Seidelbaſt. W.

*Habitat in* Sibiria *in alpibus* Altaicis. ♄ (v. ſ.)

26. DAPHNE *ſquarroſa.*

D. floribus terminalibus pedunculatis, foliis ſparſis linearibus patentibus mucronatis. *Mill. dict.* 8.

Thymelaea capitata lanuginoſa, foliis creberrimis minimis aculeatis. *Burm. afr.* 134. *t.* 49. *f.* 3

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 471.

Sparriger Seidelbaſt. W.

*Habitat in* Aethiopia. ♄

*27. DAPHNE *glomerata.*

D. floribus ſubſeſſilibus glomeratis terminalibus, foliis

ovato-lanceolatis glabris involucriformibus, caule simplici. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 423. *

Thymelaea orientalis minima Laureolae folio, floribus glomeratis albis. *Tournef. cor.* 41.

Knaulblütiger Seidelbaſt. W.

*Habitat in* Oriente. ♄

28. DAPHNE *oleoides.*

D. floribus geminis terminalibus ſeſſilibus, foliis elliptico-lanceolatis glabris. *Mant.* 66. *Schreber. dec.* 13. *t.* 7.

D. (*ſalicifolia*) floribus aggregatis perpaucis ſeſſilibus terminalibus, foliis lineari-lanceolatis utrinque glabris. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 423. *

Thymelaea cretica oleae folio utrinque glabro. *Tournef. cor.* 41.

Chamaedaphnoides cretica. *Alp. exot.* 44. *t.* 43.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 471.

Oelbaumblättriger Seidelbaſt. W.

*Habitat in* Creta. ♄ (v. ſ.)

Caulis *fruticuloſus*, *compoſitus.*

29. DAPHNE *ſericea.*

D. floribus aggregatis terminalibus ſeſſilibus, foliis lanceolatis ſubtus villoſis, laciniis corollae obtuſis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 28. *

D. (*oleaefolia*) floribus faſciculatis ſeſſilibus terminalibus, foliis lanceolato-oblongis ſubtus villoſis. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 424. *

Thymelaea cretica oleaefolio ſubtus villoſa. *Tournef. cor.* 41.

Seidenartiger Seidelbaſt. W.

*Habitat in* Creta. ♄ (v. ſ.)

*A D. oleoide differt:* foliis *ſubtus villoſis*, numero *florum*, laciniis *limbi oblongis.* Vahl. l. c.

*30. DAPHNE *collina.*

D. floribus faſciculatis terminalibus, foliis obovatis obtuſis ſupra glaberrimis ſubtus villoſis. *Smith ſpicil. t.* 18. *

D. (*buxifolia*) floribus aggregatis ſeſſilibus terminalibus, foliis oblongis obtuſiſſimis ſubtus villoſis. *Vahl ſymb.* 1. *p.* 29?

Daphnoides aliud rarum foliis ſupinis hirſutis. *Geſn. faſc. p.* 6. *t.* 3. *f.* 7. *excluſis ſynonymis.*

Thymelaea ſaxatilis oleae folio. *Tournef. inſt.* 594.

Chamelaea alpina folio inferno incano. *Bauh. pin.* 462.
Chamelaea incana et lanuginosa. *Bauh. hist.* 1. *p.* 586.
Chamelaea alpina incana. *Lob. ic.* 578.
Stumpfblättriger Seidelbast. W.
*Habitat in collibus* Italiae *australis, prope* Casertam *ad ripas* Vulturni. ♄ (v. s.)

## 774. DIRCA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 665.

*Cal.* o. *Cor.* tubulosa limbo obsoleto. *Stam.* tubo longiora. *Drupa* 1-sperma.

### 1. DIRCA *palustris.*

Dirca. *Amoen. acad.* 3. *p.* 12. *t.* 1. *f.* 7. *Kalm. it.* 3. *p.* 88. *Duham. arb.* 1. *t.* 212. *Mill. dict. Wangenh. amer.* 91. * *Willd. arb.* 102. *

Thymelaea floribus albis primo vere erumpentibus, foliis oblongis acuminatis, viminibus et cortice valde tenacibus. *Gron. virg.* 155.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 472.
Sumpf Lederholz. W.
*Habitat in* Virginiae *paludosis.* ♄ (v. v.)

## 775. GNIDIA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 666.

*Cal.* infundibulif. 4-fidus. *Petala* 4, calyci inserta. *Nux* subdrupacea.

### 1. GNIDIA *pinifolia.*

G. foliis sparsis trigonis, floribus umbellato-capitatis. *Thunb. prod.* 76.
G. foliis lineari-subulatis supra planis acutis, floribus binis axillaribus. *Lin. suppl.* 225.
G. foliis sparsis linearibus: floralibus verticillatis. *Berg. cap.* 122. *Wendl. obs.* 15. *t.* 2. *f.* 11. *
G. foliis sparsis lineari subulatis, floralibus verticillatis, floribus aggregatis terminalibus. *Sp. pl.* 2. *p.* 512.
Rapunculus foliis nervosis linearibus, floribus argenteis non galeatis. *Burm. afr.* 112. *t.* 41. *f.* 3.
Valerianoides aethiopica frutescens. *Seba. mus.* 2. *p.* 22. *t.* 32. *f.* 5.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 474.
Heidekrautartige Gnidie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Folia *linearia, acuminata, obtuſa, carinata.* Calyx *albus.* Petala *lanceolata, calyce breviora, alba.* Stamina 4 *intra tubum*: 4 *extra.*

Rami *laeves nec tomentoſi.* Folia *lineari-ſubulata acuta non pungentia ſubtus convexa, ſupra plana laevia patula.* Flores *e ſummis ramulis bini glabri.* Limbus *acutus, tubo duplo longiore.* Antherae *quatuor ſupra faucem pilis cinctae et quatuor intra tubum minores.*

2. GNIDIA *radiata.*

G. foliis ſubulatis triquetris acutis, capitulis terminalibus ſeſſilibus radiatis, bracteis lanceolatis. *Mant.* 67. *Burm. prodr.* 12. *Wendl. obſ.* 15. *t.* 2. *f.* 12. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 474.

Geſtrahlte Gnidie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

Frutex *ſcaber, prolifer.* Folia *ſparſa, triquetra, mucronata, glabra.* Capitula *terminantia ramos, radiata* Bracteis *lanceolatis, folio latioribus.* Flores *extus ſubvilloſi.* Calycis *limbus intus glaber, longitudine tubi.* Petala 4, *calyce minora, piloſa.* Stamina 4 *exſerta*; 4 *in fauce.*

3. GNIDIA *filamentoſa.*

G. foliis elliptice ovatis glaberrimis approximatis, floribus capitatis, filamentis capillaribus. *Lin ſuppl.* 224.

G. foliis ovatis glabris, floribus capitatis, filamentis capillaribus. *Thumb. prod.* 76.

Langfädige Gnidie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

Frutex *glaberrimus cicatricibus foliorum tuberculatus.* Folia *alterna ſeſſilia elliptica integerrima avenia.* Capitula *florum ſolitaria ſeſſilia.* Involucrum *glabrum.* Corolla *villoſa, limbo quadripartito.* Filamenta *capillacea, quatuor longitudine corollae, quatuor ad faucem breviora.* Varietas *foliis anguſtioribus, ſed filamentis facile cognoſcitur.*

*4. GNIDIA *carinata.*

G. foliis lanceolatis obtuſis carinatis glabris, floribus capitatis. *Thumb. prod.* 76.

Kielformige Gnidie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

* 5. GNIDIA *scabra.*

G. foliis lanceolatis acutis scabris, floribus capitatis. *Thunb. prod.* 76.

Scharfe Gnidie. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄

6. GNIDIA *simplex.*

G. foliis omnibus linearibus acutis, floribus terminalibus sessilibus. *Mant.* 67. *Burm. prodr.* 12.

G. foliis lineari-lanceolatis glabris, floribus capitatis, ramis erectis. *Thunb. prod.* 76.

G. viridis. *Berg. cap.* 125.

Thymelaea foliis Passerinae. *Breyn. cent.* 10. *t.* 6.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 475.

Einfache Gnidie. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄

Caules *semipedales, inaequales, exasperati tuberculis* 4 *a casu foliorum.* Folia *sparsa, linearia, acuta, erecta, laevia.* Flores *terminales, nudi, ex apice rami villoso, sessiles, lutei calyce, petalis, antheris.* Folia *floralia reliquis non latiora.* Petala *oblonga, acuminata.* Stamina 4 *in fauce*; 4 *supra faucem.*

7. GNIDIA *capitata.*

G. foliis sparsis lanceolatis glabris, floribus capitatis, bracteis obvallatis, pedunculo nudo. *Lin. suppl.* 224. *Thunb. prod.* 76.

Kopfblütige Gnidie. W.

*Habitat ad* Cap b. spei. ♄

Caulis *fruticosus, ramis erectis teretibus purpurascentibus.* Folia *angustiora lanceolata remotiora laevia.* Flos *aggregatus terminalis pedunculatus.* Involucrum *octophyllum lanceolatum aequale, flosculis dimidio brevius.* Flosculi *sedecim sessiles pubescentes cani.* Tubus *filiformis.* Limbus *brevis quinquepartitus.* Stamina *decem, quinque extra faucem, quinque intra faucem.* Flos *Passerinae similis. Forte Dais.*

* 8. GNIDIA *laevigata.*

G. foliis oppositis ovatis glabris, floribus terminalibus subcapitatis. *Thunb. prod.* 67. *Wendl. obs.* 17. *t.* 2. *f.* 14.

Glatte Gnidie. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)

*9. GNIDIA *biflora.*
G. foliis ſparſis lanceolatis glabris, floribus lateralibus binis, ramis divaricatis. *Thunb. prod.* 76.
Zweyblütige Gnidie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

*10. GNIDIA *racemoſa.*
G. foliis obovato-lanceolatis laxis glabris, floribus racemoſis axillaribus. *Thunb. prod.* 76.
Traubenblütige Gnidie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

11. GNIDIA *tomentoſa.*
G. foliis ſparſis ovato-oblongis glabris, margine ſcabris. *Sp. pl.* 512.
G. foliis ſparſis ovatis piloſis ſcabris, floribus capitatis. *Thunb. prod.* 76.
G. pubeſcens. *Berg. cap.* 124.
*Houttuyn Lin. Pfl.* Syſt. 3. *p.* 476.
Filzige Gnidie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)
Ramulorum *apices lanati ut congeneres.* Folia *ſuprema ſubpubeſcentia.* Stamina 4 *exſerta; 4 in fauce.* Petala *parva, emarginata.*

*12. GNIDIA *argentea.*
G. foliis ſparſis obovatis tomentoſo-argenteis, floribus capitatis. *Thunb. prod.* 76.
Silberfarbene Gnidie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

13. GNIDIA *imbricata.*
G. foliis oblongis quadrifariam imbricatis ſericeis, floribus terminalibns in axillis foliorum. *Lin. ſuppl.* 225.
G. foliis ovatis quadrifariis tomentolis, floribus capitatis. *Thunb. prod.* 76.
Dachziegelblättrige Gnidie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

14. GNIDIA *ſericea.*
G. foliis oppoſitis ovatis tomentoſis, floribus terminalibus. *Thunb. prod.* 76.
G. foliis ovatis tomentoſis: floralibus quaternis, caule hirſuto, florum corona ſetis octo. *Syſt. veg.* 309. *Wendl. obſ.* 16. *t.* 2. *f.* 13. *
Paſſerina ſericea. *Sp. pl.* 2. *p.* 513. *Amoen. acad.* 4. *p.* 271. *

Nectandra ſericea. *Burm. cap.* 131.
Thymelaea ſericea, foliis oblongis, floribus tubuloſis anguſtiſſimis. *Burm. afr.* 135. *t.* 49. *f.* 2.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 476.
Seidenartige Gnidie. W.
*Habitat ad* Cap. b. Spei. ♄ (v. ſ.)

Faux *floris coronata filis* 8 *coloratis longitudine corollae, extra petala.* Stamina *in fauce* 4; *in tubo* 4.

15. GNIDIA *oppoſitifolia.*

G. foliis oppoſitis lanceolatis tomentoſis, floribus terminalibus. *Thunb. prod.* 76.
G. foliis oppoſitis lanceolatis. *Syſt. veg.* 309.
Thymelaeae africanae ſananundae prioris Cluſii facie. *Pluk. alm.* 367. *t.* 323. *f.* 7.

*β.* Paſſerina (*laevigata*) foliis ovatis glabris acutis, floribus obtuſis. *Spec. pl.* 2. *p.* 513. *Amoen. acad.* 4. *p.* 312. *

Nectandra laevigata. *Berg. cap.* 134.
Thymelaea foliis planis acutis, coma et floribus purpureis. *Burm. afr.* 137. *t.* 49. *f.* 3.
*Houttuyn Lin. Pfl.* Syſt. 3. *p.* 476.
Paarblättrige Gnidie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

*Culta in hortis* Petala *acquirit.* Folia *ſuprema apice ſanguinea.* Flores *terminales, extus villoſi.* Stamina, *praeter callos iſtos* 4 *ſupra faucem, ſunt* 4 *ſub fauce;* 4 *in medio tubi.*

16. GNIDIA *daphnaefolia.*

G. decandra, foliis oblongis planis integerrimis, capitulo terminali pedunculato involucrato, floribus quinquefidis. *Lin. ſuppl.* 225.

*α. hirſuta;* foliis oblongis ſpathulatis hirſutie canis, floribus minoribus.

*β. glabra;* foliis oblongis verſus baſin attenuatis nudiuſculis, floribus majoribus.

Seidelbaſtblättrige Gnidie. W.
*Habitat in* Madagaſcar. ♄

*Habitus, folia, inflorescentia ejusque involucrum, calycis figura et hirſuties Daidis cotinaefoliae eſt, ſtructura vero et ſitus partium floris eſt exacte Gnidiae, ſed non numerus.* Folia *ſunt alterna nec oppoſita ut in genere Daidis.* Involucrum *florum eſt ut in Daide, ſed pentaphyllum.*

## 776. STELLERA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 667.

*Cal.* o. *Cor.* 4-fida. *Stamina* brèviſſima. *Nux* 1, roſtrata.

1. STELLERA *Paſſerina.*

S. foliis linearibus, floribus axillaribus ſeſſilibus quadrifidis. W.

S. foliis linearibus, floribus quadrifidis. *Amoen. acad.* 1. *p.* 400. *Hall. helv. n.* 1028. *Sauv. monſp.* 69. *Pollich. pal. n.* 381. *Hoffm. germ.* 137. *Roth. germ.* 171. *II.* 446.

Paſſerina foliis linearibus, floribus laxe ſpicatis alternis in foliorum binorum alis ſeſſilibus. *Guett. ſtamp.* 25. *Dalib. pariſ.* 118.

Paſſerina. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 456. *Fuchſ. p.* 535.

Lithoſpermum, lineariae folio, germanicum. *Bauh. pin.* 259.

Linaria alterna botryoides montana. *Column. ecphr.* 1. *p.* 82. *t.* 80.

Lingua paſſerina. *Tabern. p.* 828. *Tragi p.* 535. R. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 432.

Gemeine Stellere. W.

*Habitat in* Germaniae, Helvetiae, Italicae, Galliae *campis aridis apricis.* ⊙ (v. ſ.)

Facies *Theſii alpini.* Folia *glabra.* Flores *axillares, ſeſſiles, in lana minuta.*

2. STELLERA *Chamaeiaſme.*

S. foliis lanceolatis, floribus terminalibus racemoſis nudis quinquefidis. W.

S. foliis lanceolatis, floribus quinquefidis. *Amoen. acad.* 1. *p.* 400. * *Gmel. ſib.* 3. *p.* 27.

Chamaeiaſme radice mandragorae. *Amm. ruth.* 16. *t.* 2. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 432.

Sibiriſche Stellere. W.

*Habitat in* Sibiria. *Gmelin.* 24 (v. ſ.)

## 777. PASSERINA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 668.

*Cal.* o. *Cor.* 4-fida. *Stamina* tubo impoſita. *Nux* 1, corticata.

1. PASSERINA *filiformis.*

P. foliis linearibus convexis quadrifariam imbricatis, ra-

mis tomentosis. *Mill. dict.* 1. *Berg. cap.* 130. *Wendl. obs.* 18. *t.* 2. *f.* 15. *

P. foliis trigonis acutis quadrifariis, floribus racemosis. *Thunb. prod.* 75.

P. foliis linearibus. *Hort. cliff.* 246. *t.* 11.* *Roy. lugdb.* 208.

Thymelaea aethiopica fruticosa, foliis in longum striatis, furculis valde tomentosis. *Pluk. alm.* 180.

Thymelaea aethiopica, passerinae foliis. *Breyn. cent.* 10. *t.* 6.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 477.

Fadenförmiger Vogelkopf. W.

*Habitat in* Aethiopia. ♄ (v. s.)

Corollae *tubus longitudine germinis.* Folia *floralia basi margine lato membranaceo, quod non in reliquis.*

## 2. PASSERINA *hirsuta.*

P. foliis carnosis extus glabris, caulibus tomentosis. *Mill. dict. n.* 2. *Osb. it.* 50. *Wendl. obs.* 18. *t.* 2. *f.* 16. * *Vahl. symb.* 1. *p.* 29. *

P. (*Metnan*) foliis ovatis incurvis quadrifariam imbricatis, caule tomentoso, floribus congestis sessilibus terminalibus. *Forsk. descr.* 81.

Thymelaea tomentosa, foliis sedi minoris. *Bauh. pin.* 461.

Sanamunda 3. *Clus. hist.* 1. *p.* 89. *Breyn. cent. t.* 19.

Sesamoides parvum dalechampi. *Bauh. hist.* 1. *p.* 595.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 478.

Haariger Vogelkopf. W.

*Habitat in* Galloprovincia, Italia, Oriente. ♄ (v. s.)

Sanamundam 3. Clusii *ad* Daphnem *suam* dioicam *revocat Gouan. illustr.* 27. *t.* 17. *f.* 1. R.

## 3. PASSERINA *ericoides.*

P. foliis linearibus laevibus subimbricatis, corollis globosis. *Mant.* 276. *Burm. prodr.* 12.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 479.

Heideartiger Vogelkopf. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)

Facies *adeo tota Ericae, ut primo intuitu jurares Ericam esse.* Frutex *statura Passerinae filiformis.* Ramuli *pubescentes.* Folia *brevia* (*Ericae*), *ovato-oblonga, carnosa, opposita: floriferis subcordatis.* Flores *sessiles, in summis ramulis, laterales.* Semina *ova-*

*ta, atra; nitida.* Corollae *tubus globoſus, inflatus* (*Ericae*), *coloratus, uti limbus.*

*4. PASSERINA *nervoſa.*

P. foliis lanceolatis glabris tricoſtatis, floribus capitatis. *Thunb. prod.* 75.

Nervenblättriger Vogelkopf. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

*5. PASSERINA *cephalophora.* †

P. foliis trigonis quadrifariis, capitulis lanatis. *Thunb. prod.* 75.

Kopftragender Vogelkopf. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

6. PASSERINA *capitata.*

P. foliis linearibus glabris, capitulis pedunculatis tomentoſis. *Berg. cap.* 127. *Wendl. obſ.* 18. *t.* 2. *f.* 17.

P. foliis lanceolatis glabris laevibus, floribus capitatis. *Thunb. prod.* 75.

P. foliis lanceolato-linearibus glabris, floribus capitatis, receptaculo incraſſato. *Amoen. acad.* 6. *afr.* 16.*

Thymelaea foliis linearibus alternis, floribus ex uno petiolo copioſis. *Burm. afr.* 133. *t.* 48. *f.* 3.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 480.

Knoptblütiger Vogelkopf. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

Folia *ſparſa, linearia, laevia.* Capitula *terminalia, globoſa, pedunculata, tomentoſa.* Pedunculi *tomentoſi, incraſſati.* Flores *multi, absque tubo ſeſſiles.* Stamina *ſupra faucem* 16, *quorum* 8 *interiora caſtrata.*

*7. PASSERINA *orientalis.* W. †

P. foliis lanceolatis ſubcarnoſis obtuſis glabri uſculis, floribus axillaribus. W.

P. foliis lanceolatis. *Gron. orient.* 126.

Sanamunda I. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 88.

Orientaliſcher Vogelkopf. W.

*Habitat in* Oriente *et in* Hiſpania. ♄

8. PASSERINA *ciliata.*

P. foliis oblongo-lanceolatis ciliatis, floribus axillaribus, caule villoſo. W.

P. foliis lanceolatis ciliatis, floribus ſubſolitariis. *Thunb. prod.* 75.

P. foliis lanceolatis ſubciliatis erectis, ramis nudis. *Mill. dict.* 3. *Berg. cap.* 126. *Dryand. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 234.

Thymelaea foliis oblongis acutis ad oras fimbriatis. *Burm. afric.* 129. *t.* 47. *f.* 2.
Erica africana, ruſci folio. *Seb. muſ.* 2. *p.* 15. *t.* 12. *f.* 9.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 480.
Gefranzter Vogelkopf. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)
Flores *purpurei, fauce villoſa.*

9. PASSERINA *uniflora.*

P. foliis linearibus oppoſitis, floribus terminalibus ſolitariis, ramis glabris. *Berg. cap.* 128. *Wendl. obſ.* 19. *t.* 2. *f.* 18. *

P. foliis lanceolatis laevibus, floribus terminalibus ſolitariis. *Thunb. prod.* 75.

Thymelaea foliis triquetris cruciatim oppoſitis, flore ſericeo. *Burm. afr.* 132. *t.* 48. *f.* 2.
Thymelaea ramoſa, linearibus foliis anguſtis, flore ſolitario. *Burm. afric.* 131. *t.* 48. *f.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 481.
Einblütiger Vogelkopf. W.
*Habitat in* Aethiopia. ♄ (v. ſ.)
Flores *coerulei.* Stamina 8, *ad faucem floris.* Antherarum *rudimenta* 8 *latent in fundo floris.*

10. PASSERINA *grandiflora.*

P. glaberrima, foliis oblongis acutis concavis extus rugoſis, floribus terminalibus ſeſſilibus ſolitariis. *Lin. ſuppl.* 226.
P. (*linoides*) foliis lineari-lanceolatis glabris tricoſtatis, floribus terminalibus ſolitariis. *Thunb. prod.* 75?
Groß-blütiger Vogelkopf. W.
*Habitat in* Africa. ♄
Rami *uniflori.* Folia *oppoſita ſubimbricata obtuſa cum acumine, extus quaſi venis elevatis rugoſa, intus concava glaberrima.* Stamina *octo ſupra tubum.* Stigma *capitatum extra tubum. Diſtinguitur facile magnis florum limbis, extus ſericeis.*

* 11. PASSERINA *caneſcens.*

P. foliis oblongis quadrifariam imbricatis lanato-tomentoſis, floribus terminalibus lanatis. W.
Paſſerina caneſcens. *Schousboe Act. Haf.* *
Grauer Vogelkopf. W.
*Habitat in* Marocco. ♄ (v. ſ.)
*Diſtinguitur facile* ramis *numeroſis brevibus*, foliis *parvis imbricatis valde lanatis*, floribusque *cylindraceis.* W.

12. PASSERINA *ſpicata.*

P. foliis ovatis villoſis, floribus lateralibus ſolitariis. *Lin. ſuppl.* 226. *Wendl. obſ.* 19. *t* 2. *f* 19. *

P. foliis ovatis villoſis, floribus lateralibus ſeſſilibus. *Thunb. prod.* 75.

Aehrenblütiger Vogelkopf. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Ramulis *floriferis refert ſpicam folioſam.*

13. PASSERINA *laxa.*

P. foliis ovatis ſparſis, floribus capitatis, ramis laxis cernuis. *Lin. ſuppl.* 226. *Wendl. obſ.* 20. *t.* 2. *f.* 20. *

P. foliis ovatis piloſis, floribus capitatis, ramis laxis. *Thunb. prod.* 75.

Schlaffaeſtiger Vogelkopf. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

*Similis P. ericoidi, ſed differt floribus capitatis.*

* 14. PASSERINA *ſtricta.*

P. foliis ovatis hirſutis, floribus capitatis, ramis rigidis. *Thunb. prod.* 75.

Steifäſtiger Vogelkopf. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

15. PASSERINA *Anthylloides.*

P. foliis ovatis villoſis, floribus capitatis hirſutis. *Lin. ſuppl.* 225.

P. foliis oblongis villoſis, floribus capitatis. *Thunb. prod.* 76.

Wollblumenartiger Vogelkopf. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Flores *extus hirſutiſſimi albi, intus in viva planta lutei, in ſicca nigri.*

* 16. PASSERINA *pentandra.*

P. foliis ovatis hirſutis, ſpicis ovatis terminalibus. *Thunb. prod,* 76.

Fünfmänniger Vogelkopf. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

## 778. LACHNAEA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 669.

*Cal.* o. *Cor.* 4-fida: limbo inaequali. *Nux* ſubdrupacea.

1. LACHNAEA *Eriocephala.*

L. capitulis ſolitariis lanatis, foliis quadrifariam imbricatis. *Sp. pl.* 514.

Paſſerina (*Eriocephala*) foliis linearibus convexis imbricatis, capitulis lanatis. *Thunb. prod.* 75.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 482.

Wollenköpfige Lachnaea. W.

*Habitat in* Aethiopia. ♄ (v. ſ.)

Folia *trigona gibba.* Capitula *terminalia, ſolitaria, tomentoſa, cincta lana candida.*

2. LACHNAEA *conglomerata.*

L. capitulis confertis, foliis laxis. *Sp. pl.* 514.

Paſſerina (*glomerata*) foliis teretibus truncatis quadrifariis, floribus capitatis. *Thunb. prod.* 57.

Thymelaea africana, polii anguſtioribus foliis, floribus in capitulis ſummo caule conglomeratis. *Pluk. mant.* 179. *Raj. dendr.* 54.

Sanamunda 3 Cluſii affinis, polii folio. *Breyn. Cent.* 18. *t.* 7.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 482.

Knaulblütige Lachnaea. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

## 779. BAECKEA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 670.

*Cal.* infundibuliformis, 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 3-ſ. 4-locularis polyſperma calyce tecta.

1. BAECKEA *fruteſcens.*

B. foliis oppoſitis muticis, dentibus calycinis membranaceis coloratis. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 3. *p.* 260.

B. fruteſcens. *Sp. pl.* 514.

Baeckea. *Oſb. it.* 251. *t.* 1. *

Baeckea chinenſis. *Gaert. Sem.* 1. *p.* 157. *t.* 31.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 483.

Strauchartige Baeckie. W.
*Habitat in* China. ♄ *D. D. Abrah. Baeck S. R. M. Suecicae Archiater, et Amicus noster vere fautissimus, e cujus horto sicco plurimas rariores stirpes obtinuimus, etiam hanc primus nobiscum communicavit.*

Frutex *habitu abrotani, ramis virgatis*: Ramuli *oppositi, brevibus, simplicibus.* Folia *opposita, lineari, acuta, glabra, integerrima.* Flores *axillares, solitarii: pedunculo nudo longitudine floris, foliis longe breviore.* Perianthium *infundibuliforme quinquedentatum.* Petala 5, *subrotunda, calyci inserta.* Filamenta 8, *quorum 6 paria, et 2 solitaria, brevissima, inflexa.* Antherae *subovatae, parvae.* Germen *subrotundum.* Stylus *filiformis, corolla brevior.* Stigma *capitatum.* *Chinensibus* Tiongina. *Osbek.*

* 2. BAECKEA *densifolia.*
B. foliis quadrifariam imbricatis obtusis mucronulo reflexo, dentibus calycinis foliaceis. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 3. *p.* 260.
Dichtblättrige Baeckie. W.
*Habitat in* Nova Hollandia. ♄

# DIGYNIA.

## 780. SCHMIEDELIA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 672.

*Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Germina* pedicellata, flore longiora.

1. SCHMIEDELIA *racemosa.*
S. racemosa. *Mant.* 67.
Ufubis triphylla. *Burm. ind.* 81. *t.* 32. *f.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 485.
Traubenblütige Schmiedelie. W.
*Habitat in* India *orientali, sub Klinting biroe.* ♄ (v. f.)
Rami *flexuosi* (*Rhois Toxicodendri.*) Folia *alterna, ternata: foliolis petiolatis, ovato-oblongis, acuminatis, subserratis, nudis.* Petioli *communes teretes, subtomentosi, longitudine foliorum.* Racemi *axillares, simplices: floribus ad singula puncta pluribus sparsis.*

## 781. GALENIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 673.

*Cal.* 4-fidus. *Cor.* o. *Capſ.* ſubrotunda, 2-ſperma.

1. GALENIA *africana.*

G. erecta fruticoſa, foliis linearibus carnoſis. *Lin. ſuppl.* 227.

G. foliis linearibus, caule erecto. *Thunb. prod.* 77.

Galenia. *Hort. cliff.* 150. *Roy. lugdb.* 209. *Mill. dict. et illuſt. Fabr. helmſt. p.* 432.

Frutex africanus folio roſmarini tenuiore, flore et fructu chenopodii. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 267.

Sherardia. *Pont. epiſt.* 14.

Kali lignoſum, flore muſcoſo, roſmarini folio. *Bocc. muſ.* 150. *t.* 110.

Atriplex africana lignoſa fruteſcens, rosmarini foliis. *Till. piſ.* 20. *t.* 15.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 486.

Schmalblättrige Galenie. W.

*Habitat in* Africa. ♄ (v. ſ.)

Frutex *ruſticus*, *habitu Tetragoniae, licet minuta omnia, et totus obſolete papilloſus.* Caulis *teres ſetulis raris reflexis.* Folia *oppoſita, linearia, ſeſſilia, perennia.* Flores *ſeſſiles, albi, in panicula dichotoma.*

2. GALENIA *procumbens.*

G. procumbens, foliis ovatis canaliculatis apice patulo recurvato. *Lin. ſuppl.* 227.

G. foliis ovatis canaliculatis ſquarroſis, caule decumbente. *Thunb. prod.* 77.

Liegende Galenie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

## 782. WEINMANNIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 674.

*Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Capſ.* 2-locularis, biroſtris.

1. WEINMANNIA *glabra.*

W. foliis pinnatis, foliolis obovatis crenatis laevibus. *Lin. ſuppl.* 228. *Lamarck. illuſt. gen. t.* 315. *f.* 1. *Swartz. obſ.* 151.

Weinmannia pinnata. *Sp. pl.* 515.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 487.
Glatte Weinmannie. W.
*Habitat in* Jamaica. ♄

Arbuscula *Ramis oppositis: ultimis subpubescentibus.* Folia *opposita, pinnata cum impari:* Petiolo communi *alato, articulis subovatis:* Foliola 11-13, *parva, nuda, obtusa, opposita, sessilia, obovata, latere interiore versus basin angustiora, serraturis utrinque* 3 *s.* 4. Stipulae *ovatae, magnitudine foliorum, deciduae, inter paria petiolorum solitarias.* Racemi *terminales, solitarii, pedunculati, foliis longiores, erecti, simplices:* Floribus *numerosis, albis, magnitudine Tiarellae:* Pedicellis *unifloris, e singulis punctis pedunculi pluribus.* Calyx *foliolis oblongis, quatuor, patentibus, albis. Petala* 4, *lanceolata, calyce triplo longiora.* Germen *ovatum, bisulcum.* Styli 2, *albi, filiformes.* Stigmata *capitata.*

* 2. WEINMANNIA *hirta.*

W. foliis pinnatis, foliolis ovatis serrato-crenatis, subtus racemisque hirsutis. *Swartz. prod.* 65. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 691. *

Windmannia fruticosa, foliis subrotundis serratis, per pinnas cordato-alatas, racemis terminalibus, pinnis et ramis oppositis. *Brown. jam.* 212.

Behaarte Weinmannie. W.
*Habitat in altis montibus* Jamaicae *australis.* ♄ (v. s.)

*Differt a W. glabra:* hirsutie *et* pubescentia *plurium partium, quae in W. glabra glaberrima;* articulis *petioli communis subcordatis, nec obovatis;* capsulis *oblongis brevibus, nec subrotundis longius rostratis.* Swartz. l. c.

3. WEINMANNIA *tomentosa.*

W. foliis pinnatis, foliolis ovatis integerrimis subtus tomentosis, stipulis caducis. *Lin. suppl.* 227.

Filzige Weinmannie. W.
*Habitat in* Nova Granada *Mutis.* ♄

Arbor *cortice fuscescente valde ramosa, foliosaque.* Folia *opposita subtus tomentosa, pinnata cum impari.* Petiolus *communis alatus, articulis obovatis.* Foliola *undecim ad tredecim parva crassiuscula, subtus valde tomentosa ovata integerrima regularia.* Stipulae *solitariae utrinque, foliolis majores, deciduae.* Racemi

*verſus apicem denſiſſimi, quaſi ſpicaè, pedicellis breviſſimis.* Nectarium *campanulatum ſtamina cingens integerrimum membranaceum.*

## 4. WEINMANNIA *trifoliata.*

W foliis ternatis, foliolis ellipiice lanceolatis ſerratis glaberrimis, paniculis compoſitis. *Lin. ſuppl.* 227. *Lamark illuſt. gen. t.* 313. *f.* 2.

W foliis ternatis, foliolis ellipticis ſerratis glabris. *Thunb. prod.* 77.

Dreiblättrige Weinmannie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ. ſ. ſ.)

Facie *non multum aliena videtur a Pteleis.* Frutex *glaberrimus.* Folia *appoſita.* Paniculae *axillares.*

## 5. WEINMANNIA *racemoſa.*

W. foliis ſimplicibus obovato-ellipticis obtuſis, dentatis, racemis glabris. W.

W. foliis ſimplicibus ovatis ſerratis utrinque glaberrimis, ſtipulis nullis. *Lin. ſuppl.* 227.

W. foliis ſimplicibus ovatis ſerratis petiolatis, racemis axillaribus ſolitariis. *Forſt. prod. n.* 173.

Stumpfblättrige Weinmannie. W.

*Habitat in* Nova Zeelandia. ♄ (v. ſ.)

Rami *et* ramuli *glabri.* Folia *oppoſita petiolata obovato-elliptica obtuſa utrinque glaberrima, dentata, dentibus obtuſis ut in Populo monilifera.* Racemi *longiſſimi axillares ſolitarii vel gemini terminales glabri.* W.

## *6. WEINMANNIA *paviflora.*

W. foliis ſimplicibus oblongis acuminatis dentatis, racemis hirtis terminalibus paniculatis. W.

W. foliis ſimplicibus ovatis ſerratis ſubſeſſilibus, racemis terminalibus ternis quinisve. *Forſt. prod. n.* 174.

Kleinblütige Weinmannie. W.

*Habitat in inſula* Taheiti. ♄ (v. ſ.)

Rami *teretes glabri*, ramuli *pubeſcentes.* Folia *oppoſita breve petiolata oblonga acuminata utrinque glabra dentata, dentibus remotis acutis.* Racemi *pubeſcentes in ramorum apice* 3-6 *paniculati. Differt a praecedente:* foliorum *forma*, pubeſcentia *racemorum, et ramulorum, denique* foliis *quadruplo minoribus.* W.

## 783. CODIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 675.

*Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Receptaculum* commune involucratum. *Involucrum* 4-phyllum.

1. CODIA *montana.*

C. montana. *Lin. ſuppl.* 288. *Forſt. gen. n.* 30. *Forſt. prod. n.* 175.
Berg Kugelſtrauch. W.
*Habitat in* Nova Caledonia. ♄

Folia *oppoſita petiolata elliptica glaberrima integerrima obtuſa.* Capitula *globoſa terminalia et axillaria breviſſima pedunculata. Forte Bruniae ſpecies foliis ellipticis.*

## 784. MOEHRINGIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 676.

*Cal.* 4-phyllus. *Petala* 4. *Capſ.* 1-locularis, 4-valvis.

1. MOEHRINGIA *muſcoſa.*

M. muſcoſa. *Scop. carn. n.* 466. *Pall. it.* 2. *p.* 219.
Alſine octoſtemon, foliis linearibus connatis. *Hall. helv. n.* 860.
Alſine muſcoſa quibusdam. *Bauh. pin. p.* 365.
Alſine montana, capillaceo folio. *Bauh. pin.* 251. *Scheuch. alp.* 503. *t.* 6. *Pluk. alm.* 23. *t.* 75. *f.* 1.
Alſine ſaxifraga anguſtifolia minima montana. *Col. ecphr.* 1. *p.* 292. *t.* 290.
Alſine ſaxatilis. *Lindern. hort. t.* 2. R.
β. Alſine tenuifolia muſcoſa. *Bauh. pin.* 251. *Moriſ. bleſ.* 10. *hiſt.* 2. *p.* 551. *ſ.* 5. *t.* 23. *f.* 12. *Seguier. t.* 5. *f.* 1.
Alſine polygonoides, foliis tenuiſſimis, per genicula binis, ad ſummitatem polyanthos. *Pluk. phyt. p.* 22. *t.* 74. *f.* 3. *Hall.* R.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 434.
Mooſige Möhringie. W.
*Habitat in alpibus* Helvetiae, Italiae, Auſtriae, Monspelii *ad fontes et ſcaturigines.* 24 (v. f.)

# *TRIGYNIA.*

## 785. POLYGONUM.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 677.

*Cal.* o. *Cor.* 5-partita, calycina. *Sem* 1, angulatum.

*) Atraphaxoides *caule frutescente.*

### 1. POLYGONUM *frutescens.*

P. caule fruticoso, foliis lanceolatis utrinque attenuatis, ochrea lanceolata internodiis breviore, petalis binis exterioribus minoribus reflexis. W.

P. caule fruticoso, calycinis foliolis duobus reflexis. *Hort. upsl.* 95. *Willich. illustr. n.* 7. *Willd. arb.* 226. *

P. fruticosum floribus pentapetalis octandris, trigynis, petalis 2 exterioribus reflexis. *Gmel. sib.* 3. *p.* 60. *t.* 12. *f.* 2.

Atraphaxis inermis foliis planis. *Hort. cliff.* 138. *Roy. lugdb.* 209.

Lapathum orientale, frutex humilis, flore pulchro. *Tournef. cor.* 38.

Lapathum dauricum montanum, fruticans, ramis late sparsis. *Amm. ruth.* 227.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 436.

Strauchartiger Knöterig. W.

*Habitat in* Sibiria, Dauria. ♄ (v. v.)

Calyx *diphyllus.* Petala 3, *obcordata.* Stigmata 3. Frutex *triqueter.*

*Cum* Atraphaxi spinosa *conjungit Gmel. Willich; mutatur enim in Atraphaxin spinosam. Pallas it.* 1. *p.* 262, 265.

### *2. POLYGONUM *grandiflorum.* W.

P. caule fruticoso, foliis ovato-oblongis acutis, ochrea lanceolata internodiorum longitudine, petalis aequalibus erectis. W.

P. orientale fruticosum latifolium minimum, flore maximo. *Tournef. cor.* 39.

Grofsblütiger Knoeterig. W.

---

Ochrea *dicitur in Polygonis et Cyperis vagina ad petioli basin.* W.

*Habitat in* Oriente. ♄ (v. f.)

Frutex *parvus vix ſemipedalis facie Polygalae Chamaebuxi.* Folia *alterna ovato-oblonga integerrima coriacea breviſſime petiolata margine revoluta acuta leviſſime venoſa, glabra.* Ochreae *membranaceae lanceolatae internodiis longiores ſaepius lacerae diaphanae albae.* Flores *axillares pedunculati ad ramorum apicem maximi hujus generis, myrti communis fere magnitudine.* W.

* * Biſtortae *ſpica unica.*

## 3. POLYGONUM *Biſtorta.*

P. caule ſimpliciſſimo monoſtachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Mat. med* 104. *Oed. dan.* 421. *Mill. ic. t.* 66. *Blackw. t.* 254. *Pollich. pal. n.* 582. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 40. *Ludw. ect. t.* 31. *Kniph. cent.* 1. *n.* 65. *Hoffm. germ.* 137. *Roth. germ. I.* 172. *II.* 449.

P. radice lignoſa intorta, ſpica ovata, foliorum petiolis alatis. *Hall. helv. n.* 1560.

Biſtorta foliis ovato-oblongis acuminatis. *Hort. cliff.* 150. *Hort. upſ.* 95. *Roy. lugdb.* 217.

Biſtorta major, radice magis intorta. *Bauh. pin.* 192.

β. Serpentaria mas ſ. Biſtorta. *Fuchſ.* 773. R.

Biſtorta britannica. *Lob. ic.* 292. R.

Biſtorta media, folio minus rugoſo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 539. R.

Biſtorta. *Cam. epit.* 683.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 437.

Wieſen Knöterig. W.

*Habitat in montibus* Helvetiae, Auſtriae, Germaniae, Galliae. 24 (v. v.)

## 4. POLYGONUM *viviparum.*

P. caule ſimpliciſſimo monoſtachyo, foliis lanceolatis. *Oed. t.* 13. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 44. *t.* 7. *f.* 2. *Gunn. norv. n.* 9. *Kniph. cent.* 2. *n.* 61. *Hoffm. germ.* 138.

P. radice lignoſa, intorta, foliis nervoſis, radicalibus ovato-lanceolatis, caulinis linearibus. *Hall. helv. n.* 1558.

Polygonum floribus trigynis, octandris, ſpicatis; foliis caulinis lanceolatis; ſemine ſubrotundo. *Scop. carn. ed.* 1. *p.* 422. *n.* 3. *ed.* 2. *n.* 470.

Biſtorta foliis lanceolatis. *Fl. lapp.* 152. *Fl. ſuec.* 321, 340. *Hort. cliff.* 150.

Biſtorta montana minor, radice intorta inodora, floſculis in ſpicae cacumine albis ſterilibus, inferna ſpicae parte tuberculis proliferis turbinatis puniceis fecunda. *Amm. ruth.* 169.
Biſtorta alpina media. *Bauh. pin.* 192. *Pluk. t.* 151. *f.* 2.
Biſtorta alpina minor. *Bauh pin.* 192. *Amm. ruth.* 169.
Biſtorta alpina minima. *Hall. opuſc.* 234.
Biſtorta alpina ſ. minor. *Camer. epit.* 684.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 439.
Zwiebeltragender Knöterig. W.
*Habitat in* Europae *ſubalpinis paſcuis duris.* 4 (v. v.)
Spicae *flores inferiores in bulbos tranſeunt ſaepe viviparos.*

* * * Perſicariae *piſtillo bifido, aut ſtamina minus* 8.

## 5. POLYGONUM *virginianum.*

P. floribus pentandris ſemidigynis, corollis quadrifidis inaequalibus, foliis ovatis. *Sp. pl.* 516.
Perſicaria floribus pentandris digynis, corolla quadrifida inaequali. *Wach. ultr.* 258.
Perſicaria florum ſtaminibus quinis, ſtylo duplici, corolla quadrifida inaequali. *Hort. cliff.* 42. *Gron. virg.* 43. *Roy. lugdb.* 216.
Perſicaria fruteſcens maculoſa virginiana, flore albo. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 589. *Raj. hiſt.* 183.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 440.
Virginiſcher Knöterig. W.
*Habitat in* Virginia. 4 (v. ſ.)
Caulis *piloſus.* Ochreae *membranaceae truncatae ſetis rigidis tectae et ciliatae.* Folia *ovata acuminata ſuperne glabra, inferne pubeſcenti-mollia viridia, margine ſetis ciliata.* Spicae *tenuiſſimae filiformes, floribus parvis albis remotiſſimis obſitae.* Spica *terminalis ſemipedalis et ultra; laterales ſesqui-vel biunciales.* W.

## 6. POLYGONUM *lapathiſolium.*

P. floribus hexandris digynis, ſtipulis muticis, pedunculis ſcabris, ſeminibus utrinque depreſſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 30.
P. floribus pentandris ſemidigynis, ſtaminibus corollae regulari aequalibus. *Sp. pl.* 517.
Polygonum penſylvanicum. *Curt. lond.*

Perſicaria floribus pentandris digynis, corolla regulari ſtaminibus aequali. *Wach. ultr.* 257.
Perſicaria florum ſtaminibus quinis ſemidigynis, ſtylo bifido corollae regulari aequantibus. *Hort. cliff.* 42.
Peſicaria major, lapathi foliis, calyce floris purpureo. *Tournef. illuſtr.* 510. *Raj. ſuppl.* 119.
Perſicaria Hydropiper. *Lob. ic.* 315.
*Houttuyn Lin. Pfl.* Syſt. 6. *p.* 440.
Ampferblättriger Knöterig. W.
*Habitat in* Gallia, Anglia. ⊙ (v. v.)

Caulis *erectus, firmus, laevis.* Vaginae *pubeſcentes, ciliatae.* Folia *ovata, petiolata, magnitudine Phytolaccae.* Pedunculi *oppoſitifolii, longitudine foliorum ſpicato-racemoſi.*

7. POLYGONUM *amphibium.*

P. floribus pentandris ſemidigynis, ſpica ovata. *Oed. dan. t.* 282. *Pollich. pal. n.* 385. *Hoffm. germ.* 138. *Roth. germ. 1.* 173. *II.* 450.
P. foliis ovato-lanceolatis ciliatis, ſpicis ovatis. *Hall. helv. n.* 1565.
P. ſpicis ſolitariis pedunculatis, ſtaminibus quinque, foliis ſerratis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 46.
P. foliis glabris, longe petiolatis, ſpica ſubrotunda. *Moench. haſſ. n.* 308. α.
Perſicaria florum ſtaminibus quinis corollam ſuperantibus, ſtylo bifido. *Hort. cliff.* 41. *Roy. lugdb.* 216.
Perſicaria floribus pentandris digynis, corolla ſtaminibus brevioribus. *Fl. ſuec.* 318, 341.
Potamogeton ſalicis folio. *Bauh. pin.* 193.
Fontinalis ſ. Potamogeton. *Dodon. cereal.* 227.
β. Perſicaria acida lungermanni. *Trew. comm. nor.* 1737. *t.* 5. *f.* 1. 2.
P. amphibium *terreſtre*, foliis hirſutis ſubſeſſilibus, ſpica oblonga. *Moench. l. c.* β.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 441.
Waſſer Knöterig. W.
*Habitat in* Europa. 4 (v. v.)

Varietas *aquatica* α. *ſtaminibus flore brevioribus.* β. *terreſtris ſtaminibus corolla longioribus, caule erecto, foliis manifeſte hirſutis.* *Hall. Iacq.*

Varietas *aquatica* γ. *natans, glabra, ſtaminibus corolla brevioribus.* Var. ε. terreſtris, *erecta, foliis ſcabris, ſtaminibus non ſemper corolla longioribus.* Haec *rariſſime floret.* *Leers. herb. n.* 296. R.

### 8. POLYGONUM *ocreatum.*

P. floribus pentandris trigynis, foliis lanceolatis. *Sp. pl.* 517.
Perſicaria ſpicis longis copioſiſſimis, foliis ex lineari lanceolatis, vaginis debilibus, floribus pentandris trigynis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 51. *n.* 39. *t.* 8.
Scheidiger Knöterig. W.
*Habitat in* Sibiria. *D. Gmelin.*

Stipulae *ſunt vaginae integrae, ventricoſae, laeves, ampliores multo quam caulis.* Folia *lanceolata, revoluta.* Flores *racemoſi.*

### 9. POLYGONUM *Hydropiper.*

P. floribus hexandris ſemidigynis, foliis lanceolatis, ſtipulis ſubmuticis. *Mat. med.* 104. *Blackw. t.* 119. *Trew. comm. nor.* 1737. *t.* 5. *f.* 7. 8. *Pollich. pal. n.* 384. *Ludw. ect. t.* 168. *Hoffm. germ.* 158. *Roth. germ. I.* 173. *II.* 451.
P. ſpicis ſtrigoſis laxis, foliis lanceolatis, ſeminibus obtuſe triangulis, vaginis debilibus. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 50.
P. floribus digynis, hexandris; foliis lanceolatis. *Scop. carn.* 1. *p.* 420. *n.* 1. *var.* 6. *ed.* 2. *n.* 467.
P. foliis ovato-lanceolatis, vaginis calvis truncatis. *Hall. helv. n.* 1554.
Perſicaria floribus hexandris ſemidigynis. *Fl. ſuec.* 320, 343.
Perſicaria florum ſtaminibus ſenis, ſtylo bifido. *Hort. cliff.* 46. *Roy. lugdb.* 216.
Perſicaria urens ſ. Hydropiper. *Bauh. pin.* 101.
Hydropiper. *Dod. pempt.* 607. *Fuchſ.* 842.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 443.
Scharfer Knöterig. W.
*Habitat in* Europae *ſubhumidis.* ⊙ (v.v.)

### *10. POLYGONUM *filiforme.*

P. floribus pentandris digynis, ſpicis filiformibus, foliis ovatis, ſtipulis ciliatis. *Thunb. jap.* 163.*
Fadenförmiger Knöterig. W.
*Habitat in* Japonia.

Caulis *teres lineis elevatis obſoletis lineatus erectus, villoſus, pilis adpreſſis, ferrugineus.* Rami *alterni hirſuti erecti.* Folia *alterna petiolata ovata acuta integra ciliata villoſa erecta pollicaria.* Petioli *baſi dilatati amplexicaules vaginantes.* Stipulae *intrafoliaceae inflatae truncatae ciliatae membranaceae.* Flores *ſpicati inferne remoti, ſuperne approximati minuti,*

*ſenſim florentes.* Spica *terminalis filiformis apice cernua ſpithamaea.* Bractea *amplexicaulis barbata triflora. Intra hanc duae bracteae ſingulum florem obvolventes lanceolatae integrae.* Corolla *ad baſin fere 4-partita glabra: laciniae ovatae ſemilineam longae: tribus ſuperioribus rubris, inferiora verſus flexis: infima alba.* Filamenta *quinque prope germen inſerta capillaria calyce paulo breviora, tribus brevioribus, alba.* Antherae *globoſae flavae.* Germen *triquetrum ſuperum.* Styli *duo ſubulati albi erecti, longitudine filamentorum.* Stigmata *ſimplicia obtuſa patula alba.* **Thunb. l. c.**

### *11. POLYGONUM *tinctorium.*

P. floribus hexandris trigynis, ſpicis virgatis, ſtipulis glabris arctis truncatis ciliatis, foliis ovatis acutiuſculis glabris. *Ait. Kew. 2. p. 31.*

P. (*tinctorium*) floribus hexandris ſemitrigynis, ſpicis ramoſis, foliis craſſis ovatis, ſtipulis membranaceis. *Loureiro. cochin. p. 297.*

Färber Knöterig. W.

*Habitat in* China. ♂

Caulis *herbaceus perennis teres bipedalis multiplex ſuberectus*: ſtipulis *membranaceis vaginantibus.* Folia *ovata integerrima glabra craſſa ſuccoſa alterna laete viridia.* Flos *ruberrimus, ſpicis longis ramoſis ſubterminalibus.* Corolla *5-partita connivens.* Stamina *ſex.* Stylus *ſemitrifidus.* Lourciro l. c.

### *12. POLYGONUM *minus.*

P. floribus hexandris ſubmonogynis, foliis lineari-lanceolatis, caule baſi repente. *Ait. Kew. 2. p. 31. Curt. lond.*

P. (*anguſtifolium*) floribus pentandris ſemidigynis, ſpicis filiformibus, foliis lanceolato-linearibus. *Roth. germ. II. 453. Hoffm. germ. 138.*

Polygonum intermedium. *Ehrh. herb. 94.*
Polygonum mite. *Schranck. bav. 1. p. 608.*
Polygonum ſtrictum. *Allion. ped. n. 2051. t. 67. f. 1.*
Polygonum Perſicaria β. *Sp. pl. 518.*

P. foliis ovato-lanceolatis glabris, ſpicis ſtrigoſis vaginis ciliatis. *Hall. helv. n. 1555.*

Perſicaria minor. *Bauh. pin. 101. Moriſ. hiſt. 2. ſ. 5. t. 29. f. 5.*

Perſicaria puſilla repens. *Lob. ic.* 316. *bona. Raj. angl.* 3. *p.* 145.
Perſicaria anguſtifolia. *Bauh. pin.* 101. *prod.* 43.
Perſicaria pumila. *Tabern.* 858.
Kleiner Knöterig. W.
*Habitat in uliginoſis* Germaniae, Helvetiae, Italiae, Galliae, Angliae. ⊙ (v.v.)

13. POLYGONUM *Perſicaria.*

P. floribus hexandris digynis, ſpicis ovato-oblongis, foliis lanceolatis, ſtipulis ciliatis. *Fl. ſuec.* 319, 342. *Pollich. pal. n.* 385. *Flor. dan. t.* 702. *Blackw. t.* 118. *Kniph. cent.* 4. *n.* 63. *Scop. carn. n.* 460.
P. foliis ovato-lanceolatis, ſubhirſutis, ſpicis ovatis, vaginis ciliatis. *Hall. helv. n.* 1557.
P. ſpicis denſis, floribus hexandris digynis, ſeminibus compreſſis, vaginis ciliaribus. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 47.
Perſicaria florum ſtaminibus ſenis, ſtylo duplici. *Hort. cliff.* 42. *Gron. virg.* 157. *Roy. lugdb.* 216.
Perſicaria mitis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 779. *Fl. lapp.* 71.
Perſicaria mitis maculoſa et non maculoſa. *Bauh. pin.* 101. *Trew. icon. in commer. nor.* 1737. *t.* 5. *f.* 3, 4, 5, 6. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 445.
Gemeinſter Knöterig. W.
*Habitat in* Europae *humidis et ad vias.* ⊙ (v. v.)

*Variat ſpicis rubris et albis, foliis viridibus et nigro-maculatis.* W.

*14. POLYGONUM *incanum.*

P. floribus hexandris digynis, ſpicis oblongis, foliis oblongo-lanceolatis ſubtus pubeſcentibus. W.
P. (*incanum*) caule procumbente erecto geniculato, foliis ovato-lanceolatis ſubtus incanis, ſpicis terminalibus axillaribusque interruptis, floribus hexandris. *Schmidt. bohem. n.* 391. ♀
Polygonum tomentoſum. *Schrank. bav.* 1. *p.* 669.
Polygonum Perſicaria γ. *Sp. pl.* 518.
P. foliis ovato-lanceolatis ſubtus tomentoſis, ſpicis ovatis, vaginis ciliatis. *Hall. helv. n.* 1556.
Perſicaria folio ſubtus incano. *Raj. ſynop.* 3. *p.* 145.
Grauer Knöterig. W.
*Habitat in* Germania, Bohemia, Bavaria, Helvetia. ⊙ (v. v.)
Folia *ſubtus pubeſcentia albida, ceterum habitus prae-*

*cedentis, ſed* caulis *ſemper adſcendens et* ſpicae *interruptae, quod vero interdum etiam in P. Perſicaria.* W.

*15. POLYGONUM *glabrum.* W.

P. floribus hexandris digynis, ſpicis virgatis, ochreis truncatis nudis, foliis lanceolatis acuminatis glabris. W.

Mudalej pundu. *Tamul.*

Glatter Knöterig. W.

*Habitat in* India *orientali.* (v. ſ.)

*Simillimum ſequenti, ſed abunde diſtinctum:* foliis *lanceolatis valde acuminatis margine non ciliatis,* ochreis *truncatis* [illegible] *modo ciliatis ſed glaberrimis, etiam ochreae florales absque ullis ciliis. Variat* staminibus *ſex et ſeptena. Eſt certe planta diſtincta jam e longinquo ſpectata diverſa. A P. filiformi* foliis *longioribus truncatalibus,* ſpicis *brevioribus aliisque notis diſcrepat, nec cum P. tinctorio convenit ob* ochreas *glaberrimas,* foliorum *ſtructuram et alios characteres.* W.

16. POLYGONUM *barbatum.*

P. floribus hexandris trigynis, ſpicis virgatis, ochreis truncatis ſetaceo-ciliatis, foliis oblongis acutis glabriuſculis. W.

P. floribus hexandris trigynis, ſpicis virgatis, ſtipulis truncatis ſetaceo-ciliatis, foliis lanceolatis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 52.

Perſicaria procumbens longiſſima anguſtiſſima non maculoſa, ſpica longiori laxiori et graciliore. *Sloan. jam.* 48. *hiſt.* 1. *p.* 17. *t.* 3. *f.* 1.

Velutta-modela-mucu. *Rheed. mal.* 12. *p.* 145. *t.* 77.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 446. *t.* 49. *f.* 2.

Bärtiger Knöterig. W.

*Habitat in* China. (v. ſ.)

Caulis *herbaceus, rufus.* Stipulae *vaginales laxae, piloſae, truncatae, ciliatae, ſetis validis longitudine ferme ipſius ſtipulae.* Spicae *virgatae, longae: floribus remotis, tribus ex ſingula bractea turbinata.*

*Tomum duodecimum horti malabarici et Sloani opus non poſſideo, ergo hiſce de ſynonymis nil dixi. Gmelinus, Sloani plantam ad P. ocreatum pertinere, autumat.* W.

*17. POLYGONUM *tomentoſum.* W.

P. floribus hexandris trigynis, ſpicis virgatis, ochreis truncatis hiſpidis ſetaceo-ciliatis, foliis ovatis acuminatis utrinque tomentoſis. W.

Polygonum ocreatum. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 442. *t.* 49. *f.* 1. *

Perſicaria maderaſpatana longiore folio hirſuto. *Pluk. alm.* 288. *t.* 210. *f.* 7.

β. foliis adultioribus ſcabris, junioribus tantum tomentoſis. W.

Filziger Knöterig. W.

*Habitat in* Zeylona. (v. ſ.)

*Ab affinibus,* foliis *utrinque tomento tenui molli albicante tectis, et eorum forma ovata acuminata diſtinctum. Figurâ Houttuyni optimâ. Spicae ſunt nudae absque floribus. Varietas* 3. *eſt eadem planta ſed,* folia *inferiora utrinque ſcabra, nec albicantia tomentoſa.* W.

*Ochreae hujus ſpeciei ſunt bilis brevibus adpreſſis tectae membranaceae truncatae ſetaceo-ciliatae.* W.

## 18. POLYGONUM *orientale.*

P. floribus heptandris digynis, foliis ovatis, caule erecto, ſtipulis hirtis hypocrateriformibus. *Kniph. cent.* 4. *n.* 62.

Perſicaria florum ſtaminibus ſex pluribusque, ſtylo duplici. *Hort. cliff.* 42. *Hort. upſ.* 96. *Roy. lugdb.* 216.

Perſicaria foliis ovato-lanceolatis acutis, foliis pentandris, caule erecto. *Mill. dict. t.* 201.

Perſicaria orientalis; nicotianae folio, calyce florum purpureo. *Tournef. cor.* 58. *Comm. rar.* 43. *t.* 43.

Schovanna modela mucca. *Rheed. mal.* 12. *p.* 147. *t.* 76.

β. floribus albis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 52.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 447.

Tabacksblättriger Knöterig. W.

*Habitat in* Oriente, India. ⊙ (v. v.)

*Indica longe hirſutior eſt, quam orientalis.*

## 19. POLYGONUM *penſylvanicum.*

P. floribus octandris digynis, pedunculis hiſpidis, foliis lanceolatis, ſtipulis muticis. *Sp. pl.* 519.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 448.

Penſylvaniſcher Knöterig. W.

*Habitat in* Penſylvania. *Kalm.*

Facies *et habitus Pol. Perſicariae, ſed majora ſtrictiora omnia.* Caulis *ramoſus, angulatus.* Folia *lanceolata, acuminata carina ſubtus admodum ſcabra.* Stipulae *truncatae, muticae.* Pedunculi *ſcabri, ſetis rigidiuſculis apice gluten ſecernentibus.* Spicae *ſubracemoſae floſculis pedicellatis.*

**** Polygona *foliis indivisis, floribus octandris.*

20. POLYGONUM *maritimum.*

P. floribus octandris trigynis axillaribus, ochreis bilobis membranaceis, foliis ellipticis obtusis subcarnosis, caule suffruticoso. W.

P. floribus octandris trigynis axillaribus, foliis ovali-lanceolatis sempervirentibus, caule suffrutescente. *Kniph. cent.* II. *n.* 85.

P. maritimum latifolium. *Bauh. pin.* 281.

Polygonum maritimum. *Cam. epit.* 691.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 449.

Meerstrands Knöterig. W.

*Habitat in litoribus* M. mediterranei, Orientis, Virginiae. ♄ (v. s.)

*Affine nimis P. aviculari, ut vix distinguatur, etiam floribus quaternis et caule hinc planiore; sed majora durioraque omnia.* Folia *ovata, coriacea, sempervirentia, exsiccatione coerulescentia.* Caulis *brevior, durus, perennans.*

21. POLYGONUM *aviculare.*

P. floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. *Mat. med.* 105. *Hort. cliff.* 150. *Fl. suec.* 332. 339. *Gron. virg.* 44. *Roy. lugdb.* 215. *Blackw. t.* 315. *Scop. carn. n.* 471. *Pollich. pal. n.* 386. *Hoffm. germ.* 139. *Roth. germ. I.* 174. *II.* 454.

P. floribus subsolitariis, in alis foliorum sessilibus, staminibus octo. *Gmel. sib.* 3. *p.* 40. *n.* 32.

P. procumbens, foliis linearibus acutis, floribus solitariis. *Hall. helv. n.* 1560.

P. latifolium. *Bauh. pin.* 281.

β. P. brevi angustoque folio. *Bauh. pin.* 281.

γ. P. oblongo angusto folio. *Bauh. pin.* 281. *Fl. lapp.* 153. *Tabern.* 833.

δ. angustis foliis, calycibus purpurascentibus. *Dill. app.* 65.

ε. P. erectum humile, foliis orbum. *Dill. app.* 65.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 449.

Vogel Knöterig. W.

*Habitat in* Europae *cultis ruderatis.* ⊙ (v. v.)

Variat *corolla 4-partita cum staminibus septem. Gmel. l. c.* R.

*Possideo specimina ex India orientali, quae forte specie differunt, sed praeter,* folia *breviora,* caulem *ri-*

*gidum*, internodia*que brevissima, nullam video differentiam.* W.

*22. POLYGONUM *Bellardi.*

P. floribus octandris trigynis axillaribus, ochreis ciliatis, foliis lanceolatis acutis, caule erecto. W.

P. (*Bellardi*) erectum, floribus axillaribus octandris trigynis, foliis elliptico-lanceolatis, vaginis ciliatis. *Allion. pedem. n.* 2052. *t.* 90. *f.* 2. *

Bellardischer Knöterig. W.

*Habitat in agro* Pedemontano. ⊙

*23. POLYGONUM *setosum.*

P. floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lineari-subulatis, ochreis membranaceis ciliatis, caule erecto. W.

P. (*setosum*) floribus octandris trigynis? axillaribus, foliis subulato-linearibus, stipulis setaceo-laceris, caulibus subfruticosis. *Iacq. obs. bot.* 3. *p.* 8. *t.* 57. *

P. orientale caryophylli folio, flore magno albo. *Tournef. cor.* 39.

Borstiger Knöterig. W.

*Habitat in* Armenia. 24 (v. s.)

24. POLYGONUM *erectum.*

P. floribus octandris trigynis axillaribus, foliis ovalibus, caule erecto herbaceo. *Sp. pl.* 520.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 451.

Aufrechter Knöterig. W.

*Habitat in* Philadelphia, *enata ex seminibus D. Kalmii.* ⊙

25. POLYGONUM *articulatum.*

P. floribus octandris trigynis, spicis articulatis paniculatis, stipulis vaginalibus truncatis. *Sp. pl.* 520.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 451.

Gegliederter Knöterig. W.

*Habitat in* Canada. *Kalm.* ⊙

Radix *fibrosa, parva.* Caulis *pedalis, ramis superne alternis; subdivisus in paniculam floriferam.* Stipulae *solitariae, vaginales, superne latiores, integrae, truncatae, nec fissae.* Folia *linearia, glabra. Paniculam terminant Spicae filiformes, angustissimae, imbricatae bracteis vaginalibus, turbinatis, truncatis; ex sinu singulo oritur Pedunculus solitarius, capillaris, basi articulatus, coloratus, uniflorus.* Corolla *incar-*

*nata, quinquepartita, fundo laxiore quam in P. avi-cularі, ſtaminibus octo, Piſtillo ſtylis* 3.

26. POLYGONUM *divaricatum.*

P. floribus octandris trigynis racemoſo-paniculatis, foliis lanceolatis laevibus, caule divaricato patulo glabro. W.

P. floribus octandris trigynis racemoſis, foliis lanceolatis, caule divaricato patulo. *Sp. pl.* 520.

Perſicaria montana, foliis longioribus anguſtioribus, floribus racemoſis. *Amm. ruth.* 240.

Helxine foliis lanceolatis, caule diffuſo. *Hort. upſ.* 96.

Fagopyrum orientale ramoſum et multiflorum, perſicariae folio. *Tournef. cor* 39. *Buxb. cent.* 2. *p.* 31. *t.* 31.

Polygonum ſpicis paniculatis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 57. *t.* 11. *f.* 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 452.

Ausgebreiteter Knöterig. W.

*Habitat in* Sibiria. 24 (v. v.)

*A ſequentibus ſatis diſtinctum: foliis planis lanceolatis utrinque et margine glaberrimis,* ochreis *glabris,* caule *divaricato ad geniculos nullo modo piloſo. Planta Gmelini differre videtur venis foliorum prominentibus, eſt forte varietas.* W.

*27. POLYGONUM *alpinum.*

P. floribus octandris trigynis racemoſo-paniculatis, foliis ovato-lanceolatis glabris margine ciliatis, caule ramoſo, geniculis barbatis. W.

Polygonum alpinum. *Allion. pedem. n.* 2049. *t.* 68. *f.* 1.

P. caule erecto, foliis ovato-lanceolatis ſubhirſutis, ſpicis paniculatis. *Hall. helv. n.* 1564.

Perſicaria folio nigricante, floribus albis. *Bocc. muſ.* 2. *t.* 27. *Allion. ſpec. pedem.* 41. *t.* 8.

Perſicaria alpina altera ſaxatilis, foliis durioribus acutis. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 108. *t.* 83.

Alpen Knöterig. W.

*Habitat in alpibus* Helvetiae, Sabaudiae, *inque inſula* Corſica. 24 (v. ſ.)

28. POLYGONUM *undulatum.*

P. floribus octandris trigynis racemoſo-paniculatis, foliis lanceolatis undulatis ſuperne ſcabris, ſubtus pubeſcentibus, caule ramoſo inferne pubeſcente, geniculis ciliatis. W.

P. (*undulatum*) floribus octandris trigynis, foliis lanceolatis acuminatis undulatis. *Murr. comment. goett.*

1774. *p.* 34. *t.* 5. * (*excluſis ſynonymis Bocconi et Allionii.*)

P. (*ſibiricum*) floribus octandris trigynis racemoſis, foliis ovato-lanceolatis undulatis ſcabris, ſtipulis hirtis. *Lin. ſuppl.* 228.

P. ſpicis paniculatis denſe conſtipatis, floribus octandris trigynis, foliorum lanceolatorum vaginis hirſutis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 56. *t.* 10. *

Wellenblättriger Knöterig. W.

*Habitat in ſaxoſis humidiuſculis montium* Sibiriae. 4 (v. ſ.)

*Caute diſtinguendum a praecedente, differt ab hoc:* foliis *parum anguſticribus, undulatis, ſuperne ſcabris, inferne pubeſcentibus*, caule *inferne et infra geniculos pubeſcente.* W.

*29. POLYGONUM *ſericeum.*

P. floribus octandris trigynis racemoſis, foliis ovatis incano-pubeſcentibus, caule decumbente. W.

Polygonum ſericeum. *Pall. it. ed. min.* 3. *p.* 233.

P. foliis ovatis hirſutis, floribus pedunculatis in ſpicis laxiſſimis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 58. *t.* 9. *f.* 2.

Seidenartiger Knöterig. W.

*Habitat in* Sibiria *ad lacum* Baical. 4

30. POLYGONUM *ſerratum.*

P. foliis crenatis. *Sp. pl.* 517. †

P. folio oblongo crenato. *Shaw. afr.* 489.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 452.

Geſägter Knöterig. W.

*Habitat in* Mauritania.

***** Helxine *foliis ſubcordatis.*

*31. POLYGONUM *corymboſum.* W.

P. floribus octandris trigynis, pedunculis glanduloſo-piloſis, foliis oblongo-lanceolatis ſubſeſſilibus, bracteis membranaceis ciliatis. W.

Doldentraubiger Knöterig. W,

*Habitat in* Java. (v. ſ.)

*Accedit ad ſequentem ſpeciem, ſed diverſum:* foliis *oblongo-lanceolatis breviſſime petiolatis*, bracteis *ochreaeformibus membranaceis margine ciliatis minutiſſimis*, pedunculis *communibus medio paucis pilis apice glanduliferis inſtructis.* W.

32. POLYGONUM *chinenſe.*

P. floribus octandris trigynis, pedunculis ſcabris, foliis ovatis petiolatis, bracteis cordatis ſeſſilibus. W.

P. floribus octandris trigynis, pedunculis ſcabris, foliis ovatis, bracteis cordatis. *Sp. pl.* 521. *Burm. ind.* 90. *t.* 30. *f.* 3.

Chineſiſcher Knöterig. W.

*Habitat in* India, China.

Caulis *flexuoſus.* Folia *ovato-cordata, ſ. lato-ovata glabra utrinque.* Pedunculi *hiſpidi, apice ſaepius trifidi.* Flores *capitati.* Stipulae *vaginales, latae, integerrimae nec ciliatae, ovatae.* Flores *in capitulis ſubrotundis, pauci, terminales.*

33. POLYGONUM *ſagittatum.*

P. foliis ſagittatis, caule aculeato. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 65. *t.* 13. *f.* 2. *icon plantae ſylveſtris.*

Helxine caule aculeato, foliis ſagittatis. *Gron. virg.* 44. *Cold. noveb.* 92.

Helxine caule erecto aculeis reflexis exaſperato. *Hort. cliff.* 151. *t.* 12. * *ic. plantae hortenſis. Roy. lugdb.* 211.

Fagotritico ſimilis, anguſtiori folio, convolvuli modo ſcandens, caule ſpinulis deflexis denſius obſito. *Pluk. mant.* 74. *t.* 398. *f.* 5.

Planta poſterior e novo belgio. *Laët. amer.* 73. *t.* 74. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 454.

Pfeilförmiger Knöterig. W.

*Habitat in* Virginiae, Marilandiae *madidis.* ⊙ (v. L.)

Interdum *ſcandit frutices.*

34. POLYGONUM *arifolium.*

P. foliis haſtatis, caule aculeato. *Sp. pl.* 521.

Fagotritico ſimilis ſpinoſa ſcandens, ari folio latiore floridana. *Pluk. amalth.* 87. *t.* 398. *f.* 3.

Planta prior e novo belgio. *Laët. amer.* 73. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 455.

Aronblättriger Knöterig. W.

*Habitat in* Virginia, Florida.

Caulis *ſcandit. Clayt.*

35. POLYGONUM *craſſifolium.*

P. foliis haſtatis, inferioribus ovatis, reliquis lineari-lanceolatis, caule decumbente glabro. W.

P. (*craſſifolium*) floribus octandris trigynis, foliis haſtatis carnoſis. *Murr. comment. goett.* 1774. *p.* 37. *t.* 6. *

Dickblättriger Knöterig. W.
*Habitat in* Sibiria *locis apricis verſus* Ieniſeam.

## 36. POLYGONUM *perfoliatum.*

P. foliis triangularibus, caule aculeato, ſtipulis perfoliato-folioſis patentibus ſubrotundis. *Burm. ind.* 90. *t.* 31. *f.* 2.
Fagotritico ſimilis ſpinoſa minor ſinica. *Pluk. alm.* 87. *t.* 398. *f.* 1. *Burm.*
Truellum. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 401. *t.* 48. *f.* 1?
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 455.
Durchwachſener Knöterig. W.
*Habitat in* India.

Similis *P. ſagittato et arifolio.* Caulis *angulatus aculeis parvis recurvis, ut etiam Petioli.* Stipulae *non vaginantes, ſed patentes, foliaceae, ovatae ſ. ſubrotundae, integerrimae.* Folia *triangularia, baſi parum ſinuata latiora quam longa, interdum peltata.* Pedunculi *ad apicem caulis, pauciflori, aculeati.*

## 37. POLYGONUM *tataricum.*

P. foliis cordato-ſagittatis, caule inermi erecto, ſeminibus ſubdentatis. *Sp. pl.* 521.
Helxine caule erectiuſculo inermi, foliis cordato-ſagittatis, ſeminibus ſubdentatis. *Hort. upſ.* 96.
Helxine caule erecto inermi, foliis cordato-ſagittatis, ſeminum angulis dentatis. *Hort. cliff.* 151.
P. floribus octandris trigynis, ſeminibus triangulis, angulis ſinuatis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 64. *t.* 13. *f.* 1.
Fagopyrum erectum, fructu aſpero. *Amm. ruth.* 168.
Fagopyrum erectum fructu ex calyce eminente ſerrato. *Hall. goett.* 5. R.
Fagotriticum ſibiricum. *Act. Stockh.* 1744. *p.* 117. *t.* 4.
Frumentum Saracenicum. *Act. Nat. Cur.* 3. *p.* 1. R.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 456.
Tatariſcher Knöterig. W.
*Habitat in* Tataria. ⊙ (v. v.)

## *38. POLYGONUM *emarginatum.*

P. foliis cordato-ſagittatis, caule erecto inermi, ſeminibus apice truncatis emarginatis alis cartilagineis. *Roth. catalect. bot.* 1. *p.* 48. *
Ausgerandeter Knöterig. W.
*Habitat in* China. ⊙ (v. v.)

*Simillimum ſequenti, ſed* ſeminibus *abunde diſtinctum.* W.

## 39. POLYGONUM *Fagopyrum.*

P. foliis cordato-ſagittatis, caule erectiuſculo inermi, ſeminum angulis aequalibus. *Mat. med.* 105. *Knorr. del.* 2. *t. F. Hoffm. germ.* 139. *Roth. germ. I.* 174. *II.* 456.

P. caule erecto, foliis ſagittatis, valvulis integerrimis. *Hall. helv. n.* 1563.

Helxine caule erectiuſculo inermi, foliis cordato-ſagittatis, ſeminibus integerrimis. *Hort. upſ.* 96.

Helxine caule erectiuſculo inermi, foliis cordato-ſagittatis. *Hort. cliff.* 151. *Fl. ſuec.* 324, 345. *Roy. lugdb.* 217.

Eryſimum cereale, folio hederaceo. *Bauh. pin.* 27.

Ocymum cereale. *Tabern. hiſt.* 276.

Frumentum Saracenicum. *Matth.* 876.

Fagopyrum. *Dodon. cer. p.* 80.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 457.

Buchweizen Knöterig. W.

*Habitat in* Aſia, *inter ſegetes* Europae *quaſi ſponte.* ⊙ (v. v.)

## 40. POLYGONUM *Convolvulus.*

P. foliis cordatis, caule volubili angulato, floribus obtuſatis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 62. *Pall.* 1. *p.* 39. *Pollich. pal. n.* 387. *Hoffm. germ.* 139. *Flor. dan. t.* 744. *Roth. germ. I.* 174. *II.* 456.

P. caule volubili, foliis ſagittatis. *Hall. helv. n.* 1561.

Helxine caule volubili. *Fl. lapp.* 154. *Fl. ſuec.* 325, 344. *Hort. cliff.* 150. *Gron. virg.* 157. *Roy. lugdb.* 217.

Helxine ſemine triangulo. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 157. R.

Convolvulus minor, ſemine triangulo. *Bauh. pin.* 295.

Volubilis nigra. *Tabern.* 876.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 458.

Windender Knöterig. W.

*Habitat in* Europae *agris.* ⊙ (v. v.)

Caules *angulati.* Racemi *ex alis.* Flores *etiam ad baſin pedunculi communis.* Semina *calyce triquetro tecta.* Antherae *violaceae.*

## 41. POLYGONUM *dumetorum.*

P. foliis cordatis, caule volubili laevi, floribus carinato-alatis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 63. *Willich. illuſtr. n.* 9. *Poll.*

*pal. n.* 388. *Hoffm. germ.* 139. *Flor. dan. t.* 756. *Roth. germ. I.* 174. *II.* 457.

P. caule volubili, foliis sagittatis, valvulis seminalibus alatis. *Hall. helv. n.* 1562.

P. scandens. *Grim. isen. in Nov. Act. A. N. C. tom.* 3. *p.* 308.

Fagopyrum praelongum dumetorum, seminibus alatis duplici more dispositis. *Dill. app.* 60.

Fagopyrum scandens altissimum dumetorum, seminibus tribus alis pellucidis. *Rupp. jen.* 99.

Fagopyrum sylvaticum scandens, flore foliaceo. *Pont. anth.* 265.

Fagopyrum majus scandens. *Vaill. paris.* 52.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 459.

Hecken Knöterig. W.

*Habitat in* Europae *australioris sylvis umbrosis.* ⊙ (v. v.)

Folia *cordata lobis baseos rotundatis.* Caulis *non striatus.* Panicula *e racemo composito, alternatim bifario.* Antherae *albae.*

## 42. POLYGONUM *scandens.*

P. foliis cordatis, racemo simplici axillari, caule erecto laevi scandente. W.

P. foliis cordatis, caule erecto scandente. *Sp. pl.* 522.

P. foliis cordatis, caule volubili, floribus carinatis. *Syst. nat.* 1. *p.* 364.

Fagopyrum scandens americanum maximum. *Tournef. inst.* 511.

Fagopyrum scandens, caule rubente, semine nigro. *Gron. virg.* 44. *Cold. noveb.* 93.

Fagotriticum volubile majus virginianum. *Pluk. alm.* 143. *t.* 177. *f.* 7.

Fogopyrum scandens s. Volubilis nigra major, flore et fructu membranaceis compressis. *Sloan. jam.* 46. *hist.* 1. *p.* 138. *t.* 90. *f.* 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 461.

Kletternder Knöterig. W.

*Habitat in* America. 4 (v. s.)

*Obs.* Petiolorum *basis subtus poro perforata in P. scandenti, dumetorum, Convolvulo.*

## *43. POLYGONUM *multiflorum.*

P. foliis cordatis, panicula divaricata axillari, caule erecto angulato scandente. W.

P. (*multiflorum*) foliis cordatis, caule volubili angulato, florum panicula ramosa. *Thunb. jap.* 169. *

Polygonum chinense. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 453. *t.* 49. *f.* 3.

Vielblütiger Knöterig. W.

*Habitat in* Japonia. 4

## 786. COCCOLOBA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 678.

*Cal.* 5-partitus, coloratus. *Cor.* 0. *Bacca* calycina, monosperma.

### 1. COCCOLOBA *uvifera.*

C. foliis cordato-subrotundis nitidis. *Sp. pl.* 523.

C. foliis subrotundis integris nitidis planis, racemis fructuum cernuis. *Jacq. amer.* 112. *t.* 73. *Mill. dict. n.* 1.

Coccolobis foliis crassis orbiculatis sinu aperto. *Brown. jam.* 208.

Polygonum foliis subrotundis, caule arboreo, fructibus baccatis. *Sp. pl.* 1. *p.* 365.

Uvifera foliis subrotundis, amplissimis. *Hort. cliff.* 487.

Uvifera litorea, foliis amplioribus fere orbiculatis crassis americana. *Pluk. alm.* 394. *t.* 236. *f.* 7.

Guajabara racemosa, foliis coriaceis subrotundis. *Plum. ic. t.* 145.

Populus americana rotundifolia. *Bauh. pin.* 430.

Prunus maritima racemosa, folio subrotundo glabro, fructu minore purpureo. *Sloan. jam.* 183. *hist.* 2. *p.* 129. *t.* 220. *f.* 3. *Raj. dendr.* 40. *Catesb. car.* 2. *p.* 96. *t.* 96.

β. C. (*leoganensis*) foliis subrotundis integerrimis nitidis planis, racemis fructuum erectis. *Jacq. amer.* 113. *t.* 178. *f.* 33.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 489.

Gemeine Seetraube. W.

*Habitat in* America. ♄

### *2. COCCOLOBA *australis.*

C. foliis cordato-ovatis acutis, floribus polygamis. *Forst. prod. n.* 176.

Südliche Seetraube. W.

*Habitat in* Nova Zeelandia. ♄

### 3. COCCOLOBA *pubescens.*

C. foliis orbiculatis pubescentibus. *Sp. pl.* 523. *Mill. dict. n.* 2.

C. (*grandifolia*) foliis ſubrotundis integerrimis rugoſis. *Iacq. amer.* 113.
Coccolobis arborea, foliis orbiculatis. *Brown. jam.* 210.
Scortea arbor americana, ampliſſimis foliis averſa parte nervis extantibus. *Pluk. phyt.* 222. *f.* 8.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 1. *p.* 492.
Behaarte Seetraube. W.
*Habitat in* America. ♄
Arbor *praealta.* Lignum *duriſſimum ſub terra lapideſcit. Iacq.*

*4. COCCOLOBA *diverſifolia.*
C. foliis ramuſculorum ovatis, ramorum ovato-cordatis. *Iacq. amer.* 114. *t.* 76. *
Verſchiedenblättrige Seetraube. W.
*Habitat in* Domingo. ♄

*5. COCCOLOBA *flaveſcens.*
C. foliis ellipticis obtuſis mucronatis, baſi cordatis. W.
C. foliis lanceolato-oblongis obtuſis cum acumine. *Iacq. amer.* 114. *t.* 75. *
Gelbliche Seetraube. W.
*Habitat in* Domingo. ♄

6. COCCOLOBA *excoriata.*
C. foliis oblongo-ovatis acutiuſculis baſi cordatis, racemis pendulis. W.
C. foliis ovatis, ramis quaſi excorticatis. *Sp. pl.* 524. *Mill. dict. n.* 4.
Coccolobis montana major arborea, foliis ſubrotundis, cortice laevi. *Brown. jam.* 210.
Guajabara alia racemoſa, foliis oblongis. *Plum. ic.* 146. *f.* 1.
Arbor indica, glycyrrhizae foliis ſubrotundis, floribus in praelongam ſpicam adactis. *Pluk. analth.* 22. *t.* 363. *f.* 4?
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 1. *p.* 494.
Rindenloſe Seetraube. W.
*Habitat in* America. ♄

*7. COCCOLOBA *nivea.*
C. foliis oblongis acuminatis, baſi attenuatis, racemis erectiuſculis. W.
C. (*nivea*) foliis oblongis acuminatis venoſis, ſupra nitidis, racemis erectiuſculis. *Swartz. prod.* 64. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 693. *

C. (*nivea*) foliis ovato-oblongis acutis rugosis. *Iacq. amer.* 115. *t.* 78.
Weifse Seetraube. W.
*Habitat in montosis aridis* Jamaicae. ♄

8. COCCOLOBA *punctata*
C. foliis lanceolato-ovatis. *Mill. dict. n.* 3.
C. (*coronata*) foliis ovali-oblongis acuminatis planis. *Iacq. amer.* 114. *t.* 77.
Coccolobis foliis oblongo-ovatis venosis, uvis minoribus punctatis. *Bromn. jam.* 240.
Uvifera arbor americana, fructu aromatico punctato. *Pluk. alm.* 394. *t.* 257. *f.* 4.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 495.
Punctirte Seetraube. W.
*Habitat in* America. ♄

*9. COCCOLOBA *obtusifolia.*
C. foliis oblongis obtusissimis. *Iacq. amer.* 114. *t.* 74. *
Stumpfblättrige Seetraube. W.
*Habitat in fruticosis et sylvaticis* Carthagenae. ♄ (v. f.)

*10. COCCOLOBA *microstachya.* W.
C. foliis ovatis obtusis glaberrimis, racemis nutantibus. W.
Kleinährige Seetraube. W.
*Habitat in* India *occidentali.* ♄ (v. f.)
Rami *teretes glabri cinerei.* Folia *petiolata alterna ovata obtusa latere exteriore latiora utrinque glabra, fere sesquiuncialia, integerrima.* Racemi *terminales brevissimi nutantes parviflori. Accedit ad C. obtusifoliam sed:* foliis *ovatis et* racemis *multo minoribus nutantibus distincta.* W.

11. COCCOLOBA *emarginata.*
C. foliis coriaceis subrotundis exciso-emarginatis. *Syst. veg.* 314. *Iacq. amer.* 37. *obs.* 1. *p.* 18. *t.* 9.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 496.
Ausgerandete Seetraube. W.
*Habitat in* America *calidiore.* ♄

12. COCCOLOBA *barbadensis.*
C. foliis cordato-ovatis undulatis. *Syst. veg.* 314. *Iacq. amer.* 37. *obs.* 1. *t.* 8. *
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 496.
Barbadensische Seetraube. W.
*Habitat in* Barbados. ♄

13. COCCOLOBA *tenuifolia.*

C. foliis ovatis membranaceis. *Amoen. acad.* 5. *p.* 397.* *Mill. dict. n.* 5.

Coccolobis frutescens, foliis subrotundis, fructu minore trigono. *Brown. jam.* 210. *t. f.* 3.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 497.

Dünnblättrige Seetraube. W.

*Habitat in* Jamaica. ♄

## 787. PAULLINIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 679.

*Cal.* 5-phyllus. *Petala* 4. *Nectar.* 4-phyllum, inaequale. *Capf.* turbinata trigona 3-locularis, loculis monospermis.

1. PAULLINIA *nodosa.* †

P. foliis ternatis, petiolis nudis, foliolo medio obovato. *Iacq. obf.* 3. *p.* 11. *t.* 62 *f.* 3.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 490.

Knotige Paullinie. W.

*Habitat in* America. ♄

2. PAULLINIA *Cururu.*

P. capsulis pyriformibus obtusis, foliis ternatis, foliolis oblongis dentato-serratis subacuminatis, petiolis alatis. *Schumacher Act. Hist. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 121.

P. foliis ternatis, petiolis marginatis. *Iacq. l. c. t.* 61. *f.* 4.

P. foliis ternatis, petiolis marginatis, foliolis cuneiformibus obtusis subdentatis. *Sp. pl.* 2. *p.* 524. *Mill. dict. n.* 3.

P. foliis ternatis, foliolis obtusis vix denticulatis glabris desinentibus in petiolum proprium. *Hort. cliff.* 151.*

Cururu scandens triphylla. *Plum. gen.* 34. *ic.* 111. *f.* 2.

*Houttuyn. Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 490.

Stumpfrüchtige Paullinie. W.

*Habitat in* America *calidiore.* ♄

3. PAULLINIA *carthaginensis.* †

P. foliis biternatis, petiolis omnibus marginatis, caule inermi. *Iacq. obf.* 3. *t.* 62. *f.* 6.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 491.

Carthaginensische Paullinie. W.

*Habitat* Carthagenae. ♄

4. PAULLINIA *caribaea.* †

P. foliis biternatis, petiolulis omnibus marginatis, ramis aculeatis. *Iacq. l. c. t.* 62. *f.* 7.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 491.
Caribaeiſche Paullinie. W.
*Habitat in* Caribaeis. ♄

5. PAULLINIA *curaſſavica.*

P. valvulis capſularum ſemiobcordatis, foliis biternatis, foliolis crenatis ovalibus imparibus ovato-cuneatis, petiolo intermedio marginato. *Schumacher Act. Hiſt. Nat. Haf.* 3 *p.* 2. *p.* 123. *t.* 11. *f.* 2.

P. foliis biternatis, petiolulis omnibus marginatis, ramis inermibus. *Iacq. l. c. t.* 61. *f.* 8. *Swartz. obſ.* 151.

P. foliis biternatis, foliolis ovatis ſublinuatis. *Spec. pl.* 2. *p.* 525.

P. foliis decompoſitis ternatis, caule inermi. *Hort. cliff.* 152. *

P. ſarmentoſa, foliis ternato-ternatis ad apices crenatis, infimis minoribus, quandoque tantum auritis. *Brown. jam.* 212.

Cururu ſcandens enneaphylla, fructu racemoſo rubro. *Plum. gen.* 34. *ic.* 111. *f.* 1.

Cordis indi folio et facie fruteſcens curaſſavica latifolia. *Pluk. alm.* 120. *t.* 168. *f.* 6.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 491.
Curaſſaviſche Paullinie. W.
*Habitat in* Curaſſao. ♄

Caulis *ſulcatus, angulis villoſis ferrugineis, ſulcis apicem verſus ferrugineo-punctatis.* Schumacher l. c.

6. PAULLINIA *barbadenſis.*

P. valvulis capſularum ſemiovatis villoſiuſculis, foliis biternatis, foliolis ovalibus integerrimis ſerratisque coriaceis, petiolis ſubmarginatis. *Schumacher Act. Hiſt. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 123.

P. foliis biternatis, petiolo intermedio marginato, reliquis nudis. *Iacq. l. c. t.* 62. *f.* 9.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 491.
Barbadenſiſche Paullinie. W.
*Habitat in* Barbados. ♄

7. PAULLINIA *polyphylla.*

P. valvulis capſularum ſemiobovatis, foliis ſupradecompoſitis, foliolis ovato-cuneatis, apice crenatis, ſupra gla-

bris subtus petiolisque villosis. *Schumacher. Act. Hist. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 124.

P. foliis triternatis, petiolulis nudis. *Iacq. ibid. t.* 61. *f.* 10. *Fabric. helmst. p.* 235.

P. foliis supradecompositis. *Hort. cliff.* 152. * *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 492.

Vielblättrige Paullinie. W.

*Habitat in* America *calidiore.* ♄

*Cirrhus axillaris*; Flores *paniculati.* Petioli *partiales teretiusculi.*

*8. PAULLINIA *tetragona.*

P. capsulis tricarinatis tricornibus, foliis pinnatis, foliolis ovatis subserratis acutis glabris, petiolis nudis. *Schumacher Act. Hist. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 122.

P. (*tetragona*) foliis pinnatis, foliolis integerrimis, fructu trigono subalato. *Aubl. guj.* 1. *p.* 355.

Vierkantige Paullinie. W.

*Habitat in* Cajenna. ♄

*9. PAULLINIA *Vespertilio.*

P. capsulis alatis, alis horizontalibus, foliis pinnatis, foliolis ovatis apice inciso-serratis, petiolis nudis. *Schumacher. Act. Hist. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 122. *t.* 11. *f.* 1.

P. foliis pinnatis, foliolis ovatis acuminatis incisis, petiolis nudis, capsulis pedicellatis, alis horizontalibus lanceolatis. *Swartz. prod.* 64. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 695. *

Geflügelte Paullinie. W.

*Habitat in insula* St. Christophori Americes. ♄

10. PAULLINIA *pinnata.*

P. capsulis pyriformibus tricornibus, foliis pinnatis, foliolis oblongis obtuse serratis acuminatis, petiolis marginatis. *Schumacher Act. Hist. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 121.

P. foliis pinnatis, petiolis marginatis, foliolis nitidis. *Iacq. l. c. t.* 62. *f.* 12.

P. foliis pinnatis: foliolis incisis, petiolis marginatis. *Hort. cliff.* 152. * *Roy. lugdb.* 464. *Mill. dict. n.* 5.

Cururu scandens pentaphylla. *Plum. gen.* 34.

Clematis pentaphylla, pediculis alatis, fructu racemoso tricocco et coccineo. *Plum. amer.* 76. *t.* 91.

Pisum cordatum non vesicarium. *Sloan jam.* 111.

Cururu-ape. *Marcgr. bras.* 22. *Pis. bras.* 114. *Raj. hist.* 1347.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 492.
Gefiederte Paullinie. W.
*Habitat in* Brasilia, Iamaica, Domingo, *locis siccis arenosis.* ♄ (v. s.)
*Foliola oblongo-ovata, profunde et remote serrata.*
Fructus *ruber.*

11. PAULLINIA *tomentosa.*
P. foliis pinnatis, foliolis ovato-rhombeis repandis obtusis tomentosis, petiolis marginatis. *Schumacher Act. Hist. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 121.
P. foliis pinnatis, petiolis marginatis, foliolis tomentosis.
P. foliis pinnatis tomentosis, petiolis infra foliola nudis. *Iacq. amer. p.* 37. *obs.* 1. *p.* 19. *t.* 10. *et obs.* 3. *t.* 61. *f.* 13.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 493.
Filzige Paullinie. W.
*Habitat in* America. ♄
Petioli communes *marginati, sed non inter foliola inferiora.*

*12. PAULLINIA *cauliflora.* †
P. foliis pinnatis, pinnula infima ternata, petiolo ad apicem marginato, basi nudo, floribus corymboso-capitatis axillaribus et terminalibus.
P. foliis pinnatis glabris, pari infimo ternato. *Iacq. ic. rar.* 3 *t* 458. *Collect.* 4. *p.* 176. *
Stammblütige Paullinie. W.
*Habitat in sylvis* Americae *calidioris ad* Caracas. ♄

*13. PAULLINIA *japonica.* †
P. foliis quinato-pinnatis petiolulatis marginatis, caule herbaceo inermi. *Thunb. jap.* 170.
Japanische Paullinie. W.
*Habitat in* Japonia. 4.

Caulis *herbaceus angulatus scandens glaber, crassitie vix calami, inermis.* Folia *alterna petiolata glabra.* Foliola *infima ovata subsessilia inciso-bifida vel trifida, incisuris integris, pollicaria.* Foliola *intermedia ternata petiolulo marginato, pinnis lateralibus ovatis integris vel incisis, intermedia trifida.* Foliolum *ultimum pinnatum petiolulo articulato marginato.* Pinnae *bijugae oblongae inciso-trifidae vel quinquefidae, ultima trifida majori.* Petioli *cauli similes bipollica-*

*res.* Flores *foliis oppositi paniculati.* Pedunculi *longitudine foliorum pedicellis brevissimis.* Thunb. l. c.

14. PAULLINIA *diversifolia.* †

P. foliis supradecompositis, petiolis marginatis: infimis pinnatis, reliquis ternatis. *Iacq. l. c. t.* 62. *f.* 14.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 493.
Verschiedenblättrige Paullinie. W.
*Habitat in* America. ♄

## *788. SERIANA.

*Schumacher Act. Hist. Nat. Haf.*

*Cal.* 5-phyllus. *Petala* 4. *Nectar.* 4-phyllum. *Samarae* 3, longitudinaliter connatae globosae, inferne in alam membranaceam dilatatam.

1. SERIANA *sinuata.*

S. alis capsularum postice dilatatis, foliis ternatis, foliolis ovato-lanceolatis dentato-sinuatis. *Schumacher Act. Hist. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 126. *t.* 12. *f.* 1.
Paullinia (*Seriana*) foliis ternatis, petiolis nudis, foliolis ovato-oblongis. *Sp. pl.* 524. *Iacq. obs.* 3. *p.* 11. *t.* 61. *f.* 2.
Paullinia foliis ternatis, foliolis crenatis, pedunculis cirrhiferis. *Hort. cliff.* 152. *Mill. dict. n.* 4.
Seriana scandens triphylla et racemosa. *Plum. gen.* 34. *ic.* 113. *f.* 2.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 490.
Tiefzähnige Seriane. W.
*Habitat in* America *calidiore.* ♄
Caulis *sulcatus hirsutus;* foliola *coriacea glabra mucronata, basi angustata, per petiolum decurrentia.* Schumacher l. c.

*2. SERIANA *divaricata.*

S. foliis biternatis, foliolis ovatis integerrimis subacutis lucidis petiolatis, petiolis nudis. *Schumacher Act. Hist. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 126. *t.* 12. *f.* 2.
Paullinia (*divaricata*) foliis biternatis, foliolis ovatis acutis subintegris, petiolis nudis, paniculis divaricatis, alis capsularum ovatis. *Swartz. prod.* 64. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 696. *
Weitrispige Seriane. W.

*Habitat in ſylvis* Jamaicae. ♄

Panicula *bicirrhoſa*, alis *capſularum poſtïce pàrum dilatatis et rotundatis.* Schumacher l. c.

*3. SERIANA *caracaſana.*

S. alis capſularum poſtice rotundatis, foliis biternatis, foliolis oblongis utrinque acutis remotiſſime dentatis, petiolis nudis. W.

Paullinia (*caracaſana*) foliis biternatis, petiolis nudis. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 52. *t.* 99. *

Weitzähnige Seriane: W.

*Habitat ad* Caracas. ♄

Folia *glabra*, *foliolis utrinque dentibus breviſſimis tribus vel quatuor notatis.* Panicula *bicirrhoſa racemoſa.* W.

*4. SERIANA *racemoſa.*

S. alis capſularum poſtice dilatatis antice ſubſinuatis, foliis biternatis, foliolis ovatis profunde ſerratis. *Schumacher Act. Hiſt. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 127. *t.* 12. *f.* 3.

Traubenblütige Seriane. W.

*Habitat in* Vera Cruce. ♄

Folia *acuta.* Petioli *ſubnudi.* Panicula *bicirrhoſa.* Schumacher l. c.

*5. SERIANA *ſpectabilis.*

S. capſularum alis poſtice dilatatis, foliis biternatis, foliolis obovatis terminalibus retuſis, petiolis alatis. *Schumacher. Act. Hiſt. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 127. *t.* 12. *f.* 4.

Anſehnliche Seriane. W.

*Habitat in* America. ♄

Racemi *ſubſimplices bicirrhoſi.* Schumacher l. c.

Foliola *integerrima, lateralia acuta, terminale emarginatum.* W.

6. SERIANA *mexicana.* †

S. foliis biternatis, foliolis obovatis integerrimis omnibus emarginatis, petiolis alatis, racemis compoſitis. W.

Paullinia (*mexicana*) foliis biternatis, petiolis marginatis, foliolis ovatis integris. *Sp. pl.* 525. *Schumacher Act. Hiſt. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 124. *t.* 11. *f.* 3.

Paullinia foliis ternato-decompoſitis, caule aculeato. *Hort. cliff.* 152.

Quauhomecatl. *Hern. mex.* 289.

Mexicaniſche Seriane. W.

*Habitat in* Mexico. ♄

*Specimen herbarii Linnæani depinxit Clariſſ. Schumacher, ſed fructibus carebat, hinc dubii generis planta.* W.

*7. SERIANA *anguſtifolia.* W.

S. foliis biternatis, foliolis lineari-lanceolatis integerrimis acutis, petiolis alatis. W.

Paullinia mexicana. *Iacq. obſ.* 3. *p.* 11. *t.* 61. *f.* 5.

Seriana ſcandens enneaphylla et racemoſa. *Plum. gen.* 34. *ic.* 113. *f.* 1.

Schmalblättrige Seriane. W.

*Habitat in* America *calidiore.* ♄

*Perperam conjunxit Linnaeus hanc cum praecedente, a qua diſtinctiſſima videtur:* foliolis *lineari-lanceolatis acutis, nec obovatis emarginatis,* petiolis *articulate alatis,* racemis *ſimplicibus.* W.

*8. SERIANA *lupulina.*

S. alis capſularum ſemiovalibus, foliis biternatis crenatis ſubtus ferrugineis, foliolis terminalibus ſubrhombeis lateralibus ovatis, petiolis ſubalatis. *Schumacher Act. Hiſt. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 127. *t.* 12. *f.* 5.

Hopfenartige Seriane. W.

*Habitat in* America. ♄

Racemi *ſubſimplices longitudine foliorum bicirrhoſi.* Schumacher l. c.

*9. SERIANA *lucida.*

S. alis capſularum ſemiovalibus, foliis biternatis, foliolis ovatis acutis ſerratis petiolis ſubnudis. *Schumacher Act. Hiſt. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 128.

Glänzende Seriane. W.

*Habitat in inſula* St. Crucis. ♄ (v. l.)

Folia *apice lucida.* Flores *racemoſo-paniculati.* Panicula *bicirrhoſa.* Schumacher l. c.

10. SERIANA *triternata.*

S. foliis triternatis, foliolis ovatis obtuſis repandis, petiolis alatis, racemis paniculatis. W.

Paullinia (*triternata*) foliis triternatis, petiolis marginatis. *Mant.* 236. *Iacq. obſ.* 3. *p.* 11. *t.* 62. *f.* 11? *Iacq. amer.* 110. *t.* 180. *f.* 52?

Seriana fruteſcens polyphylla et racemoſa. *Plum. gen.* 34. *ic.* 112.

Cordis-indi folio et facie fruteſcens portoricenſis. *Pluk. alm.* 120. *t.* 168. *f.* 5.

Dreymalgedreyte Scriane. W.
*Habitat in* America. ♄

## 789. CARDIOSPERMUM.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 680.

*Cal.* 4-phyllus. *Pet.* 4. *Nectar.* 4-phyllum, inaequale. *Capſ.* 3, connatae, inflatae.

1. CARDIOSPERMUM *Halicacabum.*

C. caule, petiolis, foliolisque inciſo-dentatis glabris. W.
C. foliis laevibus. *Hort. cliff.* 150. *Hort. upſ.* 97. *Fl. zeyl.* 142. *Roy. lugdb.* 464. *Mill. dict. n.* 2. *Kniph. cent.* 2. *n.* 11.
C. foliis ternato-ternatis acuminatis ſerratis. *Brown. jam.* 213.
Piſum veſicarium, fructu nigro, alba macula notato. *Bauh. pin.* 743. *Sloan. hiſt.* 1. *p.* 238.
Halicacabum. *Rumph. amb.* 6. *p.* 60. *t.* 24. *f.* 2.
Halicacabus peregrinus. *Dod. pempt.* 455.
β. Corindum ampliore folio, fructu maximo. *Tournef. inſt.* 431.
γ. Corindum fructu et folio minori. *Tournef. inſt.* 431. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 461.
Glatter Herzſame. W.
*Habitat in* Indiis. ⊙ (v. v.)

*2. CARDIOSPERMUM *hirſutum.* W.

C. caule petiolisque hirſutis, foliolis dentatis glabris. W.
Behaarter Herzſame. W.
*Habitat in* Guinea. (v. ſ.)

Caulis *quadripedalis et ultra ſcandens, profunde ſulcatus denſe hirſutus.* Folia *alterna petiolata biternata, foliolis ovatis acuminatis uncias duas et dimidiam longis, ſesquiuncíam latis, ſimpliciter et groſſe dentatis, utrinque glabris venoſis; axillis venarum ſubtus pubeſcentibus.* Petiolus *fere triuncialis ſulcatus hirſutus, partialis uncialis vel ſesquiuncialis ſemiteres glaber vel pilis rariſſime obſitus.* Pedicelli *teretes trilineares glabri.* Pedunculi *ſemipedales ſulcati glabri, ut in praecedente.* Flores *praecedentis ſed paulo majores.* Fructum *non vidi.* W.

*Simile C. Halicacabo ſed triplo majus, differt:* caule *et* pedunculis *communibus hirſutis*, foliolis *ovatis ſimpliciter dentatis, nec inciſo-dentatis*, axillis *venarum*

*subtus pubescentibus. A C. Corindo* foliis *acuminatis subtus glabris distinctum.* W.

3. CARDIOSPERMUM *Corindum.*

C. foliis subtus tomentosis. *Sp. pl.* 526.

C. villosum, foliis incisis obtusis, petiolis brevibus. *Mill. dict. n.* 3.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 462.

Brasilianischer Herzsame. W.

*Habitat in* Brasilia. ☉

*Similis C. Halicacabo, sed capsulae et Folia subtus tomentosa. Pedunculi inter cirrhos* 10 *s.* 11 *floribus, a casu fructificationum persistentes, rigidi: Capsulae arctiores.*

*4. CARDIOSPERMUM *grandiflorum.*

C. foliis pubescentibus, capsulis acuminatis maximis. *Swartz. prod.* 64. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 698. *

Grossblütiger Herzsame. W.

*Habitat in fruticetis sepibusque* Jamaicae. ♄

*Distinguitur a C. Corindo:* foliis *magis acuminatis nec basi subcordatis,* floribus *et* fructibus 3 *s.* 4-*plo majoribus,* capsulis *acuminatioribus.* Swartz l. c.

## 790. SAPINDUS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 681.

*Cal.* 4-phyllus. *Pet.* 4. *Caps.* carnosae, connatae, ventricosae.

1. SAPINDUS *Saponaria.*

S. inermis, foliis pinnatis, foliolis lanceolatis, rachi alata. *Ait. Kew.* 2. *p.* 35.

S. foliis impari-pinnatis, caule inermi. *Mat. med. p.* 105. *Mill. dict. n.* 1.

Sapindus. *Hort. cliff.* 152. *Roy. lugdb.* 464.

S. foliis oblongis vix petiolatis per costam ample alatam *Brown. jam.* 206.

Prunifera racemosa, folio alato costa media membranulis utrinque exstantibus donata. *Sloan. jam.* 184. *hist.* 2. *p.* 131.

Nux americana, foliis alatis bifidis. *Comm. hort.* 1. *p.* 183. *t.* 94.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 498.

Gemeiner Seifenbaum. W.

*Habitat in* America *calidiori.* ♄ (v. f. f. a.)

* 2. SAPINDUS *longifolius.*

S. foliis pinnatis, foliolis lanceolatis glabris, unico terminali, rachi simplici. *Vahl. symb.* 3. *p.* 55. *

Langblättriger Seifenbaum. W.

*Habitat in* India *orientali?* ♄

3. SAPINDUS *spinosus.*

S. foliis abrupte pinnatis, caule spinosissimo. *Sp. pl.* 526.

S. fruticosus, caudice et ramis spinosissimis, foliis ovatis pinnatis. *Brown. jam.* 207. *t.* 20. *f.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 501.

Dorniger Seifenbaum. W.

*Habitat in* Jamaica. ♄

4. SAPINDUS *laurifolius.*

S. foliis pinnatis, foliolis ovato-oblongis attenuatis glabris, rachi simplici, petalis margine tomentosis. *Vahl. symb.* 3. *p.* 54. *

S. (*trifoliatus*) foliis ternatis. *Fl. zeyl.* 603.

Poerinsii s. Vercoepoelongi. *Rheed. mal.* 4. *p.* 43. *t.* 19.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 503.

Lorbeerblättriger Seifenbaum. W.

*Habitat in* Malabaria. ♄

* 5. SAPINDUS *emarginatus.*

S. foliis pinnatis, foliolis oblongis emarginatis subtus villosis, rachi simplici, petalis margine tomentosis. *Vahl. symb.* 3. *p.* 54. *

Ausgerandeter Seifenbaum. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄ (v. s.)

* 6. SAPINDUS *rubiginosus.*

S. foliis pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis acutis subtus villosis, rachi simplici, petalis glabris. W.

Sapindus rubiginosa. *Roxb. corom.* 1. *p.* 44. *t.* 62. *

Rostfarbiger Seifenbaum. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄

*Differt a praecedente*: foliis *quinquejugis, longioribus acutis, (nec trijugis emarginatis)*, panicula *e paucis raeemis composita divaricata, nec supradecomposita coarctata*, petalis*que glabris*. W.

* 7. SAPINDUS *tetraphyllus.*

S. foliis pinnatis, foliolis lanceolato-oblongis glabris, rachi simplici, racemis sublimplicibus, petalis glabris. *Vahl. symb.* 3. *p.* 54. *

Vierblättriger Seifenbaum. W.
*Habitat in* India *orientali.* ♄
Racemi *plures ex eodem puncto ſimplices, baſi ramo uno alterove digitales.* Vahl. l. c.

*8. SAPINDUS *rigidus.*
S. foliis pinnatis, foliolis ovato-oblongis, rachi ſimplici, corollis fructibusque glabris. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 55.
S. inermis, foliis pinnatis, foliolis ovato-oblongis, rachi ſimplici. *Ait. Kew.* 2. *p.* 36. *Gaert. ſem.* 1. *p.* 341. *t.* 70. *f.* 3. *Mill. dict.*
Nuciprunifera arbor americana, fructu ſaponario orbiculato monococco nigro. *Pluk. alm.* 255. *t.* 217. *f.* 7.
Eſchenblättriger Seifenbaum. W.
*Habitat in* America. ♄
Racemus *ſupradecompoſitus pedalis, ramis ramulisque patentibus.* Vahl. l. c.

9. SAPINDUS *arboreſcens.* †
S. foliis pinnatis, foliolis ovatis acuminatis glabris, panicula axillari ſimplici. W.
S. fructu parvo rubro. *Aubl. guj.* 1. *p.* 357. *t.* 139. *
Kleinfrüchtiger Seifenbaum. W.
*Habitat in ſylvis* Gujanae. ♄
Folia *trijuga.* W.

*10. SAPINDUS *fruteſcens.* †
S. foliis pinnatis, foliolis alternis lanceolatis acuminatis glabris, panicula axillari ſimplici. W.
S. foliis pinnatis, fructu coccineo. *Aubl. guj.* 1. *p.* 355 *t.* 138. *
Strauchartiger Seifenbaum. W.
*Habitat in ſylvis* Gujanae. ♄
Folia *ſeptemjuga.* W.

## *791. PONAEA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 682.

*Cal.* 5-partitus. *Cor.* 4-petala. *Capſ.* trilocularis trialata; loculis monoſpermis.

*1. PONAEA *ſaponarioides.* W.
Toulicia gujanenſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 359. *t.* 140. *.
Seifenbaumartige Ponäa. W.
*Habitat in interioribus ſylvis* Gujanae. ♄
Arbor *mediocris.* Folia *alterna abrupte pinnata octo-*

*juga, foliolis oblongis acutis ſeſſilibus integerrimis venoſis glabris.* Racemi *paniculati terminales.* W.

# *TETRAGYNIA.*

## *792. VEREA.

*Andrews repoſ. bot.* 21.

*Cal.* 4-phyll. *Cor.* hypocrateriformis 4-fida, tubo ventricoſo. *Squamae nectarif.* 4 ad baſin germinum. *Capſulae* 4 ſuperae 1-loculares polyſpermae.

### *1. VEREA *crenata.*

V. (*crenata*) foliis oppoſitis patentibus, racemis longiſſimis laxis, floribus luteis. *Andrews repoſit. bot. p.* 21. *t.* 21. *

Gekerbte Verea. W.

*Habitat in* Sierra Leone. ♄

Planta *fruticoſa quadripedalis ſucculenta.* Folia *ampla oppoſita oblonga baſi in petiolum attenuata, obtuſa, repanda, groſſe crenata carnoſa avenia.* Racemi *terminales et in axillis foliorum ſub apice caulis, ſimplices.* Corollae *flavae fauce rubicundae.* W.

## 793. PARIS.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 683.

*Cal.* 4-phyllus. *Pet.* 4, anguſtiora. *Bacca* 4-locularis.

### 1. PARIS *quadrifolia.*

P. foliis quaternis. *Fl. lapp.* 155. *Fl. ſuec.* 325, 346. *Hort. cliff.* 153. *Roy. lugdb.* 461. *Hall. helv. n.* 1006. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 176. *Willich. illuſtr. n.* 35. *Scop. carn. n.* 472. *Pollich. pal. n.* 389. *Blackw. t.* 286. *Flor. dan. t.* 139. *Kniph. cent.* 12. *n.* 73. *Hoffm. germ.* 140. *Roth. germ. I.* 175. *II.* 457.

Solanum quadrifolium bacciferum. *Bauh. pin.* 167.

Herba Paris. *Matth.* 1193. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 613. R.

Aconitum ſalutiferum. *Tabern. hiſt.* 720.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 9. *p.* 463.

Vierblättrige Einbeere. W.
*Habitat in* Europae *nemoribus.* 4 (v. v.)
Foliis 3, 4, 5, *etiam* 6 *variat. Haller.*

## 794. ADOXA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 684.

*Cal.* 2-fidus, inferus. *Cor.* 4-f. 5-fida, supera. *Bacca* 4-f. 5-locularis, calyce coalita.

### 1. ADOXA *Moschatellina.*

Adoxa. *Hort. cliff.* 152. *Fl. suec.* 326, 347. *Roy. lugdb.* 252. *Oed. dan. t.* 9. *Gunn. norv. n.* 616. *Pollich. pal. n.* 390. *Kniph. cent.* 8. *n.* 3. *Sabb. hort.* 2. *t.* 69. *Hoffm. germ.* 140. *Roth. germ. I.* 176. *II.* 459.
Moschatellina. *Hall. helv. n.* 1005.
Moschatella. *Cord. hist.* 172.
Ranunculus nemorosus Moschatellina dictus. *Bauh. pin.* 178.
Fumaria bulbosa s. tuberosa minima. *Tabern. ic.* 39.
Minimus Ranunculus septentrionalium, herbide muscoso flore. *Lob.* 674.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 465.
Gemeines Bisamkraut. W.
*Habitat in* Europae *nemoribus.* 4 (v. v.)
*Huc relata secundum florem terminalem ex principiis Phil. bot.* 178.

## 795. ELATINE.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 685.

*Cal.* 4-phyllus. *Pet.* 4. *Capf.* 4-locularis, 4-valvis, depressa.

### 1. ELATINE *Hydropiper.*

E. foliis oppositis. *Fl. lapp.* 156. *Fl. suec.* 327, 348. *Gron. virg.* 158. *Roy. lugdb.* 452. *Flor. dan. t.* 156. *Roth. germ. I.* 175. *II.* 458.
E. foliis conjugatis. *Hall. helv. n.* 858.
*α.* E. (*Hydropiper*) foliis oppositis, floribus alternis. *Hoffm. germ.* 140. *Schkuhr bot. Handb. t.* 109.
Hydropiper. *Buxb. cent.* 3. *p.* 35. *t.* 37. *f.* 3.
Alsinastrum serpillifolium, flore albo tetrapetalo. *Vaill. paris.* 5. *t.* 2. *f.* 2.

β. E. (*triandra*) foliis et floribus oppositis. *Hoffm. germ.* 140. *Schkuhr bot. Handb. t.* 109.
Alsinastrum serpillifolium, flore roseo tripetalo. *Vaill. paris.* 5. *t.* 2. *f.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 467.
Paarblättriger Wasserpfeffer. W.
*Habitat in* Europae *inundatis.* ☉ (v. s.)

2. ELATINE *Alsinastrum.*

E. foliis verticillatis. *Fl. suec.* 2. *n.* 349. *Roy. lugdb.* 452. *Sauv. monsp.* 164. *Boehm. lipsi.* 127. *Hall. helv. n.* 857. *Roth. germ. I.* 176. *II.* 458.
E. foliis emersis linearibus, immersis capillaceis. *Sauv. act. monsp.* 1743. *p.* 50.
Potamopitys. *Buxb. act. petrop. t.* 1. *f.* 6.
Ericoides facie pinastellae. *Rupp. jen.* 90. * *Buxb. hall. p.* 105.
Equisetum palustre, linariae scopariae folio. *Bauh. pin.* 15.
Alsinastrum galii folio. *Vaill. paris.* 6. *t.* 1. *f.* 6.
Alsinastrum gratiolae folio. *Tournef. inst.* 244. *Raj. suppl.* 502.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 468.
Wirtelblättriger Wasserpfeffer. W.
*Habitat* Aboae, Lipsiae, Parisiis, Monspelii, *in* Helvetia *in fossis.* (v. s.)

## 796. HALORAGIS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 686.

*Cal.* 4-phyllus superus. *Pet.* 4. *Drupa* sicca.
*Nux* 4-locularis.

1. HALORAGIS *Cercodia.*

H. foliis serratis floribus verticillatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 37. *Medicus obs. bot.* 1783. *p.* 73.
H. (*Tetragonia*) foliis lanceolatis incisis, fructibus tetragonis. *l'Herit. stirp. nov.* 1. *p.* 82.
H. (*alata*) fructu quadrialato. *Jacq. ic. rar.* 1. *t.* 69. *Misc.* 2. *p.* 332. *
H. (*alata*) foliis ovato-lanceolatis, fructibus pyramidatis tetragonis alatis. *Forst. prod. n.* 180.
Cercodia erecta. *Murray comment. goett.* 1780. *p.* 5. *t.* 1. *

Tetragonia (*ivaefolia*) erecta glabra, foliis petiolatis ovato-lanceolatis ferratis, petalis deciduis. *Lin. suppl.* 257.
Sägeblättriges Meerträublein. W.
*Habitat in* Nova Zeelandia. ♄ (v.v.)

Suffrutex *bipedalis ramosus paniculatus erectus.* Caulis *tetragonus, angulis elevatis rotundatis scabris, ruber.* Rami *oppositi.* Folia *opposita petiolata horizontalia ovato-lanceolata inaequaliter serrata, serraturis pungentibus scabra plana venosa pollicaria.* Petioli *foliis triplo breviores semiteretes canaliculati.* Stipulae *nullae.* Flores *in summitate ramorum axillares terni pedunculati parvi viridi-rubicundi.* Pedunculi *breves teretes scabri, post floreſcentiam reflectuntur infra folia.*

2. HALORAGIS *prostrata.*
H. foliis integerrimis, floribus solitariis axillaribus. W.
H. (*prostrata*) foliis oblongis integerrimis mucronatis, fructibus globosis. *Forst. prod. n.* 179.
H. (*prostrata*) foliis lanceolatis integris, fructibus globosis. *l'Herit. stirp. nov.* 1. *p.* 82.
Haloragis prostrata. *Lin. suppl.* 229.
Liegendes Meerträublein. W.
*Habitat in* Botanices *insula*, *in* Nova Caledonia, *inque* Pinorum *insula.* ♄

Rami *tetragoni glabri.* Folia *opposita, sessilia oblonga, basi attenuata in insertionem, undulata glabra.* Fructus *globosi axillares solitarii pedicellati. Primo habitu fructu maturo referebat Ammanniam latifoliam ut fere jurassem illam.*

## 797. FORSKOLEA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 678.

*Cal.* 4-phyllus corolla longior. *Pet.* 3, spathulata. *Pericarp.* nullum. *Sem.* 4 lana connexa.

1. FORSKOLEA *tenacissima.*
F. pilosо-hispida, foliis ellipticis mnticis laciniis calycinis oblongo-lanceolatis acutis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 121.
F. foliis ovatis serratis. *Lin. suppl.* 245.
Forskoelea tenacissima. *Mant.* 72. *Lin. fasc.* 1. *t.* 1. *Iacq hort.* 1. *p.* 18. *t.* 48. *Giseckе ic. fasc.* 1. *n.* 10.

Caidbeja adhaerens. *Forſk. deſcr.* 82.
Chamaedrifolia tomentoſa muſcatenſis. *Pluk. alm.* 97. *t.* 275. *f.* 6. *Shaw. afr.* 133.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 689.
Eyförmige Forſkolea. W.
*Habitat in* Aegypto. ⊙ (v. v.)

Caulis *bipedalis paniculatus teres hiſpidus ruber.* Ramis *alternis.* Folia *alterna petiolata ovata lineata ſerrata, ſerraturis* 5 *ſ.* 6, *hiſpida, hiſpiditate ſuperioris paginae hamata.* Petioli *teretes foliis breviores.* Flores *axillares gemini ſeſſiles hirti decidui maturo fructu.*

2. FORSKOLEA *candida.*

F. ſcabra, foliis ellipticis undulatis muticis, laciniis calycinis ovatis obtuſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 122.
F. (*candida*) foliis dentatis. *Lin. ſuppl.* 245.
F. (*candida*) foliis ovatis dentatis. *Thunb. prod.* 77.
F. (*ſcabra*) foliis ovato-lanceolatis dentatis ſcabris ſubtus albidis. *Retz. obſ.* 3. *p.* 31. *
Weiſsblättrige Forſkolea. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

Caulis *ſuffruticoſus laevis ſimilis F. tenaciſſimae.* Folia *ovalia petiolata alterna tribus ſ. quatuor angulis ſ. dentibus utrinque, F. tenaciſſimae multo minora, ſubtus niveo-tomentoſa, ſupra ſcabritie adhaerentia ut in F. tenaciſſima.* Flores *axillares ſeſſiles, ſimiles F. tenaciſſimae ſed minores.* Petala *alba.*

*3. FORSKOLEA *anguſtifolia.*

F. ſtrigoſa, foliis lanceolatis, dentibus ſpinoſo-ſetaceis, laciniis calycinis lanceolato-ſubulatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 122.
F. foliis lanceolatis octodentatis ciliato-ſpinuloſis, ſubtus nudis. *Retz. obſ.* 3. *p.* 31. *
F. foliis lanceolatis dentatis ſinuatis. *Murr. comment. goett.* 1784. *p.* 24. *t.* 2. *
Schmalblättrige Forſkolea. W.
*Habitat in inſula* Teneriffa. ⊙ (v. v.)

*Classis IX.*

# ENNEANDRIA.

## *MONOGYNIA.*

798. LAURUS. *Cal.* o: *Cor.* 6-petala, calycina. *Bacca* 1-sperma. *Nectarii* glandulae bisetae.

800. PANKE. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida. *Capsul.* monosperma.

799. ANACARDIUM. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Stamine* decimo castrato. *Nux* receptaculo carnoso.

801. PLEGORHIZA. *Cal.* o. *Cor.* 1-petala. *Capsul.* 1-locul. 1-sperma.

802. CASSYTA. *Cal.* o. *Cor.* 6-partita, calycina. *Bacca* 1-sperma. *Nectarii* glandulae truncatae.

† *Anacardium stamine decimo castrato. Amyris enneandra. Browniaea enneandra. Gardenia Thunbergia.*

## *TRIGYNIA.*

803. RHEUM. *Cal.* o. *Cor.* 6-fida. *Sem.* 1, *triquetrum.*

## *HEXAGYNIA.*

804. BUTOMUS. *Cal.* o. *Cor.* 6-petala. *Capsul.* 6, polyspermae.

# *MONOGYNIA.*

## 798. LAURUS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 688.

*Cal.* o. *Cor.* calycina, 6-partita. *Nectarium* glandulis tribus, biſetis, germen cingentibus. *Filamenta* interiora glandulifera. *Drupa* 1-ſperma.

### 1. LAURUS *Cinnamomum.*

L. foliis trinerviis ovato-oblongis, nervis verſus apicem evaneſcentibus. *Fl. zeyl.* 145. * *Mat. med. p.* 106. *Mill. dict. n.* 11. *Iacq. amer.* 217. *Blackw. t.* 354.

L. foliis oblongo-ovatis nitidis planis. *Hort. cliff.* 154.

Cinnamomum foliis latis ovatis, frugiferum. *Burm. zeyl.* 62. *t.* 27.

Cinnamomum ſ. Canella zeylanica. *Bauh. pin.* 408.

Caſſia cinnamomea. *Herm. lugdb.* 129. *t.* 655. *Burm. ind.* 91.

ß. Katou-Karva. *Rheed. mal.* 5. *p.* 105. *t.* 53. R. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 1. *p.* 505. *t.* 8. *f. B.*

Zimmt Lorbeer. W.

*Habitat in* Zeylona, *in* America *ad montem* Calebaſſe *Martinicae.* ♄ *Iacq.* (v. ſ.)

*Dioica enneandra.*

### 2. LAURUS *Caſſia.*

L. floribus triplinerviis lanceolatis. *Fl. zeyl.* 146. *Mat. med.* 107.

Cinnamomum perpetuo florens, folio tenuiore acuto. *Burm. zeyl.* 63. *t.* 28.

Laurus Canella. *Mill dict. n.* 12.

Caſſia lignea. *Blackw. t.* 319.

Caſſia malabarica. *Herm. lugdb.* 130.

Caſſia cinnamomea, myrrhae odore, folio trinervi ſubtus caeſio. *Plukn. alm.* 89.

Cinnamomum ſ. Canella malabarica ſ. javanenſis. *Bauh. pin.* 409.

Carna. *Rheed. mal.* 1. *p.* 107. *t.* 59. *Burm. ind.* 91. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 1. *p.* 514.

Caſſien Lorbeer. W.

*Habitat in* Malabaria, Sumatra, Iava. ♄

3. LAURUS *Camphora.*

L. foliis triplinerviis lanceolato-ovatis. *Mat. med. p.* 107. *Mill. dict. n.* 9. *Fabric. helmſt.* 400. *Iacq. Collect.* 4. *p.* 221. *t.* 3. *f.* 2. * *Thunb. jap.* 172. *

L. foliis ovatis utrinque acuminatis trinerviis nitidis, petiolis laxis. *Hort. cliff.* 154.

L. Camphorifera. *Kaempf. amoen.* 770. *t.* 771.

Camphora officinarum. *Bauh. pin.* 500. *Blackw. t.* 347.

Arbor camphorifera japonica. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 16. *ic.* 16. *t.* 2. *Comm. hort.* 1. *p.* 185. *t.* 59.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 517.

Campfer Lorbeer. W.

*Habitat in* Japonia. ♄ (v. f.)

4. LAURUS *Culilaban.* †

L. foliis triplinerviis oppoſitis. *Mant.* 237. *Mat. med. p.* 108.

Cortex caryophylloides. *Rumph. amb.* 2. *p.* 65. *t.* 14.

Coelit Lawan. *E. N. C. dec.* 2. *ann.* 3. *p.* 53.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 521.

Culilaban Lorbeer. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄

Obſ. *Cum ſit prorſus ſingulare, dari in Lauri genere folia oppoſita, mereretur ejus fructificatio acutius examinari. Fide Rumphii receptum genus.*

*5. LAURUS *montana.*

L. foliis triplinerviis ovato-acuminatis perennantibus, floribus racemoſo-paniculatis. *Swartz. prod.* 65. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 700.*

Berg Lorbeer. W.

*Habitat in altis montibus* Jamaicae *auſtralis.* ♄ (v. f.)

*Habitu L. Camphorae ſimillima, ſed folia craſſiora nec glauca.* Swartz l. c.

6. LAURUS *Chloroxylon.*

L. foliis trinerviis ovatis coriaceis: nervis apicem attingentibus. *Sp. pl.* 508.

Chloroxylon foliis ovatis glabris rigidis trinerviis, floribus ſingularibus. *Brown. jam.* 187. *t.* 7. *f.* 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 524.

Grünholziger Lorbeer. W.

*Habitat in* Jamaica. ♄

*7. LAURUS *glauca.*

L. foliis nervoſis lanceolatis perennantibus, ramulis tuberculatis, floribus ſolitariis. *Thunb. jap.* 173. *

Tſons. *Kaempf. amoen.* 770.
Graugrüner Lorbeer. W.
*Habitat in* Japonia. ♄

Folia *lanceolata acuminata, acumine obtuſo, integerrima, margine reflexo, ſupra pallide viridia, ſubtus glauca vel lutea glabra bipollicaria vel ultra.* Flores *in ramulis infra folia ſparſi ſolitarii pedunculati.* Pedunculi *breviſſimi uniflori vel bifidi craſſi cinerei ſemilineam longi.* Drupa *ovata parum attenuata obtuſa coeruleo-atra ſucculenta glabra magnitudine piſi, ſucco coeruleo.* Nux *figura drupae ſtriata ferruginea unilocularis.* Oleum *fructuum expreſſum pro fundendis candelis inſervit.* Thunb. l. c.

*8. LAURUS *pedunculata.*
L. foliis nervoſis oblongis integerrimis, floribus ſolitariis pedunculatis. *Thunb. jap.* 174.
Einblütiger Lorbeer. W.
*Habitat in* Japonia. ♄

Caulis *fruticoſus.* Rami *teretes a caſu foliorum nodoſi cinerei rugoſi glabri.* Folia *oppoſita breviter petiolata oblonga acuminata nervoſa integerrima glabra bipollicaria.* Flores *verſus apicem ramulorum ſparſi pedunculati.* Pedunculi *ſolitarii uniflori longitudine dimidia foliorum.* Thunb. l. c.

*9. LAURUS *cauſtica.* †
L. foliis ovalibus rugoſis perennantibus, floribus quadrifidis. *Molina chil. ed. germ. p.* 151.*
Llithi. *Feuill. peruv.* 3. *p.* 30. *t.* 23.
Aezender Lorbeer. W.
*Habitat in* Chili. ♄

Arbor *venenata.* Folia *reticulato-venoſa.* W.

10. LAURUS *nobilis.*
L. foliis lanceolatis venoſis perennantibus, floribus quadrifidis, dioicis. *Hort. cliff.* 155. *Hort. upſ.* 98. *Mat. med.* 107. *Roy. lugdb.* 98. *Mill. dict. n.* 1. *Scop. carn.* 474. *Blackw. t.* 175. *femina.*
L. foliis ovato-lanceolatis, ramis floriferis folio brevioribus. *Hall. helv. n.* 1602.
L. vulgaris. *Bauh. pin.* 460.
Laurus. *Cam. epit.* 60. *Tournef. inſt.* 597. *Dod. pempt.* 849. *Raj. hiſt.* 2. 1688.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 524.,
Gemeiner Lorbeer. W.

*Habitat in* Italia, Graecia. ♄ (v. v.)

Stamina *numero variant*, flore plano *etiam ludit.* R.

11. LAURUS *indica.*

L. foliis venosis lanceolatis perennantibus planis, ramulis tuberculatis cicatricibus, floribus racemosis. *Hort. cliff.* 154. *Gron. virg.* 159. *Mill. dict. n.* 4. *Fabric helmst. p.* 400. *Wendl. obs. bot. p.* 21. *t.* 3. *f.* 22.*

L. indica. *Pluk. alm.* 210. *t.* 301. *f.* 1. *Ald. farn.* 61.

L. latifolia indica. *Barr. car.* 123. *t.* 877.

Cinnamomum sylvestre americanum. *Seb. thes.* 2. *p.* 90. *t.* 84. *f.* 6.

Laurus indica Aldini. *Raj. hist.* 2. *p.* 1553. R.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 526.

Madera Lorbeer. W.

*Habitat in* Madera. ♄ (v. v.)

*12. LAURUS *foetens.*

L. foliis venosis ellipticis acutis perennantibus, axillis venarum subtus villosis, racemis elongatis compositis paniculaeformibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 39.

Stinkender Lorbeer. W.

*Habitat in insulis* Canariis, *inque* Madera. ♄ (v. f. f. fl.)

13. LAURUS *Persea.*

L. foliis ovatis coriaceis transverse venosis perennantibus, floribus corymbosis. *Iacqu. obs.* 1. *p.* 37. *Swartz obs.* 152.*

L. foliis oblongo-ovatis, fructu obovato, pericarpio butyraceo. *Brown. jam.* 214.

Persea. *Clus. hist.* 1. *p.* 2. *Plum. gen.* 44. *t.* 20. *Mill. dict. n.* 11.

Persea americana. *Bauh. pin.* 441.

Pyro similis fructus in nova hispania, nucleo magno. *Bauh. pin.* 439.

Prunifera arbor fructu maximo pyriformi viridi, pericarpio esculento butyraceo nucleum unicum maximum nullo officulo tectum cingente. *Sloan. jam.* 132. *hist.* 2. *p.* 132. *t.* 222. *f.* 2. *R j. dendr.* 48.

Arbor americana, amplissimis pergamenis foliis superficie nitidissima, fructu pyriformi crustaceo cortice coriaceo. *Pluk. alm.* 39. *t.* 267. *f.* 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 528.

Advagto Lorbeer. W.

*Habitat in* America *calida.* ♄ (v. f. f. fl.)

Stamina *huic* 6. *Miller*; Fructus *gratissimus. Introducta in hortum Farnesii* 1620.

14. LAURUS *Borbonia.*

L. foliis lanceolatis perennantibus, calycibus fructus baccatis. *Hort. cliff.* 154. *Gron. virg.* 46. *Roy. lugdb.* 226. *Fabric. helmst.* 389.

L. foliis lanceolatis perennantibus, marginibus reflexis, transverse venosis, floribus racemosis. *Mill. dict.* 5.

L. carolinienſis, foliis acuminatis, baccis coeruleis, pedicellis longis rubris insidentibus. *Catesb. car.* 1. *p.* 63. *t.* 63. *Seligm. aves. ic.* 60.

*Tournefort Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 532.

Rother Lorbeer. W.

*Habitat in* Carolina, Virginia. ♄ (v. v. I. A.)

Stamina 5; *antheris fuscis.* Germen *globosum.* Stylus *brevis.* Stigma *tuberculatum.* Baccae *purpureae.* Pedunculi *longi rubri. Fabric. helmst.* 389.

Mihi *vero visa:* Cal. 3-*phyllus*, *brevissimus.* Petala 3, *lanceolata.* Stamina 9: *tribus interioribus utrinque glandula ad basin.* Antherae *utroque latere polliniferae et apice bivalves introrsum deorsum. Staminis decimi rudimentum.* Stylus *stigmate crassiusculo.*

*15. LAURUS *martinicensis.* †

L. foliis oblongis acuminatis coriaceis perennantibus planis, racemis paniculatis, pedunculis calycibusque tomentosis. W.

L. foliis oblongis acuminatis venosis planis, racemis paniculatis. *Jacq. Collect.* 2. *p.* 109. *t.* 5 *f.* 2.*

Martiniquer Lorbeer. W.

*Habitat in sylvis* Martinicae. ♄

*Diversa a sequenti, sed ad L. coriaceam accedere videtur.* W.

*16. LAURUS *exaltata.*

L. foliis lanceolato-ovatis subcoriaceis perennantibus planis, floribus racemoso-corymbosis, fructu calyce urceolato glabro semitecto. *Swartz prod.* 65. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 702.*

Heher Lorbeer. W.

*Habitat in sylvis montium* Jamaicae *occidentalis.* ♄

*17. LAURUS *alpigena.*

L. foliis ovatis obtusis convexiusculis coriaceis, subtus venosis glaucescentibus, racemis erectis folio longioribus. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 704.*

Gebirgs Lorbeer. W.

*Habitat in summis montibus* Jamaicae *australis.* ♄

*A caeteris dignoscenda:* foliis *fere minoribus, magis ovatis obtusis subtus glauco-pubescentibus,* racemis *erectis pauciflоris.* Swartz l. c.

*18. LAURUS *triandra.*

L. foliis lanceolato-ovatis acuminatis membranaceis planis, floribus triandris, fructu calyce fere tecto. *Swartz prod.* 65. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 706. *

Dreyfadiger Lorbeer. W.

*Habitat rarius in montibus* Jamaicae *occidentalis.* ♄

*Distinctissima ab omnibus* floribus *triandris et figura fructus.* Flores *numerosi decidunt steriles, antheris tantum praediti absque pistillo.* Swartz l. c.

*19. LAURUS *sanguinea.*

L. foliis lanceolato-ovatis acuminatis, subtus venoso-reticulatis, racemis terminalibus lateralibusve erectis folio brevioribus, calyce turbinato fructum basi cingente. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 707.

Nectandra (*sanguinea*) caule diffuso, foliis alternis lanceolatis, antheris quaternis collateralibus. *Rottb. pl. surin.* 10. *

Blutfarbener Lorbeer. W.

*Habitat* Surinami. ♄

*20. LAURUS *surinamensis.*

L. foliis lanceolato-ovatis acuminatis, ramis patentissimis, racemis filiformibus lateralibus axillaribusve. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 708.

Nectandra (*bijuga*) foliis ovato-lanceolatis acuminatis, racemis filiformibus, floribus polygamis, antheris bijugis. *Rottb. pl. surinam. p.* 10. *

Ocotea gujanensis. *Aubl. guj.* 2. *p.* 781. *t.* 310. *

Porostema. *Schreb. gen. pl. n.* 1226.

Surinamischer Lorbeer. W.

*Habitat in sylvis* Gujanae. ♄

*21. LAURUS *hexandra.*

L. foliis lanceolatis, racemis axillaribus, floribus hexandris. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 708.

Ajovea gujanensis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 311. *t.* 120. *

Douglassia. *Schreb. gen. pl. n.* 1761.

Sechsfädiger Lorbeer. W.

*Habitat in sylvis interioribus* Gujanae. ♄

*22. LAURUS *salicifolia.*

L. foliis lanceolatis acuminatis planis perennantibus co

riaceis, racemis axillaribus folio brevioribus. *Swartz Fl. ind. occid. 2. p. 709.* *
Weidenblättriger Lorbeer. W.
*Habitat in* India *occidentali.* ♄

*23. LAURUS *coriacea.*
L. foliis ovatis acuminatis planis reticulato-venosis subcoriaceis, racemis erectis foliis brevioribus. *Swartz prod.* 65. *Fl. ind. occid. 2. p.* 710. *
Lederartiger Lorbeer. W.
*Habitat in montibus frigidioribus* Jamaicae. ♄

*24. LAURUS *Leucoxylon.*
L. foliis oblongo-lanceolatis planis perennantibus, racemis axillaribus folio brevioribus, calycibus fructiferis pedunculisque incrassatis verrucosis. *Swartz prod.* 65. *Fl. ind. occid. 2. p.* 711. *
L. foliis venosis ovatis, fructu majori, calycibus tumidis, laciniis reflexis. *Brown. jam.* 214?
Weifsholziger Lorbeer. W.
*Habitat in sylvis montium* Jamaicae. ♄ (v. f.)
Calyce *tumido exalbido-verrucoso, haec species valde notabilis.* Swartz l. c.

*25. LAURUS *membranacea.*
L. foliis oblongis acuminatis venosis margine convexis coriaceo-membranaceis, racemis erectis folio brevioribus. *Swartz prod.* 65. *Fl. ind. occid. 2. p.* 713.
Häutiger Lorbeer. W.
*Habitat in montibus excelsis* Jamaicae, Hispaniolae. ♄
*L. Borboniae proxima, diversa tamen:* ramulis *strictioribus*, foliis *minoribus erectis (nec declinatis subpendulis,) chartae instar membranaceis*, racemis *brevioribus minus subdivisis erectis nec diffusis.* Swartz l. c.

*26. LAURUS *patens.*
L. foliis oblongis utrinque acuminatis planis membranaceis, racemis erectis folio longioribus, ramisque patentibus diffusis. *Swartz prod.* 65. *Fl. ind. occid. 2. p.* 715. *
Ausgebreiteter Lorbeer. W.
*Habitat in* Jamaicae *montosis.* ♄
*Differt a praecedente:* foliis *minime nitidis fuscoviridibus*, ramis racemisque *folio longioribus patentibus.* Swarz l. c.

*27. LAURUS *parviflora.*
L. foliis oblongo elliptics acuminatis planis membrana-

ceis, racemis terminalibus axillaribusve folio brevioribus erectis confertis subpaniculatis. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 717. *

Kleinblütiger Lorbeer. W.

*Habitat in montibus* Jamaicae. ♄

*Quoad figuram foliorum et racemorum L. Leucoxylo similima*, flores *vero in hac pedicellis longioribus, laciniis calycinis rotundatis concavis, nec acutis subreflexis.* Fructu *seu figura drupae, quam adhuc ignoramus, magis forte differunt.* Swartz l. c.

*28. LAURUS *pendula.*

L. foliis oblongis apice brevi attenuato venosis membranaceis subtus glaucescentibus, racemis laxis, fructibus pendulis nudis. *Swartz prod.* 65. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 719. *

L. foliis obverse ovatis subtus cinereis, fructibus oblongis sparsis, calycibus deciduis. *Brown. jam.* 214.

Hängender Lorbeer. W.

*Habitat in sylvis montium* Jamaicae *occidentalis.* ♄

*Optime dignoscitur*: racemis *laxis fere deflexis*, fructu *nudo pendulo.* Swartz l. c.

*29. LAURUS *floribunda.* †

L. foliis ovato-lanceolatis planis membranaceis venosis, racemis axillari-terminalibus folio longioribus paniculatis, pedunculis longissimis. *Swartz prod.* 65. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 721. *

Vielblütiger Lorbeer. W.

*Habitat in sylvis montium* Jamaicae *australis.* ♄

*30. LAURUS *lucida.*

L. foliis oblongis serratis, ramulis ternis, floribus axillaribus solitariis subsessilibus. *Thunb. jap.* 174. *

Glänzender Lorbeer. W.

*Habitat in* Japonia. ♄

*31. LAURUS *umbellata.* †

L. foliis ovatis serratis, ramulis umbellatis, floribus racemosis. *Thunb. jap.* 175. *

Doldentraubiger Lorbeer. W.

*Habitat in* Japonia. ♄

32. LAURUS *aestivalis.*

L. foliis venosis oblongis acuminatis annuis, subtus rugosis, ramis supra axillaribus. *Mill. dict. n.* 8.

L. foliis lanceolatis enervibus annuis. *Gron. virg.* 159.
L. foliis enervibus ovatis utrinque acutis. *Gron. virg.* 46.
Cornus foliis salicis laureae acuminatis, floribus albis, fructu sassafras. *Catesb. car.* 2. *p.* 28. *t.* 28?
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 553.
Sommer Lorbeer. W.
*Habitat in* Virginia *ad ripas rivulorum.* ♄

*Pedunculi hujus fructiferi colorati sunt.* Mas 6-*andrus.* Mill.

## 33. LAURUS *Benzoin.*

L. foliis enerviis ovatis utrinque acutis integris annuis. *Hort. cliff.* 154. *Gron. virg.* 46. *Roy. lugdb.* 226. *Fabric. helmst.* 401. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 354. *Mill. dict. n.* 6. *Willd. arb.* 165. *
Laurus aestivalis. *Wangh. amer.* 87.
Arbor virginiana citreae vel limonii folio, Benzoinum fundens. *Comm. hort.* 1. *p.* 189. *t.* 97.
Arbor virginiana, pistaminis folio, baccata Benzoinum redolens. *Pluk. alm.* 42. *t.* 159. *f.* 3. 4.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 534.
Benzoin Lorbeer. W.
*Habitat in* Virginia. ♄ (v. v.)

## 34. LAURUS *Sassafras.*

L. foliis integris trilobisque. *Hort. cliff.* 154. *Mat. med.* 108. *Gron. virg.* 46. *Roy. lugdb.* 227. *Cold. noveb.* 94. *Kalm. it.* 2. *p.* 270. 434. *Mill. dict. n.* 7. *Trew. ehret. t.* 59. 60. *Du Roi. harbk.* 1. *p.* 356. *Blackw. t.* 267. *Giesek. ic. fasc.* 1. *n.* 9.
Cornus mas odorata, folio trifido: margine plano, Sassafras dicta. *Pluk. alm.* 120. *t.* 222. *f.* 6. *Catesb. car.* 1. *p.* 55. *t.* 55. *Seligm. av. ic.* 2. *t.* 10.
Sassafras arbor, ex florida, ficulneo folio. *Bauh. pin.* 431.
β. Cornus mas f. Sassafras laurinis foliis indivisis. *Pluk. amalth.* 66.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 535.
Sassafras Lorbeer. W.
*Habitat in* Virginia, Carolina, Florida. ♄ (v. f.)

Mares 5-*petali*, 8-*andri*; Hermaphroditae 6-*andrae*. *Mill. Du Roi.*

## 799. ANACARDIUM.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 1582.

*Cal.* 5-partitus. *Petala* 5, reflexa. *Antherae* 9, decimo castrato. *Nux* reniformis supra receptaculum carnosum.

### 1. ANACARDIUM *occidentale.*

Anacardium. *Hort. cliff.* 161. *Fl. zeyl.* 165. *Mat. med.* 113. *Hort. upsal.* 102. *Roy. lugdb.* 463. *Brown. jam.* 227. *Mill. dict. Iacq. amer.* 124. *t.* 181. *f.* 35. *Blackw. t.* 369.

Anacardii alia species. *Bauh. pin.* 512.

Pomifera s. potius Prunifera indica, nuce reniformi. *Catesb. car.* 3. *p.* 9. *t.* 9.

Acaiou. *Pis. bras.* 58. *mant.* 193.

Cassuvium. *Rumph. amb.* 1. *p.* 177. *t.* 69.

Caschon. *Mer. surin.* 16. *t.* 16.

Kapa-maua. *Rheed. mal.* 3. *p.* 65. *t.* 54.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 539.

Westindischer Nierenbaum. W.

*Habitat in* Indiis. ♄ (v. s.)

Calyx *supra receptaculum carnosum, pyriforme; infra Germen nucis, dorso affixa. diss. alt. de surinam.* 1776. Filamenta *quidem* 10, *sed unico castrato. E nuce, candelae admota, ignis lusorius Physicis.*

*Est plana polygama dioica.* Filamentum *longius in apertis floribus sterile est, in clausis vero* Antheram *gerit magnam, torosam. Cetera Filamenta* Antheris *minoribus, effoetis, persistentibus gaudent. Rottboell. in Coll. havn.* 2. *p.* 253. R.

## *800. PANKE.

*Molin. chil. ed. germ.* 119.

*Cal.* 4-fidus. *Cor.* campanulata 4-fida. *Caps.* 2-valvis monosperma.

### *1. PANKE *tinctoria.*

P. foliis quinquelobis petiolatis. W.

P. (*tinctoria*) caule erecto racemifero. *Molin. chil. ed. germ.* 120. *

Färber Panke. W.

*Habitat in* Chili *montosis humidis.* 4

Folia *quinqueloba ſerrata quinquenervia papilloſa tomentoſa pulpoſa perſiſtentia.* Petioli *teretes ſemipedales aculeati.* Racemus *terminalis.* Flores *pedunculati plurimi.* Molin. l. c.

* 2. PANKE *ſonchifolia.* W.

P. foliis lyratis amplexicaulibus. W.

Llaupanke ampliſſimo Sonchi folio. *Feull. peruv.* 2. *p.* 44. *t.* 31. *

Gänſedиſtelblättrige Panke. W.

*Habitat in* Chili *locis montoſis.* ♃

Caulis *tripedalis.* Folia *lyrata repanda denticulata utrinque tomentoſa reticulato-venoſa.* Racemus *terminalis ſimpliciſſimus.* W.

*Panke acaulis Molinae ad Gunneram pertinet, ſecundum ſententiam Clariſſimi Juſſieu gen. pl. ed. Uſt. p.* 444. W.

## *801. PLEGORHIZA.

*Molin. chil. ed. germ.* 140.

*Cal.* o. *Cor.* monopetala. *Capſ.* 1-locul. 1-ſperma.

* 1. PLEGÓRHIZA *adſtringens.* W.

Plegorhiza Guajcuru. *Molin. chil. ed. germ.* 140. *

Zuſammenziehende Wundwurzel. W.

*Habitat in* Chili *provinciis borealioribus.* ♄

Caulis *lignoſus.* Folia *radicalia in ceſpitem congeſta petiolata ovalia ſimplicia integra; ramea ſeſſilia ovata.* Flores *terminales pedunculati plurimi.* Corolla *monopetala integra.* Stamina *novem breviſſima.* Antherae *oblongae.* Germen *orbiculatum.* Stylus *cylindricus longitudine ſtaminum.* Stigma *ſimplex.* Capſula *oblonga compreſſiuſcula.* Semen *unicum oblongum ſubcompreſſum.* Mol. l. c.

## 802. CASSYTA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 690.

*Cor.* calycina 6-partita. *Nectarium* glandulis 3, truncatis, germen cingentibus. *Filamenta* interiora glandulifera. *Drupa* 1-ſperma.

1. CASSYTA *filiformis.*

C. filiformis laxa. *Oſb. it.* 243. * *Iacq. amer.* 115. *t.* 97. *Mill. dict.*

Volutella aphylla. *Forſk. deſc.* 84.

Cuſcuta altera ſ. major. *Camell. luz.* 1. *n.* 1. *Pet. gaz.* 77. *t.* 49. *f.* 12.
Cuſcuta baccifera barbadenſium. *Pluk. alm.* 126. *t.* 172. *f.* 2.
Cuſcuta. *Rumph. amb.* 5. *p.* 491. *t.* 184. *f.* 4.
Acatſia-valli. *Rheed. mal.* 7. *p.* 83. *t.* 44. *Raj. ſuppl.* 551. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 469.
Fadenförmige Caſſyte. W.
*Habitat in* India. (v. ſ.)
Herba *Cuſcutae*; Fructificatio *Lauri.*

2. CASSYTA *corniculata.*

C. ramis lignoſis ſpinoſis. *Mant.* 277. *Burm. ind.* 93. *t.* 33. *f.* 1. †
Caſſutha cornea. *Rumph. amb.* 7. *p.* 56. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 471.
Stachliche Caſſyte. W.
*Habitat in* Celebis *montibus inter truncos putridos.* ♄
Rami *pedales, lignoſi, craſſitie digiti.* Spinae *ſolitariae, recurvae.* Folia *ſpinis minora, lanceolato-linearia.* Baccae *ſubſeſſiles.*
*Propoſui hanc, ut autoptae accurate examinent fructificationem. Genus ex Burmanno mutuatum.*

# TRIGYNIA.

## 803. RHEUM.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 692.

*Cal.* o. *Cor.* 6-fida, perſiſtens. *Sem.* 1, triquetrum.

1. RHEUM *Rhaponticum.*

R. foliis obtuſis glabris, venis ſubtus piloſiuſculis, ſinu baſeos dilatato, petiolis ſupra ſulcatis margine rotundatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 41.
R. foliis glabris, petiolis ſubſulcatis. *Mat. med. p.* 109. *Georgi. it.* 1. *p.* 210. *Pall. it.* 1. *p.* 380. *Knorr. del.* 2. *t. R. Sabb. hort.* 1. *t.* 34. *Regn. bot.*
R. foliis glabris. *Hort. upſ.* 98.
Rheum. *Hort. cliff.* 155.
R. foliis cordatis, ſpicis obtuſis. *Mill. dict. n.* 1.
Rhaponticum. *Alp. rhapont. f. t.* 1.

Rhaponticum folio lapathi majoris glabro. *Bauh. pin.* 116. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 472.
Stumpfblättriger Rhabarber. W.
*Habitat in* Thracia, Scythia, Monte Aureo. 24 (v. v.)
*Petioli ſubtus ſulcati, quod non in ſequenti ſpecie.*

2. RHEUM *undulatum.*

R. foliis ſubvilloſis undulatis, ſinu baſeos dilatato, petiolis ſupra planis margine acutis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 41.
R. (*Rhabarbarum*) foliis ſubvilloſis, petiolis aequalibus. *Syſt. veg.* 385. *Pall. it.* 2. *p.* 559. *Regn. bot.*
R. (*undulatum*) foliis ſubvilloſis undulatis, petiolis aequalibus. *Spec. pl.* 551. *Amoen. acad.* 3. *p.* 212. *t.* 4. * *Mill. dict. n.* 2. *Kniph. cent.* 2. *n.* 68.
R. foliis ſubvilloſis. *Hort. upſ.* 98.
Rhabarbarum folio oblongo criſpo undulato, flabellis ſparſis. *Geoffr. mat.* 2. *p.* 125.
Rhabarbarum ſinenſe, folio criſpo, flagellis rarioribus et minoribus. *Amm. herb.* 206.
Rhabarbarum folio longiori hirſuto criſpo, florum thyrſo longiori et tenuiori. *Amm. ruth.* 9.
Acetoſa montana, folio cubitali oblongiore criſpo, floribus in ſubviridi luteolis, *Meſſerſchmidii. Amm. ruth.* 226.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 473. *t.* 50. *f.* 1.
Wellenblättriger Rhabarber. W.
*Habitat in* China, Sibiria. 24 (v. v.)

3. RHEUM *palmatum.*

R. foliis palmatis acuminatis ſcabriuſculis, ſinu baſeos dilatato, petiolis ſupra obſolete ſulcatis margine rotundatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 41.
R. foliis palmatis acuminatis. *Lin. faſc.* 7. *t.* 4. *Act. angl.* 1765. *p.* 292. *t.* 12. *Mat. med.* 109. *Med. in obſ. Soc. oecon. Lut.* 1771. *p.* 324. *Mill. dict. n.* 4. *Blackw. t.* 600. *a. b. Kniph. cent.* 12. *n.* 84. *Mill. illuſtr.*
Rhabarbe. *Brun. orient.* 192. *t.* 73.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 475. *t.* 50. *f.* 2.
Schlizblättriger Rhabarber. W.
*Habitat in* China *ad murum.* 24 (v. v.)
Gemmae *obſcure rubrae.* Folia *ſeminalia ovalia et integra. Medic. l. c.*

4. RHEUM *compactum.*

R. foliis ſublobatis obtuſiſſimis lucidis argute denticulatis glaberrimis. *Sp. p.* 531.

R. foliis cordatis glabris marginibus ſinuatis, ſpicis diviſis nutantibus. *Mill. dict. t.* 218.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 475.
Dickier Rhabarber. W.
*Habitat in* Tataria, China. 4

Folia, *magis quam reliqua, coriacea ſ. compacta:* Lobis *rotundatis, obſoletioribus, crenatis margine cartilagineo acutis denticulis, utrinque glaberrimis, venis robuſtioribus.* Paniculae *rami nutantes.*

5. RHEUM *tataricum.*

R. foliis cordato-ovatis integris planis glaberrimis, petiolis ſemiteretibus angulatis, panicula ſulcata. *Lin. ſuppl.* 229.
Tatariſcher Rhabarber. W.
*Habitat in* Tataria *minori.* 4

Folia *glaberrima plana magna radicalia humo incumbentia.* Petioli *rubri ſemiteretes.* Nervi *foliorum valde dilatati.* Inflorescentia *vix foliis altior.* Racemi *ſulcati.*

6. RHEUM *Ribes.*

R. foliis obtuſiſſimis ſubverſucuioſis, venis ſubtus ſpinuloſis, petiolis ſupra planis margine rotundatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 42.
R. foliis granulatis, petiolis aequalibus. *Gron. orient.* 130. *Mill. dict. n.* 5.
Lapathum orientale, aſpero et verrucoſo folio, Ribes arabibus dictum. *Dill. elth.* 191. *t.* 158. *f.* 192.
Lapathum orientale tomentoſum rotundifolium, Ribes arabum dictum. *Breyn. E. N. C. cent.* 7. *p.* 7.
Lapathum orientale aſperum, folio ſubrotundo, fructu magno purpureo. *Pocock. orient.* 189. *t.* 84.
Ribes arabum. *Raun. it.* 266. 282.
Ribes arabum, foliis petaſitidis. *Bauh. pin.* 455.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 477.
Morgenländiſcher Rhabarber. W.
*Habitat in* Perſia, Libano, Carmelo. 4

Flores *hujus ſpeciei non vidi. Facies ſundet hujus generis eſſe.*

*7. RHEUM *hybridum.*

R. foliis ſupra glabris, ſubtus piloſiuſculis ſublobatis acutis, ſinu baſeos anguſtato, petiolis ſupra obſolete ſulcatis margine rotundatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 42.
R. foliis cordatis acuminatis planis, radicalibus utrinque

bi-vel tridentatis, reliquis repandis. *Murr. Comm. goett.* 1779. *p* 7. *t.* 1 *Comm. goett.* 1774. *p.* 50. *t.* 12.
Baſtard Rhabarber. W.
*Habitat in* Aſia *boreali.* 24 (v. v.)

8. RHEUM *leucorrhizum.*
R. foliis transverſe ovalibus depreſſis, panicula feminifera divaricata, calycis foliolis binis multoties majoribus. *Pall. Nov. Act. petrop.* 1792. *p.* 331.
Weiſswurzliger Rhabarber. W.
*Habitat in* Sibiria *in montoſis deſerti* Songarici. 24
Folia *radicalia communiter tria, diametro 4 ad 5 pollicum, ad terram appreſſa trinervia valde venoſa glabra coriacea, orbiculato-transverſe ovalia, baſi productiuſcula, per oram confertim aſperata denticulis minutiſſimis acutis cartilagineo-rigidis.* Petioli *compreſſi laeves ſolidi ſucculenti.* Caulis *florens ſpithamaeus ſulcatus paniculatus.* Pall. l. c.

# *HEXAGYNIA.*

## 804. BUTOMUS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 695.

*Cal.* 0. *Petala* 6. *Capſ.* 6, polyſpermae.

1. BUTOMUS *umbellatus.*
Butomus. *Fl. lapp.* 159. *Fl. ſuec* 328, 350. *Roy. lugdb.* 45. *Hall. helv. n.* 1186. *Pollich. pal. n.* 391. *Scop. carn. n.* 475. *Fl. dan. t.* 604. *Curt. fl. lond. faſc.* 1. *Kniph. cent.* 7. *n.* 6. *Hoffm. germ.* 141. *Roth. germ. I.* 177. *II.* 460.
Iuncus floridus major. *Bauh. pin.* 112.
Sedo affinis Iuncoidles umbellata paluſtris. *Moriſ. hiſt. 3. p.* 468. *ſ.* 12. *t.* 5. *f.* 1.
Gladiolus aquatilis. *Dod. pempt.* 600.
Iuncus floridus. *Matth.* 1037. *Camer. epit.* 781. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 524.
Iuncus cyperoides floribus paluſtris. *Lob. ic. p.* 86.
Butomus. *Caeſalp.* 553.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 660.
Doldenblütiger Waſſerliſch. W.
*Habitat in* Europae *aquoſis.* 24 (v. v.)

## *Classis X.*

# DECANDRIA.

## *MONOGYNIA.*

### * *Flores polypetali irregulares.*

805. SOPHORA. *Cor.* papilion: Vexillo adſcendente. *Lomentum* moniliforme.

806. PODALYRIA. *Cor.* papilion: Vexillo adſcendente. *Legumen* ventricoſum polyſpermum.

807. PULTENAEA. *Cor.* papilion: Alae vexillo breviores. *Legumen* diſpermum.

808. ANAGYRIS. *Cor.* papilion: Vexillo brevi recto. *Carina* alis longiore.

809. CERCIS. *Cor.* papilion. alis vexilliformibus. *Nect.* gland. ſtyliformis, ſub germine.

810. BAUHINIA. *Cor.* patens, unguiculata, adſcendens. *Petala* lanceolata.

811. HYMENAEA. *Cor.* ſubaequalis. *Legum.* ligno-ſum pulpa farinoſa.

829. MYROXYLON. *Cor.* petalo ſupremo latiore. *Legumen* 1-ſpermum apice dilatatum.

812. PARKINSONIA. *Cor.* petalo infimo reniformi. *Legum.* teres, tortuoſum.

815. CAESALPINIA. *Cor.* petalo infimo pulchriore. *Cal.* laciniae inaequales. *Legum.* compreſſum.

828. TOLUIFERA. *Cor.* petalo infimo majore. *Cal.* campanulatus.

813. CASSIA. *Cor.* inaequalis. *Anth.* roſtratae. *Lomentum* planum.

814. CUBAEA. *Cor.* ſubaequalis, petalis 2 deflexis. *Legumen* coriaceum ventricoſum. *Semina* ſubreniformia.

---

Lomentum *differt a legumine, quod ſeptis transverſis ſit interſtinctum. Legumen dehiſcit longitudinaliter, lomentum vero vel nunquam, vel in articulos transverſales, qui ut in bacca ſic dicta ſicca, clauſi manent.* W.

816. GUILANDINA. *Cor.* subaequal. calyci insidens. *Legum.* rhombeum. *Sem.* ossea.

817. HYPERANTHERA. *Cor.* subaequalis. *Legumen* 3-valve. *Sem.* alata.

837. GAERTNERA. *Cor.* subaequalis. *Cal.* 4-partitus. *Samara* quadrialata.

851. GOMPHIA. *Cor.* subaequalis. *Baccae* plures receptaculo magno insertae.

824. DICTAMNUS. *Cor.* patula. *Filam.* pulveracea. *Capsl.* 5, connexae. *Sem.* arillata.

866. RHODORA. *Cor.* inaequalis tripetala. *Cal.* 5-dentatus. *Capsl.* 5-loculares.

* * *Fl. polypetali aequales.*

820. CYNOMETRA. *Cal.* 4-phyllus: lacin. oppos. major. *Legum.* 1-spermum, carnosum.

831. PROSOPIS. *Cal.* hemisphaericus, 4-dentatus. *Legum.* polyspermum.

818. SCHOTIA. *Cal.* 5-fidus aequalis. *Legum.* compressum polyspermum.

832. CADIA. *Cal.* 5-fidus. *Petala* obcordata. *Legumen* polyspermum.

836. ADENANTHERA. *Antheris* glandula insidens. *Leg.* compressum membranaceum.

830. HAEMATOXYLON. *Pistilli* stigma emarginatum. *Legumen* valvis navicularibus.

839. GILIBERTIA. *Nectar.* tubulosum truncatum. *Antherae* sessiles. *Capsl.* 4-locularis.

840. TRICHILIA. *Nectar.* tubulosum, 5-dentatum. *Capsl.* 3-locularis, 3-valvis. *Sem.* baccata.

841. TURRAEA. *Nectar.* tubulosum, 10-dentatum. *Capsl.* 5-cocca. *Sem.* bina.

845. MELIA. *Nect.* tubulosum, 10-dentatum. *Drupa* Nuce 5-loculari.

842. SANDORICUM. *Nect.* tubulosum, 10-dentatum. *Drupa* nucibus 5.

843. SWIETENIA. *Nect.* tubulosum, 10-dentatum. *Capsl.* lignosa, 5-valvis. *Sem.* imbricata, margine membranaceo.

819. GUAIACUM. *Cal.* laciniae 2 exteriores minores. *Capsl.* carnosa, 3 s. 5-locularis, angulata.

827. RUTA. *Germen* punctis 10 melliferis. *Capsl.* 5-fida, 5-locularis, polyspermia.

848. TRIBULUS. *Piſtilli* ſtylus nullus. *Capſ.* 5, connexae, polyſpermae.

847. FAGONIA. *Cor.* ungues calyci inſertae. *Capſ.* 5-locularis, 10-valvis, 1-ſperma.

846. ZYGOPHYLLUM. *Nect.* ſquamae 10 ſtaminiferae. *Capſ.* 5-locularis, polyſperma.

850. ZWINGERA. *Capſ.* 5, coriaceae non dehiſcentes.

849. QUASSIA. *Capſ.* 5, bivalves, 1-ſpermae, inſertae receptaculo carnoſo.

861. CERATOPETALUM. *Cor.* 5-petala pinnatifida. *Cal.* 5-fidus ſtaminiferus. *Capſ.* 2-locularis.

852. THRYALLIS. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* tricocca.

855. EKEBERGIA. *Cor.* 4-petala. *Bacca* 5-ſperma.

857. SCHOUSBOEA. *Cor.* 5-petala calyci inſerta. *Bacca* infera 5-gona monoſperma.

826. PETALOMA. *Cor.* 5-petala inter calycis lacinias inſerta. *Bacca* 1 locularis.

853. LIMONIA. *Cor.* 5-petala. *Bacca* 3-ſperma.

844. COOKIA. *Cor.* 5-petala. *Pomum* 5-loculare, loculis monoſpermis.

858. HEISTERIA. *Cor.* 5-petala. *Drupa* inſidens calyci colorato grandefacto.

859. QUISQUALIS. *Cor.* 5-petala, calyci inſidens filiformi.

854. MONOTROPA. *Cal.* corollinus, baſi gibbus. *Capſ.* 5-locularis polyſperma.

872. CLETHRA. *Piſtilli* ſtigmata tria. *Capſ.* 3-locul. polyſperma.

873. PYROLA. *Antherae* ſurſum bicornes. *Capſ.* 5-locularis polyſperma.

865. LEDUM. *Cor.* plana, 5-partita. *Capſ.* 5-locul. polyſperma.

855. DIONAEA. *Cal.* 5-phyllus. *Stigma* fimbriatum. *Capſ.* 1-locularis. *Sem.* baſeos capſulae.

833. MURRAYA. *Bacca* 1-ſperma. *Cor.* 5-petala. *Nectarium* margine cingens germen.

834. BERGERA. *Bacca* 2-ſperma. *Cor.* 5-petala. *Stigma* turbinatum.

862. MELASTOMA. *Cor.* calyci inſidens. *Anther.* refractae. *Bacca* 5-locularis, calyce veſtita.

863. MERIANIA. *Cor.* calyci inſidens. *Antherae* refractae. *Capſ.* 5-loculares diſſepimentis contrariis.

856. IUSSIEUA. *Cor.* 4 f. 5-petala. *Capſ.* infera.

† *Rhexiae nonnullae. Conocarpus racemoſa. Combretum decandrum, alternifolium. Iacquinia racemoſa. Amyris decandra. Geranias aliquot. Lythrum cordifolium, ciliatum, Melanium. Griſlea tomentoſa. Anacardium occidentale.*

* * * *Flores monopetali aequales.*

822. PANZERA. *Petalum* unicum laterale. *Cal.* 4-partitus. *Legumen.*

825. NICANDRA. *Cor.* tubuloſa 10-fida. *Cal.* 4-fidus inaequalis. *Bacca* 3-locularis.

823. CODON. *Cor.* campanulata, 10-fida. *Cal.* 10-partitus. *Capſ.* polyſperma.

875. INOCARPUS. *Cor.* tubuloſa, 5-fida. *Cal.* 2-fidus. *Drupa* 1-ſperma.

838. STRIGILIA. *Cor.* 5-fida. *Nectar.* 10-partitum. *Fructus* 6-locularis.

868. ANDROMEDA. *Cor.* campanulata, rotunda. *Capſ.* 5-locularis.

867. RHODODENDRON. *Cor.* infundibulif. *Stam.* declinata. *Capſ.* 5-locularis.

864. KALMIA. *Cor.* limbo ſubtus 5-corniculato. *Capſ.* 5-locularis.

869. EPIGAEA. *Cal.* exterior 3-phyllus; interior 5-phyllus. *Capſ.* 5-locularis.

870. GUALTHERIA. *Cal.* exterior 2-phyllus; interior 5-fidus. *Capſ.* 5-locul. calyce baccato.

871. ARBUTUS. *Cor.* ovata, baſi diaphana. *Bacca* 5-locularis.

874. STYRAX. *Cor.* infundibulif. *Drupa* diſperma.

† *Vaccinia nonnulla. Gardenia Thunbergia.*

* * * * *Fl. apetali ſ. incompleti.*

860. DAIS. *Cor.* 1-petala. *Involuer.* 4-phyllum, multiflorum.

878. AQUILARIA. *Cal.* 5-fidus. *Nectar.* 5-fidum, lobis bifidis. *Capſ.* 2-locularis 2-valvis.

879. AUGEA. *Cal.* 5-partit. *Nect.* 10-dentat. *Capſ.* 10-locul.

876. SAMYDA. *Cal.* 5-partitus. *Nectar.* 10-fidum, cingens germen ſtaminiferum. *Capſ.* baccata unilocularis 4-valvis.

877. CASEARIA. *Cal.* 5-phyllus. *Nect.* 5-phyllum foliolis cum filamentis alternantibus. *Capſ.* baccata 1-locul. 3-valvis.
881. BUCIDA. *Cal.* 5-partitus. *Bacca* 1-ſperma.
821. CRUDIA. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 0. *Samara* orbiculata.
880. COPAIFERA. *Cal.* 0. *Cor.* 4-petala. *Legumen* 1-ſpermum.

† *Stellera Chamaejaſme. Conocarpus racemoſa. Forſkolea.*

## *DIGYNIA.*

890. SCLERANTHUS. *Cor.* 0. *Cal.* 5-fidus, inferus. *Sem.* 2.
885. TRIANTHEMA. *Cor.* 0. *Capſ.* circumſciſſa.
886. CHRYSOSPLENIUM. *Cor.* 0. *Cal.* ſuperus. *Capſ.* 2-locularis, 2-roſtris.
882. ROYENA. *Cor.* 1-petala. *Cal.* ventricoſus. *Capſ.* 4-ſperma, 4-valvis.
883. HYDRANGEA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-fidus, ſuperus. *Capſ.* 2-locul. 2-roſtris, circumſciſſa.
887. SAXIFRAGA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-partitus. *Capſ.* 1-locularis, 2-roſtris.
888. TIARELLA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* corolliferus. *Capſ.* bivalvis: altera majore.
889. MITELLA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* corolliferus. *Capſ.* bivalvis. *Petala* pectinata.
884. CUNONIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* 2-locularis, acuta.
891. GYPSOPHILA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-part. campanulatus. *Capſ.* 1-locul. globoſa.
892. SAPONARIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* tubuloſus, baſi nudus. *Capſ.* 1-locul. oblonga.
893. DIANTHUS. *Cor.* 5-petala. *Cal.* tubuloſus, baſi ſquamoſus. *Capſ.* 1-locul. oblonga.

## *TRIGYNIA.*

900. BRUNNICHIA. *Capſ.* 1-ſperma. *Cor.* 0. *Cal.* 5-fidus
897. ARENARIA. *Capſ.* 1-locul. *Pet.* integra, patentia.
896. STELLARIA. *Capſ.* 1-locul. *Pet.* 2-partita, patentia.

899. DEUTZIA. *Capſ.* 3-locul. 3-roſtrata. *Petala* integra.
894. CUCUBALUS. *Capſ.* 3-locul. *Pet.* bifida, fauce nuda.
895. SILENE. *Capſ.* 3-locul. *Pet.* bifida, fauce coronata.
898. CHERLERIA. *Capſ.* 3-locul. *Nectar.* petaloidea calyce minora.
901. GARIDELLA. *Capſ.* 3, diſtinctae. *Pet.* calycina. *Nectar.* 5, bilabiata.
906. ERYTHROXYLON. *Drupa* 1-ſperma. *Petala* baſi ſquama inſtructa.
902. MALPIGHIA. *Drupa* 3-ſperma. *Pet.* 5, unguiculata. *Cal.* glandulosus.
903. BANISTERIA. *Samarae* 3, unialatae. *Pet.* 5, unguiculata. *Cal.* glandulosus.
904. HIRAEA. *Samarae* 3, alis binis oppoſitis ſ. ala circumdatae. *Pet.* 5, unguiculata. *Cal.* eglandulosus.
905. TRIOPTERIS. *Samarae* 3, tri ſ. quadrialatae. *Pet.* 5, ungulata. *Cal.* glandulosus.

† *Tamarix germanica.*

# *TETRAGYNIA.*

† *Lychnis alpina, quadridentata.*

# *PENTAGYNIA.*

911. CNESTIS. *Capſ.* 5, monoſpermae. *Cor.* 5-petala.
912. COTYLEDON. *Capſ.* 5 ad nectaria. *Cor.* 1-petala.
913. SEDUM. *Capſ.* 5 ad nectaria. *Cor.* 5-petala.
914. PENTHORUM. *Capſ.* 5-loba. *Cor.* petala rariora.
915. BERGIA. *Capſ.* 5-locul. 5-valvis: valvis horizontaliter dehiſcentibus.
908. JONQUETIA. *Capſ.* 1-locul. 5-ſperma. *Pet.* integra. *Cal.* 5-phyllus.
922. SPERGULA. *Capſ.* 1-locul. polyſperma. *Pet.* integra. *Cal.* 5-phyllus.
921. CERASTIUM. *Capſ.* 1-locul. *Pet.* 2-fida. *Cal.* 5-phyllus.
919. AGROSTEMMA. *Capſ.* 1-locul. oblonga. *Cal.* tubuloſus, coriaceus.

920. LYCHNIS. *Capſ.* 3-locul. oblonga. *Cal.* tubuloſus, membranaceus.
918. OXALIS. *Capſ.* 5-locularis, angulata. *Cor.* baſi ſubcohaerens.
910. ROBERGIA. *Drupa* nuce 1-loculari. *Cal.* 1-phyllus.
909. SPONDIAS. *Drupa* nuce 5-loculari. *Cal.* 1-phyllus.
907. AVERRHOA. *Pomum* 5-loculare. *Cal.* 5-phyllus.
917. GRIELUM. *Sem.* 5 diſtincta, mutica. *Cor.* 5-petala. *Styli* nulli.
916. SURIANA. *Sem.* 5 ſubrotunda. *Cor.* 5-petala. *Styli* filiformes, laterales.

† *Adoxa. Coriaria. Geranía. Droſera luſitanica.*

## *DECAGYNIA.*

923. NEURADA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 10-cocca.
924. PHYTOLACCA. *Cal.* 5-phyllus, corollinus. *Cor.* nulla. *Bacca* 10-cocca.

# *MONOGYNIA.*

## 805. SOPHORA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 694.

*Cal.* 5-dentatus, ſuperne gibbus. *Cor.* papilionacea: alis longitudine vexilli. *Lomentum* moniliforme.

* 1. SOPHORA *tetraptera.*

S. foliis pinnatis, foliolis numeroſis (17—19.) lanceolato-oblongis villoſiuſculis, leguminibus membranaceo-quadrangulis, caule arboreo. *Ait. Kew.* 2. *p.* 43.

Sophora tetraptera. *Ioh. Mill. ic. tab.* 1. *Lamarck. illuſt. gen. t.* 325. *f.* 3.

Flügelfrüchtige Sophore. W.

*Habitat in* Nova Zeelandia. ♄ (v. v.)

2. SOPHORA *microphylla.*

S. foliis pinnatis, foliolis numeroſis (33—41.) obovatis villoſiuſculis, leguminibus membranaceo-quadrangulis, caule arboreo. *Ait. Kew.* 2. *p.* 43. *Lamarck illuſt. gen. t.* 325. *f.* 1.

S. (*tetraptera*) foliis pinnatis, foliolis numeroſis obovatis emarginatis, leguminibus tetragonis, angulis membranaceis. *Lin. ſuppl.* 230. *Forſt. prod. n.* 183.

Kleinblättrige Sophore. W.

*Habitat in* Nova Zeelandia. (v. v. f. ſ.)

* 3. SOPHORA *flaveſcens.*

S. foliis pinnatis, foliolis numeroſis oblongis glabris caule herbaceo. *Ait. Kew.* 2. *p.* 43.

Gelbliche Sophore. W.

*Habitat in* Sibiria. 2 (v. ſ.)

*Similis ſequenti ſed tota glabra.* Folia *impari-pinnata, foliolis ſexjugis ovato-lanceolatis obtuſiuſculis.* Calyx *obſolete quinquedentatus.* Fructus *mihi ignotus.* W.

4. SOPHORA *alopecuroides.*

S. foliis pinnatis: foliolis numeroſis oblongis villoſis, caule herbaceo. *Mill. dict. n.* 1. *Kniph. cent.* 10. *n.* 94.

Sophora. *Hort. cliff.* 156.

Ervum orientale alopecuroides perenne, fructu longiſſimo. *Tournef. cor.* 27. *Dill. elth.* 136. *t.* 112. *f.* 136.

Glycyrrhiza ſiliquis nodoſis quaſi articulatis. *Buxb. cent.* 3. *p.* 25. *t.* 46.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 494.
Fuchsſchwanzartige Sophore. W.
*Habitat in* Oriente. ♃ (v. ſ.)

5. SOPHORA *tomentoſa.*

S. foliis pinnatis: foliolis numeroſis ſubrotundis tomentoſis. *Mill. dict. n.* 2.
S. tomentoſa, foliolis ſubrotundis. *Fl. zeyl.* 163.
Indigofera foliis tomentoſis. *Hort. cliff.* 487.
Colutea zeylanica argentea tota. *Herm. lugdb.* 169. *t.* 171. *Raj. hiſt.* 1720.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 495.
Filzige Sophore. W.
*Habitat in* Zeylona. ♄ (v. ſ.)

6. SOPHORA *occidentalis.*

S. foliis pinnatis, foliolis numeroſis ſubrotundis incanis ſubtomentoſis. *Swartz obſ.* 154. *
S. foliis pinnatis: foliolis numeroſis ſubrotundis. *Trew. ehret.* 27. *t.* 59.
Galega fruticoſa, foliis ſubrotundis pinnatis, ſpicis ſimplicibus terminalibus. *Brown. jam.* 289. *t.* 31. *f.* 1.
Corallodendron foliis pſeudo-acaciae ſubtus tomentoſis, flore luteo. *Plum. ſpec.* 21. *ic.* 101.
Arbori coral affinis non ſpinoſa, fraxini folio rotundiore, foliis et ramulis pubeſcentibus. *Sloan. jam.* 144. *hiſt.* 2. *p.* 40. *t.* 107. *f.* 3.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 496.
Weſtindiſche Sophore. W.
*Habitat in* America. ♄ (v. ſ.)

*Differt a Soph. tomentoſa parum admodum. Folia minus tomentoſa, et fere ſubtus tantum ſubtomentoſa. An varietas praecedentis?*

7. SOPHORA *japonica.*

S. foliis pinnatis: foliolis pluribus ovatis glabris, caule arboreo. *Mant.* 68. *Burm. ind.* 93. *Thunb. jap.* 178. * *Willd. arb.* 364. *
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 497.
Japaniſche Sophore. W.
*Habitat in* Japonia. ♄ *Kleinhoff.* (v. v. ſ. fl.)

Arbor *foliis Robiniae Caragannae.* Folia *ſparſa, pinnata: Foliolis ovatis, tenuibus, utrinque laevibus,*

7-11; *inferioribus paulo minoribus.* Racemi *parvi.* Flores *albi, magnitudine Indigoferae.*

8. SOPHORA *heptaphylla.*

S. foliis pinnatis: foliolis septenis glabris. *Mat. med.* 110.

S. glabra, foliolis septenis. *Fl. zeyl.* 164.

Fruticulus sinensis, sennae sylvestris folio angustiore, nodosa siliqua rostro longiore donata. *Pluk. amalth.* 18. *t.* 451. *f.* 10?

Anticholerica. *Rumph. amb.* 4. *p.* 60. *t.* 22.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 498.

Siebenblättrige Sophore. W.

*Habitat in* India. ♄

*9. SOPHORA *monosperma.*

S. foliis impari-pinnatis, pinnis 5-jugis, leguminibus monospermis, caule arboreo. *Swartz prod.* 66. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 722.*

Glycine arboreum, foliis oblongis, seminibus majoribus. *Brown. jam.* 298.

Einsaamige Sophore. W.

*Habitat in* Jamaica *aliisque insulis* Indiae *occidentalis.* ♄

Arbuscula *decempedalis cortice albido, ligno duro.* Rami *ferrugineo-tomentosi.* Folia *pinnata cum impari, foliolis utrinque glabris rigidis.* Paniculae *terminales ramosae.* Corolla *magna coerulea odorata.* Legumen *ovatum villosum lignosum monospermum bivalve.* Semen *unicum sphaericum magnum coccineum, macula nigra notatum, suturae leguminis superiori adfixum.* Swartz. l. c.

## *806. PODALYRIA.

*Virgilia et Podalyria Lamarck ill. gen. t.* 326, 327.

*Cal.* subbilabiatus 5-fidus. *Cor.* papilionacea, alae vexilli longitudine. *Legumen* ventricosum polyspermum.

1. PODALYRIA *capensis.*

P. foliis pinnatis, foliolis lanceolatis mucronatis subtus incanis, leguminibus tomentosis. W.

Sophora (*capensis*) foliis pinnatis: foliolis numerosis lanceolatis subtus tomentosis, caule fruticoso. *Mant.* 67. *Thumb. prod.* 79.

Sophora oroboides. *Berg. cap.* 142.

*Houttuyn Lin. Pfl.* Syſt. 3. *p.* 497.
Capſche Podalyrie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Frutex *tenellus pubeſcens, adultior ſpontaneus nudus facie Amorphae.* Folia *alterna pinnata cum impari:* Foliolis 23 *anguſto lanceolatis aequalibus integerrimis ſupra nitidis, ſubtus ſubtomentoſis.* Racemus *terminalis:* Floribus *albis Crotalariae recurvatis.* Filamenta *quaſi villis intertexta:* Legumen *oblongum compreſſum tomentoſum.* Semina 3-6, *duriſſima.*

*2. PODALYRIA *aurea.*

P. foliis pinnatis, foliolis ellipticis acutiuſculis ſubtus nudiuſculis, leguminibus glabris. W.

Sophora (*aurea*) foliis pinnatis: foliolis numeroſis oblongo-ovalibus, ſupra glaberrimis, caule fruticoſo. *Ait. Kew.* 2. *p.* 44.
Virgilia. *Lamarck. illuſt. gen. t.* 326. *f.* 1.
Robinia (*ſubdecandra*) racemis ſimplicibus, filamentis ſubliberis, foliis impari-pinnatis, caule inermi. *l'Herit. ſtirp. nov.* 1. *p.* 157. *t.* 75. *
Goldfarbene Podalyrie. W.
*Habitat in* Abyſſinia. ♄

*3. PODALYRIA *argentea.* †

P. petiolis ſpineſcentibus diphyllis, foliolis ſericeo-tomentoſis oblongis utrinque acutis. W.

Sophora (*argentea*) petiolis diphyllis ſpineſcentibus, pedunculis racemoſo-multifloris terminalibus. *Pall. Act. petrop.* 1792. *p.* 373. *t.* 8. *
Silberfarbene Podalyrie W.
*Habitat in* Sibiria *in collibus arenoſis deſerti* Songarici *ad fluvium* Bekun. ♄

*Simillima Robiniae Halodendro*, Legumina *plana monoſperma.* Flores *vero adhuc ignoti.* W.

4. PODALYRIA *geniſtoides.*

P. foliis ternatis ſeſſilibus, foliolis linearibus mucronatis, margine revolutis. W.

Sophora (*geniſtoides*) foliis ternatis ſeſſilibus: foliolis linearibus. *Sp. pl.* 534. *Thumb. prod.* 79.
Geniſta africana, foliis galii. *Old. afr.* 31.
β. Sophora *gallioides. Berg. cap.* 141.
Geniſta roſmarini folio, triphyllos. *Pluk. phyt.* 413. *f.* 5.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 499.

Ginſterartige Podalyrie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)
Corollae *carina utrinque cornuta, ut Indigoferae.*

*5. PODALYRIA *ternata.*
P. foliis ſeſſilibus, foliolis lanceolatis ſericeis.
Sophora ternata. *Thunb. prod.* 79.
Gedreyte Podalyrie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

6. PODALYRIA *auſtralis.*
P. foliis ternatis petiolatis, foliolis obovato-lanceolatis obtuſis, ſtipulis lanceolatis acutis petiolo duplo longioribus. W.
Sophora (*auſtralis*) foliis ternatis ſubſeſſilibus glabris, ſtipulis enſiformibus. *Syſt. veg.* 325.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 499.
Südliche Podalyrie. W.
*Habitat in* Carolina. 24 (v. v.)
Caulis *herbaceus, ſaepius decumbens.* Folia *cuneato-oblonga, glabra, viridi-flaveſcentia.* Stipulae *enſiformes, petiolo breviſſimo longiores.*

7. PODALYRIA *tinctoria.*
P. foliis ternatis petiolatis, foliolis ſubrotundo-obovatis obtuſis mucronatis, ſtipulis obſoletis oblongis acutis petiolo multoties brevioribus. W.
Podalyria. *Lamarck. illuſt. gen. t.* 327. *f.* 1.
Sophora (*tinctoria*) foliis ternatis ſubſeſſilibus: foliolis obovatis glabris, ſtipulis minutis. *Sp. pl.* 534. *Mill. dict.* 3.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 500.
Färbende Podalyrie. W.
*Habitat in* Barbados *et* Virginia. 24 (v. ſ.)
Caulis *ramoſiſſimus.* Stipulae *vix ullae.* Folia *breviſſime petiolata, obovata, obtuſa exſiccatione nigra.*
Racemi *craſſitie ſetae equinae, pauciflori.*

8. PODALYRIA *alba.*
P. foliis ternatis petiolatis, foliolis oblongis obtuſis, ſtipulis filiformibus petiolo brevioribus. W.
Sophora (*alba*) foliis ternatis petiolatis, foliis ellipticis glabris, ſtipulis ſubulatis brevibus. *Syſt. veg.* 325.
Crotalaria (*alba*) foliis ternatis lanceolato-ovatis, caule laevi herbaceo, racemo terminali. *Sp. pl.* 2. *p.* 1006. *Hort. cliff.* 499. * *Roy. lugdb.* 375. *Mill. dict. n.* 11.

Anonis caroliniana perennis non ſpinoſa, foliorum marginibus integris, floribus in thyrſo candidis. *Mart. cent.* 44. *t.* 44.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 500.
Weiſse Podalyrie. W.
*Habitat in* Carolina. 4 (v. ſ.)
Caulis *laevis*, *altus*, *atropurpureus*. Folia (*Laburni*) *ternata*, *laevia*, *elliptica*, *mucronata*, *utrinque glabra*, *ſesquipollicaria*, *modice petiolata*. Stipulae *vix ullae*. Filamenta *omnino diſtincta*. Vexillum *corolla brevius*. Racemus *pendulus floribus albis*, *magnitudine Laburni*, *pedalis*.

9. PODALYRIA *lupinoides*.

P. foliis ternatis petiolatis, foliolis elliptico-lanceolatis obtuſis pubeſcentibus, ſtipulis lanceolatis petiolo longioribus. W.
Sophora (*lupinoides*) foliis ternatis petiolatis: foliolis ovalibus piloſis. *Sp. pl.* 534. *Pall. it.* 2. *p.* 676.
S. foliis ternatis, ſpica verticillata. *Amoen. acad.* 2. *p.* 350. *
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 501.
Feigbohnenartige Podalyrie. W.
*Habitat in* Camtſchatca. 4 *G. Demidoff.* (v. ſ.)
Flores *ſubſeſſiles*, *lutei*. Stipulae *enſiformes*, *magnae*.

*10. PODALYRIA *trifoliata*.

P. foliis ternatis petiolatis, foliolis ovatis ſericeis.
Sophora trifoliata. *Thunb. prod.* 79.
Dreyblättrige Podalyrie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

11. PODALYRIA *calyptrata*.

P. foliis ſimplicibus ellipticis ſupra ſcabriuſculis, ſubtus villoſis reticulato-venoſis, pedunculis unifloris, calycibus villoſis baſi calyptra decidua inſtructis. W.
Sophora (*calyptrata*) foliis ſimplicibus ſubovatis pubeſcentibus, pedunculis unifloris, calycibus tomentoſis, florum calyptra decidua. *Retz. obſ.* 1. *p.* 36. *
Sophora (*calyptrata*) foliis ſimplicibus ovatis reticulatis, floribus axillaribus calyptratis. *Thunb. prod.* 79.
Crotalaria foliis ſimplicibus ovatis villoſis, petiolis ſimpliciſſimis, ramis teretibus. *Hort. cliff.* 357. * *Roy. lugdb.* 374. *Seb. muſ.* 2. *t.* 99. *f.* 3. *bona.*
Sophora biflora. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 501. *t.* 24. *f.* 1.

Netzblättrige Podalyrie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

*12. PODALYRIA *biflora.*
P. foliis ſimplicibus ovatis ſubtomentoſis, pedunculis biflo-ris, calycibus baſi intruſis tomentoſis coloratis.
Podalyria. *Lamarck illuſt. gen. t.* 327. *f.* 3.
Sophora biflora. *Retz. obſ.* 1. *p.* 36.*
Zweyblütige Podalyrie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

13. PODALYRIA *myrtillifolia.*
P. foliis ſimplicibus elliptico-obovatis obtuſis cuſpidatis utrinque ſericeis, pedunculis unifloris. W.
Sophora (*myrtillifolia*) foliis ſimplicibus obovatis utrinque ſericeis obtuſis cum acumine, pedunculis unifloris, calycibus baſi intruſis tomentoſis. *Retz. obſ.* 1. *p.* 36.*
Sophora (*rotundifolia*) foliis ſimplicibus obovatis ſericeis, floribus axillaribus, pedunculis longitudine folii. *Thunb. prod.* 79.
Sophora (*biflora*) foliis ſimplicibus obovatis ſubtomentoſis, pedunculis bifloris. *Sp. pl.* 534.
Sophora rotundifolia α. *Berg. cap.* 138.*
Crotalaria arbor africana ſtyracis folio molli incano. *Pluk. alm.* 122. *t.* 185. *f.* 2.
Geniſta arboreſcens africana ſtyracis folio. *Herm. lugdb.* 270. *t.* 271.
Myrto-Geniſta capitis b. ſpei. *Breyn. cent. t.* 29?
Myrtenblättrige Podalyrie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

*14. PODALYRIA *hirſuta.*
P. foliis ſimplicibus hirſutis, ſuperioribus ovatis, inferioribus ſubrotundis, ramis teretibus, laciniis calycinis lanceolatis longitudine alarum.
Sophora hirſuta. *Ait. Kew.* 2. *p.* 46.
Haarige Podalyrie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

*15. PODALYRIA *buxifolia.*
P. foliis ſimplicibus ovalibus, ſupra glabris, ſubtus ſericeis, pedunculis unifloris, calycibus baſi intruſis tomentoſis coloratis.
Podalyria. *Lamarck illuſt. gen. t.* 327. *f.* 4.
Sophora buxifolia. *Retz. obſ.* 1. *p.* 35.*
Sophora (*pedunculata*) foliis ſimplicibus ovatis tomen-

tosis, floribus axillaribus, pedunculis folio longioribus. *Thunb. prod.* 79.

Genista africana frutescens nummulariae hirsuto folio, floribus parvis purpureis. . *Raj. dendr.* 105?

Buchsbaumblättrige Podalyrie. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄ (v. s.)

*Sophoram cordatam Thunbergii ob brevem descriptionem omisi.* W.

## *807. PULTENAEA.

*Smith Nov. Holl.* 1. *p.* 35.

*Cal.* 5-dentatus utrinque appendiculatus. *Cor.* papilionacea, alis vexillo brevioribus. *Legumen* uniloculare dispermum.

### *1. PULTENAEA *stipularis*.

P. foliis linearibus mucronatis subciliatis, floribus terminalibus capitatis. W.

P. (*stipularis*) foliis linearibus mucronatis subciliatis, stipulis solitariis binerviis laceris. *Smith. Nov. Holl.* 1. *p.* 35. *t.* 12. *

Ginsterartige Pultenäa. W.

*Habitat in* Nova Hollandia. ♄

### *2. PULTENAEA *paleacea*.

P. foliis linearibus mucronatis glabris, capitulo terminali, bracteis oblongo-acuminatis dentatis flore longioribus. W.

Spreublütige Pultenäa. W.

*Habitat in* Nova Hollandia. ♄ (v. s.)

### *3. PULTENAEA *linophylla*.

P. foliis linearibus obtusis mucronatis strigosis, capitulis terminalibus paucifloris, bracteis scariosis bifidis calyce multo brevioribus. W.

P. (*linophylla*) sericea, foliis linearibus carinatis, mucrone obtuso reflexo terminatis. *Schrad. et Wendl. sert. hannov. p.* 28. *t.* 18. *

Flachsblättrige Pultenäa. W.

*Habitat in* Nova Hollandia. ♄ (v. s.)

### *4. PULTENAEA *juncea*.

P. foliis filiformibus apice cartilagineo-trifido, racemo terminali, calycibus inappendiculatis, caule exstipulato. W.

Sophora (*juncea*) foliis simplicibus teretibus acuminatis

apice tridentatis, floribus racemosis. *Schrad. et Wendl. sert. hannov. p.* 9. *t.* 3. *

Binsenartige Pultenäa. W.

*Habitat in* Nova Hollandia. ♄ (v. v.)

*5. PULTENAEA *villosa.*

P. foliis oblongis pilosis, floribus solitariis axillaribus, caule villoso. W.

Haarige Pultenäa. W.

*Habitat in* Nova Hollandia. ♄ (v. s.)

*6. PULTENAEA *daphnoides.*

P. foliis obovatis glabris mucronatis, floribus terminalibus capitatis. W.

P. *(daphnoides)* frutex tripedalis, caule erecto sericeo ramoso; foliis alternis cuneiformibus submucronatis subsericeis, floribus papilionaceis terminalibus capitatis, 6-8, involucro sericeo, stipula cava pilosa. *Wendl. obs.* 43.

Seidelbastartige Pultenäa. W.

*Habitat in* Nova Hollandia. ♄ (v. s.)

## 808. ANAGYRIS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 695.

*Vexillum alaeque* carina breviores in corolla papilionacea. *Legumen.*

1. ANAGYRIS *foetida.*

A. foetida. Sp. pl. 534.

Anagyris. *Hasselq. it.* 466. *Clus. hist.* 1. *p.* 93.

A. foliis ovatis, floribus lateralibus. *Mill. dict. n.* 1.

A. floribus lateralibus. *Roy. lugdb.* 371.

A. foetida. *Bauh. pin.* 391.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 503.

Stinkende Anagyris. W.

*Habitat in* Italiae, Siciliae, Hispaniae *montibus*. ♄ (v. s.)

Folia *alterna ternata.* Flores *in ramis terminales subracemosi.* W.

## 809. CERCIS.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 696.

*Cal.* 5-dentatus, inferne gibbus. *Cor.* papilionacea: vexillo sub alis brevi. *Legumen.*

1. CERCIS *Siliquastrum.*

C. foliis orbiculatis cordatis. *Willd. arb.* 58. *

C. foliis cordato-orbiculatis glabris. *Hort. cliff.* 156. *Hort. upſ.* 99. *Roy. lugdb.* 463. *Gron. orient.* 131. *Mill. dict. n.* 1. *Medic. in obſ. Soc. oecon. Lutrenſ. p. a.* 1774. *p.* 167.
Siliqua ſylveſtris rotundifolia. *Bauh. pin.* 402.
Arbor judae. *Dod. pempt.* 786. *Raj. hiſt. p.* 1717.
Siliquaſtrum. *Tournef. inſt.* 646. *t.* 414.
Arbor judaica. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 433.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 549.
Europäiſcher Judasbaum. W.
*Habitat in* Italia, Hiſpania, Narbona, Oriente. ♄ (v. v.)

2. CERCIS *canadenſis.*

C. foliis cordatis acuminatis. *Willd. arb.* 59. *
C. foliis cordatis pubeſcentibus. *Hort. cliff.* 156. *Hort. upſ.* 99. *Roy. lugdb.* 463. *Gron. virg.* 47. *Mill. ic.* 2. *Medic. in obſ. Soc. oecon. Lutr. p. a.* 1774. *p.* 170.
C. foliis cordato acuminatis. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 147.
Siliquaſtrum-canadenſe. *Tournef. inſt.* 647. *Du Ham. arb.* 3.
Ceratia agreſtis virginiana, folio rotundo minore. *Raj. dendr.* 100.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 552.
Canadiſcher Judasbaum. W.
*Habitat in* Virginia. ♄ (v. v.)
Folia *glabra ſunt.* Du Roi *l. c.* R.

## 810. BAUHINIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 697.

*Cal.* 5-fidus, deciduus. *Petala* patula, oblonga, unguiculata: ſuperiore magis diſtante, omnia calyci inſerta. *Legumen.*

1. BAUHINIA *ſcandens.*

B. caule cirrhifero. *Loefl. it.* 218. *Mill. dict. n.* 9.
Clematis indica, folio bifido, flore fructuque carens, arbores tranſcendens. *Raj. ſuppl.* 328.
Folium linguae. *Rumph. amb.* 5. *p.* 1. *t.* 1.
Naga-mu-valli. *Rheed. mal.* 8. *p.* 57. *t.* 29.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 504.
Klimmende Bauhinie. W.
*Habitat in* Malabaria, Amboina, Cumana. ♄
*Sub hac latent ſine dubio binae diſtinctae ſpecies.* W.

*2. BAUHINIA *parviflora.*

B. racemis axillaribus terminalibusque nutantibus, petalis linearibus, lobis foliorum rotundatis glabris. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 55. *

Kleinblütige Bauhinie. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄

*Differt a B. ſcandente*: cirrhis *nullis*, foliis *multo minoribus, lobis rotundatis obtuſiſſimis nec attenuatis.* Vahl. l. c.

*3. BAUHINIA *racemoſa.*

B. floribus triandris extus ſtaminibusque baſi hirſutis, foliis ſubtus ſericeis, lobis rotundatis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 56. *t.* 62. *

B. foliis ſubrotundo-cordatis, lobis ſemiorbiculatis ſubtus tomentoſis, ſtaminibus barbato-plumoſis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 385. *

Traubenblütige Bauhinie. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄

4. BAUHINIA *aculeata.*

B. caule aculeato. *Hort. cliff.* 156. *t.* 14. *Roy. lugdb.* 463. *Loeſl. it.* 219. *Mill. dict. n.* 1. *Iacq. amer.* 119. *t.* 177. *f.* 2.

Bauhinia aculeata, folio rotundo et emarginato. *Plum. gen.* 23. *ic.* 44. *f.* 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 505.

Stachliche Bauhinie. W.

*Habitat in* America *calidiore.* ♄ (v. f. f. A.)

5. BAUHINIA *divaricata.*

B. foliis glabris, lobis divaricatis acutis binerviis, petalis lanceolatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 47.

B. foliis ovatis: lobis divaricatis. *Sp. pl.* 535.

Bauhinia foliis quinquenerviis, laciniis acuminatis remotiſſimis. *Hort. cliff.* 156. *t.* 15. *Roy. lugdb.* 464.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 506.

Ausgebreitete Bauhinie. W.

*Habitat in* America. ♄

*6. BAUHINIA *aurita.*

B. foliis baſi ſubtransverſis, lobis lanceolatis porrectis trinerviis, petalis lanceolatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 48.

Bauhinia divaricata β. *Sp. pl.* 535.

B. foliis ovato-cordatis lobis longiſſimis parallelis. *Mill. ic.* 41. *t.* 61.

Geöhrte Bauhinie. W.
*Habitat in* Jamaica. ♄ (v. f. f. a.)

*7. BAUHINIA *porrecta.*
B. foliis cordatis, lobis porrectis acutis trinerviis, petalis lanceolatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 48.
B. floribus subdecandris, foliis cordatis, lobis porrectis acutis trinerviis, petalis lanceolatis. *Swartz. prod.* 66.
B. floribus diadelphis subdecandris, foliis cordatis, lobis semiovatis acutis subquadrinerviis, petalis lanceolatis. *Iac. hort. Schoenb.* 1. *p.* 52. *t.* 100.
B. non aculeata, folio ampliori et bicorni. *Plum. gen.* 23. *ic.* 44. *f.* 2.
B. foliis bilobis, spicis laxis terminalibus. *Brown. jam.* 286.
Sennae spuriae aut Aspalatho affinis arbor siliquosa, foliis binis. *Sloan. jam.* 150. *hist.* 1. *p.* 51.
Spitzblättrige Bauhinie. ♄
*Habitat in* Jamaica, Hispaniola. (v. f. f. a.)

8. BAUHINIA *ungulata.*
B. foliis ovatis: lobis parallelis. *Sp pl.* 535.
B. foliis ovatis oblongis recta linea bifidis. *Hort. cliff.* 157. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 506.
Klauenförmige Bauhinie. W.
*Habitat in* America. ♄ (v. f. f. a.)

9. BAUHINIA *variegata.*
B. calycibus monophyllis rumpentibus, petalis sessilibus ovatis, foliorum lobis ovatis obtusis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 48.
B. foliis cordatis: lobis coadunatis obtusis. *Mill. dict. n.* 8.
Arbor. f. Thomae f. Assitra. *Zanon. hist.* 26. *t.* 15.
Chovanna-mandaru. *Rheed. mal.* 1. *p.* 157. *t.* 32. *Raj. hist.* 1751. *Burm. ind.* 94.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 554.
Bunte Bauhinie. W.
*Habitat in* Malabariae Maderae *arenosis.* ♄
Corollae *patentes*: Petalis *ovatis, acutis, roseis, luteo purpureoque variegatis.*

*10. BAUHINIA *candida.*
B. foliis cordatis subtus pubescentibus, lobis ovatis obtusis, calycibus superne attenuatis elongatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 49.
Weisse Bauhinie. W.
*Habitat in* India *orientali.* ♄

11. BAUHINIA *purpurea.*

B. floribus triandris, foliorum lobis ovalibus obtusis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 49.

B. foliis subcordatis bipartitis rotundatis subtus tomentosis. *Mill. dict. n.* 6.

Chovanna mandaru. *Rheed. mal.* 1. *p.* 59. *t.* 33. *Raj. hist. p.* 1751.

Mandaru secunda species. *Pluk. alm.* 240. *Burm. ind.* 94. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 556.

Rothe Bauhinie. W.

*Habitat in* Indiae *arenosis.* ♄ (v. s.)

*Flores patentes, purpurascentes: Petalis lanceolatis, distantibus.*

12. BAUHINIA *tomentosa.*

B. foliis cordatis: lobis semiorbiculatis tomentosis. *Mill. dict. n.* 2.

B. foliis cordato-subrotundis: laciniis rotundatis. *Hort. cliff.* 157. *Hort. upsal.* 99. *Fl. zeyl.* 147. *Roy. lugdb.* 464.

B. foliis subrotundis, flore flavescente striato. *Burm. zeyl.* 44. *t.* 18. *Burm. ind.* 94.

Mandaru maderaspatense, foliis firmioribus bisulcis glabritie splendentibus. *Pluk. alm.* 240. *t.* 44. *f.* 6.

Chanschena-pou. *Rheed. mal.* 1. *p.* 63. *t.* 35. *Raj. hist.* 1752.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 2. *p.* 557.

Filzige Bauhinie. W.

*Habitat in* India. ♄

*Corollae campanulatae, albo-flavescentes: Petalis obovatis.*

13. BAUHINIA *acuminata.*

B. foliis ovatis: lobis acuminatis semi-ovatis. *Mill. dict. n.* 3.

B. inermis foliis cordatis semibifidis: laciniis acuminato-ovatis erectis dehiscentibus. *Hort. cliff.* 157. *Fl. zeyl.* 148.

Velutta-mandaru. *Rheed. mal.* 1. *p.* 61. *t.* 34. *Raj. hist.* 1751.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 558.

Zugespitzte Bauhinie. ♄

*Habitat in* India *orientali.* ♄ (v. s. s. a.)

*Corollae campanulatae, albae: Petalis obtusis. Stamina diadelpha in B. hac et B. divaricata, contrario ac in Papilionaceis modo.*

*14. BAUHINIA *gujanenſis.*
B. foliis binatis, foliolis acuminatis, caule cirrhoſo. W.
B. (*gujanenſis*) foliis usque ad petiolum diviſis, foliolis acutis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 386. *
α. B. (*Outimouta*) caule cirrhifero, foliis cordiformibus bipartitis, ſubtus aureis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 375. *t.* 144. *
β. B. (*gujanenſis*) caule cirrhifero, foliis laevibus bipartitis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 377. *t.* 145. *
Gujanaſche Bauhinie. W.
*Habitat in ſylvis* Gujanae. ♄

*15. BAUHINIA *rubeſcens.*
B. foliis binatis, foliolis obtuſis: W.
B. (*rubeſcens*) foliis ad petiolum usque diviſis, foliolis ſemiorbiculatis obtuſis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 386. *
*illuſt. gen. t.* 329. *f.* 2.
Röthliche Bauhinie. W.
*Habitat in* Africa. ♄

## 811. HYMENAEA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 698.

*Cal.* 5-partitus. *Pet.* 5, ſubaequalia. *Stylus* intortus. *Legumen* repletum pulpa farinacea.

1. HYMENAEA *Courbaril.*
H. foliolis coriaceis ſubaveniis baſi inaequalibus, paniculae floribus pedunculatis. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 30.
H. Courbaril. *Sp. pl.* 537. *Gaert. ſem.* 2. *p.* 305. *t.* 145. *f.* 1. *Lamarck illuſt. gen. t.* 330. *f.* 1.
Hymenaea. *Hort. cliff.* 484. *Hort. upſ.* 305. *Mat. med.* 510. *Brown. jam.* 221. *Mill. dict.*
Courbaril bifolia, folio pyramidato. *Plum. gen.* 49.
Ceretia diphyllos anteguana, ricini majoris fructu nigro, ſiliqua grandi incluſo. *Pluk. alm.* 96. *t.* 82. *f.* 3.
Itaiba Braſilienſibus, Arbor ſiliquoſa et gummifera. *Raj. hiſt.* 1760.
Arbor ſiliquoſa ex qua Gummi Elemi. *Bauh. pin.* 404.
Itaiba. *Piſ. braſ.* 123.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 560.
Gemeiner Locuſtbaum. W.
*Habitat in* America *meridionali.* ♄ (v. f. f. ſ.)

*2. HYMENAEA *venoſa.*
H. foliis membranaceis venoſis baſi ſubaequalibus, paniculae floribus ſubſeſſilibus. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 31. *

Adriger Locuſtbaum. W.
*Habitat in* Cajenna. ♄

*Similis H. Courbaril, differt vero:* foliis *triplo longioribus venis numeroſis tenuiſſimis ſubreticulatis, baſi fere aequalibus, nec foliis venis obſcuris latereque interiore ſupra baſin deſinentibus*, calycibus *ſericeis magis nitentibus ſeſſilibus, nec pedunculatis.* Vahl. l. c.

* 3. HYMENAEA *verrucoſa.*
H. foliolis venoſis baſi inaequalibus, panicula flexuoſa divaricata, pedunculis multifloris, legumine verrucoſo. W.
Hymenaea verrucoſa. *Gaert. ſem. 2. p. 306. t. 139. f. 7. Lamarck illuſt. gen. t. 330. f. 2.*
Warziger Locuſtbaum. W.
*Habitat in* Madagaſcar. ♄

*Habitus H. Courbaril, ſed diverſa:* foliis *minoribus*, panicula *divaricata flexuoſa, pedunculis multifloris, floribus pedicellatis, atque* legumine *minore verrucis elevatis ornato.* W.

## 812. PARKINSONIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 699.

*Cal.* 5-fidus. *Pet.* 5, ovata: infimo reniformi. *Stylus* nullus. *Lomentum* moniliforme.

1. PARKINSONIA *aculeata.*
Parkinſonia. *Hort. cliff.* 157. *t.* 13. *Hort. upſ.* 99. *Roy. lugdb.* 465. *Brown. jam.* 222. *Iacq. amer.* 121. *t.* 80.
P. aculeata, foliis minutis uni coſtae adnexis. *Plum. gen.* 25.
P. aculeata, foliis mimoſae uni coſtae affixis. *Walth. hort.* 6. *t.* 13.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 1. *p.* 563. *t.* 8. *f.* 2.
Stachliche Parkinſonie. W.
*Habitat in* America *calidiore.* ♄ (v. ſ.)

## 813. CASSIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 700.

*Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. *Antherae* ſupremae 3, ſteriles; infimae 3, roſtratae. *Lomentum.*

* *Sennae.*

1. CASSIA *diphylla.*
C. foliis conjugatis, ſtipulis cordato-lanceolatis. *Sp. pl.* 537.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 537.
Zweyblättrige Caſſie. W.
*Habitat in* India. ⊙
*Frutex* Caule *tereti.* Folia *conjugata ſ. duo in petiolo brevi, ſemiorbiculata, obtuſa, ſtriata.* Stipulae *cordato-lanceolatae, totos ramos obtegentes.*

2. CASSIA *Abſus.*
C. foliis bijugis obovatis, glandulis duabus ſubulatis inter infima. *Fl. zeyl.* 153.*
Senna quadrifolia, ſiliqua plana hirſuta, flore aureo ſanguineo. *Burm. zeyl.* 212. *t.* 97.
Senna exigua maderaſpatana tetraphylla ſiliquifera glabra, florum pediculis ad exortum foliorum propendentibus. *Pluk. alm.* 341. *t.* 60. *f.* 1.
Loto affinis aegyptiaca. *Bauh. pin.* 332.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 508.
Aegyptiſche Caſſie. W.
*Habitat in* India, Aegypto. ⊙ (v. ſ.)
Planta *piloſa.*

3. CASSIA *viminea.*
C. foliis bijugis ovato-oblongis acuminatis, glandula oblonga inter infima, ſpinis ſubpetiolaribus obſoletis tridentatis. *Amoen. acad.* 5. *p.* 397. * *Loefl. it.* 252. *Swartz obſ.* 156. *
C. viminea, foliis ovatis acuminatis bijugatis, racemis laxis alaribus, ſiliquis brevioribus compreſſis. *Brown. jam.* 223.
Senna ſpuria tetraphylla, ſiliqua lata compreſſa. *Sloan. jam.* 2 *p.* 49. *t.* 189. *f.* 6. 7.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 509.
Schlanke Caſſie. W.
*Habitat in* Jamaicae *montibus altiſſimis interioris ſylvaticis.* ♄

4. CASSIA *bacillaris.*
C. foliis bijugis ovatis obliquis, glandula obtuſa inter infima, racemis axillaribus pedunculatis, ſiliqua tereti longa. *Lin. ſuppl.* 231.
Stockfrüchtige Caſſie. W.
*Habitat in* Surinamo. ♄ *C. G. Dalberg.*
Frutex *duodecim pedum glaberrimus.* Folia *alterna petiolata bijuga.* Foliola *latere interiore obliqua, utrinque glaberrima, inferiora exquiſite ovata, ſuperiora*

*magis elongata.* Glandula *conica obtusa inter inferiora foliola.* Stipulae *nullae.* Racemi *axillares solitarii pauciflori erecti.* Pedicelli *dependentes angulati.* Flores *aurantiaci mediocres.* Legumen *omnino C. fistulae, ut distingui nequeat, subcurvum, cylindricum glaberrimum, acumine filiformi terminatum, longitudine pedali, interius isthmis interceptum, quod externe tamen non apparet.*

5. CASSIA *Tagera.*

C. foliis trijugis: glandula petiolari, stipulis ciliatis cordatis acuminatis. *Sp. pl.* 538.

Cassia 6, Senna spuria tetraphylla arborescens, siliquis tenuibus longissimis pendulis. *Amm. herb* 603. *n.* 53?

Tagera. *Rheed. mal.* 2. *p.* 103. *t.* 52.? *Raj. hist.* 1743. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 509.

Gefranzte Cassie. W.

*Habitat in* India.

Fruticulus *procumbens*: *Ramis filiformibus.* Petioli *brevissimi*; Foliola *quatuor, semiorbiculata, venosa, quorum duo exteriora majora.* Stipulae *cordatae s. cordato-lanceolatae, margine pilosae.*

6. CASSIA *Tora.*

C. foliis trijugis obovatis: exterioribus majoribus: glandula subulata inter inferiora. *Roy. lugdb.* 468. *Fl. zeyl.* 152. *Hort. upsal.* 100. *Mill. dict. t.* 82.

C. siliqua quadrangulari. *Dill. elth.* 72. *t.* 63. *f.* 73.

β. C. humilis, siliquis foeni graeci. *Plum. spec.* 18. *t.* 76. *f.* 2.

Senna orientalis hexaphylla, Tala Zeylonensium. *Herm. lugdb.* 557. *Raj. hist.* 1743.

Sénna orientalis hexaphylla, siliquis longis incurvis. *Pluk. alm.* 342.

Galega indica minor hexaphyllos Amanni. *Raj. hist.* 911. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 510.

Viereckigfrüchtige Cassie. W.

*Habitat in* India. ⊙ (v. f.)

Caulis *erectus, minus lignosus, subscaber, a cicatricibus foliorum nodosus.* Rami *patentissimi.* Foliola *mucrone molli; inferiora breviora, obtusiora.* Stipulae *lineares, acuminatae, pilosae.* Glandulae *acuminatae, apice fuscae, inter singula paria 2 inferiora, non vero inter extimum par sitae.* Flores *lutei.*

Var. β. *differt siliqua recurva.* An *distincta species*?

7. CASSIA *bicapsularis.*

C. foliis trijugis obovatis glabris: interioribus rotundioribus: glandula interjecta globosa. *Hort. cliff.* 159. *Hort. upsf.* 100. *Roy. lugdb.* 468. *Mill. dict. n.* 7. *Merian. sur. t.* 32.

C. hexaphylla, filiqua bicapsulari. *Plum. spec.* 18. *t.* 76. *f.* 1. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 510.

Zweyfächrige Cassie. W.

*Habitat in* India. ♄

Folia *bijuga tantum, glandula rotunda inter infimum par.* Bracteae *ventricosae, subimbricatae.* Siliqua *teres longa. Linn. diff. plant. Suriam.* 1776.

8. CASSIA *emarginata.*

C. foliis subquadrijugis ovatis subintegris, floribus racemosis irregularibus, caule arboreo. *Swartz. obs.* 157.*

C. foliis trijugis ovatis rotundatis emarginatis aequalibus. *Hort. cliff.* 159. *Roy. lugdb.* 467.

C. (*racemosa*) foliolis quinquejugis lanceolatis rigidis, floribus racemosis axillaribus, siliquis planis, caule fruticoso. *Mill. dict.*

C. arborescens, siliquis compressis. *Brown. jam.* 223.

C. minor hexaphylla fruticosa, sennae foliis. *Sloan. jam.* 146. *hist.* 2. *p.* 44. *t.* 180. *f.* 1. 2. 3. 4. *Raj. dendr.* 110. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 511.

Ausgerandete Cassie. W.

*Habitat in* Caribaeis. ♄

9. CASSIA *obtusifolia.*

C. foliis trijugis ovatis obtusiusculis. *Sp. pl.* 539. *Swartz obs.* 158.*

C. foetida, foliis sennae italicae. *Dill. elth.* 71. *t.* 62 *f.* 72.

C. minor herbacea plerumque hexaphylla, folio obtuso. *Sloan. jam.* 148. *hist.* 2. *p.* 47. *t.* 180. *f.* 5?

Gallinaria rotundifolia. *Rumph. amb.* 5. *p.* 283. *t.* 97. *f.* 2. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 512.

Stumpfblättrige Cassie. W.

*Habitat in* Cubae *et* Jamaicae *ruderatis.* ⊙ (v. s.)

*10. CASSIA *sennoides.*

C. foliis trijugis, foliolis ellipticis obtusis, glandula inter infima foliola. W.

C. foliis trijugis, foliolis averse ovatis, glandula obtusa inter infima, stipulis subulatis, caule arboreo. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 70. *Collect.* 1. *p.* 74.*

Sennenartige Cassie. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄

*11. CASSIA *acuminata.* W.

C. foliis trijugis, foliolis ovatis acuminatis, glandula ſeſſili inter foliola. W.

C. (*Apoucouira*) arboreſcens, foliis amplis bi- et trijugis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 379. *t.* 146. *

Langſpitzige Caſſie. W.

*Habitat in* Gujanae *ſylvis.* ♄

Racemi *axillares.* W.

*12. CASSIA *corymboſa.*

C. foliis trijugis lanceolatis ſubfalcatis glabris, glandula inter infima, corymbis pedunculatis axillaribus, leguminibus cylindricis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 637. *

Doldentraubige Caſſie. W.

*Habitat in* Bonaria. ♄

13. CASSIA *longiſiliqua.*

C. foliis quadrijugis, foliolis extimis lanceolatis, glandula ſubulata infra infima interque extima. *Lin. ſuppl.* 230.

C. arboreſcens diffuſa, ſiliquis longis compreſſis. *Brown. jam.* 223.

Langfrüchtige Caſſie. W.

*Habitat in* America. ♄

Caulis *erectus teretiuſculus, obtuſe ſulcatus, ramis vix pubeſcentibus.* Folia *quadrijuga.* Foliola *viridia glaberrima ſubtus pallidius viridia, ovato-oblonga, extima gradatim longiora, ut linearia potius quam lanceolata.* Glandula *inter vel infra infimum par oblonga ſubulata, inter extimum par acutior, raro ulla inter paria intermedia.* Petiolus *erectus teretiuſculus.* Stipulae *lineares acutae breves.* Legumen *tetragonum hirtum brevius. Nocte obdormit arcte petiolo erigato, foliolis pendulis prope caulem.*

14. CASSIA *falcata.*

C. foliis quadrijugis ovato-lanceolatis retrofalcatis: glandula baſeos petiolorum. *Hort. cliff.* 159. *

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 512.

Sichelblättrige Caſſie. W.

*Habitat in* America. ⊙

*15. CASSIA *fericea.*

C. foliis ſubquadrijugis ovatis hirſutis, glandula ſubulata inter foliola, pedunculis quadrifloris, legumini-

bus tetragonis. *Swartz. prod.* 66. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 724.*

C. (*fericea*) foliolis trijugatis acuminatis ovatis villosis, floribus solitariis axillaribus, siliquis erectis. *Mill. dict.*

C. (*sensitiva*) foliis quinquejugis et quadrijugis, foliis villose ciliatis, glandula pedicellata et villosa inter omnia foliolorum paria. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 459. *Collect.* 2. *p.* 362.*

Paiomirioba II. *Pis. bras.* 185.

Seidenartige Caſſie. W.

*Habitat in graminosis subalpinis* Jamaicae. ⊙ (v.v.)

16. CASSIA *occidentalis.*

C. foliis quinquejugis ovato-lanceolatis margine scabris: exterioribus majoribus: glandula baseos petiolorum. *Sp. pl.* 539. *Mill. dict. n.* 1. *Fabric. helmst.* 329. *Swartz obs.* 159.

C. foliolis quatuor parium ovato-lanceolatis, glandula baseos petiolorum. *Hort. cliff.* 159. *Roy. lugdb.* 467.

C. herbacea major erecta ramosa, foliis ovato-acuminatis siliquis angustioribus compressis, spicis laxioribus terminalibus assurgentibus. *Brown. jam.* 224.

Senna occidentalis, odore opii virosо, orobi pannonici foliis mucronatis, glabra. *Comm. hort.* 1. *p.* 51. *t.* 26. *Sloan. jam. hist.* 2. *t.* 176. 3. 4.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 512.

Westindische Caſſie. W.

*Habitat in* Jamaica. ♄ (v. v.)

Caulis *sesquipedalis, punctis vagis scaber, exaratus deorsum a singulo petiolo sulcis duobus.* Folia *superiora Foliolis quinque parium, ovato-lanceolatis, glabris, margine scabris, acuminatis, exterioribus sensim majoribus, foetidis.* Racemus *terminalis.* Flores *lutei absque macula.* Folia *impuberis plantae quinquejuga; adultae tantum trijuga.*

17. CASSIA *planisiliqua.*

C. foliis quinquejugis ovato-lanceolatis glabris, glandula baseos petiolorum. *Roy. lugdb.* 468.

C. siliquis planis. *Plum. spec.* 18. *t.* 77.

*Houttuyn Lin. Pfl.* Syst. 3. *p.* 513.

Flachfrüchtige Caſſie. W.

*Habitat in* America *calidiore.* ♄

18. CASSIA *Fistula.*

C. foliis quinquejugis ovatis acuminatis glabris, petio-

lis eglandulatis. *Fl. zeyl.* 149. * *Mat. med.* 111. *Haſſelq. it.* 468. *Mill. dict. n.* 8. *Blackw. t.* 381.

C. foliolis quinque parium lanceolatis: extimis minoribus. *Hort. cliff.* 158.

C. fiſtula alexandrina. *Bauh. pin.* 405. *Comm. hort.* 1. *p.* 215. *t.* 110. *Rumph. amb.* 2. *p.* 83. *t.* 21.

Canna. *Rheed. n. l.* 1. *p.* 37. *t.* 22.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 514.

Röhrenfrüchtige Caſſie. W.

*Habitat in* India, Aegypto. ♄

Stipulae *vix manifeſtae.* Folia *glabra, baſi aequalia.*

* 19. CASSIA *patula.*

C. foliis quinquejugis oblongis acutiuſculis glabris, glandula baſeos petiolorum, ramis laevibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 51.

Ausgebreitete Caſſie. W.

*Habitat in* India *occidentali.* ♄ (v. v.)

Folia *interdum ſejuga. Differt a C. occidentali et planiſiliqua*, foliis *apice non attenuatis.* Ait. l. c.

* 20. CASSIA *lineata.*

C. foliis quinquejugis oblongiuſculis ſubtus pubeſcentibus ſubaequalibus, glandula obſoleta ſub infimis, pedunculis unifloris. *Swartz. prod.* 66. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 726. *

Geſtreifte Caſſie. W.

*Habitat in ruderatis et cultis* Jamaicae. ♃

*Diverſa a C. piloſa*; caule *magis fruticoſo rigido*, ramis *minime piloſis*, ſtipulis, pedunculis *brevibus et* leguminibus *linearibus.* Swartz l. c.

21. CASSIA *atomaria.*

C. foliis quinquejugis ovatis ſubtomentoſis, petiolis teretibus eglandulatis. *Sp. pl.* 540.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 515.

Punctirte Caſſie. W.

*Habitat in* America. *Dr. Iacquin.*

Caulis *mihi humanae altitudinis, lignoſus, cinereus, ramoſiſſimus.* Ramuli *et* Petioli *vix manifeſte pubeſcentes.* Petioli *atomis ſubferrugineis adſperſi, non canaliculati.* Folia *utrinque viridia, tactu tomentoſa, ovata; inferiora minora, obtuſiora, ſubemarginata, margine interiore baſeos non minore.* Stipulae *ſubulatae, ſaepe perſiſtentes a caſu foliorum praeſentis anni. Non dum mihi floruit in Horto Upſal.*

22. CASSIA *piloſa.*

C. foliis quinquejugis eglandulatis, ſtipulis ſemicordatis acuminatis, caule ſtricto piloſo. *Mant.* 68. *Swartz obſ.* 160. *

C. ſuffruticoſa erecta hirſuta, floribus ſingularibus ad alas. *Brown. jam.* 224.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 516.

Haarige Caſſie.

*Habitat in* Jamaicae *auſtralis aridis cultis.*

Caulis *erectiuſculus, fruticuloſus:* Ramis *erectis, undique valde piloſis.* Folia *glabra.* Stipulae *ſemicordatae, acuminatae, ciliatae.* Folia *laevia.* Pedunculi *erecti, gemini, uniflori, laeves.* Siliquae *oblongae, compreſſae.* Flores *pentandri.*

23. CASSIA *arboreſcens.*

C. foliis ſubquinquejugis ellipticis glabris, glandula oblonga inter inferiora, ſtipulis ſubulato-falcatis, racemis axillaribus. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 56. *

Wellia Tagera. *Rheed. mal.* 6. *p.* 17. *t.* 9. 10.

Baumartige Caſſie. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄ (v. ſ.)

24. CASSIA *Senna.*

C. foliis ſejugis ſubovatis, petiolis eglandulatis. *Mat. med.* 110.

C. foliis tri-quadri-ſejugiſve ſubovatis. *Sp. pl.* 2. *p.* 539. *Hort. cliff.* 159. *Roy. lugdb.* 468.

Senna (*alexandrina*) foliolis 4-jugis lanceolatis acutis. *Mill. dict. n.* 1.

Senna Alexandrina ſ. foliis acutis. *Bauh. pin.* 397. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 201. *ſ.* 2. *t.* 24. *f.* 1.

β. Senna italica ſ. foliis obtuſis. *Bauh. pin.* 397. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 200. *ſ.* 2. *t.* 24. *f.* 2.

Senna (*italica*) foliolis quinquejugatis cordatis obtuſis. *Mill. dict. n.* 2.

Senna. *Dod. pempt.* 361.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 516.

Sennen Caſſie. W.

*Habitat in* Aegypto. ☉

Stipulae *patentes.* Petioluli *luteo-colorati absque glandulis.* Legumina *ovali-oblonga, refalcata.*

25. CASSIA *ruſcifolia.*

C. foliis ſubſejugis ovato-lanceolatis glabris, glandula ad petioli baſin, lomento compreſſo marginato. W.

C. foliis ſejugis, foliolis lanceolatis acutis glabris, glandula ſupra baſin coſtae, pedunculis multifloris. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 71. *Collect.* 1. *p.* 43. *

Mäuſedornblättrige Caſſie. W.

*Habitat in* Maderae *rupibus.* ♄ (v. ſ.)

26. CASSIA *biflora.*

C. foliis ſejugis oblongiuſculis glabris: inferioribus minoribus, glandula ſubulata inter infima, pedicellis ſubbifloris. *Hort. cliff.* 159. *

C. biflora. *Amoen. acad.* 5. *p.* 397. *

C. fruticoſa, foliis minoribus obovatis ſexjugatis, floribus geminis ſ. bigeminatis, racemis alaribus. *Brown. jam.* 223.

C. minor arboreſcens, ſiliquis planis articulatis. *Plum. ſpec.* 18. *ic.* 78. *f.* 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 517.

Zweyblumige Caſſie. W.

*Habitat in* America. ♄

*27. CASSIA *chinenſis.*

C. foliis ſubſejugis ovatis acutis glabris, glandula ad petioli baſin, lomento cylindrico uncinato, transverſim coſtato. W.

C. foliis pinnatis ex quatuor ad ſeptem paribus, foliolis lanceolatis, glandula ſupra baſin coſtae, legumine transverſim coſtato. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 73. *Collect.* 1. *p.* 64. *

Chineſiſche Caſſie. W.

*Habitat ad* Peking *in* China. ♄

*28. CASSIA *multiglandulosa.*

C. foliis ſejugis ovali-oblongis obtuſis piloſis, exterioribus majoribus, glandulis ſubulatis omnium parium, ſiliquis linearibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 52.

C. (*multiglandulosa*) foliis ſejugis, foliolis obtuſis ſubtus et ad oras villoſis, glandula inter omnia foliorum paria. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 72. *Collect.* 1. *p.* 42. *

Vieldrüſige Caſſie. W.

*Habitat culta in inſula* Teneriffa. ♄

29. CASSIA *hirſuta.*

C. foliis ſejugis late ovatis acuminatis lanatis. *Lin. ſuppl.* 231.

C. foliis ſejugis ovatis acuminatis lanatis. *Hort. cliff.* 159. *Roy. lugdb.* 467.

C. americana foetida, foliis amplioribus villoſis. *Tournef. inſt.* 619.

Senna occidentalis, odore opii virosо, foliis orobi pannonici mucronatis hirsutis. *Herm. lugdb.* 556.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 518.
Rauhe Cassie. W.
*Habitat in* America.

30. CASSIA *tomentosa.*
C. foliis sex-s. octojugis, foliolis linearibus basi oblique rotundatis supra hirtis, paniculis axillaribus, leguminibus villosis. *Lin. suppl.* 231.
Filzige Cassie. W.
*Habitat in* America *meridionali. Mutis.* ♄
Arbor *ramis lignosis teretibus flexuosis, villo densiori molli albo, in siccis luteo, tectis.* Folia *petiolata pinnata sex-ad octojuga.* Foliola *opposita linearilanceolata acuta integerrima, basi oblique rotundata, supra viridia hirta, subtus alba s. lutea et tomentosa, margine interiori obliterato.* Petiolus *tomentosus.* Stipulae *semilunares s. lanceolatae tomentosae deciduae.* Paniculae *axillares in summitate caulis solitariae.* Pedunculi *tomentosi.* Flores *magnitudine mediocri lutei.* Siliquae *erectae compressae valde tomentosae.*

31. CASSIA *serpens.*
C. foliis septemjugis, floribus pentandris, caulibus filiformibus prostratis herbaceis. *Sp. pl.* 541. *Swartz obs.* 161.*
C. herbacea tenuissima procumbens, floribus singularibus ad alas. *Brown. jam.* 225.
Senna occidentalis siliqua singulari, foliis herbae mimosae, floribus pediculis longioribus insidentibus. *Sloan. hist.* 2. *p.* 5.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 518.
Kriechende Cassie. W.
*Habitat in* Jamaicae *pascuis aridis.* ⊙
Caules *filiformes, herbacei, prostrati, rarius ad basin ramosi, glabri.* Foliola *oblonga, striata, angustata.* Stipulae *subulatae.* Pedunculi *axillares, solitarii, longitudine foliorum, nudi, horizontales.* Siliquae *erectae, rhombeo-oblongae; ad angulum rectum cum pedunculo positae.*

*32. CASSIA *mexicana.*
C. foliis septemjugis, foliolis obtusiusculis pubescentibus ciliatis, glandula cylindrica inter infima. W.
C. foliis septemjugis villosulis, glandula tereti inter infima. *Iacq. hort. Schoenb.* 2. *p.* 41. *t.* 203.*

Mexicanische Cassie. W.
*Habitat in* Mexico.

*33. CASSIA *angustifolia.*
C. foliis septemjugis lanceolatis, extimis majoribus, petiolis eglandulatis, caule fruticoso. *Vahl. symb.* 1. *p.* 29. *
Schmalblättrige Cassie. W.
*Habitat in* Arabia. ♄
*A C. Senna differt:* numero *et* figura *foliorum*, leguminibus *maturis intus non curvatis. A C. ligustrina* foliolis *extimis majoribus*, petiolis *eglandulatis discrepat.* Vahl. l. c.

34. CASSIA *ligustrina.*
C. foliis septemjugis lanceolatis, extimis minoribus, glandula baseos petiolorum. *Hort. cliff.* 199. *Hort. upsal.* 100. *Gron. virg.* 47. *Roy. lugdb.* 467.
C. ligustri folio. *Plum. spec.* 10. *Dill. elth.* 350. *t.* 259. *f.* 338.
C. bahamensis, pinnis foliorum mucronatis angustis, calyce floris non reflexo. *Mart. cent.* 21. *t.* 21. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 519.
Ligusterartige Cassie. W.
*Habitat in* Virginia, Bahama. ♄
*Folia glabra, margine pilosa.*

*35. CASSIA *florida.*
C. foliis septemjugis ovali-oblongis glabris emarginatis eglandulosis, floribus racemosis, bracteis spathulatis mucronatis. *Vahl symb.* 3. *p.* 57. *
Vielblütige Cassie. W.
*Habitat in* India *orientali.* ♄ (v. s.)

*36. CASSIA *stipulacea.*
C. foliis suboctojugis ovato-lanceolatis, glandula inter inferiora, stipulis ovatis maximis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 52.
Pseudo-Acacia foliis mucronatis, flore luteo. *Feuill. peruv.* 3. *p.* 56. *t.* 42.
Chilische Cassie. W.
*Habitat in* Chili. ♄

37. CASSIA *alata.*
C. foliis octo-jugis ovali-oblongis: *exterioribus* minoribus, petiolis eglandulatis, stipulis patulis. *Syst. Veget.* 328. *Swartz obs.* 162. *
C. foliis octojugis ovali-oblongis: inferioribus minoribus, petiolis eglandulatis, stipulis patulis. *Sp. pl.* 2.

*p.* 541. *Hort. cliff.* 158. *Hort. upſ.* 100. *Roy. lugdb.* 467. *Mill. dict. n.* 3.

C. (*herpetica*) foliis circiter decemjugis oblongis apice rotundatis, ſiliquis membranaceis quadrangulis fragilibus rigidis. *Iacq. obſ.* 2. *p.* 24. *t.* 45. *f.* 2. *

C. ſiliquis quadrialatis, ſpicis terminalibus, foliis plurimis pinnatis majoribus obovatis. *Brown. jam.* 224.

C. ſylveſtris foetida, ſiliquis alatis. *Plum. ſpec.* 18.

Faba dulcis. *Mer. ſurin.* 58. *t.* 58.

Herpetica. *Rumph. amb.* 7. *p.* 35. *t.* 18.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 519.

Geflügelte Caſſie. W.

*Habitat in* America *calidiore.* 2 (v. v. ſ. ſi.)

Planta 11 *pedum.* Caulis *craſſus, herbaceus tamen.* Stipulae *ſemicordatae.* Petioli *flaveſcentes, valde canaliculati ut fere marginati.* Foliola 16-20, *lineari-ovata, obtuſa: inferiora minora.* Glandulae *foliorum nullae, ſed ſetae breviſſimae,* 2, *diſtantes.*

38. CASSIA *marilandica.*

C. foliis octojugis ovato-oblongis aequalibus, glandula baſeos petiolorum. *Hort. cliff.* 159. *Hort. upſ.* 100. *Roy. lugdb.* 467. *Mill. dict. n.* 6. *Kniph. cent.* 12. *n.* 22. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 133. *Willd. arb.* 54. *

C. mimoſae foliis, ſiliqua hirſuta. *Dill. elth.* 351. *t.* 260. *f.* 339.

C. foliis octo ſaepius parum ovato-oblongis aequalibus, glandula ſupra baſin petiolorum. *Gron. virg.* 65.

C. marilandica, pinnis foliorum oblongis, calyce floris reflexo. *Mart. cent.* 23. *t.* 23.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 520.

Marilandiſche Caſſie. W.

*Habitat in* Virginia, Marilandia. 2 (v. v.)

*Caulis et folia adſperſa pilis raris.*

*39. CASSIA *faſtigiata.*

C. foliis novemjugis oblongis glabris, glandula pedicellata inter omnia foliola, floribus racemoſis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 57. *

Gipfelblütige Caſſie. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄

*40. CASSIA *frondoſa.*

C. foliis novemjugis ovali-oblongis glabris obtuſiuſculis, glandula cylindrica inter inferiora, petiolo baſi eglanduloſo. *Ait. Kew.* 2. *p.* 35.

C. (*Criſta*) foliis pinnatis ex ſeptem et novem paribus, foliolis oblongis obtuſis, glandula terete et obtuſa inter infima. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 74. *Collect.* 1. *p.* 82. *.
Blattreiche Caſſie. W.
*Habitat in* India *occidentali.* ♄

41. CASSIA *tenuiſſima.*
C. foliis novemjugis oblongis, glandula ſubulata inter infima. *Roy. lugdb.* 478.
Senna ſpuria fruteſcens, ſiliquis tenuiſſimis. *Houſt. mſſ. Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 512.
Dünnfrüchtige Caſſie. W.
*Habitat in* Havana. ♄

*42. CASSIA *virgata.*
C. foliis decemjugis ovato-lanceolatis villoſis, glandula petiolari pedicellata, pedunculis unifloris foliolis longioribus. *Swartz prod.* 66. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 728.*
Ruthenförmige Caſſie. W.
*Habitat in* Jamaica, Hiſpaniola. ♄
*C. Chamaecriſtae proxima, ſed differt;* caule *fruticoſo ramoſo,* ramis *rigidis ſubflexuoſis erectis*: foliis *anguſtioribus acutioribus.* Swartz l. c.

43. CASSIA *Sophera.*
C. foliis decemjugis lanceolatis, glandula baſeos oblonga. *Fl. zeyl.* 150.
Senna vigintifolia ſiliquis teretibus. *Burm. zeyl.* 213. *t.* 98.
Galegae affinis. *Bauh. pin.* 352.
Gallinaria acutifolia. *Rumph. amb.* 5. *p.* 283. *t.* 97. *f.* 1.
Ponnam-Tagera. *Rheed. mal.* 2. *p.* 101. *t.* 52.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 521.
Sophoraartige Caſſie.
*Habitat in* Indiae *umbroſis.*
Facies *foliorum C. liguſtrinae.* Folia *pinnata, foliolis circiter* 10 *parium, coriariae facie, foliolis lanceolatis, ſive ovato-lanceolatis acutis viridibus herbaceis glabris ſubaequalibus ſubpetiolatis.* Glandula *oblonga ſupra baſin petioli communis.* Racemus *parvus ex alis.* Corollae *albido-flaveſcentes venis fuſcis.* Antherae *tres ſupremae minimae ſteriles, tres infimae arcuatae, quatuor intermediae rectae.* Fl. zeyl.

44. CASSIA *bracteata.*
C. foliis decemjugis oblongis obtuſis eglandulatis, race-

mis elongatis, bracteis ovatis tumidis imbricatis, legumine quadrangulari compreſſo. *Lin. ſuppl.* 232.
Beblätterte Caſſie. W.
*Habitat in* Surinamo. *C. G. Dalberg.*

Folia *plus quam pedalia octo ſ. decemjuga.* Foliola *palmaria linearia, apice rotundata, ſubtus mollia cana.* Petiolus *compreſſus inter paria canaliculatus.* Racemus *maximus ex floribus denſe congeſtis, inter bracteas ovatas magnas tumidas imbricatas nervoſas pubeſcentes, ſtatim ante explicationem floris caducas.* Flores *lutei.* Rudimenta *leguminum erant incurva compreſſa, angulis quatuor.*

45. CASSIA *auriculata.*

C. foliis duodecim-jugis obtuſis mucronatis, glandulis ſubulatis pluribus, ſtipulis reniformibus barbatis. *Fl. zeyl.* 151. *
Senna ſpuria maderaſpatana, caule ad foliorum alas geminatis ſubrotundis appendiculis auriculato. *Pluk. alm.* 341. *t.* 314. *f* 4. *Raj. dendr.* 110.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 522.
Geöhrte Caſſie. W.
*Habitat in* India.

*46. CASSIA *brevifolia.*

C. ramoſiſſima ſubglabra, foliis duodecim-jugis obovatis, pedunculis lateralibus unifloris foliis longioribus. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 644. *
Kurzblättrige Caſſie. W.
*Habitat in* Madagaſcar. ♄

Folia *quinque ſ. ſex lineas longa, e* 12 *rarius* 14 *paribus compoſita.* Foliola *mimtiſſima valde approximata.* Pedunculus *ſupraaxillaris foliis multo longior.*
Lamarck l. c.

*47. CASSIA *mollis.*

C. foliis duodecim-jugis ovali-oblongis, molliter villoſis, baſi aequalibus, apice integris eglandulolis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 57. *
C. foliis plurimis oblongis, flore rubello, ſiliquis maximis craſſioribus trinerviis. *Brown. jam.* 223.
C. nigra ſ. fiſtuloſa ſecunda. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 41.
C. fiſtula flore incarnato braſiliana. *Breyn. cent.* 58. *t.* 21.
C. fiſtula braſiliana. *Bauh. pin.* 403.
Weiche Caſſie. W.
*Habitat in* America *meridionali.* ♄

48. CASSIA *javanica.*

C. foliis duodecim-jugis ovali-oblongis glabris eglandulosis obtusis emarginatis basi obliquis, racemis axillaribus. *Vahl. symb.* 3. *p.* 58. *

C. foliis duodecim-jugis oblongis obtusis glabris, glandula nulla. *Sp. pl.* 542.

C. fistula javanica, flore carneo. *Comm. hort.* 1. *p.* 217. *t.* 111.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 522.

Javanische Cassie. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄ (v. s.)

49. CASSIA *grandis.*

C. foliis vigintijugis subholosericeis eglandulatis. *Lin. suppl.* 230.

Arbor siliquosa brasiliana, siliqua hispida ferruginea, ceratoniae facie. *Breyn. cent. t.* 14.

Grosse Cassie. W.

*Habitat in* Surinamo. ♄ *C. G. Dahlberg.*

Arbor *robusta valida, ramis subtilissime holosericeis.* Folia *circiter vigintijuga absque* glandulis. Foliola *oblonga obtusa aequalis latitudinis, secundum longitudinem subtilissime holosericea.* Siliquae *sesquipedales compressiusculae digitos tres latae ponderosissimae acuminatae, suturis elevatis teretibus extantibus; altera geminata.*

* * Chamaecristae *foliolis numerosis.*

*50. CASSIA *nigricans.*

C. foliis quatuordecim-jugis lineari-oblongis obtusissimis mucronatis, glandula baseos sessili. *Vahl. symb.* 1. *p.* 30. *

Cassia procumbens. *Forsk. Cat. pl. arab. p.* 111.

Schwärzliche Cassie. W.

*Habitat in* Arabia *felici.* ♄

*51. CASSIA *polyphylla.*

C. foliis multijugis, foliis ellipticis obtusis ciliatis, glandula oblonga sessili inter infima, pedunculis subbifloris. W.

C. foliis a quinquejugis ad duodecim-juga, in ramis senioribus aggregatis, foliolis oblongis ciliatis, facie glabris, dorso hispidulis, glandula pyramidali sessili inter foliola infima, pedunculis subbifloris. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 460. *Collect.* 4. *p.* 104. *

Vielblättrige Cassie. W.

*Habitat in insula* Porto Rico. ♄

52. CASSIA *Chamaecriſta.*

C. foliis multijugis, glandula petiolari pedicellata, ſtipulis enſiformibus. *Hort. upſ.* 101. *Swartz obſ.* 164. *

C. foliolis plurium parium linearibus, ſtipulis ſubulatis. *Hort. cliff.* 158. *Gron. virg.* 47.

C. ſuffruticoſa erecta, foliolis linearibus plurimis pinnatis, floribus ſingularibus vel geminis ſparſis. *Brown. jam.* 225.

Chamaecriſta pavonis major. *Comm. hort.* 1. *p.* 53. *t.* 37.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 524.

Niedrige Caſſie. W.

*Habitat in* Jamaica, Barbados, Virginia. ⊙ (v. v.)

Foliola 20. *Pedicellus ſpatio ſupra petiolum egredieus.* Petala *duo ſuperiora macula purpurea.* Antherae *rubrae.*

53. CASSIA *glandulosa.*

C. foliis multijugis multiglandulatis, ſtipulis ſubulatis. *Sp. pl.* 542.

Chamaecriſta pavonis americana, ſiliqua multiplici. *Breyn. cent.* 64. *t.* 24.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 524.

Drüſige Caſſie. W.

*Habitat in* Jamaica, Guadeloupe. (v. ſ.)

Caules *ſuffruticoſi; ramis nudiuſculis.* Foliola *lanceolata petiolo, inter ſingula paria, glandula pedicellata notato.* Stipulae *ſubulatae.* Pedunculi *axillares foliorum, gemini, uniflori, folio breviores.* Siliquae *orobi.* Flores *hexandri antheris duabus longiſſimis.*

54. CASSIA *mimoſoides.*

C. foliis multijugis linearibus: glandula baſeos petiolorum obſoleta, ſtipulis ſetaceis. *Fl. zeyl.* 154.

Mimoſa herba zeylanica, foliis et ſiliquis anguſtis glabris. *Burm. zeyl.* 160.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 525.

Sinnpflanzenartige Caſſie. W.

*Habitat in* Zeylona.

Petioli *absque glandula.* Caulis *non flexuoſus.* Stipulae *lanceolatae, ſeta terminatae.*

Caulis *erectus ſimpliciſſimus teres bipedalis altior.* Folia *pinnata: foliolis infinitis linearibus, glandula ſeſſili ſupra baſin petioli.* Stipulae *lanceolatae ſeta terminatae; ex alis.* Pedunculi *duo, erecto uniflori filiformes, verſus apicem bractea duplici lanceolata, ter-*

*minuti flore patulo.* Stamina 10, *quorum 7 cum antheris oblongis.* Legumina *linearia.* Fl. zeyl.

*55. CASSIA *microphylla.* W.

C. foliis multijugis linearibus mucronatis, glandula inter infima, ſtipulis lanceolatis mucronatis, pedunculis ſolitariis unifloris, caule ramoſo virgato. W.

Feinblättrige Caſſie. W.

*Habitat in inſula* St. Crucis. (v. ſ.)

Caulis *pubeſcens.* Lomentum *compreſſum lineare pube tenui tectum. Valde affinis praecedenti, diſtinxi tantum hanc auctoritate Clariſſ. Vahl, qui diverſam eſſe credit.* W.

56. CASSIA *flexuoſa.*

C. foliis multijugis, ſtipulis dimidiato-cordatis. *Sp. pl.* 543.

Senna ſpuria occidentalis, ſiliqua ſingulari, foliis herbae mimoſae. *Herm. lugdb.* 558. *Sloan. jam.* 150. *Raj. ſuppl.* 18.

Chamaecriſta pavonis braſiliana, ſiliqua ſingulari. *Breyn. cent.* 65. *t.* 2$\frac{3}{3}$.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 3. p.* 525.

Gebogene Caſſie. W.

*Habitat in* Braſilia. ⊙

*57. CASSIA *capenſis.*

C. foliis multijugis, foliis linearibus, caule flexuoſo-erecto villoſo. *Thunb. prod.* 79.

Capiſche Caſſie. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

58. CASSIA *nictitans.*

C. foliis multijugis, floribus pentandris, caule erectiusculo. *Sp. pl.* 543.

C. calycibus acutis, floribus pentandris. *Hort. cliff.* 497. *t.* 36. *Hort. upſ.* 101.

Senna ſpuria virginiana, mimoſae foliis, floribus parvis nictitantibus. *Pluk. alm.* 341. *t.* 514. *f.* 5.

Amoena moeſta. *Rumph. amb.* 6. *p.* 147. *t.* 61. *f.* 1.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 3. p.* 526.

Virginiſche Caſſie. W.

*Habitat in* Virginia. ⊙ (v. v.)

Glandula *petiolorum pedicellata et fuſca.* Pedunculi *ſaepius tripartiti et triflori, ſpatio ſupra alas enati.*

59. CASSIA *procumbens.*
C. foliis multijugis eglandulatis, caule procumbente. *Sp. pl.* 543.
C. americana procumbens herbacea, mimosae foliis, floribus parvis siliquis angustis planis. *Comm. pet. op. t.* 11.
Chamaecrista mariana, flore minore. *Pet. sicc.* 243. *n.* 40.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 527.
Liegende Cassie. W.
*Habitat in* Indiis, Virginiae *apricis siccis.* ☉

## *814. CUBAEA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 702.

*Cal.* turbinatus 5-partitus. *Cor.* 5-petala subaequalis. *Stam.* calyci inserta longa omnia foecunda, tria superiora breviora. *Legumen.*

*1. CUBAEA *paniculata.*
C. foliis pinnatis, foliolis oppositis.
Tachigali paniculata. *Aubl. guj.* 1. *p.* 372. *t.* 143. *f.* 1. *
Rispenblütige Cubäa. W.
*Habitat in sylvis* Gujanae. ♄

*2. CUBAEA *trigona.*
C. foliis pinnatis, foliolis alternis.
Tachigali trigona. *Aubl. guj.* 1. *p.* 374. *t.* 143. *f.* 2. *
Dreyeckige Cubäa. W.
*Habitat in* Gujanae *sylvis.* ♄
*Simillima praecedenti cujus forte varietas, differt tantum:* foliolis *majoribus alternis, nec oppositis.* Rachis *foliorum in binis speciebus trigona.* W.

## 815. CAESALPINIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 701. 703.

*Cal.* 5-partit. laciniа infima majori subfornicata. *Petala* 5. *Stam.* basi lanata omnia foecunda. *Legumen* compressum.

1. CAESALPINIA *bijuga.*
C. aculeata, foliis duplicato-bijugis, foliolis obcordatis calycibusque glabris, staminibus corollam aequantibus.
*Swartz obs.* 166.

Poinciana (*bijuga*) aculeis ſolitariis, foliolis emarginatis. *Sp. pl.* 544. *Iacq. amer.* 123. *n.* 2.
Caeſalpinia (*veſicaria*) caule aculeato, foliis obcordatis ſubrotundis. *Sp. pl.* 545.
C. ſpinoſa, foliis minoribus obcordatis bipinnatis. *Brown. jam.* 227.
Senna ſpuria arborea ſpinoſa, foliis alatis ramoſis ſ. decompoſitis flore luteo, ſiliquis brevibus ſulcatis nigris ſabinae odore. *Sloan. jam.* 149. *hiſt.* 2. *p.* 50. *t.* 181. *f.* 2. ♄. *bona. Raj. dendr.* 111.
Acacia glorioſa jamaicenſis, foliis minoribus ſubrotundis, ſpinis ad genicula ſimplicibus, floribus flavo-purpureis. *Plum. alm.* 5.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 528. 569.
Ausgerandetblättrige Cäſalpinie. W.
*Habitat in* Jamaica. ♄ (v. ſ. ſ. ſ.)

2. CAESALPINIA *pulcherrima.*

C. aculeata, foliolis oblongo-ovalibus emarginatis, calycibusque glabris, corymbis ſimplicibus, petalis fimbriatis, ſtaminibus longiſſimis. *Swartz obſ.* 166.
Poinciana (*pulcherrima*) aculeis geminis. *Hort. upſ.* 101. *Iacq. amer.* 122. *Mill. dict.*
Poinciana aculeata, foliis bipinnatis, floribus croceis pulcherrimis, pedunculis longis ſpicatis inſidentibus. *Brown. jam.* 1. *p.* 225.
Senna ſpuria, arborea, ſpinoſa, foliis alatis ramoſis ſeu decompoſitis, flore ex luteo et rubro ſpecioſo. *Sloan. jam.* 2. *p.* 40.
Criſta pavonis flore elegantiſſimo variegato. *Burm. zeyl.* 79.
Frutex pavonius, Criſta pavonis. *Breyn. cent.* 61. *t.* 22. *Raj. hiſt.* 981.
Acacia orientalis glorioſa, coluteae foliis, ad genicula ſpinis gemellis aculeata. *Pluk. alm.* 5.
Flos pavonis. *Mer. ſur.* 45. *t.* 45?
Tſieki mandaru. *Rheed. mal.* 6. *p.* 1. *t.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 528.
Schönſte Cäſalpinie. W.
*Habitat in* Indiis. ♄ (v. ſ.)

Petiolus communis *Glandula una ad baſin et alia ad ſupremum par*; partialis *ſupra baſin mucronibus duobus.* Frutex 12-*pedalis. Emmenagoga Tinctura ex* Herb. *manip.* 3 *et* Sem. *no.* 20. Doſis *uncia una. Diſſ alt. de pl. Surin. anno* 1776. *edit.*

3. CAESALPINIA *elata.*

C. inermis, foliolis linearibus obtusis cum acumine, corymbis compositis, calycibus coriaceis tomentosis, petalis fimbriatis, staminibus longissimis. *Swartz obs.* 166.

Poinciana caule inermi. *Cent.* 146. *Forskaehl. aegypt.* 83.

Poinciana foliis bipinnatis, foliolis ovato-oblongis, caule inermi. *Hort. cliff.* 158. *Fl. zeyl.* 159.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 521.

Hohe Cäsalpinie. W.

*Habitat in* India. ♄ (v. s.)

Foliola *integerrima, minuta.* Calyces *coriacei.* Filamenta *atropurpurea, basi villosa, longissima.*

*4. CAESALPINIA *Coriaria.*

C. inermis, foliolis linearibus obtusis, racemis paniculatis, calycibus glabris, staminibus corolla duplo longioribus. W.

Poinciana (*Coriaria*) caule inermi racemis spicatis. *Iacq. amer.* 123. *t.* 175. *f.* 36. *

Siliqua arboris Guatapanae ex Curacao insula. *Breyn. cent. p.* 58. *f.* 5.

Libidibi. *Berg. Act. holm.* 1774. *p.* 57.

Gerber Cäsalpinie. W.

*Habitat in maritimis inundatis salsis* Curacao *et* Carthagenae. ♄ (v. s.)

5. CAESALPINIA *brasiliensis.*

C. inermis, foliolis ovato-oblongis, rachidibus pubescentibus, calycibus tomentosis, staminibus corolla brevioribus. *Swartz obs.* 166.

C. caule foliisque inermibus. *Mat. med.* 112.

C. arborea inermis, foliis minoribus: paribus bipinnatis, ligno kermesino: Brasiletto. *Brown. jam.* 227.

C. foliolis duplicato-pinnatis, foliolis emarginatis, floribus decandris. *Mill. dict. n.* 1.

Pseudo-Santalum croceum. *Sloan. jam.* 213. *hist.* 2. *p.* 184.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 566.

Brasilische Cäsalpinie. W.

*Habitat in* Carolina, Jamaica, Brasilia. ♄

Brasiletto *officinis dicta.*

*6. CAESALPINIA *echinata.*

C. aculeata, foliolis ellipticis obtusis, racemis simplicibus, leguminibus echinatis. W.

C. (*echinata*) caule ramisque aculeatis, foliolis ovatis obtusis, leguminibus echinatis. *Lamarck encyclop.* 1. *p.* 455. *

Pseudo-Santalum rubrum s. arbor Brasilia. *Bauh. pin.* 393.

Arbor Brasilia. *Raj. hist.* 1756.

Acacia glorioſa ſpinis armata, cujus lignum Brasilia dictum, tinctoria. *Pluk. alm.* 5.

Ibirapitanga. *Pis. bras.* 164.

Fernambuc Cäſalpinie. W.

*Habitat in* Brasilia. ♄

## 7. CAESALPINIA *Sappan.*

C. aculeata, foliolis oblongo-ovalibus inaequilateris obtusis, calycibusque glabris, staminibus corolla longioribus, petalo supremo minore. *Swartz obs.* 167.

C. caule aculeato, foliolis oblongis inaequilateralibus emarginatis. *Fl. zeyl.* 158. *Roxb. corom.* 1. *p.* 17. *t.* 16. *

Ligno brasiliano simile. *Bauh. pin.* 393.

Lignum Sappan. *Rumph. amb.* 4. *p.* 56. *t.* 21. *Meist. it.* 90.

Tsiam pangam. *Rheed. mal.* 6. *p.* 3. *t.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 570.

Brasilienholz Cäſalpinie. W.

*Habitat in* Indiis. ♄

## 8. CAESALPINIA *Crista.*

C. aculeata, foliolis ovalibus, racemis simplicibus, petalis ovatis calyce glabro brevioribus, staminibus calyce longioribus. *Swartz. obs.* 167.

C. caule aculeato, foliolis ovatis integris, floribus pentandris. *Sp. pl.* 544.

C. foliis duplicato-pinnatis, foliolis ovatis integerrimis, floribus pentandris. *Mill. dict. n.* 2.

Caesalpina polyphylla aculeis horrida. *Plum. gen.* 26. *t.* 68.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 568.

Vielfachliche Cäſalpinie. W.

*Habitat in* Jamaica. ♄

## * 9. CAESALPINIA *mimosoides.*

C. aculeata, foliolis oblongis obtusis, staminibus corolla brevioribus, leguminibus lanuginosis. W.

C. caule petiolis pedunculisque aculeatis, foliolis oblon-

gis obtusis parvis, leguminibus lanuginosis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 457. *

Mimosa malabarica, flore pentapetalo, siliquis lanuginosis. *Raj. hist.* 1740.

Kal-todda-vaddi. *Rheed. mal.* 6. *p.* 15. *t.* 8.

Sinnpflanzenartige Cäsalpinie. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄

*Est sensitiva ut nonnullae Mimosae, notante Rheede.* W.

## 816. GUILANDINA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 704.

*Cal.* 1-phyllus, hypocrateriformis. *Petala* calycis collo inserta, subaequalia. *Legumen.*

### 1. GUILANDINA *Bonduc.*

G. aculeata, pinnis ovatis, foliolis aculeis solitariis. *Mill. dict. n.* 1. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 429. *

G. caule fructuque aculeatis. *Hort. cliff.* 158.

Cäsalpinia aculeis recurvis, foliolis ovatis. *Fl. zeyl.* 157.

Bonduc vulgare majus polyphyllum. *Plum. gen.* 25.

Acacia glorioса, lentisci folio, spinosa flore spicato luteo, siliqua magna muricata. *Plnk. alm.* 4. *t.* 2. *f.* 2.

Lobus echinatus, fructu flavo, foliis rotundioribus. *Sloan. jam.* 144. *hist.* 2. *p.* 40.

Frutex globulorum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 89. *t.* 48.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 532.

Gemeine Guilandine. W.

*Habitat in* Indiis. ♄

### 2. GUILANDINA *Bonduccella.*

G. aculeata, pinnis oblongo-ovatis, foliolis aculeis geminis. *Mill. dict. n.* 2. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 429. *
*Vahl. symb.* 1. *p.* 30.

G. aculeata, foliolis ovalibus acuminatis. *Fl. zeyl.* 156.
*Hort. upsal.* 101.

G. spinosa, foliis bipinnatis ovatis cum acumine, seminibus cinereis. *Brown. jam.* 228.

Glycyrrhiza *(aculeata)* ramis rachibusque foliorum universalibus et partialibus aculeatis. *Forsk. descr.* 135.

Bonduc vulgare minus polyphyllum. *Plum. gen.* 25.

Crista Pavonis, glycyrrhizae folio, minor repens spinosissima, flore luteo spicato minimo, siliqua latissima

echinata, femine rotundo cinereo. *Breyn. prod.* 3. *app.* 33. *t.* 28.
Globuli majores. *Rumph. amb.* 5. *p.* 92. *t.* 49. *f.* 1.
Lobus echinatus fructu caesio, foliis longioribus. *Sloan. jam.* 144. *hist.* 2. *p.* 41.
Caretti. *Rheed. mal.* 2. *p.* 35. *t.* 22.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 533.
Zweystachliche Guilandine. W.
*Habitat in* Indiis. ♄ (v. s.)

3. GUILANDINA *Nuga.*
G. caule inermi, foliis petiolo primario subtus aculeis geminis. *Sp. pl.* 546. †
Nugae sylvarum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 94. *t.* 50.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 534.
Stachellose Guilandine. W.
*Habitat in* Amboina. ♄
*Legumina laevia sunt.*

*4. GUILANDINA *paniculata.*
G. ramis petiolisque aculeatis, floribus paniculatis ebracteatis, leguminibus monospermis laevibus. *Lamarck encyclop.* 1. *p.* 429. *
Ticanto. *Adans. fam.* 319.
Cacu mullu. *Rheed. mal.* 6. *p.* 33. *t.* 19.
Rispenblütige Guilandine. W.
*Habitat in* Malabaria *et* Nova Hibernia. ♄

*5. GUILANDINA *axillaris.*
G. aculeata, foliis pinnatis, floribus axillaribus subsolitariis, leguminibus monospermis villosis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 430. *
Bau-caretti. *Rheed. mal.* 6. *p.* 35. *t.* 20.
Winkelblütige Guilandine. W.
*Habitat in* India *orientali.* ♄

## *817. HYPERANTHERA.

*Vahl. symb.* 1. *p.* 30.

*Cal.* 5-partitus. *Petala* calyci inserta inaequalia. *Legumen* 3-valve toruloſum. *Semina* alata.

*1. HYPERANTHERA *decandra.* †
H. floribus decandris, foliis subbipinnatis; foliolis inferioribus ternatis, leguminibus suboctogonis. W.

Anoma (*Moringa*) foliis alternis bipinnatis, siliquis polygonis, seminibus triquetro-alatis. *Loureiro cochin.* 342. *

Zehnfädige Behennuſs. W.

*Habitat in* India. ♄

*An varietas sequentis?* W.

2. HYPERANTHERA *Moringa.*

H. floribus semidecandris, foliis subbipinnatis, foliolis inferioribus ternatis, leguminibus trigonis. W.

H. (*Moringa*) floribus semidecandris, foliis subbipinnatis, foliis inferioribus ternatis. *Vahl. symb.* 1. *p.* 30.*

Anoma (*Morunga*) foliis oppositis bipinnatis, siliquis trigonis, seminibus triquetro-alatis. *Loureiro cochin. p.* 343. *

Moringa zeylanica. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 393.* *illust. gen. t.* 337. *Schreb. gen. n.* 1606.

Guilandina (*Moringa*) inermis, foliis subbipinnatis, foliolis inferioribus ternatis. *Fl. zeyl.* 155. *Mat. med. p.* 112. *Mill. dict. n.* 4. *Swartz obs.* 167.* *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 461. *Collect.* 2. *p.* 371. *

Lignum peregrinum aquam coeruleam reddens. *Bauh. pin.* 416.

Moringha zeylanica, foliorum pinnis pinnatis, flore majore, fructu anguloso. *Burm. zeyl.* 162. *t.* 75.

Morungu. *Rheed. mal.* 6. *p.* 19. *t.* 11. *Rumph. amb.* 1. *p.* 184. *t.* 74, 75.

Balanus Myrepsica. *Blackw. t.* 386.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 573.

Gemeine Behennuſs. W.

*Habitat in* Zeylona, America, Aegypto. ♄

Polygama *ex Hermaphroditis duobus.* Legumen *longissimum, triquetrum, 3-valve, laeve, valvulis triquetris, uniloculare.* Semina *alterna, remota, longitudinaliter digesta, triquetra.*

*3. HYPERANTHERA *semidecandra.*

H. floribus semidecandris, foliis bipinnatis, apice simpliciter pinnatis. *Vahl. symb.* 1. *p.* 30.

Hyperanthera peregrina. *Forsk. descr.* 67. *

Gymnocladus (*arabica*) foliis bipinnatis, petiolo communi glanduloso, floribus inaequalibus hermaphroditis. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 726.

Arabiſche Behennuſs. W.

*Habitat in* Arabia. ♄

### *4. HYPERANTHERA *cochinchinenſis.* †

H. floribus ſemidecandris, foliis bipinnatis tomentoſis, leguminibus bivalvibus, ſeminibus nudis. W.

Anoma (*cochinchinenſis*) foliis oppoſitis bipinnatis, ſiliquis ſubcompreſſis bivalvibus, ſeminibus nudis. *Loureiro cochin.* 343. *

Cochinchineſiſche Behennuſs. W.

*Habitat in* Cochinchina. ♄

## *818. SCHOTIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 705.

*Cal.* 5-fidus. *Petala* 5, calyci inſerta, lateribus invicem incumbentibus clauſa. *Legumen* pedicellatum.

### 1. SCHOTIA *ſpecioſa.*

S. ſpecioſa. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 75. *Collect.* 1. *p.* 93. * *Ait. Kew.* 2. *p.* 56.

Schotia afra. *Thunb. prod.* 79.

Theodora ſpecioſa. *Medic. monogr. p.* 16. *t.* 1.

Guajacum (*afrum*) foliis multijugis acutis. *Sp. pl.* 547. *Mill. dict. n.* 3.

Guilandinoides. *Hort. cliff.* 439.

Acacia africana, quae Acaciae ſimilis, foliis myrti parvis aculeatis pinnatis, flore coccineo tetrapetaloide. *Walth. hort.* 2. *t.* 2.

Afra arbor acaciae ſimilis foliis myrti aculeatis ſplendentibus. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 57.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 582.

Prächtige Schotie. W.

*Habitat in* Senegal *et ad* Cap. b. ſpei *prope* Moſſel-Bay. ♄ (v. ſ.)

Rami *rigidi.* Folia *alterna pinnata octojuga.* Petiolus *communis marginatus articulatus canaliculatus.* Foliola *ovato-oblonga oppoſita integerrima mucronata glabra rigidula perennia, baſi interiore laeviſſime abbreviata.* Stipulae *ramis adpreſſae ſubulatae minimae.*

## 819. GUAIACUM.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 727.

*Cal.* 5-fidus, inaequalis. *Petala* 5, calyci inserta. *Capf.* angulata, 3 f. 5-locularis.

*1. GUAIACUM *dubium*. †

G. foliis conjugatis oblongo-lanceolatis obtusis. *Forst. prod. n.* 186.

Zweifelhaftes Franzosenholz. W.

*Habitat in insula* Tongatabu. ♄

2. GUAIACUM *officinale*.

C. foliolis bijugis obtusis. *Mat. med.* 112. *Mill. dict. n.* 1. *Swartz obs.* 168. *

G. foliis pinnatis; foliolis quaternis obtusis. *Hort. cliff.* 187.

G. foliis fere impetiolatis bijugis obovatis et leniter radiatis, pinnis et ramulis dichotomis. *Brown. jam.* 225.

G. flore coeruleo, fructu subrotundo. *Plum. gen.* 39.

G. jamaicense, foliis velut muria conditis spissius virentibus, flore subcaeruleo. *Pluk. alm.* 180. *t.* 35. *f.* 4.

G. magna matrice. *Bauh. pin.* 448.

Pruno vel Evonymo affinis arbor, folio alato buxeo subrotundo. *Sloan. jam.* 186. *hist.* 2. *p.* 133. *t.* 222. *f.* 3. 4. 5. 6.

Arbor ligni Sancti vel Guajacum. *Seb. thes.* 1. *p.* 86. *t.* 53. *f.* 2. *Blackw. t.* 350. *n.* 1. 2.

Guayacum. *Clus. exot.* 312. 314.

β. Guajacum jamaicense, lentisci subrotundis foliis laete virentibus; flore albo. *Pluk. alm.* 180. *t.* 35. *f.* 3.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 579.

Vierblättriges Franzosenholz. W.

*Habitat in* Hispaniola, Jamaica. ♄ (v. f.)

3. GUAIACUM *sanctum*.

G. foliolis multijugis obtusis. *Mill. dict. n.* 2.

G. foliis pinnatis, foliolis obverse ovatis integerrimis. *Roy. lugdb.* 208.

G. flore coeruleo fimbriato, fructu tetragono. *Plum. gen.* 39.

G. americanum, lentisci folio. *Comm. hort.* 1. *p.* 171. *t.* 88.

G. propemodum sine matrice. *Bauh. pin.* 448.

Jasminum vulgo americanum s. Evonymo affinis occidentalis, alatis ruscifoliis, nucifera, cortice ad genicula fungoso. *Pluk. alm.* 139. *t.* 94. *f.* 4.

Lignum vitae ex Brasilia. *Blackw. t.* 350. *f.* 3. 4.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 581.
Vielblättriges Franzosenholz. W.
*Habitat in* Americes *insula s. Iohannis de Porto Rico.* ♄

## 820. CYNOMETRA.

*Cal.* 4-phyllus. *Antherae* apice bifidae. *Legumen* carnosum, lunatum, 1-spermum.

### 1. CYNOMETRA *cauliflora.*

C. trunco floritero. *Act. upf.* 1741. *p.* 79. *Fl. zeyl.* 166.
Cynomorium. *Rumph. amb.* 1. *p.* 163. *t.* 62. *Burm. ind.* 100.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 583.
Stammblütige Hundsruthe. W.
*Habitat in* India. ♄ (v. f. c. fr.)

### 2. CYNOMETRA *ramiflora.*

C. ramis floriferis. *Act. upf.* 1741. *p.* 79. *Fl. zeyl.* 167.
Cynomorium sylvestre. *Rumph. amb.* 1. *p.* 164. *t.* 63.
Iripa. *Rheed. mal.* 4. *p.* 65. *t.* 31. *Raj. hist.* 1675. *Burm. ind.* 100.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 585.
Astblütige Hundsruthe. W.
*Habitat in* India. ♄

## *821. CRUDIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 711.

*Cal.* monophyllus, limbo 4-fido. *Cor.* o. *Filamenta* basi dilatata. *Samara* subdisperma orbiculata.

### *1. CRUDIA *spicata.*

C. foliis pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis acuminatis. W.
Apalatoa spicata. *Aubl. guj.* 1. *p.* 383. *t.* 147.*
Aehrenblütige Crudie. W.
*Habitat in sylvis* Gujanae. ♄
Folia *alterna pinnata, foliolis alternis glabris.* Racemi *simplices axillares.* W.

*2. CRUDIA *aromatica.*
C. foliis ſimplicibus ellipticis acuminatis. W.
Touchirоa aromatica. *Aubl. guj.* 1. *p.* 385. *t.* 148. *
Gewürzhafte Crudie. W.
*Habitat in ſylvis* Gujanae. ♄
Folia *hujus ſimplicia alterna.* Racemi *ut in praecedente, cui ceterum ſimillima.* W.

## *822. PANZERA. W.

*Eperua Aubl. guj.* 1. *p.* 369.

*Cal.* monophyllus limbo 4-partito. *Petalum* 1, ſubrotundum laterale baſi convolutum. *Filamenta* baſi incraſſata barbata, 5 ſterilia. *Legumen.*

*1. PANZERA *falcata.* W.
Eperua falcata. *Aubl. guj.* 1. *p.* 369. *t.* 142. *
Sichelſaamige Panzere. W.
*Habitat in ſylvis* Gujanae *ad fluviorum ripas.* W.
Arbor *ſexagintapedalis. Folia alterna pari-pinnata, foliolis trijugis ellipticis acuminatis ſubſeſſilibus integerrimis glabris.* Panicula *ſimplex e racemis ſimplicibus valde elongata.* W.
*Genus a Dimorpha* ſtaminibus *et* legumine *aliisque notis diſtinctiſſimum, licet affine.* W.
*Dixi hoc genus in honorem Panzeri, Med. Doct. Norimbergenſis, Botanici multis ſcriptis celebris.* W.

## 823. CODON.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 715.

*Cal.* 10-partitus. *Cor.* campanulata, 10-fida. *Capſ.* polyſperma.

1. CODON *Royeni.*
C. Royeni. *Syſt. nat. ed.* 13. *p.* 292. *Thunb. prod.* 80. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 479.
Royeniſchea Codon. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ☉
Caulis *herbaceus, firmus, cubitalis, teres ramis aſſurgentibus.* Folia *alterna petiolata, cordato-ovata, ſubrepanda, indiviſa, acuminata, ſubcoriacea, gla-*

*bra, ſupra avenia.* Flores *ſupra-axillares, ſolitarii, pedunculati, facie corollae Atropae Belladonnae, albidi, extus notati ſtriis* 10 *purpuraſcentibus.* Herba *tota adſperſa ſtriis. Royen. mſſ.*

## 824. DICTAMNUS.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 726.*

*Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5, patula. *Filamenta* punctis glandulosis adſperſa. *Capſ.* 5, coalitae.

### 1. DICTAMNUS *albus.*

Dictamnus. *Hort cliff.* 161. *Hort. upſ.* 102. *Mat. med.* 113. *Roy. lugdb.* 463. *Sauv. monſp.* 232. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 177. *Scop. carn. n.* 476. *Pollich. pal. n.* 392. *Mill. ic. t.* 123. *Blackw. t.* 75. *Ludw. ect. t.* 10. *Kniph. cent.* 1. *n.* 25. *Hoffm. germ.* 141. *Roth. germ. I.* 180. *II.* 461.

D. albus vulgo Fraxinella. *Bauh. pin.* 222.

Fraxinella. *Reneal. ſpec.* 122. *t.* 121. *Hall. helv. n.* 1029. *Riv. pent. irreg. t.* 132.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 480.

Weiſswurzlicher Diptam. W.

*Habitat in* Germania, Gallia, Italia. ♃ (v. v.)

*Ordo naturalis Rutae communis.*

## *825. NICANDRA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 714.

*Cal.* turbinatus 4-partitus. *Cor.* 1-petala profunde 10-fida. *Filamenta* annulo nectarifero inſerta. *Bacca* ſexſulcata 3-locul. polyſperma.

### *1. NICANDRA *amara.*

Potalia amara. *Aubl. guj.* 1. *p.* 394. *t.* 151.*

Bittrer Männerſieg. W.

*Habitat in* Gujanae *ſylvis.* ♄

Caulis *ligneſus mono-vel tripedalis ſimplex, inferne nudus.* Folia *oppoſita petiolata oblongo-obovata acuminata luteo-viridia venoſa integerrima glabra.* Petioli *baſi vaginati connati.* Corymbus *pauciflorus terminalis.* Calyx *luteus.* Corolla *alba.* W.

## *826. PETALOMA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 1750.

*Cal.* urceolatus 5-dentatus. *Petala* 5, calyci inſerta. *Stamina* margini calycis inſidentia. *Bacca* 1-locularis.

### *1. PETALOMA *myrtilloides.*

P. pedunculis ſolitariis unifloris, foliis ſubſeſſilibus ovatis attenuatis baſi obliquis. *Swartz prod.* 73. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 833. *

Myrti folio arbor cortice argenteo, foliis oblongis ad baſin latioribus acuminatis inodoris, ex adverſo ſitis, flore pentapetaloide pallide albicante. *Sloan. cat. p.* 162. *hiſt.* 2. *p.* 78. *t.* 187. *f.* 3.

Arbor foliis cordatis myrtineis oppoſitis, baccis diſpermis. *Brown. jam.* 370.

Myrtenblättrige Randblume. W.

*Habitat in ſylvis depreſſis* Hiſpaniolae, Jamaicae. ♄

### *2. PETALOMA *Muriri.*

P. pedunculis confertis axillaribus, foliis petiolatis ovatis acuminatis, baccis tetraſpermis. *Swartz prod.* 73. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 835. *

Mouriri gujanenſis. *Aubl guj.* 1. *p.* 453. *t.* 180. *

Langzugeſpitzte Randblume. W.

*Habitat in ſylvis* Gujanae. ♄

## 827. RUTA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 725.

*Cal.* 5-partitus. *Petala* concava. *Receptac.* punctis melliferis decem cinctum. *Capſ.* lobata.

* *Quinta pars numeri in quibusdam excluditur.*

### 1. RUTA *graveolens.*

R. foliis ſupradecompoſitis, foliolis oblongis, terminali obovato, petalis integerrimis. W.

R. foliis decompoſitis, floribus lateralibus quadrifidis. *Hort. cliff.* 145. *Hort. upſ.* 102. *Mat. med.* 113. *Roy. lugdb.* 461. *Scop. carn. n.* 477. *Ludw. ect. t.* 20. *Blackw. t.* 7. *Kniph. cent.* 3. *n.* 79. *Willd. arb.* 330. *

R. foliis duplicato-pinnatis, lobulis ovatis. *Hall. helv. n.* 1003.
R. ſylveſtris major. *Bauh. pin.* 336. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 507. *ſ.* 5. *t.* 14. *f.* 3. *Du Ham.* 2. *ic.* 61.
β. Ruta hortenſis latifolia. *Bauh. pin.* 336.
R. (*hortenſis*) foliis decompoſitis, floribus octandris, ſtaminibus corolla longioribus. *Mill. dict. n.* 1. R.
R. graveolens hortenſis. *Dod. pempt.* 119.
γ. Ruta hortenſis latifolia arbuſculae ſimilis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 260.
R. africana maxima. *Swert. hort.* 24.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 535.
Gemeine Raute. W.
*Habitat in* Europae *auſtralis*, Alexandriae, Mauritaniae, Helvetiae *ſterilibus*. ♄ (v. v.)
Flos *primarius* 5-*fidus*, *reliqui quadrifidi*. Paniculae *rami primi bipartiti*, *reliqui flores alterni*.

*2. RUTA *montana*.
R. foliis ſupradecompoſitis, foliolis omnibus linearibus, petalis integerrimis. W.
R. (*montana*) foliis ſupradecompoſitis, laciniis linearibus, petalis imberbibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 57.
R. (*montana*) foliis bipinnatis linearibus, floribus ſpicatis ſecundis, ſpicis divaricato-corymboſis. *Loefl. it.* 140. *
R. (*legitima*) foliolis linearibus acutis, petalis erectis imberbibus. *Jacq. ic. rar.* 1. *t.* 76. *collect.* 1. *p.* 74. *
R. (*legitima*) foliolis linearibus acutis, petalis adunco-roſtratis imberbibus, ſtipulis trifidis ariſtatis. *Allion. pedem. n.* 1023. *
R. (*ſylveſtris*) foliis inferioribus decompoſitis, ſummis quinquefidis trifidisque. *Mill. dict. n.* 3.
R. foliis duplicato-pinnatis linearibus, lanceolatis. *Hall. helv. n.* 1004.
R. ſylveſtris minor. *Bauh. pin.* 336. *Cam. epit.* 495.
R. montana legitima. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 136.
R. minor. *Tabern.* 134.
Berg Raute. W.
*Habitat in collibus* Helvetiae, Aquitaniae, Hiſpaniae *et* Luſitaniae. ♄ (v. l.)

3. RUTA *chalepenſis*.
R. foliis ſupradecompoſitis oblongis, terminali obovato, petalis ciliato-dentatis. W.

R. foliis ſupradecompoſitis, petalis ciliatis. *Mant.* 69.

α. R. chalepenſis latifolia, petalis villis ſcatentibus. *Tourn. inſt.* 257.

β. R. chalepenſis anguſtifolia, petalis villis ſcatentibus. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 508. *ſ.* 5. *t.* 35. *f.* 8.

R. (*chalepenſis*) foliis decompoſitis, floribus decandris, petalis ciliatis. *Mill. dict. n.* 5. R.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 537.

Aleppiſche Raute. W.

*Habitat in* Arabia. ♄ (v. v.)

*Simillima* R. graveolenti *ejusque progenies.* Primi *flores* 5-*fidi*, *reliqui* 4-*fidi.* Petala *concava*, *margine neque undulata*, *ut in* R. graveolente, *ſed* Caulis *altior*; Petala *margine ciliata*; Capſulae *lobi acuti*, *obtuſi.*

*Differt* β. Petalorum *unguibus longioribus*, Capſulae*que lobis approximatis*, *nec diſtantibus.* H. V.

4. RUTA *pinnata.*

R. foliis pinnatis, foliolis lanceolatis baſi attenuatis ſerrato-crenatis, petalis integerrimis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 58.

R. foliis pinnatis trijugis, foliolis lanceolatis, impari ſerrato, petalis planis ſubcrenulatis. *Lin. ſuppl.* 232.

Gefiederte Raute. W.

*Habitat in* Canariis *ad rupes circa* Puerto de la Orotava. *Fr. Maſſon.* ♄ (v. ſ.)

Caulis *ut in reliquis ſpeciebus.* Folia *pinnata trijuga cum impari.* Foliola *lateralia oppoſita linearia integra ſ. crenulata punctata.* Foliolum impar *ſubovatum ſerratum.*

5. RUTA *patavina.*

R. foliis ternatis ſeſſilibus linearibus integerrimis, baſi attenuatis. W.

R. foliis ternatis ſeſſilibus. *Sp. pl.* 549. *Mill. dict. n.* 8.

Pſeudo-Ruta patavina trifolia, floribus luteis umbellatis. *Mich. gen.* 22. *t.* 19.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 538.

Dreyblättrige Raute. W.

*Habitat prope* Patavium. ♃

Petala *plana*, *integra.*

6. RUTA *linifolia.*

R. foliis ſimplicibus lanceolatis glabris, filamentis ciliatis, caule ſimplici herbaceo. W.

R. foliis lanceolatis, indiviſis. *Sp. pl.* 549. *Mill. dict. n.* 6.

R. foliis ſimplicibus ſolitariis. *Hort. cliff.* 146.
R. ſylveſtris linifolia hiſpanica. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 82. *t.* 73. *Barr. ic.* 1186.
*β.* Ruta montana, foliis integris ſubrotundis. *Buxb. cent.* 2. *p.* 30. *t.* 28. *f.* 2.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 538.
Flach-blättrige Raute. W.
*Habitat in* Hiſpania, *β. in* Rodaſtro. ♃ (v. ſ.)

*Paniculae rami laterales bifidi, triflori, flore intermedio ſeſſili. Petala* 5, *ſeſſilia, integra, ovata. Filamenta baſi piloſa arcte includunt receptaculum poris melliferis pertuſum. Pericarpia punctis elevatis.*

*Planta Buxbaumii non eſt diverſa ab hiſpanica.* W.

*7. RUTA *fruticuloſa.*

R. foliis ſimplicibus lineari-ſpathulatis pubeſcentibus, filamentis lanatis, caule ramoſo fruticoſo. W.
R. (*fruticuloſa*) foliis integris ſeſſilibus ovato-lanceolatis, ramisque piloſis. *Billard. pl. ſyr. dec.* 1. *p.* 15. *t.* 4. *
R. orientalis linariae folio, flore parvo. *Tournef. cor.* 19. *Buxb. cent.* 2. *p.* 30. *t.* 28. *f.* 1.
Kleinblütige Raute. W.
*Habitat in* Media, *inque* Syria *prope* Damaſcum. ♄ (v. ſ.)

Filamenta *dilatata baſi valde ſunt lanata.* Flores *duplo minores praecedente, et* petala *magis unguiculata.* W.

## 828. TOLUIFERA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 713.

*Cal.* 5-dentatus, campanulatus. *Petala* 5, infimo maximo, obcordato. *Stylus* nullus.

1. TOLUIFERA *Balſamum.*

Toluifera. *Mat. med.* 114. *Mill. dict.*
Balſamum Tolutanum, foliis ceratiae ſimilibus. *Bauh. pin.* 401.
Balſamum provinciae Tolu, Balſamifera quarta. *Hernand. mex.* 53.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 587.
Americaniſcher Tolubaum. W.
*Habitat in* America *prope* Carthagenam. ♄

## 829. MYROXYLON.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 709.

*Cal.* campanulatus 5-dentatus. *Petala* 5, ſupremo reliquis majore. *Germen* corolla longius. *Legumen* apice monoſpermum!

### 1. MYROXYLON *peruiferum.*

M. foliis abrupte pinnatis bijugis, foliolis ſuboppoſitis. W.
Myroxylon peruiferum. *Lin. ſuppl.* 233.
Hoitziloxitl. *Hern. mex. p.* 51. *cum figura ſatis bona.*
Cabureiba. *Piſo braſ.* 57. 119. *absque figura.*
Wohlriechendes Balſamholz. W.
*Habitat in calidiſſimis provinciis* Terrae Firmae Americae meridionalis. *Mutis.* ♄

Arbor *pulcherrima, cortice laevi craſſo valde reſinoſo, ut omnes arboris partes.* Folia *alterna abrupte pinnata.* Foliola *bijuga ſuboppoſita petiolata ovato-lanceolata, apice producto obtuſo emarginato, integra venoſa glaberrima.* Rachis *per longitudinem inferioris paginae folii currens elevata pubeſcens.* Petiolus *communis teres pubeſcens.* Racemi *axillares erecti ſecundi, foliis longiores, pedunculo teretiuſculo pubescente, floribus ſparſis.* Bractea *ſingulum pedunculum ſuffulciens minima ovata erecta concava, nudo oculo tuberculum referens.* Pedicelli *erecti.* Calyx *campanulatus viridi-caneſcens, cinctus extra orificium petalis antherisque albis, intra continens legumen viride, quod in flore ſingularem faciem repraeſentat.* Foliorum *ſubſtantia plena punctis linearibus translucentibus reſinoſis, ut folia Citri.*

*Ex hac arbore venit Balſamum peruvianum.* W.

### *2. MYROXYLON *pedicellatum.*

M. foliis impari pinnatis ſubquinquejugis, foliolis alternis, legumine pedicellato. W.
Myroſpermum (*pedicellatum*) leguminibus pedicellatis. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 181. * *illuſt. gen. t.* 341. *f.* 1.
Myroſpermum. *Iuſſ. gen. ed. Uſt. p.* 403.
Geſtieltes Balſamholz. W.
*Habitat in* Peru. ♄

Folia *quadri-ſ. quinquejuga.* W.

### *3. MYROXYLON *fruteſcens.*

M. foliis impari-pinnatis ſeptemjugis, foliolis alternis, legumine ſeſſili. W.

Myrospermum (*frutescens*) leguminibus sessilibus. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 181. * *illust. gen. t.* 341. *f.* 2.
Myrospermum frutescens. *Iacq. amer.* 120. *t.* 174. *f.* 34.
Strauchartiges Balsamholz. W.
*Habitat in* Carthagenae *fruticetis.* ♄
Legumen *hujus in calyce est sessile. Diversissima a praecedente*: foliis *et* legumine. W.
*Clariss. Lamarck hanc speciem non a M. pernifero diversam esse credit, sed dissuadent: descriptiones Iacquini et Linnaei, ut et balsamum hujus foetidum.* W.

## 830. HAEMATOXYLON.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 708.

*Cal.* 5-partitus. *Pet.* 5. *Caps.* lanceolata, 1-locularis, 2-valvis: valvis navicularibus.

1. HAEMATOXYLON *campechianum.*
Haematoxylum. *Hort. cliff.* 160. *Roy. lugdb.* 465. *Mat. med.* 114. *Mill. dict. Iacq. obs.* 1. *p.* 20.
H. spinosum, foliis pinnatis, racemis terminalibus. *Brown. jam.* 1. *p.* 221.
Lignum campechianum, species quaedam. *Sloan. jam.* 213. *hist.* 2. *p.* 183. *t.* 10. *f.* 1. 2. 3. 4. *Catesb. car.* 3. *p.* 66. *t.* 66.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 590.
Westindisches Blutholz. W.
*Habitat in Campeche* Americes. ♄ (v. s.)
Tabula *Blackw.* 493. *non huc pertinet, monente* Iacquino. R.

## 831. PROSOPIS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 706.

*Cal.* hemisphaericus, 4-dentatus. *Stigma* simplex. *Legumen* polyspermum.

1. PROSOPIS *spicigera.*
Prosopis. *Mant.* 68. *Burm. ind.* 102. *t.* 25. *f.* 3. *Roxb. corom.* 1. *p.* 45. *t.* 63. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 593.
Aehrentragende Prosopis. W.
*Habitat in* India. ♄
Arbor. Folia *alterna conjugata: foliolis pinnatis, octojugis sine impari, Tamarindi similibus, pinnis ob-*

*longis obtusis.* Spicae *angustae, longae, terminales et axillares.* Flores *parvi.*

## *832. CADIA.

*Forsk. descr.* 90.

*Cal.* 5-fidus. *Petala* 5 aequalia obcordata. *Legumen* polyspermum. W.

### *1. CADIA *purpurea.*

C. purpurea. *Forsk. descript. p.* 90. * *Ait. Kew. 3. p.* 492. *l'Herit. in Magaz. encycl. 5. p.* 29. *

Panciatica purpurea. *Piccivoli hort. panciat. 9. cum fig.*

Spaendoncea tamarindifolia. *Desfont. in Decad. philos. polit. et litter. 7. p.* 259. *

Rothe Cadie. W.

*Habitat in* Arabia *felici.* ♄

Rami *griseo-virescentes teretes propendentes, juniores lanugine pubescentes.* Folia *alterna impari-pinnata, foliolis numerosissimis parvis oblongis obtusis sessilibus glabris.* Petiolus *pubescens.* Pedunculi *solitarii axillares bi-vel triflori.* Flores *nutantes.* Corolla *recens alba dein rosea.* W.

## 833. MURRAYA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 717.*

*Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala campanulata. *Nectar.* germen cingens. *Bacca* 1-sperma.

### 1. MURRAYA *exotica.*

M. exotica. *Mant.* 563. *Murr. commentar. goett. 9. p.* 186. *t.* 1. *

Chalcas paniculata. *Mant.* 68.

Chalcas Cammuneng. *Burm. ind.* 104.

Marsana buxifolia. *Sonnerat. it. 2. p.* 192. *t.* 139.

Cammunium. *Rumph. amb. 5. p.* 29. *t.* 18. *f.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 3. p.* 539. 541. *t.* 24. *f.* 2.

Indische Murraye. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄ *Koenig.* (v. s.)

Arbor *inter minores, cortice albicante, facie Schini.* Folia *alterna, petiolata, rigidula, pinnata impari.* Foliola 7, *petiolulata, alterna, obovata, glabra, obtusiuscula.*

## 834. BERGERA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 718.

*Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Stigma* turbinatum. *Bacca* 2-ſperma.

### 1. BERGERA *Koenigii.*

B. Koenigii. *Mant.* 563.
Papaja ſylveſtris. *Rumph. amb.* 1. *p.* 149. *tab.* 53. *f.* 1. W.
Königſche Bergere. W.
*Habitat in* India *orientali.* *Koenig.* ♄ (v. ſ.)

Arbor *frondoſa, cortice Alni.* Folia *alterna, petiolata, pinnata impari.* Foliola *alterna, petiolulata, ovato-lanceolata, rhomboidea, latere altero anguſtiora, glabra; latere antico ſubſerrata.* Corymbi *terminales compoſiti, foliis breviores, patentes.* Bracteae *pedicellis adpreſſae, ſolitariae, lanceolatae, parvae, caducae.* Racemi *erecti pedicellis teretiuſculis, brevibus;* Bracteae *lanceolatae, perſiſtentes.*

## *835. EKEBERGIA.

*Gen. pl. edit. Schreb. n.* 719.

*Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-petala. *Nectar.* annulus germen cingens. *Bacca* 5-ſperma.

### *1. EKEBERGIA *capenſis.*

E. capenſis. *Sparrman Act. holm.* 1779. *p.* 252. *t.* 9. * *Thunb. Diſſ. nov. pl. gen.* 2. *p.* 44. * *Thunb. prod. p.* 79.
Capiſche Ekebergie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in ſylvis* Hauteniquas *inque ſylva* Eſſenboſch *infra* Longkloff. ♄

Arbor *procera cortice cinereo.* Folia *alterna abrupte pinnata, rarius impari-pinnata, quadri ſ. ſexjugis foliolis ovato-lanceolatis integerrimis venoſis, glabris ſeſſilibus.* Rachis *foliorum triquetra ſubalata.* Panicula *axillaris corymboſa foliis multoties brevior.* Pedicelli *ut calyces extus lanati.* W.

## 836. ADENANTHERA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 707.

*Cal.* 5-dentatus. *Petala* 5. *Antherae* apice exteriore glandulae globosae affixae. *Legumen* membranaceum.

### 1. ADENANTHERA *pavonina.*

A. foliis decompositis utrinque glabris. *Roy. lugdb.* 462. *Vir. cliff.* 36. *Fl. zeyl.* 160. * *Burm. ind.* 100. *Mill. dict. Iacq. collect.* 4. *p.* 212. *t.* 23. *

Poinciana foliis duplicato-pinnatis: foliolis alternis. *Hort. cliff.* 158.

Coralaria parvifolia. *Rumph. amb.* 3. *p.* 173. *t.* 109.

Mandsiadi. *Rheed. mal* 6. *p.* 25. *t.* 14. *Raj. hist.* 1752. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 594.

Glattblättrige Drüsenblume. W.

*Habitat in* India. ♄ (v. s.)

### 2. ADENANTHERA *falcata.*

A. foliis decompositis subtus tomentosis. *Sp. pl.* 550.

Clypearia alba. *Rumph. amb.* 3. *p.* 176. *t.* 111. *Burm. ind.* 101.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 596.

Haarige Drüsenblume. W.

*Habitat in* India. ♄

### *3. ADENANTHERA *scandens.* †

A. foliis pinnatis bijugis, foliolis ovatis obliquis glabris, cirrhis terminalibus bifidis. *Forst. prod. n.* 187.

Kletternde Drüsenblume. W.

*Habitat in insula* Mallicollo. ♄

## *837. GAERTNERA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 735.

*Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala lacero-ciliata. *Filamenta* basi leviſſime cohaerentia, cum reliquis longius. *Samara* monosperma qradrialata, alis inaequalibus.

### 1. GAERTNERA *racemosa.*

G. racemosa. *Roxb. corom.* 1. *p.* 19. *t.* 18. *

Molina (*racemosa*) foliis ovato-lanceolatis, floribus racemosis terminalibus. *Cavan. Diss.* 9. *p.* 435. *t.* 263. *

Hiptage Madablota. *Gaert. sem.* 2. *p.* 169. *t.* 116.

Madablota. Baniſteria tetraptera. *Sonnerat. it.* 2. *p.* 238. *t.* 135. *

Baniſteria (*benghalenſis*) foliis ovato-oblongis acuminatis, racemis lateralibus, ſeminibus patentibus. *Sp. pl.* 611. *Fl. zeyl.* 176. * *Mill. dict. n.* 5.

Baniſteria (*unicapſularis*) *foliis* ovato-lanceolatis acuminatis, racemis terminalibus, capſulis ſolitariis polypteris. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 363. *

Acer benghalenſis laurinis foliis, fructu tergemino. *Pluk. alm.* 7. *t.* 3. *f.* 1. *mala.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 593.

Traubenblütige Gärtnere. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄ (v. f.)

## *838. STRIGILIA.

*Cavan. diſſ.* 7. *p.* 358.

*Cal.* 5-dentatus. *Cor.* profunde 5-partita. *Nectarium* profunde 10-partitum, laciniis lanceolatis. *Antherae* ſeſſiles in nectarii laciniis. *Fructus* 6-locularis?

### *1. STRIGILIA *racemoſa.*

S. racemoſa. *Cavan. Diſſ.* 7. *p.* 358. *t.* 201. *

Traubenblütige Strigilie. W.

*Habitat in* Peru. ♄

Rami *rufo-tomentoſi.* Folia *alterna petiolata elliptica acuta integerrima, ſupra glabra, infra rufo-tomentoſa.* Racemi *axillares.* W.

## *839. GILIBERTIA.

*Gmel. ſyſt. nat. p.* 682.

*Cal.* 4-5-dentatus. *Cor.* 4-5-petala. *Nectar.* cylindricum truncatum. *Antherae* margini nectarii inſertae. *Capſ.* 4-locul. loculis ſubmonoſpermis.

### *1. GILIBERTIA *decandra.*

G. foliis alternis oblongis integris utrinque attenuatis, racemis axillaribus. W.

Quivilia (*decandra*) foliis alternis lanceolatis glabris integerrimis, floribus axillaribus racemoſis. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 367. *t.* 211. *

Zehnfädige Gilibertie. W.

*Habitat in insula* Mauritii. ♄

*2. GILIBERTIA *ovata.*

G. foliis alternis obovatis obtusis integris, pedunculis unifloris axillaribus, fructibus tomentosis. W.

Quivisia (*ovata*) foliis ovatis alternis integerrimis, floribus subsessilibus axillaribus binis aut pluribus. *Cavan. diss. 7. p. 368. t. 212.* *

Eyförmige Gilibertie. W.

*Habitat in insula* Borbonia. ♄

*3. GILIBERTIA *heterophylla.*

G. foliis alternis obovatis integris sinuatisque, pedunculis unifloris axillaribus, fructibus glabris. W.

Quivisia (*heterophylla*) foliis ovatis integris aut pinnatifidis, floribus axillaribus binis. *Cavan. diss. 7. p. 368. t. 213. f. 1. 2.* *

Verschiedenblättrige Gilibertie. W.

*Habitat in insula* Borbonia. W.

*Forte tantum varietas praecedentis.* W.

*4. GILIBERTIA *oppositifolia.*

G. foliis oppositis ellipticis obtusiusculis integris, pedunculis axillaribus trifloris. W.

Quivisia (*oppositifolia*) foliis oppositis ovatis integerrimis glabris, floribus axillaribus, pedunculis trifloris. *Cavan. diss. 7. p. 368. t. 214.* *

Paarblättrige Gilibertie. W.

*Habitat in insula* Mauritii. ♄

## 840. TRICHILIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 721.*

*Cal.* sub 5-dentatus. *Petala* 5. *Nectarium* dentatum cylindricum, in apice dentium Antheras gerens. *Caps.* 3-locularis, 5-valvis. *Sem.* baccata.

1. TRICHILIA *hirta.*

T. foliis pinnatis, foliolis paucioribus ellipticis acuminatis glabris, racemis confertis. *Swartz obs. 171.*

T. foliis pinnatis subhirsutis. *Sp. pl. 550.*

T. subhirsuta, foliis pinnatis ovatis, racemis alaribus. *Brown. jam. 278.*

Pruno forte affinis arbor, folio alato, flore herbaceo pentapetalo racemoso. *Sloan. hist. 2. t. 220. f. 1.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 1. p. 598.*

Rauhblättrige Trichilie. W.
*Habitat in* Jamaica. ♄

*2. TRICHILIA *spondioides.*
T. foliis impari-pinnatis subhirsutis, pinnis numerosis, inferioribus majoribus, racemis axillaribus. *Swartz prod.* 67. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 730. *.
T. (*spondioides*) racemis axillaribus, foliis pinnatis, foliolis intermediis majoribus. *Iacq. amer.* 128. *hort. Schoenb.* 1. *p.* 54. *t.* 102.
Evonymus caudice non ramoso, folio alato, fructu rotundo tripyreno. *Sloan. jam.* 171. *hist.* 2. *p.* 103. *t.* 210. *f.* 2. 3. *Raj. hist.* 3. *dendr. p.* 70.
Myrobalanenartige Trichilie. W.
*Habitat in sylvaticis montosis* Jamaicae, Hispaniolae. ♄

*5. TRICHILIA *emetica.*
T. foliis pinnatis subtus villosis, foliolis ellipticis. *Vahl. symb.* 1. *p.* 31. *
Elcaja. *Forsk. descr.* 127.
Brechenmachende Trichilie. W.
*Habitat in montibus* Arabiae *felicis.* ♄

4. TRICHILIA *glabra.*
T. foliis pinnatis glabris, foliolis extimis majoribus. *Syst. nat.* 13. *p.* 294.
T. havanensis. *Iacq. amer.* 129. *n.* 2. *t.* 175. *f.* 38. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 600.
Glatte Trichilie. W.
*Habitat ad* Havanam *in sylvis montosis.* ♄

*5. TRICHILIA *pallida.*
T. foliis impari-pinnatis membranaceis, racemis axillaribus terminalibusque, floribus octandris, capsulis bivalvibus. *Swartz prod.* 67. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 733. *
Portesia (*ovata*) foliis pinnatis cum impari, foliolis obovatis, floribus glomerato-racemosis. *Cavan. diss.* 7. *p.* 369. *t.* 215. *
Bleiche Trichilie. W.
*Habitat in fruticetis montosis* Hispaniolae. ♄

*6. TRICHILIA *moschata.*
T. foliis alternatim pinnatis, racemis axillaribus, floribus subdecandris monopetalis, capsulis monospermis. *Swartz prod.* 67. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 735. *
Bisamduftende Trichilie. W.
*Habitat in* Jamaicae *borealis sylvis vetustis.* ♄

*7. TRICHILIA *ſpectabilis.*
T. foliis pinnatis, foliolis obovatis, racemis axillaribus compoſitis. *Forſt. prod. n.* 188.
Anſehnliche Trichilie. W.
*Habitat in* Nova Zeelandia. ♄

*8. TRICHILIA *alliacea.*
T. foliis pinnatis, foliolis lanceolatis acutis, racemis axillaribus ſupradecompoſitis. *Forſt. prod. n.* 189.
Knoblauchduftende Trichilie. W.
*Habitat in inſula* Namoka. ♄

*9. TRICHILIA *heterophylla.* W.
T. foliis pinnatis ternatisque, foliolis ovatis acuminatis, racemis axillaribus, floribus octandris. W.
Porteſia (*mucronata*) foliis ternatis aut quinato-pinnatis, foliolis glabris mucronatis, racemulis florum axillaribus. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 370. *t.* 216. *
Verſchiedenblättrige Trichilie. W.
*Habitat in* Madagaſcar. ♄

10. TRICHILIA *trifoliata.*
T. foliis ternatis, foliolis obovatis nitidis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 31.
T. foliis ternatis. *Sp. pl.* 551. *Iacq. amer.* 129. *t.* 82.
T. Haleſia. *Loeſl. it* 188. *
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 1. *p.* 601.
Dreyblättrige Trichilie. W.
*Habitat in* America *meridionali.* ♄

*11. TRICHILIA *nervoſa.*
T. foliis ternatis, foliolis ovatis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 31. *
Melia (*Koetjape*) foliis ternatis. *Burm. ind.* 101. *excluſ. ſynonymo.*
Nervenblättrige Trichilie. W.
*Habitat in* Java. ♄

*12. TRICHILIA *ſpinoſa.* W.
T. foliis ſimplicibus ovatis emarginatis, ramis ſpinoſis. W.
Turraea virens. *Hellenius Act. holm.* 1788. *p.* 294. *t.* 10. *f.* 1. * *bona.*
Dornige Trichilie. W.
*Habitat in* India *orientali.* ♄ (v. ſ.)
Fructus *hujus plantae eſt* bacca *trilocularis, loculis monoſpermis ut ipſe obſervavi et amicus meus indicus D. Klein adnotavit. Medium itaque tenetinter Trichiliam et Limoniam.* Rami *ſunt ſpinoſi.* W.

## 841. TURRAEA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 722.

*Cal.* 5-dentatus. *Petala* 5. *Nectar.* dentatum cylindricum ore inter dentes antheras gerens. *Capſ.* 5-cocca. *Sem.* bina.

### 1. TURRAEA *virens.*

T. foliis elliptico-lanceolatis emarginatis glaberrimis, calycibus fructibusque ſericeo-villoſis. *Smith ic. ined.* 1. *p.* 10. *t.* 10. *

Turraea virens. *Mant.* 237.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 580.
Glänzende Turraea. W.
*Habitat in* Indiae *orientalis acervis ſcoriarum ad montes quondam ardentes.* ♄ *Koenig.*

Arbor *ſaturate virens, facie Quisqualis.* Folia *alterna, petiolata, elliptico-lanceolata, integerrima, emarginata, laevia, ſubtus pallidiora.* Petioli *breviſſimi.* Stipulae *nullae.* Flores *laterales, axillares, flavi, congeſti in ſpicam minimam, foliolis aliquot parvis interſtincti.*

### *2. TURRAEA *pubeſcens.* †

T. foliis ovatis emarginatis ſubtus pubeſcentibus, calycibus villoſis. W.

T. foliis ovatis integris emarginatisve membranaceis pubeſcentibus, floribus umbellatis. *Hellen. Act. holm.* 1788. *p.* 296. *t.* 10. *f.* 3. *

Behaarte Turraea. W.
*Habitat in inſula* Hainam. ♄
Fructus *adhuc ignotus.* W.

### *3. TURRAEA *maculata.*

T. foliis ovatis acutis glabris, calycibus ciliatis. W.

T. (*maculata*) foliis nudis, calycibus glabris ciliatis. *Smith ic. ined.* 1. *p.* 11. *t.* 11. *

T. (*glabra*) foliis ovato-lanceolatis glabris acutis, petiolis longiſſimis glabris. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 360. *t.* 204. *

Gefleckte Turraea. W.
*Habitat in* Madagaſcar. ♄

### *4. TURRAEA *ſericea.*

T. foliis ovatis obtuſiuſculis utrinque tomentoſis, calycibus pedunculis petalisque villoſis. W.

T. (*fericea*) foliis utrinque villoſis, calycibus pedunculisque tomentoſis. *Smith ic. ined.* 1. *p.* 12. *t.* 12. *

T. (*tomentoſa*) foliis ovatis integerrimis tomentoſis, petalis longiſſimis villoſis. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 361. *t.* 205. *f.* 2. *

Seidenartige Turraea. W.
*Habitat in* Madagaſcar. ♄

*5. TURRAEA *lanceolata.*

T. foliis lanceolatis utrinque rotundatis glabris, laciniis calycinis longiſſimis lanceolatis. W.

T. foliis alternis lanceolatis coriaceis glabris, pedunculis axillaribus ſubbifloris. *Cavan. Diſſ.* 7. *p.* 361. *t.* 205. *f.* 1. *

Lanzettenblättrige Turraea. W.
*Habitat in* Madagaſcar. ♄

## *842. SANDORICUM.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 1751.

*Cal.* 5-dentatus. *Petala* 5. *Nectar.* cylindricum truncatum ore antheras gerens. *Drupa* nucibus 5 foeta.

### *1. SANDORICUM *indicum.*

S. indicum. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 357. *t.* 202. 203. * *Lamarck encycl.* 3. *p.* 66. *
Hantol. *Raj. ſuppl. p.* 54.
Sandoricum. *Rumph. amb.* 1. *p.* 167. *t.* 64?
Indiſches Sandoricum. W.
*Habitat in* Philippinis *et* Moluccis. ♄

Arbor *cortice cinereo ligno centro rubro.* Folia *alterna longe petiolata ternata.* Foliola *petiolata ſubrotundo-ovata acuminata venoſa integerrima, ſuperne glabra, inferne ferrugineo-tomentoſa.* Petioli *tomentoſi.* Panicula *anguſta axillaris petiolo longior nuda.* Valde *affine Trichiliae nervoſae, ſed differre videtur:* foliis *ſupra non aveniis et* panicula *nuda nec foliolo lanceolato ad ſingulum ramum inſtructa.* W.

## 843. SWIETENIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 723.

*Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Nectar.* cylindricum ore antheras gerens. *Capſ.* 5-locularis, lignoſa, baſi dehiſcens. *Sem.* imbricata, alata.

### 1. SWIETENIA *Mahagoni.*

S. foliis pinnatis ſubquadrijugis, foliolis ovato-lanceolatis baſi aequalibus, paniculis axillaribus. W.

S. foliis abrupte pinnatis, pinnulis ovato-lanceolatis obliquis, floribus racemoſis minimis. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 365. *t.* 209. *

Swietenia. *Sp. pl.* 548. *Iacq. amer.* 127.
Cedrus Mahagoni. *Mill. dict. n.* 2.
Cedrela foliis pinnatis, floribus ſparſis, ligno odorato. *Brown. jam.* 158.
Arbor foliis pinnatis nullo impari: nervo ad latus. *Catesb. car.* 2. *p.* 81. *t.* 81.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 1. *p.* 603.
Gemeiner Mahagonibaum. W.
*Habitat in* America *meridionali.* ♄ (v. ſ. ſ. ſ.)

*Affinitate proxima jungitur Cedrelae.*

### *2. SWIETENIA *febrifuga.*

S. foliis pinnatis ſubquadrijugis, foliolis elliptico-ſubrotundis emarginatis, baſi inaequalibus, panicula terminali divaricata. W.

Swietenia febrifuga. *Roxb. corom.* 1. *p.* 18. *t.* 17. *
Fieberrinden Mahagonibaum. W.
*Habitat in montibus* Indiae *orientalis.* ♄

### *3. SWIETENIA *Chloroxylon.*

S. foliis pinnatis multijugis, foliolis dimidiato-cordatis obtuſis, panicula terminali patenti. W.

Swietenia Chloroxylon. *Roxb. corom.* 1. *p.* 46. *t.* 64. *
Grünholziger Mahagonibaum. W.
*Habitat in montibus* Indiae *orientalis.* ♄

## *844. COOKIA.

*Retz. obf. 5. p. 29.*

*Cal.* 5-fidus, inferus. *Cor.* 5-petala aequalis. infera. *Pomum* 5-loculare; loculis 1-ſpermis.

### *1. COOKIA *punctata.*

C. punctata. *Sonnerat it. 2. p. 181. t. 130.* * *Retz. obſ. bot. 6. p. 29.* * *Iacq. hort. Schoenb. 1. p. 53. t. 101.* *

Quinaria Lanſium. *Loureiro cochin. p. 334.* *

Punktirte Cookie. W.

*Habitat in* China *auſtrali.* ♄ (v. ſ. ſ. ſ.)

Arbor *trunco fuſceſcente ſtriato verrucoſo.* Ramuli *teretes virides ut petioli et pedunculi communes paniculae verrucis parvis punctati.* Folia *alterna impari-pinnata.* Foliola *petiolata alterna ovata acuminata integerrima, interiore latere anguſtiora glabra.* Panicula *vaſta divaricata terminalis.* Flores *albi.* W.

## 845. MELIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n. 724.*

*Cal.* 5-dentatus. *Petala* 5. *Nectarium* cylindraceum dentatum fauce, *Antheras* gerens. *Drupa* nuce quinqueloculari.

### 1. MELIA *Azedarach.*

M. foliis bipinnatis, foliolis laevibus ſubquinatis. W.

M. foliis bipinnatis. *Fl. zeyl.* 162. * *Gron. orient.* 133. *Mill. dict. n.* 1. *Kniph. cent. 2. n.* 44. *Cavan. diſſ. 7. p. 363. t. 207.* *

M. foliis decompoſitis. *Hort. cliff.* 161. *Roy. lugdb.* 462.

Azedarach. *Dod. pempt.* 848. *Burm. zeyl.* 40. *Herm. lugdb.* 652. *Raj. hiſt.* 1546.

Arbor fraxini folio, flore caeruleo. *Bauh. pin.* 415.

Pſeudo-Sycomorus. *Cam. epit.* 181.

Azadirachta indica, foliis ramoſis minoribus, flore albo ſubcaeruleo purpuraſcente majore. *Comm. hort. 1. p. 147. t. 76.*

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 1. p.* 608.

Glatter Zedrach. W.

*Habitat in* Syria, Zeylona. ♄ (v. v.)

*2. MELIA *sempervirens.*
M. foliis bipinnatis, foliolis rugosiusculis subseptenis.
*Swartz prod.* 67. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 737. *
Melia Azedarach β. *Sp. pl.* 550.
Azedarach sempervirens et florens. *Tournef. inst.* 616.
Immergrüner Zedrach. W.
*Habitat in sepibus* Jamaicae. ♄ (v. s.)

*A M. Azedarach distincta est, non pro varietate aestimari debet. Differt enim ab illa, quod tota* planta *minor et saepe floret biennis, quod* foliola *laete viridia raro plus quam 7 rugosiuscula profundius et magis inaequaliter serrata et acuminata.* Swartz obs. 181.

*3. MELIA *composita* W.
M. foliis pinnatis, foliolis infimis ternatis, pedunculis, calycibus, corollisque tomentosis. W.
Behaarter Zedrach. W.
*Habitat in* India *orientali.* ♄ (v. s.)

Ramuli *nigricantes teretes crassi rugoso-striati a casu foliorum cicatrisati.* Ramuli *juniores teretes tomentosi et tantum foliis instructi.* Folia *alterna longe petiolata impari-pinnata.* Foliola *petiolata utrinque glabra ovata acuminata venosa remote et obtuse dentata, basi integerrima, inferiora ternata.* Folia *juniora utrinque pubescentia.* Petioli *subpubescentes praesertim basin versus.* Paniculae *corymbosae multiflorae axillares pedunculatae foliis breviores.* Pedunculi *teretes pubescentes.* Calyx *obtuse quinque dentatus tomentosus.* Petala *linearia obtusa externe tomentosa.* Nectarium *cylindricum dentatum.* Antherae *ovatae acutae faucinectarii insertae.* Stigma *capitatum.* Fructus *ignotus. Meliis, nec Trichiliis hanc adnumeravi, quum habitu et nectarii structura Meliis sit proxima.* Folia *quemadmodum iis Staphyleae indicae a Burmanno tab.* 24. *delineatae similia. Melia dubia Cavanilles diss.* 7. *p.* 364. *nostrae videtur proxima.* W.

4. MELIA *Azadirachta.*
M. foliis pinnatis *Hort. cliff.* 161. *Fl. zeyl.* 161. * *Roy. lugdb.* 462. *Mill. dict. n.* 2. *Cavan. diss.* 7. *p.* 364. *t.* 208. *
Olea malabarica, fraxini folio. *Pluk. alm.* 269. *t.* 247. *f.* 1.
Azedarach foliis falcato-serratis. *Burm. zeyl.* 40. *t.* 15.
Azadirachta indica, folio fraxini. *Breyn. ic.* 21. *t.* 15.

Arbor indica, fraxino similis, oleae fructu *Bauh. pin.* 416.
Aria Bepou. *Rheed. mal.* 4. *p.* 107. *t.* 52.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 610.
Grofsblättriger Zedrach. W.
*Habitat in* India. ♄ (v. s.)

## 846. ZYGOPHYLLUM.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 730.

*Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. *Nectarium* 10-phyllum, germen tegens staminiferum. *Caps.* 5-locularis.

### 1. ZYGOPHYLLUM *simplex.*

Z. foliis simplicibus sessilibus cylindricis. *Mant.* 68.
Z. portulacoides. *Forsk. flor. aegypt. p.* 88. *n.* 67. *ej. ic. t.* 12. B.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 486.
Einfaches Doppelblatt. W.
*Habitat in* Arabia. *Forskoehl.*

Planta *tenera, succulenta, nata e seminibus Forskoehlianis, non floruit.* Caulis *herbaceus, dichotomus, pollicaris, divaricatus.* Folia *opposita, subsessilia, carnosa, linearia, patentissima.* Flores *flavi. Forskoehl.* H. V.

### *2. ZYGOPHYLLUM *cordifolium.*

Z. foliis simplicibus oppositis sessilibus subrotundis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 60.
Z. foliis simplicibus oppositis cordato-orbiculatis. *Lin. suppl.* 232. *Thunb. prod.* 80.
Herzblättriges Doppelblatt. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄

### 3. ZYGOPHYLLUM *Fabago.*

Z. foliis conjugatis petiolatis, foliolis obovatis, pedunculis erectis, calyce glabro, petalis indivisis, caule herbaceo. W.
Z. foliis conjugatis petiolatis: foliolis obovatis, caule herbaceo. *Gmel. sib.* 4. *p.* 176. *n.* 93. *Mill. dict. n.* 1. *Lerch. in nov. Act. A. N. C. vol.* 5. *app. p.* 163. *Knorr. del.* 2. *t. C.*
Z. capsulis prismatico-pentaëdris. *Hort. upsal.* 103. *Sp. pl.* 1. *p.* 385. *Gron. orient.* 132.

Z. foliis petiolatis. *Hort. cliff.* 160. *Roy. lugdb.* 460.
Capparis portulacae folio. *Bauh. pin.* 480.
Capparis fabago. *Dod. pempt.* 741.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syft.* 6. *p.* 483.
Gemeines Doppelblatt. W.
*Habitat in* Syria, Mauritania, Sibiria. 4 (v. v.)
*Folia ovata, petiolata.* Petala *obtufa.*

*4. ZYGOPHYLLUM *foetidum.*
Z. foliis conjugatis petiolatis, foliolis obovatis, flore nutante, calyce pubefcente, petalis incifis, caule fruticofo. W.
Z. (*foetidum*) foliis petiolatis, foliolis obovatis, floribus nutantibus, petalis reflexis incifis. *Schrad. et Wendl. fert. hannov. p.* 17. *t.* 9. *
Z. (*retrofractum*) foliis conjugatis petiolatis, foliolis ovatis, caule fruticofo ramisque retrofractis. *Thunb. prod.* 80?
Stinkendes Doppelblatt. W.
*Habitat ad* Cap. b. fpei. ♄ (v. v.)

*5. ZYGOPHYLLUM *maculatum.*
Z. foliis conjugatis petiolatis, foliolis lineari-lanceolatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 60.
Geflecktes Doppelblatt. W.
*Habitat ad* Cap. b. fpei. ♄
Petala *lutea macula cordata rubra ad bafin omnium, et fupra hanc linea transverfa rubra in tribus fuperioribus.* Ait. l. c.

6. ZYGOPHYLLUM *coccineum.*
Z. foliis conjugatis petiolatis: foliolis cylindricis carnofis laevibus. *Lepech. it.* 1. *p.* 310.
Z. foliis petiolatis: foliolis linearibus carnofis. *Sp. pl.* 2. *p.* 551.
Z. defertorum. *Forskoehl. flor. arab. p.* 87. *n.* 65. *ic. t.* 11.
Z. capfulis cylindricis. *Sp. pl.* 1. *p.* 386.
Fabago arabica teretifolia, flore coccineo. *Shaw. afr.* 231. *f.* 231.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syft.* 6. *p.* 484.
Rothes Doppelblatt. W.
*Habitat in* Africa, Sibiria. (v. f.)
*Diftincta a Z. albo floribus rubris, Capfulis oblongis.*

## 7. ZYGOPHYLLUM *album.*

Z. foliis conjugatis petiolatis: foliolis clavatis carnosis arachnoideo-incanis. *Mant.* 379.

Z. foliis petiolatis: foliolis clavatis carnosis. *Linn. dec.* 1. *t.* 8.

Z. proliferum. *Forsk. flor. p.* 87. *n.* 65. *it. t. XII. f. A. Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 485.

Weifses Doppelblatt. W.

*Habitat in* Aegypto *inque* Canariis. ♄

Fruticulus *succulentus*, *cano-albus*, *ut tota planta.* Folia *opposita*, *ovata*, *teretia.* Petiolus *ovato-oblongus adhuc major.* Pedunculi *laterales*, *uniflori*, *brevissimi.* Calyx *purpurascens*, *concavus.* Petala *lato-lanceolata.* Staminum *basi squamae*, *quae tegunt receptaculum.* Receptaculum *fructus carnosum*, *germine majus*, *depressum*, *angulis* 10 *obsoletis.* Germen *superum*, *ovatum.* Stylus *stigmatibus* 5, *acutis.*

## 8. ZYGOPHYLLUM *Morgsana.*

Z. foliis conjugatis subpetiolatis, foliolis obovatis, caule fruticoso. *Mill. dict. n.* 3. *Thunb. prod.* 80.

Fabago triphylla et tetraphylla, flore tetrapetalo, fructu membranaceo quadrangulari. *Burm. afr.* 7. *t.* 3. *f.* 2.

Fabago capensis frutescens major. *Dill. elth.* 142. *t.* 116. *f.* 141.

Planta africana frutescens, portulacae foliis, Morgsani syrorum, ex brevi pediculo binis. *Pluk. amalth.* 173. *t.* 429. *f.* 4.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 541.

Kurzgestieltes Doppelblatt. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♄

Caulis *teres*, *articulatus*, *cinereus.* Rami *alterni.* Folia *opposita*, *conjugata*, *subsessilia.* Foliola *ovata*, *obtusa*, *integerrima*, *carnosa*, *laevia.* Stipulae *solitariae inter petiolos*, *lineares*, *reflexae.* Pedunculi *laterales*, *gemini*, *uniflori*, *interfoliacei*, *alterius lateris* (*nec oppositi*,) *longitudine folii.* Calyx 4-*phyllus*, *laevis*, *concavus*, *obtusus.* Corolla *flava*, *intra calycis apices fusca.* Petala 4, *rarius* 5, *patentia*, *subemarginata.* Stamina *petalis duplo plura*, *erecta* Antherae *flavae*, *basi squama nectarifera flava margine fusco.* Stylus *longitudine staminum.*

9. ZYGOPHYLLUM *microphyllum.*

Z. foliis conjugatis ſeſſilibus, foliolis ovatis laevibus, caule frutiçoſo. *Thunb. prod.* 80.

Z. foliolis ovalibus minutis, capſulis emarginatis. *Lin. ſuppl.* 232.

Kleinblättriges Doppelblatt. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

Caulis *fruticoſus erectus, ramis ſaepius alternis.* Folia *oppoſita ſubpetiolata conjugata, foliolis ovalibus carnoſiuſculis planis laevibus.* Pedunculi *capillares laterales longitudine foliorum ſolitarii.* Petala *oblonga flava.* Capſula *utrinque retuſa quinquangularis, angulis valde compreſſis rotundatis.*

10. ZYGOPHYLLUM *ſeſſilifolium.*

Z. foliis conjugatis ſeſſilibus: foliolis lanceolato-ovalibus margine ſcabris, caule fruticoſo. *Mill. dict. n.* 2. *Thunb. prod.* 80.

Z. capſulis globoſo-depreſſis. *Sp. pl.* 1. *p.* 385.

Z. foliis ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 160. *Roy. lugdb.* 460.

Fabago capenſis fruteſcens minor. *Dill. elth.* 142. *t.* 116. *f.* 142.

Fabago humilis quadrifolia glabra, flore albido, fructu rotundo. *Burm. afr.* 4. *t. f.* 1.

Fabago africana arboreſcens, flore ſulphureo, fructu rotundo. *Comm. rar.* 10. *t.* 10.

β. Zygophyllum *fulvum* capſulis ovatis acutis. *Sp. pl.* 1. *p.* 386. *Mill. dict. n.* 4. *Kniph. cent.* 3. *n.* 100.

Fabago flore luteo, petalorum unguibus rubris, fructu ſulcato acuto oblongo. *Burm. afr.* 6. *t.* 3. *f.* 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 542.

Ungeſtieltes Doppelblatt. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

*Folia ſeſſilia: Foliola ovali-lanceolata margine cartilagineo crenata ſ. ſcabra. Caulis angulatus. Pedunculi ſolitarii, foliis longiores. Petala crenata.*

11. ZYGOPHYLLUM *ſpinoſum.*

Z. foliis conjugatis ſeſſilibus: foliolis linearibus, carnoſis ſupra planis, caule fruticoſo. *Mant.* 380. *Thunb. prod.* 80.

Z. caule aculeato. *Sp. pl.* 1. *p.* 386.

Fabago tenuifolia ſpinoſa, fructu rotundo. *Burm. afr.* 5. *t.* 5.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 543.

Stachliches Doppelblatt. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

Caulis *erectus*: *Ramis alternis, longitudine plantae.* Stipulae *verticillatae*, 4, *ſubulatae, breviſſimae, rigidulae.* Folia *quaterna, linearia, carnoſa, ſupra plana, ſubtus teretiuſcula, acuta.* Corollae *nutantes, luteae.*

12. ZYGOPHYLLUM *aeſtuans.*

Z. foliis conjugatis ſeſſilibus: foliolis obovatis retuſis. *Sp. pl.* 552.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 485.
Surinamſches Doppelblatt. W.
*Habitat in* Surinamo. *Rolander: ſed impubes periit.*

Caules *herbacei, pedales, laeves, diffuſi, teretiuſculi, latere ſuperiore plani.* Folia *oppoſita, conjugata, ſeſſilia:* Foliola *obovata, avenia, retuſa.* Stipulae *quinae, reflexae; duabus inter folia a latere ſuperiore; unica inter folia a latere inferiore; unica inter foliorum utrumque par.*

*13. ZYGOPHYLLUM *lanatum.* W. †

Z. foliis ternatis, foliolis ſubtus papilloſis, floribus pentagynis, caule flexuoſo articulis lanato. W.
Wolliges Doppelblatt. W.
*Habitat in* Sierra Leone. (v. ſ.)

*Dubii generis planta.* Caulis *videtur herbaceus, flexuoſus teres glaber.* Articuli *valde lanati.* Folia *oppoſita petiolata ternata parva.* Foliola *breviſſime petiolata ſubrotunda baſi attenuata, apice mucronata, ſuperne laevia, ſubtus papillis elevatis obſita.* Pedunculi *axillares ſolitarii uniflori, durante floreſcentia erecti, poſtea cernui.* Calyx *pentaphyllus foliolis linearibus obtuſis interne et margine pubeſcentibus.* Corollam *nullam vidi, forte decidua jam erat.* Filamenta *baſi parum dilatata.* Germen *clavatum.* Styli *quinque longi filiformes.* Stigmata *obtuſa.* Capſula *quinquangularis ovata, quinquelocularis quinquevalvis baſi dehiſcens; valvulis carinato-marginatis.* Semina *ſolitaria.* W.

14. ZYGOPHYLLUM *arboreum.*

Z. foliis pinnatis, caule arboreo. *Iacq. amer.* 130. *t.* 83.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 612.
Baumartiges Doppelblatt. W.
*Habitat in* America *calidiore.* ♄

Folia *oppoſita, pinnata absque impari, ſaepius ſeptemjuga; pinnis alternis, lanceolatis, obtuſis.* Pedunculi *ramoſi.*

## 847. FAGONIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 731.

*Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5, cordata. *Capſ.* 5-locularis, 10-valvis: loculis 1-ſpermis.

### 1. FAGONIA *cretica.*

F. ſpinoſa, foliolis lanceolatis planis laevibus. *Hort. upſ.* 103. *Mill. dict. n.* 1. *Knoph. cent.* 8. *n.* 41.

F. ſpinoſa. *Hort. cliff.* 160.

Trifolium ſpinoſum creticum. *Bauh. pin.* 330. *prodr.* 142. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 24. 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 487.

Cretiſche Fagonie. W.

*Habitat in* Creta. ⊙ (v. v.)

Caulis *pentagonus, depreſſus, patens, dichotomus, pedalis, latere ſuperiore canaliculatus, nodoſo-geniculatus.* Rami *alterni, bifarii, patentes.* Folia *oppoſita, petiolata, ternata*: Foliola *aequalia, ſeſſilia, lanceolata, mucronata, ſubcarnoſa, integerrima.* Stipulae 4, *ſubulatae, patentes, ſpineſcentes, breves, recurvatae.* Pedunculi *laterales, axillares, ſolitarii, uniflori, alterni, erecti, longitudine petioli, ex eadem ala cum ramulo.* Calyx *deciduus.* Petala *violacea, unguiculata, inter ſinus calycis patentia etiam unguibus extra calycem.* Capſula *cernua, ovata,* 5-*gona angulis compreſſis, ſubciliatis. Ergo* Flos *Malpighiae,* Herba *Tribuli ſtructura.* Affinis *Zygophyllo.*

### 2. FAGONIA *hiſpanica.*

F. inermis. *Mill. dict. n.* 2.

F. hiſpanica non ſpinoſa. *Tournef. inſt.* 265.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 488.

Spaniſche Fagonie. W.

*Habitat in* Hiſpania. ♂

### 3. FAGONIA *arabica.*

F. ſpinoſa, foliolis linearibus convexis. *Shaw. afr.* 229. *Forskochl. aegypt. p.* 88. *Mill. dict. n.* 3.

F. arabica longiſſimis aculeis armata. *Shaw. afr.* 229.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 488.

Arabiſche Fagonie, W.
*Habitat in* Arabia.

4. FAGONIA *indica.*
F. foliis ſimplicibus ovalibus, ſpinis geminis. *Mant.* 238. *Burm. ind.* 102. *t.* 34. *f.* 1. †
Indiſche Fagonie. W.
*Habitat in* Perſia.
Folia *oppoſita, ſubpetiolata, ovali-oblonga, glabra, integerrima, Burm.*

## 848. TRIBULUS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 732.

*Cal.* 5-partitus. *Petala* 5, patentia. *Stylus* 0.
*Capſ.* 5, gibbae, ſpinoſae, polyſpermae.

1. TRIBULUS *maximus.*
T. foliis ſubquadrijugis; exterioribus majoribus, pericarpiis decaſpermis muticis. *Loeſl. it.* 208. *Mill. dict. n.* 2. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 462. *Collect.* 4. *p.* 110. *
T. foliis trium parium pinnatis. *Hort. cliff.* 160.
T. foliis ſenis pinnatis: extimis majoribus, floribus ſingularibus. *Brown. jam.* 120. *t.* 132. *f.* 3.
T. terreſtris major, flore maximo odorato. *Sloan. jam.* 90. *hiſt.* 1. *p.* 209. *t.* 132. *f.* 1. *Raj. ſuppl.* 650.
T. terreſtris fructu turbinato, foliis lanuginoſis. *Plum. ſpec.* 7. *ic.* 254. *f.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl.* Syſt. 6. *p.* 489.
Groſser Bürzeldorn. W.
*Habitat in* Jamaicae *aridis.* ⊙ (v. ſ.)
*Fructus decaſpermos, laevis ſ. muticus.*

2. TRIBULUS *lanuginoſus.*
T. foliis ſubquinquejugis ſubaequalibus, ſeminibus bicornibus. *Sp. pl.* 553.
T. foliolis quinque parium. *Fl. zeyl.* 168. *
T. terreſtris zeylanicus, cauliculis villoſis, fructu acuminato. *Burm. zeyl.* 266. *t.* 106. *f.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 490.
Wolliger Bürzeldorn. W.
*Habitat in* Zeylona. (v. ſ.)
Caules *adſcendentes, longi, teretes, piloſi, articulati.* Folia *oppoſita (ſuprema alterna,) petiolata altero minore: Foliola ovali-oblonga, acutiuſcula, utrin-*

*que piloſa.* Petioli *piloſi.* Stipula *ad quodvis folium, lanceolata, marceſcens.* Pedunculus *ex alis alternis, ſ. minoris folii* (*una cum ramulo,*) *uniflorus, piloſus, foliis brevior.* Fructus *angulatus, piloſus.*

3. TRIBULUS *terreſtris.*

T. foliolis ſexjugatis ſubaequalibus, ſeminibus quadricornibus. *Hort. cliff.* 160. *Hort. upſ.* 103. *Hort. lugdb.* 460. *Sauv. monſp.* 227. *Brown. jam.* 220. *Mill. dict. n.* 1. *Gmel. it.* 1. *p.* 172. *Kniph. cent.* 6. *n.* 95.

T. foliis aequalibus duodenis, conjugatis, fructu quadricorni. *Hall. helv. n.* 947. R.

T. terreſtris, ciceris folio, fructu aculeato. *Bauh. pin.* 250.

T. terreſtris. *Lob. ic.* 2. *p.* 84. *Dod. cer.* 223. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 352.

T. terreſtris minor incanus hiſpanicus. *Barr. rar.* 54. *t.* 558.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 491.

Gemeiner Bürzeldorn. W.

*Habitat in* Europa *auſtrali ad ſemitas.* ⊙ (v. v.)

4. TRIBULUS *ciſtoides.*

T. foliolis octojugatis ſubaequalibus. *Mill. dict. n.* 3. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 54. *t.* 103. *Collect. ſuppl.* 109. * *Swartz obſ.* 171.

T. foliis octo parium pinnatis. *Roy. lugdb.* 460.

T. terreſtris major curaſſavicus. *Herm. par.* 236. *t.* 136.

T. terreſtris americanus, argemones flore flavo. *Pluk. alm.* 374. *t.* 67. *f.* 4. *Raj. ſuppl.* 649.

*Houttuyn Lin. Pfl.* Syſt. 6. *p.* 492.

Ciſtenblütiger Bürzeldorn. W.

*Habitat in* America *calidiore.* 4

## 849. QUASSIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 728.

*Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. *Nect.* 5-phyllum. *Drupae* 5, diſtantes bivalves monoſpermae receptaculo carnoſo inſertae.

1. QUASSIA *amara.*

Q. floribus hermaphroditis, foliis impari-pinnatis, foliolis oppoſitis ſeſſilibus; petiolo articulato alato, floribus racemoſis. *Lin. ſuppl.* 235.

Quaſſia. *Mat. med.* 114. *Amoen. acad.* 6. *p.* 421. *t.* 4.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 2. *p.* 464.
Echte Quaſſie. W.
*Habitat in* Surinamo. ♄

Arbor *alta* (*eſt ſemper frutex nunquam arbor.* W.) Folia *alterna interrupte pinnata cum impari bijuga.* Foliola *oppoſita ad articulos petioli elliptica utrinque acuminata integerrima glaberrima venoſa.* Petiolus *biarticulatus more Citri alatus membranula verſus articulorum apices ſenſim dilatata, rotundata, ad apicem articuli primi foliolis duobus ſeſſilibus, ad ultimi tribus aequalibus inſtructus.* Racemi *elongati ſecundi.* Flores *remoti bracteati. Facillime cognoſcitur foliis a reliquis omnibus diverſiſſimis.*

*Quaſſia amara eſt planta rariſſima, lignum amaritie reliquis palmam praeripit. Lignum Quaſſiae venale non ex hac fruticе venit; colligitur a Quaſſia excelſa, quae minus amara. Lund Act. Soc. Hiſt. Nat. Haf.* 1. *p.* 2. *p.* 68. W.

## 2. QUASSIA *Simaruba.*

Q. floribus monoicis, foliis abrupte pinnatis, foliolis alternis ſubpetiolatis, petiolo nudo, floribus paniculatis. *Lin. ſuppl.* 234.
Simarouba. *Aublet. Act. pariſ.* 1776.
Simarouba amara. *Aubl. guj.* 2. *p.* 859. *t.* 331. 332.
Simarube Quaſſia. W.
*Habitat in locis arenoſis* Cajennae, Gujanae, *in* Carolina, *et in inſulis* Sandominicana, Jamaica. ♄ (v. ſ. ſ. a.)

Truncus *cortice laeteſcente amaro luteſcente.* Folia *abrupte pinnata, foliolis utrinque duobus ad novem oblongis acutis glaberrimis ſubſeſſilibus.* Petiolus *cylindricus.* Paniculae *axillares amplae.* Flores *in eadem panicula maſculi et feminei mixti.* Flores *maſculi:* Perianthium 1-*phyllum* 5-*dentatum.* Petala 5 *albicantia lanceolata calyci inſerta.* Nectarium *ſquamula ſubrotunda villoſa, ſinguli filamenti baſi interiori adnata.* Filamenta 10 *longitudine corollae.* Germen *ſterile in receptaculo carnoſo patulo depreſſum* 5-*ſtriatum nectariis tectum.* Stylus *nullus.* Stigma *nullum.* Flores *feminei:* Perianthium *ut in maſculis.* Petala *ut in maſculis.* Nectarium *ſquamulae* 10 *villoſae in orbem locatae.* Stamina *nulla.* Germina 5 *connexa.* Stylus *quinqueſtriatus.* Stigmata 5 *patentia.* Drupae *ovatae ſub-*

*carnosae nigrae receptaculo carnoso orbiculato lateraliter affixae.* Semina *solitaria, testa fragili.*

*Cortex Simarubae officinarum est cortex radicis. Barbari utuntur decocto hujus amaro purgante in febribus et diarrhoeis curandis. Ex his cognitionem hujus corticis habuerunt Europaei, quo diarrhoeas et dysenterias tam facile curarunt.*

*3. QUASSIA *excelsa.*

Q. floribus polygamis pentandris paniculatis, foliis impari-pinnatis, foliolis oppositis petiolatis, petiolo nudo. *Swartz Act. holm.* 1788. *p.* 302. *t.* 8. *prod.* 67. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 742.*

Quassia polygama. *Act. Edinb.* 3.

Unechte Quassie. W.

*Habitat in sylvis submontosis* Jamaicae *et* Caribaearam. ♄

## *850. ZWINGERA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 1752.

*Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Filamenta* basi dilatata pilosa. *Caps.* 5, coriaceae 1-spermae receptaculo carnoso insertae.

*1. ZWINGERA *amara.* W.

Simaba gujanensis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 400. *t.* 153.*

Bittere Zwingere. W.

*Habitat in sylvis* Gujanae. ♄

Frutex *octopedalis.* Folia *alterna impari-pinnata e foliolis quinis, vel ternata.* Foliola *oblonga acuminata emarginata integerrima venosa glabra.* Pedunculi *trifiori axillares.* Flores *albidi.* W.

*Genus proximum Quassiae sed diversum:* Calyce 5-*partito, nec* 5-*phyllo,* Nectarii *defectu,* Fructibus*que siccis. An character sufficiens pro diverso genere, quum et Quassia excelsa nectario careat?* W.

## *851. GOMPHIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 738.

*Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. *Antherae* subsessiles. *Drupae* 2 s. 5 monospermae receptaculo subrotundo carnoso insertae.

*1. GOMPHIA *angustifolia.*

G. foliis lanceolatis extrorsum serratis, panicula termi-

nali, petalis calyce longioribus. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 49. *

Schmalblättrige Nagelbeere. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄

*2. GOMPHIA *nitida.*

G. foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſerratis, paniculis terminalibus, calycibus corollae aequalibus. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 49. * *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 739?

Glänzende Nagelbeere. W.

*Habitat in ſylvis* Jamaicae. ♄

*Clariſſ. Vahl mihi in litteris ſcripſit ſuam a planta Swartzii eſſe diverſam.* W.

3. GOMPHIA *Jabotapita.*

G. racemis terminalibus, petalis calyce triplo longioribus, drupis receptaculo immerſis, foliis ovato-lanceolatis ſerratis. W.

Ochna (*Iabotapita*) racemis terminalibus. *Sp. pl.* 732.

Jabotapita pyramidato flore luteo, fructu rubro. *Plum. amer.* 42. *ic.* 153.

Jabotapita. *Marcg. braſ.* 101. *Raj. hiſt.* 1632.

*Houttuyn Linn. Pfl. Syſt.* 2. *p.* 22.

Jabotapita Nagelbeere. W.

*Habitat in* America *meridionali.* ♄

*4. GOMPHIA *laevigata.*

G. foliis lanceolatis obtuſiſſimis integerrimis emarginatis, panicula terminali. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 49. *

Glatte Nagelbeere. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄

*5. GOMPHIA *laurifolia.*

G. racemis terminalibus, drupis receptaculo ſuperimpoſitis, foliis oblongis utrinque acuminatis integerrimis. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 741. *

Lorbeerblättrige Nagelbeere. W.

*Habitat in montibus* Jamaicae. ♄

## 852. THRYALLIS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 733.

*Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Capſ.* 3-cocca.

1. THRYALLIS *braſilienſis.*

T. braſilienſis. *Sp. pl.* 554.

Fruticeſcens herba piſonis. *Marcgr. braſ.* 97. *f.* 3.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 493.
Braſiliſche Dochtpflanze. W.
*Habitat in* Braſilia. ♄

Fruticulus *ramis teretibus, articulatis.* Folia oppoſita, *petiolata, ovata, integerrima.* Stipulae *ſetaceae,* Racemus *terminalis, e dichotomia ramorum, ſimplex, pedalis*: Bracteis *ſetaceis, breviſſimis*; Pedicellis *filiformibus, flore longioribus.* Flores *parvi lutei. Fructus tricocci.*

## 853. LIMONIA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 720.

*Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Bacca* 3-locularis. *Sem.* ſolitaria.

### * *Spinoſae.*

### 1. LIMONIA *monophylla.*

L. foliis ſimplicibus ſpinis ſolitariis. *Mant.* 237.
Limones puſilli zeylanici ſylveſtres. *Burm. zeyl.* 143. *t.* 65. *f.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 614.
Einblättrige Limonelle. W.
*Habitat in* India *orientali.* ♄

Folia *oblongo-ovata.* Spinae *axillares, ſolitariae.* Pedunculi *axillares conferti, uniflori.*

### 2. LIMONIA *trifoliata.*

L. foliis ternatis, ſpinis geminis. *Mant.* 237. *Iacq. ic. rar. t.* 463. *Collect.* 3. *p.* 176. *

L. ſpinis axillaribus geminis, foliis ternatis ovatis, impari majore, fructu ſolitario. *Burm. ind.* 103. *t.* 35. *f.* 1.

β. inermis foliis ſeſſilibus. W.
Citrus parva dulcis. *Sonnerat it. nov. guin. p.* 103. *t.* 63.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 615.
Dreyblättrige Limonelle. W.
*Habitat in* India *orientali. D. du Cheſne.* ♄ (v. ſ.)

Arbor *facie Citri, ramulis flexuoſis.* Folia *alterna, petiolata, ternata, integerrima, adſperſa poris more Citri, magnitudine Iaſmini frutico ſi.* Foliola *lateralia ſeſſilia; intermedium majus, emarginatum.* Spinae *ſtipulares, petiolo longiores.* Bacca *pedunculata, globoſa, glabra, rubra, magnitudine Vaccinii.*

3. LIMONIA *acidissima.*
L. foliis pinnatis, spinis solitariis. *Mant.* 380.
L. spinis axillaribus solitariis rectis, foliis pinnatis: petiolis alatis. *Brown. jam.* 102.
L. malus sylvestris zeylanica, fructu pumilo. *Burm. zeyl.* 143. *Burm. ind.* 102.
Schinus foliis pinnatis: petiolo marginato articulato, spinis axillaribus solitariis. *Fl. zeyl.* 175. *
Anilifolium. *Rumph. amb.* 2. *t.* 43.
Catu Thiru Naregam. *Rheed. mal.* 4. *p. t.* 14.
*Houttuyn Lin. Pfl.* Syst. 1. *p.* 616.
Gefiederte Limonelle. W.
*Habitat in* India. ♄
*Clariss. Koenig putat, hanc ad Crataevae genus pertinere.* Retz. obs. 4. p. 26.

** *Inermes.*

*4. LIMONIA *lucida.*
L. inermis, foliis simplicibus, pedunculis axillaribus. *Forst. prod. n.* 191.
Glänzende Limonelle. W.
*Habitat in insula* Mallicollo. ♄

*5. LIMONIA *mauritiana.*
L. foliis subternatis, foliolis ovatis integris subacuminatis, paniculis axillaribus. *Lamarck encycl.* 3. *p.* 497.*
Africanische Limonelle. W.
*Habitat in insula* Mauritii. ♄
*Habitus Rhois.* Folia *e tribus rarius quatuor foliolis composita.* W.

*6. LIMONIA *pentaphylla.*
L. inermis, foliis subquinatis. *Retz. obs.* 5. *p.* 24.
Fünfblättrige Limonelle. W.
*Habitat in* India *orientali.* ♄
Spinae *nullae.* Folia *plerumque in petiolo quina alterna ovata acuta integra magnitudine foliorum Citri medicae.* Petioli *partiales breves subalati, alae vero inflexae.* Racemi *breves compositi.* Flores *minuti.* Calyx *quinquedentatus.* Retz. l. c.

*7. LIMONIA *madagascarensis.*
L. foliis pinnatis, foliolis alternis subquaternis lanceolatis dentatis, paniculis brevibus axillaribus. *Lamarck encycl.* 3. *p.* 497.*

Madagaſcarſche Limonelle. W.
*Habitat in* Madagaſcar. ♄

*8. LIMONIA *minuta.*

L. inermis, foliis pinnatis, racemis corymboſis terminalibus. *Forſt. prod. n.* 190.
Kleine Limonelle. W.
*Habitat in* Amicorum *inſulis.* ♄

## 854. MONOTROPA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 737.

*Cal.* 0. *Petala* 10; horum 5 exteriora baſi excavato-mellifera. *Capſ.* 5-valvis. *Quinta* pars numeri quibusdam excluditur.

### 1. MONOTROPA *Hypopithys.*

M. floribus lateralibus octandris, terminali decandro. *Fl. ſuec.* 329, 351. *Phil. bot.* §. 158. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 177. *Willich. obſ. n.* 70. *Pollich. pal. n.* 393. *Mattuſch. ſil. n.* 288. *Kniph. cent.* 10. *n.* 63. *Flor. dan.* 232. *Hoffm. germ.* 142. *Roth. germ. I.* 180. *II.* 461.
Hypopithys ſpica florida nutante. *Hall. helv. n.* 1002.
Hypopithys multiflora. *Scop. carn. n.* 478.
Orobanche quae Hypopithys dici poteſt. *Bauh. pin.* 88. *prodr.* 31.
Orobanche Hypopithys lutea. *Mentz. pug.* 3. *f.* 5.
Orobanche flore breviore duplici, verbaſculi odore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 504. *ſ.* 12. *t.* 16. *f.* 20.
Orobanche verbaſculi odore. *Plot. oxf.* 146. *t.* 9. *f.* 6. *Pluk. alm.* 273. *t.* 209. *f.* 5.
Hypopithys. *Riv. tetr. irreg.*
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 494.
Fichten Ohnblatt. W.
*Habitat in* Sueciae, Germaniae, Angliae, Canadae *ſylvis Paraſitica radicum.* 24 (v. v.)
*Variat floribus cernuis et erectis. Varietas floribus erectis quandoque eſt uniflora.* W.

### 2. MONOTROPA *uniflora.*

M. caule unifloro, flore decandro. *Sp. pl.* 555.
M. flore nutante. *Gron. virg.* 41.
Orobanche monanthos virginiana, flore majore pentapetalo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 502. *ſ.* 12. *t.* 16. *f.* 5. *mala.*

Orobanche virginiana, flore pentapetalo cernuo. *Pluk. alm.* 273. *t.* 209. *f.* 2. *Catesb. car.* 1. *p.* 36. *t.* 36. *bon. Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 496.
Einblüthiges Ohnblatt. W.
*Habitat in* Marilandia, Virginia, Canada. 24 (v. f.)

## 855. DIONAEA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 729.

*Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. *Capf.* 1-locularis, gibba, polyfperma.

### 1. DIONAEA *Muscipula.*

Dionaea. *Ellis. in Nov. act. Upfal.* 1. *p.* 98. *t.* 8. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 497. *t.* 50. *B.*
Wunderbarer Fliegenfänger. W.
*Habitat in* Carolinae *uliginofis.* 24

Miraculum *Naturae.* Folia *radicalia, petiolata, biloba, fubrotunda, ciliata, conduplicanda, fupra fpinulis* 3 *f.* 4 *breviffimis.* Petioli *alati* (more Aurantii,) *folio fere longiores absque ciliis.* Scapus *fpithameus, erectus, filiformis.* Corymbus *terminalis, fubumbellatus:* Pedunculis *fimplicibus, unifloris, interftinctis* Bractea *lanceolata, pedunculis breviore.* Flores *albi* Petala *lineata* ftriis 7, *ad apicem utrinque inflexa.*

Senfibilia *funt Folia, ut dum infectum irrepat aut infideat folio, fe claudant conduplicatis lateribus et decuffatis ciliis marginalibus, detinentia etiam infectum aculeis paginae fuperioris, ufquedum laffum quiefcat, tumque dimittunt.*

*Hanc plantam in epiftola ad Ill.* Linneum *data fufius defcripfit cl.* Ioh. Ellis. *Quam epiftolam Ill.* Schreberus *latine et germanice reddidit et una cum icone plantae vivis coloribus expreffa publici juris fecit Erlangae* 1771. R.

## 856. IUSSIEUA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 741.

*Cal.* 4 f. 5-partitus, fuperus. *Petala* 4 f. 5. *Capf.* 4 f. 5-locularis, oblonga, angulis dehifcens. *Sem.* numerofa, minuta.

### 1. IUSSIEUA *repens.*

I. repens, floribus pentapetalis decandris, foliis ovato-oblongis. *Mant.* 381.

I. repens, flor. pentapetalis decandris, pedunculis folio longioribus. *Fl. zeyl.* 169. *

Iuſſieua repens. *Swartz obſ.* 172?

Oenothera herbacea repens. *Brown. jam.* 208?

Nir Carambu. *Rheed. mal.* 2. *p.* 99. *t.* 51. *Raj. hiſt.* 1510.

ß. Iuſſieua *adſcendens.*

I. adſcendens, floribus pentapetalis decandris, foliis ovato-oblongis glabris, pedunculis folio brevioribus. *Mant.* 69.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 499.

Kriechende Iuſſieua. W.

*Habitat in* India. 2|.

*Huic ß.* Caules *herbacei, adſcendentes, ſimplices, laeves.* Folia *alterna, petiolata, obovato-oblonga, laevia, obtuſa.* Pedunculi *axillares, ſolitarii, uniflori, folio breviores, ſed fructus longitudine folii.*

2. IUSSIEUA *tenella.*

I. glabra, floribus pentapetalis ſubſeſſilibus, foliis oppoſitis lineari-lanceolatis. *Burm. ind.* 103. *t.* 34. *f.* 2. †

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 500.

Zarte Iuſſieua. W.

*Habitat in* Iava.

* 3. IUSSIEUA *linearis.* W.

I. foliis linearibus ſeſſilibus hiſpidis, floribus tetrapetalis octandris. W.

Linienblättrige Iuſſieua. W.

*Habitat in* Guinea. (v. f.)

Caulis *erectus ramoſus glaber ſtriatus teres, apice piliis rariſſimis tectus.* Rami *alterni ſimplices divaricati ſtriati teretes, pilis ſparſis ad ſummitatem copioſioribus breviſſimis obſiti.* Folia *longiſſima biuncialia et ultra linearia obtuſiuſcula ſeſſilia alterna, vix manifeſte venoſa, pilis rigidis minutis erectis hiſpida.* Flores *ſeſſiles axillares.* Germen *inferum hiſpidum teres calyce perſiſtenti coronatum.* W.

* 4. IUSSIEUA *linifolia.*

I. foliis laciniisque calycinis lineari-lanceolatis glabris, floribus ſeſſilibus octandris. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 32.

Flachsblättrige Iuſſieua. W.

*Habitat in* America *meridionali.*

Caulis *herbaceus erectus tener glaber, inferne tetragonus, ſuperne compreſſo-angulatus ramoſus.* Rami *alterni ſubfiliformes patentiſſimi.* Folia *ſubſeſſilia pol-*

*licaria vel minora anguſta lineari-lanceolata utrinque attenuata glaberrima, vix venoſa, tenuiſſime ſubnervoſa.* Flores *axillares ſolitarii ſeſſiles.* Calyx *laciniis quatuor lanceolatis attenuatis vix ſemiunguicularibus.* Capſula *pollicaris tenuis teres glabra.* Vahl. l. c.

5. IUSSIEUA *peruviana.*

I. erecta, floribus pentapetalis, pedunculis bracteatis, foliis oblongis utrinque attenuatis ſubtus pubeſcentibus. W.

I. erecta, floribus pentapetalis, pedunculis folioſis. *Sp. pl.* 555.

Onagra laurifolia, flore amplo pentapetalo. *Few. peruv.* 71. *t.* 11.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 500.

Peruvianiſche Iuſſieua. W.

*Habitat in* Lima.

6. IUSSIEUA *hirta.*

I. erecta hirſuta, foliis lanceolatis attenuatis ſubtus hirtis, floribus pedunculatis octandris. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 31.*

I. erecta hirſuta, floribus tetrapetalis octandris, foliis ovatis acuminatis ſubtus hirtis. *Swartz. obſ.* 143.

Oenothera (*hirta*) hirta, foliis ſupra glabris. *Sp. pl.* 491.

Oenothera aſſurgens hirſuta, floribus ſolitariis. *Brown. jam.* 208.

Onagra fruteſcens et hirſuta nerii folio, flore magno luteo. *Plum. ſpec.* 7. *ic.* 174. *f.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 4. *p.* 417.

Rauhe Iuſſieua. W.

*Habitat in* America *calidiore.* ♄ (v. ſ.)

7. IUSSIEUA *pubeſcens.* †

I. erecta villoſa, floribus pentapetalis decandris ſeſſilibus. *Mill. dict. n.* 2. *Loefl. it.* 282. *n.* 201.

Lyſimachia lutea erecta non pappoſa major, foliis hirſutis, fructu caryophylloide. *Sloan. jam.* 85.

Behaarte Iuſſieua. W.

*Habitat in* America.

8. IUSSIEUA *octovalvis.*

I. erecta, floribus tetrapetalis octandris pedunculatis, capſulis multivalvibus, foliis lanceolatis. *Swartz obſ.* 142.*

Oenothera (*octovalvis*) foliis lanceolato-oblongis acuminatis planis glabris. *Sp. pl.* 492. *Iacq. amer.* 102. *t.* 70.

Oenothera assurgens glabra, foliis lanceolatis alternis integerrimis, floribus solitariis alaribus. *Brown. jam.* 208.
Onagra foliis persicariae angustioribus, flore magno luteo. *Pium. spec.* 7. *ic.* 275. *f.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 4. *p.* 416. *t.* 48. *f.* 2.
Vielklappige Iussieua. W.
*Habitat in* Caribaeis *locis aquosis humidis.* ⊙

. IUSSIEUA *suffruticosa.*

I. erecta villosa, floribus tetrapetalis octandris pedunculatis. *Mill. dict. n.* 1. *Rumph. amb.* 6. *t.* 41.
Ludwigia capsulis oblongis uncialibus. *Roy. lugdb.* 252.
Lysimachia indica non papposa, flore luteo minimo, siliquis caryophyllum aromaticum aemulantibus. *Herm. lugdb.* 396.
Carambu. *Rheed. mal.* 2. *p.* 55. *t.* 49. *Raj. hist.* 1510.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 501.
Staudige Iussieua. W.
*Habitat in* India.

Caulis *erectus, alterne ramosus.* Folia *alterna, lanceolata, vix petiolata, uti tota planta, utrinque pubescentia.* Capsulae *foliis paulo breviores, pollices* 2 *longae, striatae, subsessiles.*

*10. IUSSIEUA *acuminata.*

I. erectiuscula glabra, foliis lato-lanceolatis attenuatis, floribus octandris subsessilibus. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 745. *
Langzugespitzte Iussieua. W.
*Habitat in depressis* Jamaicae *australis rarius.* ⊙

11. IUSSIEUA *inclinata.*

I. erecta glabra, floribus tetrapetalis octandris pedunculatis. *Lin. suppl.* 235.
Gebogene Iussieua. W.
*Habitat in* Surinami *paludosis. C. G. Dalberg.* ⊙

Planta *annua erecta tota glabra.* Caulis *simplex teres crassus porosus aquaticus, ad articulos inferiores radicans.* Folia *obovata obtusa petiolata, petiolis vix longiora costata glabra alterna.* Pedunculi *solitarii axillares uniflori, petiolo paulo longiores.* Germen *pedunculo paulo brevius laeve incrassatum tetragonum acutangulum.* Calyx *foliolis ovatis persistentibus.* Petala *quatuor ovata majora venosa tenerrima.* Antherae *octo.*

12. IUSSIEUA *erecta.*

I. erecta glabra, floribus tetrapetalis octandris ſeſſilibus. *Flor. zeyl.* 170. *Hort. upſ.* 105. *Mill. dict. n.* 3. *Swartz obſ.* 173. * *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 31? *Thunb. jap.* 180? I. (*diffuſa*) caule repente, foliis lanceolatis. *Forſk. deſcr.* 210?

Ludwigia capſulis oblongis. *Hort. cliff.* 491.

Onagra perſicae foliis amplioribus, parvo flore luteo. *Plum. ſpec.* 7. *t.* 175. *f.* 2.

Lyſimachia lutea non pappoſa erecta, foliis glabris, fructu caryophylloidi. *Sloan. jam.* 85. *hiſt.* 1. *p.* 37. *t.* 11. *f.* 1.

Iaſminum catalonicum, flore luteo. *Seb. theſ.* 1. *p.* 42. *t.* 24. *f.* 3.

Herba vitiliginum *Rumph. amb.* 6. *p.* 49. *t.* 21. *f.* 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 501.

Aufrechte Iuſſieua. W.

*Habitat in* America *et forte in* Virginia. ⊙

Caulis *erectus*, *ſimplex*, *altus*, *ſtrictus*, *teres*, *ut tota planta glaberrimus.* Folia *alterna*, *petiolata*, *lanceolata*, (*obovata. Diſſ. de pl. ſurinam.* 1776.) *polliicis transverſi latitudine.* Capſulae *ſubſeſſiles*, *folio triplo breviores.* *Paluſtris planta.*

## *857. SCHOUSBOEA. W.

*Cacoucia Aubl. guj.* 1. *p.* 450.

*Cal.* campanulatus 5-fidus corollifer. *Petala* 5. *Bacca* quinquangularis monoſperma. *Semen* arillatum.

### *1. SCHOUSBOEA *coccinea.* W.

Cacoucia coccinea. *Aubl. guj.* 1. *p.* 450. *t.* 179. *

Scharlachfarbene Schousböa. W.

*Habitat in* Gujana *ad ripas fluvii* Sinemarenſis. ♄

Frutex *ſcandens.* Folia *alterna petiolata ovata acuminata ſubcordata venoſa integerrima glabra.* Racemus *terminalis.* Flores *breviſſime pedunculati*, *bractea lanceolata viridi ſuffulti.* Calyx *coloratus coccineus.* Petala *rubra venoſa.* Fructus *magnitudine nucis juglandis.* W.

*Genus proximum Fuchſiis et Combretis, ſed fructu diverſum. Dixi in honorem Clariſſ. Schousboe, bota-*

*nici celebris, qui in itinere per imperium Maroccanum multa nova detexit vegetabilia.* W.

## 858. HEISTERIA.

*Gen. pl. edit. Schreb. n.* 736.

*Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Drupa* calyce colorato maximo.

1. HEISTERIA *coccinea.*

Heisteria. *Iacq. amer.* 126. *t.* 81.

Borbonia fructu oblongo nigro, calyce coccineo. *Plum. gen.* 4.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 544.

Scharlachfarbene Heisterie. W.

*Habitat in sylvis densis* Martinicae *ad torrentes.* ♄

Lauro *affinis.*

## 859. QUISQUALIS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 739.

*Cal.* 5-fidus, filiformis. *Petala* 5. *Drupa* 5-angulari.

1. QUISQUALIS *indica.*

R. indica. *Sp. pl.* 556.

Quisqualis pubescens. *Burm. ind. t.* 35. *f.* 2.

Quisqualis glabra. *Ej. t.* 28. *f.* 2.

Quisqualis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 71. *t.* 38.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 546.

Indische Quisqualis. W.

*Habitat in* India. ♄

Rami *teretes, pubescentes.* Folia *opposita, petiolata, cordata s. ovata, integerrima.* Stipulae *nullae.* Spica *terminalis et axillares pedunculatae Bracteis ovato-oblongis, oppositis,* Floribusque *oppositis statura Daphnes, calyce filiformi extus pubescente.*

## 860. DAIS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 740.

*Involucrum* 4-phyllum. *Cor.* 4. *s.* 3-fida. *Bacca* 1-sperma.

1. DAIS *cotinifolia.*

D. foliis obovatis obtusis, floribus quinquefidis decandris. W.

D. floribus quinquefidis decandris. *Sp. pl.* 556. *Lamarck illuſt. gen. t.* 368. *f.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 548.
Perükenbaumblättrige Dais. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ *Dav. v. Royen.*

Folia *oppoſita, obovata, integerrima, glabra, petiolata.* Flores *faſciculo aggregati, terminales, pubeſcentes:* Involucro *gemmaceo, quadrivalvi. Affinis Paſſerinis.*

*2. DAIS *diſperma.*

D. floribus octandris decandrisque, foliis ovato-lanceolatis enerviis. *Forſt. prod. n.* 192.
Zweyſaamige Dais. W.
*Habitat in inſula* Tongatabu. ♄

3. DAIS *octandra.*

D. foliis ovato-lanceolatis venoſis, floribus quadrifidis octandris. W.
D. floribus quadrifidis octandris. *Mant.* 69. *Burm. ind. t.* 33. *f.* 2.
β. D. (*laurifolia*) floribus decandris, foliis lanceolatis acutis. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 77. *Collect.* 1. *p.* 146.*
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 548.
Achtmännige Dais. W.
*Habitat in* India. ♄

*Folia oppoſita, elliptico-oblonga, acuminata, petiolata, laevia.* Involucrum *unum alterumve, terminale, pedunculatum, floribus brevius.* Flores *glabri.* Stamina 8, *ſupra tubum, corolla quadrifida longiora.*

*Binas hujus generis ſpecies indicavit adhuc Clariſſ. Lamarck encycl.* 2. *p.* 252. *Ambae vero jam a Linnaei filio, ſub nomine Gnidia daphnaefolia, videntur deſcriptae. Altera enim Dais pubeſcens, eſt hujus plantae varietas α. altera Dais madagaſcarenſis dicta, eſt varietas* β. W.

## *861. CERATOPETALUM.

*Smith. Nov. Holl.* 1. *p.* 9.

*Cal.* 5-partitus ſtaminiferus perſiſtens. *Petala* 5-pinnatifida. *Antherae* calcaratae *Capſ.* in fundo calycis tecta bilocularis.

*1. CERATOPETALUM *gummiferum.*

C. gummiferum. *Smith. Nov. Holl.* 1. *p.* 9. *t.* 3.*
Gummibringende Hornblume. W.

*Habitat in* Nova Hollandia. ♄

Arbor *procera.* Folia *oppoſita petiolata ternata.* Foliola *ſeſſilia lanceolata ſerrata venoſa glabra.* Paniculа *terminalis.* Calyx *flaveſcens laciniis rubicundis.* Petala *flava.* W.

## 862. MELASTOMA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 742.

*Cal.* 5-fidus, campanulatus. *Petala* 5, calyci inſerta. *Bacca* 5-locularis, calyce obvoluta.

### * *Dodecandrae.*

*1. MELASTOMA *calyptrata.*

M. foliis elliptico-lanceolatis attenuatis trinerviis glabris obſolete denticulatis, floribus paniculatis. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 40. *

Gekappter Schwarzſchlund. W.

*Habitat in inſula* Montſerrat. ♄

Panicula *terminalis erecta palmaris.* Rami *patentes infimi quatuor, reliqui oppoſiti, glabri.* Ramuli *divaricati triflori.* Flores *pedicellati calyptrati.* Calyptra *conica acuta transverſim decidua.* Calyx *magnitudine ſeminis Coriandri truncatus.* Petala *flava.* Vahl. l. c.

*2. MELASTOMA *crocea.*

M. foliis ovatis ſubſerratis glabris, nervis ad petiolum barbatis, panicula terminali. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 54. *

Safranfarbener Schwarzſchlund. W.

*Habitat in* Peru. ♄

Folia *ſunt quinquenervia.* W.

*3. MELASTOMA *patens.*

M. foliis quinquenerviis cordatis hirſutis ſubdenticulatis, racemo terminali patulo, floribus dodecandris. *Swartz prod.* 68. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 791. *

Melaſtoma umbellata. *Mill. dict.*

Weitriſpiger Schwarzſchlund. W.

*Habitat in montibus altioribus* Jamaicae. ♄

Hirſuties *omnium partium fuſco-rubra.* Swartz l. c.

### * * *Decandrae foliis trinerviis.*

*4. MELASTOMA *crenata.*

M. hiſpida, foliis ſubcordatis oblongis crenatis acumina-

tis, racemis axillaribus paucifloris longitudine petioli. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 41. *

Gekerbter Schwarzſchlund. W.

*Habitat in* America *meridionali.* ♄

*5. MELASTOMA *rigida.*

M. foliis trinerviis ſubdenticulatis ſubcordato-ovatis rigidis, ſubtus ſcabris, racemis terminalibus paniculatis ferrugineo-hirtis. *Swartz. prod.* 69. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 768. *

Steifblättriger Schwarzſchlund. W.

*Habitat in montibus altiſſimis coeruleis* Jamaicae. ♄

*6. MELASTOMA *decuſſata.*

M. foliis lanceolato-oblongis ſerrulatis ciliatis ſupra glaberrimis, ſpicis racemoſis bipartitis, floribus confertis. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 42. *

M. (*racemoſa*) foliis ovatis quinquenerviis, petiolis et limbis foliorum villoſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 406. *t.* 156. *

Durchkreuztraubiger Schwarzſchlund. W.

*Habitat ad rivulorum ripas* Cajennae, Gujanae. ♄

*7. MELASTOMA *montana.*

M. foliis trinerviis ſubdenticulatis glabriuſculis, racemo terminali, pedunculis tripartito-trifidis patulis, petalis retuſis, calyce truncato. *Swartz prod.* 69. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 766. *

Berg Schwarzſchlund. W.

*Habitat in montibus excelſis* Jamaicae *auſtralis.* ♄

*8. MELASTOMA *procera.*

M. arborea, foliis trinerviis ſubdenticulatis glabris, racemo terminali, pedunculis trifidis erectis, calycibus truncatis. *Swartz prod.* 68. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 764. *

Hoher Schwarzſchlund. W.

*Habitat in altis montibus* Jamaicae. ♄

*9. MELASTOMA *adſcendens.*

M. foliis trinerviis denticulatis ovatis acutis glabris, racemo ovato terminali, racemulis floribus ſubſecundis, caule ſcandente. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 772. *

Melaſtoma ſcandens. *Swartz prod.* 69.

Steigender Schwarzſchlund. W.

*Habitat in ſylvis montium* Jamaicae. ♄

10. MELASTOMA *aspera.*

M. foliis ovato-lanceolatis integerrimis trinerviis scabris, floribus terminalibus subcorymbosis. W.

M. foliis integerrimis trinerviis lanceolatis scabris. *Sp. pl.* 560. *Fl. zeyl.* 172.

M. scabra trinervia. *Burm. zeyl.* 154. *t.* 72.

Fragarius ruber. *Rumph. amb.* 4. *p.* 91. *t.* 43. *Raj. hist.* 1493.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 624.

Scharfblättriger Schwarzschlund. W.

*Habitat in* India. ♄

11. MELASTOMA *ledifolia.*

M. villosa, foliis ovato-lanceolatis integerrimis trinerviis, floribus axillaribus terminalibusque bracteatis. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 48.*

Porstblättriger Schwarzschlund. W.

*Habitat in* Peru. ♄

Folia *petiolata Ledi latifolii superne raris pilis obsita, inferne albo-villosa.* Flores *pedunculati solitarii vel gemini.* Bracteae *binae sub calyce.* Lamarck. l. c.

12. MELASTOMA *strigosa.*

M. foliis integerrimis trinerviis strigosis ovatis, floribus solitariis. *Lin. suppl.* 236.

Srieglicher Schwarzschlund. W.

*Habitat in* Nova Granada. ♄ *Mutis.*

Frutex *caule strigis adpressis scabro.* Folia *opposita subpetiolata ovata trinervia integerrima, supra strigosa, subtus solis nervis strigosa.* Pedunculi *oppositi aut terminales uniflori cernui, saepius diphylli.* Calyx *valde strigosus.* Corolla *purpurea.*

13. MELASTOMA *holosericea.*

M. foliis oblongo-ovatis integerrimis subtus canis, spicis racemosis bipartitis, floribus confertis biseriatis. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 42.*

M. foliis integerrimis trinerviis oblongo-ovatis subtus tomentosis, racemis brachiatis, spicis bipartitis. *Sp. pl.* 559.

M. foliis integerrimis ovato-lanceolatis subtus sericeis, nervis ante basin coadunatis. *Hort. cliff.* 162.

Acinodendrum americanum ampliore folio trinervi, inferius alba lanugine incano maximo utrinque glabro. *Pluk. mant.* 4. *t.* 252. *f.* 2.

Arbor racemosa brasiliana folio malabathri. *Breyn. cent.* 3. *t.* 2. 4.
Mucra. *Marcgr. bras.* 117.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 625.
Sammetartiger Schwarzschlund. W.
*Habitat in* Brasilia, Surinamo. ♄

Arbor *ramis tomentosis.* Folia *petiolata trinervia excepto marginali nervo, reticulata, subtus tomentosa, uti petioli.* Racemi *terminales e dichotomia bruchiati, spicis lateralibus conjugatis secundis flavis.*

*14. MELASTOMA *velutina.* W.
M. foliis trinerviis integerrimis sessilibus ovatis acutis villoso-sericeis, racemis brachiatis, ramis bipartitis, caule acute quadrangulo.
Melastoma holosericea. *Swartz obs.* 176. *
Seidenartiger Schwarzschlund. W.
*Habitat in* Jamaica, Brasilia. ♄

15. MELASTOMA *sessilifolia.*
M. foliis integerrimis trinerviis spathulatis sessilibus subtus subtomentosis. *Sp. pl.* 558.
M. foliis amplioribus per petiolum recurrentibus et contractis, fasciculis florum sparsis. *Brown. jam.* 219. *t.* 29. *f.* 1. 2.
Arbor americana, foliis a concursu nervorum ima parte longius productis, subtus lanugine candicante tomentosis. *Pluk. alm.* 50. *t.* 249. *f.* 2.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 626.
Stielloser Schwarzschlund. W.
*Habitat in* Jamaica. ♄

*16. MELASTOMA *ramiflora.*
M. foliis trinerviis integerrimis ovato-lanceolatis scabriusculis, ramis floriferis, floribus pedunculatis subconfertis. *Swartz prod.* 69. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 775. *
Astblütiger Schwarzschlund. W.
*Habitat in* paroecia St. Thomae *in* Jamaica *locis palu-dosis.* ♄

*17. MELASTOMA *glabra.*
M. foliis integerrimis trinerviis oblongis acuminatis glabris, panicula terminali, calycibus circumscissis. W.
M. foliis integerrimis trinerviis elliptico-lanceolatis scabris, calycibus circumscissis. *Forst. prod. n.* 194.
Glatter Schwarzschlund. W.
*Habitat in* Societatis *insulis.* ♄ (v. s.)

*18. MELASTOMA *chrysophylla.*

M. glabra, foliis ovatis acutis trinerviis integerrimis subtus aureo-virentibus, panicula terminali. *Lamarck encycl. 4. p. 50.* *

Goldfarbener Schwarzschlund. W.

*Habitat in* Madagascar. ♄.

*Tota planta glabra.* Folia *subtus sunt flavo-viridia coloris Lichenis vulpini.* Flores *mediocres.* Calycis *laciniae lanceolatae ciliatae deciduae.* Lamarck l. c.

*19. MELASTOMA *quadrangularis.*

M. foliis trinerviis integerrimis ovato-lanceolatis glabris, nervis subtus coloratis, ramis tetragonis, racemo stricto terminali. *Swartz prod.* 69. *Fl. ind. occid. 2. p. 770.* *

Viereckiger Schwarzschlund. W.

*Habitat in* Jamaicae *montibus altis.* ♄

*20. MELASTOMA *trinervia.*

M. foliis trinerviis absque marginali, integerrimis utrinque glabris tenuioribus, racemis terminalibus, racemulis bipartitis, floribus sessilibus. *Swartz. prod.* 69. *Fl. ind. occid. 2. p. 774.* *

Dreynerviger Schwarzschlund. W.

*Habitat in* Jamaicae *montosis.* ♄ (v. s.)

*21. MELASTOMA *repens.*

M. foliis obovatis glabris trinervibus subintegerrimis, floribus solitariis terminalibus caule repente. *Lamarck encycl. 4. p. 54. illust. gen. t. 362. f. 2.*

Melastoma octandra. *Osb. it.* 213. * *Retz. obs. 4. p. 25.* *

Kriechender Schwarzschlund. W.

*Habitat in* China. ♃

*** *Decandrae foliis triplinerviis.*

22. MELASTOMA *Grossularioides.*

M. foliis subrotundo-ovatis acuminatis denticulatis triplinerviis glabris. W.

M. foliis denticulatis triplinerviis ovatis acuminatis. *Sp. pl.* 558.

Arbor americana, latiore et acuminato folio trinervio, utrinque glabro et margine laeviter crenato. *Pluk. alm.* 40. *t.* 249. *f.* 4.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 1. p.* 621.

Stachelbeerartiger Schwarzschlund. W.

*Habitat in* Surinamo. *D. Bartsch.*

*23. MELASTOMA *parviflora.*
M. foliis ovato-lanceolatis utrinque attenuatis denticulatis triplinerviis glabris, panicula terminali trichotoma. W.
M. (*parviflora*) foliis ovato-oblongis glabris denticulatis, floribus paniculatis terminatricibus, fructu parvo coeruleo. *Aubl. guj.* 1. *p.* 433. *t.* 171. *
Kleinblütiger Schwarzschlund. W.
*Habitat in paludosis* Cajennae, Gujanae. ♄

*24. MELASTOMA *succosa.*
M. foliis ellipticis acutis integerrimis triplinerviis hirsutis subtus tomentosis, floribus lateralibus subsessilibus, petalis denticulatis. W.
M. (*succosa*) foliis ovatis hirsutis asperis, subtus incanis, fructu purpurascente. *Aubl. guj.* 1. *p.* 418. *t.* 162. *
Saftiger Schwarzschlund. W.
*Habitat in sylvis* Gujanae, Cajennae. ♄

*25. MELASTOMA *arborescens.*
M. foliis subrotundo-ovatis acutis integerrimis triplinerviis glabris, corymbis bracteatis lateralibus, petalis biunguiculatis. W.
M. (*arborescens*) foliis subrotundis quinquenerviis, floribus corymbosis, petalis basi bifidis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 420. *t.* 163. *
Baumartiger Swarzschlund. W.
*Habitat in sylvis* Gujanae. ♄
*Videtur affinis M. Grossularioidi, sed quoad folia diversa, defectu dentium et acuminis.* W.

*26. MELASTOMA *longifolia.*
M. foliis lanceolatis acutis integerrimis glabris triplinerviis, summis quaternis, panicula terminali supradecompósita. W.
M. (*longifolia*) foliis lanceolatis glabris trinerviis, ad summitatem caulis quaternis, floribus parvis albis paniculatis, fructu parvo coeruleo. *Aubl. guj.* 1. *p.* 432. *t.* 170. *
Langblättriger Schwarzschlund. W.
*Habitat in* Gujana *ad ripam amnis* Galibiensis. ♄

*27. MELASTOMA *prasina.*
M. foliis triplinerviis integerrimis lato-lanceolatis glabris, panicula terminali patentissima. *Swartz prod.* 69. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 777. *
M. (*laevigata*) foliis integerrimis quinquenerviis ova-

to-oblongis laeviuſculis acuminatis, margine laevibus. *Aubl. guj.* 1. *p.* 412. *t.* 159.
Lauchfarbener Schwarzſchlund. W.
*Habitat in ſylvis* Jamaicae, Hiſpaniolae *inque pratis* Cajennae, Gujanae. ♄

* * * * *Decandrae, foliis quintuplinerviis.*

28. MELASTOMA *agreſtis.*

M. villoſa, foliis ovato-lanceolatis denticulatis quintuplinerviis, corymbo terminali. W.
M. (*agreſtis*) foliis ovato-oblongis, floribus albis paniculatis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 425. *t.* 166. *
Acker Schwarzſchlund. W.
*Habitat ad rivulorum ripas, inque muris antiquis* Cajennae. ♃
Folia *ferrugineo-villoſa.* Aubl. l. c.

*29. MELASTOMA *ſcandens.*

M. foliis ovatis ſubſerratis hirſutis quintuplinerviis, corymbo terminali capitato, caule ſcandente. W.
M. (*ſcandens*) caule et foliis piloſis, floribus albis terminatricibus. *Aubl. guj.* 1. *p.* 435. *t.* 172. *
Kletternder Schwarzſchlund. W.
*Habitat in ſylvis* Gujanae. ♄

*30. MELASTOMA *alata.*

M. foliis ovatis utrinque acuminatis integerrimis quintuplinerviis ſubtus pubeſcentibus, capitulis paniculatis terminalibus, caule alato. W.
M. (*alata*) floribus racemoſis, foliis ovato-oblongis ſubtus tomentoſis canis ſubſeſſilibus. *Aubl. guj.* 1. *p.* 410. *t.* 158. *
Geflügelter Schwarzſchlund. W.
*Habitat in campeſtribus* Cajennae, Gujanae. ♄

*31. MELASTOMA *flaveſcens.*

M. foliis obovato-acutis integerrimis quintuplinerviis ſubtus pubeſcentibus, corymbis bracteatis lateralibus. W.
M. (*flaveſcens*) foliis ovatis quinquenerviis ſubtus incanis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 423. *t.* 164. *
Gelblicher Schwarzſchlund. W.
*Habitat in ſylvis* Gujanae. ♄

***** *Decandrae, foliis quinquenerviis.*

*32. MELASTOMA *hirta.*

M. foliis denticulatis quinquenerviis ovato-lanceolatis, caule hiſpido. *Mill. dict. n.* 3. *Swartz obſ.* 175. *

Arbuſcula Jamaicenſis quinquenervis, minutiſſime dentatis foliis et caule pubeſcentibus. *Pluk. alm.* 40. *t.* 264. *f.* 1. *vel potius* 265. *f.* 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 623.

Behaarter Schwarzſchlund. W.

*Habitat in* America *meridionali.* ♄

*Flores in foliorum alis breviter pedunculati.*

*Variat* floribus *dodecandris*, calyce *ſexfido*; petalis *ſex*, ſtaminibus *duodecim*, bacca *ſexloculari.* Swartz l. c.

*33. MELASTOMA *ſpicata.*

M. foliis ſubdenticulatis quinquenerviis ovato-lanceolatis villoſis, ſpicis axillaribus. W.

M. (*ſpicata*) foliis ovato-oblongis acuminatis piloſis, floribus cernuis ſpicatis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 423. *t.* 165.

Aehrenblütiger Schwarzſchlund. W.

*Habitat in pratis* Gujanae. ♄

34. MELASTOMA *Acinodendron.*

M. foliis ovatis acuminatis denticulatis quinquenerviis, cymis axillaribus. W.

M. foliis denticulatis ſubtrinerviis ovatis acutis. *Sp. pl.* 558.

M. foliis ovato-lanceolatis crenatis, nervis quinque longitudinalibus, extimis obſoletioribus. *Hort. cliff.* 162.

Acinodendron americanum pentaneuron, foliis craſſis hirſutis ad ambitum rarioribus ſerris. *Pluk. mant.* 4. *t.* 159. *f.* 1.

Groſſularia alia plantaginis folio, fructu rariore violaceo. *Plum. ic.* 142. *f.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 620.

Beeren Schwarzſchlund. W.

*Habitat in* America *calidiore.* ♄

*Species obſcura.* Swartz obſ. 174.

*35. MELASTOMA *cymoſa.*

M. foliis cordatis acuminatis quinquenerviis ſerrulatis pubeſcentibus, cyma terminali, calycinis laciniis ſubrotundis, ſtaminibus quinque ſterilibus. W.

M. (*cymoſum*) foliis ſeptemnerviis cordato-acuminatis pubeſcentibus, floribus terminalibus cymoſis. *Schrad. ed Wendl. ſert. hannov.* 18. *t.* 8. *

Doldentraubiger Schwarzſchlund. W.
*Habitat in* America *meridionali.* ♄ (v. v.)

*36. MELASTOMA *grandiflora.*
M. foliis cordatis acuminatis quinquenerviis ſerrulatis piloſis, pedunculo terminali bifido, calycinis lanceolatis lineari-ſubulatis, ſtaminibus quinque ſterilibus. W.
M. foliis cordatis quinquenerviis ſerrulatis cauleque hirtis, pedunculis bifidis, ſtaminibus quinque ſterilibus. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 59. *
M. (*grandiflora*) caule et foliis hirſutis cordatis acuminatis, flore violaceo. *Aubl. guj.* 1. *p.* 414. *t.* 160. *
Groſsblütiger Schwarzſchlund. W.
*Habitat in pratis* Cajennae *et* Gujanae. ♄

*37. MELASTOMA *elegans.*
M. hiſpida, foliis cordatis inaequaliter crenato-dentatis, racemis dichotomiae terminalibusque paucifloris. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 44. *
M. (*elegans*) foliis cordatis piloſis eleganter crenatis, floribus corymboſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 427. *t.* 167. *
Schöner Schwarzſchlund. W.
*Habitat in* Cajennae *muris antiquis.* ♄

*38. MELASTOMA *rufeſcens.*
M. foliis cordatis crenulatis ſcabris ſubtus tomentoſis, floribus terminalibus glomerato-ſpicatis. W.
M. (*rufeſcens*) foliis craſſis rugoſis cordatis ſubtus tomentoſis ſubſeſſilibus. *Aubl. guj.* 1. *p.* 408. *t.* 157.
Fuchsfarbener Schwarzſchlund. W.
*Habitat in locis compeſtribus* Gujanae. ♄

*39. MELASTOMA *rubra.*
M. foliis cordatis ſubcrenatis ſubtus ferrugineo-tomentoſis, floribus axillaribus et lateralibus ſolitariis ſeſſilibus. W.
M. (*rubra*) foliis ſubcordatis ſeſſilibus, floribus axillaribus. *Aubl. guj.* 1. *p.* 416. *t.* 161. *
Rother Schwarzſchlund. W.
*Habitat ad rivulorum ripas* Gujanae. ♄

*40. MELASTOMA *Majeta.*
M. foliis obovatis acuminatis quinquenerviis ſubcrenulatis piloſis, baſi ad petiolum veſiculoſis, floribus ſolitariis axillaribus ſeſſilibus, calyce ſquamoſo. W.
M. (*Majeta*) piloſa, foliis ovatis acuminatis baſi veſiculoſis, floribus ſeſſilibus, calyce ſquamis involucrato. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 34. *

Majeta gujanenſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 443. *t.* 176. *
Beutelblättriger Schwarzſchlund. W.
*Habitat in ſylvis* Gujanae. ♄

Folia *ut in toto genere oppoſita, ſed altero ſemper duplo minore.* Haec *et binae ſequentes gaudent veſica ſingulari ad folii baſin.* W.

*41. MELASTOMA *heterophylla.*
M. piloſa foliis oppoſitis diſparibus denticulatis, petiolis ſuperne veſiculoſis, paniculis breviſſimis lateralibus. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 35. *
Verſchiedenblättriger Schwarzſchlund. W.
*Habitat in* Peru. ♄

Folia *oppoſita quinquenervia, alterum petiolatum ovato-oblongum acuminatum, veſica inſtructum, alterum minus, ſeſſile cordatum vix veſica donatum.* Lamarck l. c.

*42. MELASTOMA *Phyſiphora.*
M. foliis ovatis attenuatis denticulatis ciliatis, petiolis hiſpidis apice veſiculoſis. *Vahl. ecl.* 1. *p.* 45. *
Tococa gujanenſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 438. *t.* 174. *
Blaſentragender Schwarzſchlund. W.
*Habitat ad viarum margines* Cajennae, Gujanae. ♄

Racemus *terminalis erectus ſubcompoſitus.* W.

*43. MELASTOMA *purpurea.*
M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis quinquenerviis piloſis ſubdenticulatis, ramis bifidis paniculatis terminalibus. W.
M. (*purpuraſcens*) floribus racemoſis, foliis ovato-oblongis acuminatis, denticulis caule et ramis hiſpidis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 402. *t.* 154. *
Purpurbeeriger Schwarzſchlund. W.
*Habitat ad ripas rivulorum* Gujanae. ♄

*44. MELASTOMA *argentea.*
M. foliis quinquenerviis ſubdenticulatis ovatis glabris, ſubtus tomentoſis candidis, paniculis terminalibus patentibus. *Swartz prod.* 70. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 779.
Acinodendron americanum quinquenervium comantibus floſculis, foliis ampliſſimis glabris, prona parte albicantibus. *Pluk. mant.* 4.
Groſſulariae fructu arbor maxima non ſpinoſa, malabathri folio maximo inodoro, flore racemoſo albo. *Sloan. jam.* 164. *hiſt.* 2. *p.* 84. *t.* 196. *f.* 1. *Raj. hiſt.* 3. *dendr. p.* 26.

Silberfarbener Schwarzschlund. W.
*Habitat ad littus* Mosquito-shore Americes. ♄

*45. MELASTOMA *elata.*
M. foliis quinquenerviis serrato-denticulatis oblongis coriaceis, subtus ferrugineo-tomentosis, paniculis terminalibus patentibus, floribus sessilibus. *Swartz prod.* 70. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 781.*
Grosser Schwarzschlund. W.
*Habitat in montibus elevatioribus* Iamaicae *aliarumque insularum* Indiae *occidentalis.* ♄
*Differt a M. argentea cui proxima:* foliis *argute nervosis ferrugineo-tomentosis, nec argenteo-albidis,* paniculis *erectioribus,* floribus*que subsessilibus.* Swartz l. c.

*46. MELASTOMA *impetiolaris.*
M. foliis quinquenerviis denticulatis subsessilibus oblongis acuminatis coriaceis, subtus tomentoso-ferrugineis, paniculis terminalibus axillaribusque erectis, floribus sessilibus. *Swartz prod.* 70. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 788.*
Sitzender Schwarzschlund. W.
*Habitat in* India *occidentali.* ♄

47. MELASTOMA *fragilis.*
M. foliis quinquenerviis ovatis reticulatis serratis, racemis brachiatis terminalibus, pedunculis inferioribus trifidis, pedicellis subbifloris. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 44.*
M. foliis quinquenerviis reticulatis, racemis floribus secundis sessilibus. *Lin. suppl.* 256.
Coa-ghiyryo. *Marcg. bras.* 59. *Piso. bras.* 217.
Texauatl. *Hernand. mex.* 414.
Zerbrechlicher Schwarzschlund. W.
*Habitat in* Brasilia, Mexico *et* Surinamo. *C. G. Dahlberg.* ♄
Frutex *rigidulus.* Folia *opposita brevius petiolata ovata quinquenervia laevia serrata ciliata reticulata fragilissima.* Racemus *terminalis brachiatus, racemulis trifidis e basi floriferis.* Flores *sursum secundi.* Antherae *in fundo umbilici decem.* Fructus *majores globosi pisiformes glabri, umbilico excavato; minores umbilico clauso squamis quinque.*

*48. MELASTOMA *coriacea.*
M. foliis quinquenerviis cartilagineo-denticulatis ovatis rugosis glabris coriaceis, ramulis petiolisque strigosis, paniculae ramis tetragonis, floribus subsessilibus. *Swartz prod.* 70. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 790.*

Lederblättriger Schwarzschlund. W.
*Habitat in summitate montis* la Soufrière *insulae* Guadeloupae. ♄

49. MELASTOMA *grossa.*
M. foliis integerrimis quinquenerviis subcordatis scabris. *Lin. suppl.* 236.
Ansehnlicher Schwarzschlund. W.
*Habitat in* Nova Granada. *D. Mutis.* ♄
Arbor *ramis rigidiusculis teretibus hispidis.* Folia *cordata ovata integerrima quinquenervia hirsutie rigidula densissima quasi tomentosa.* Flores *in apice ramorum subsessiles grossi.* Calyx *validus, pilis strigosus.* Corolla *extus parum pilosa.*

50. MELASTOMA *malabathrica.*
M. foliis integerrimis quinquenerviis lanceolato-ovatis scabris. *Fl. zeyl.* 171. * *Mill. dict. n.* 7. *Burm. ind.* 104.
M. quinquenervia hirta major, capitulis sericeis villosis. *Burm. zeyl.* 155. *t.* 73.
Kedali. *Rheed. mal.* 4. *p.* 87. *t.* 42.
Fragarius niger. *Rumph. amb.* 4. *p.* 137. *t.* 72.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 627.
Malabarischer Schwarzschlund. W.
*Habitat in* India. ♄

*51. MELASTOMA *strigillosa.*
M. foliis quinquenerviis subdenticulatis acuminatis, superne strigoso-pilosis subtus tomentosis, racemis axillaribus, floribus pedicellatis confertis. *Swartz prod.* 71. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 793. *
Borstiger Schwarzschlund. W.
*Habitat in* Jamaica *rarius.* ♄

*52. MELASTOMA *Tamonea.*
M. foliis quinquenerviis oblongo-lanceolatis acutis integerrimis subtus tomentoso-incanis, racemis terminalibus compositis, racemulis brachiatis, pedunculis umbellulatis, bracteis geminis. *Swartz prod.* 70. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 783. *
Fothergilla mirabilis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 441. *t.* 175. *
Grossulariae fructu arbor maxima non spinosa, malabathri folio integro minori, subtus albido, fructu majori *Sloan. jam.* 164. *hist.* 2. *p.* 84. *Raj. hist.* 3. *p.* 1501. *et* 1642.
Beblätterter Schwarzschlund. W.

*Habitat in montibus* Jamaicae *auſtralis et in inſulis* Caribaeis *inque ſylvis* Cajennae *et* Gujanae. ♄

*53. MELASTOMA *albicans.*

M. foliis quinquenerviis integris ovatis acutis, ſupra glabris; ſubtus tomentoſis albido-ferrugineis, racemis terminalibus erectis, floribus confertis ſeſſilibus. *Swartz prod.* 70. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 786. *

Weiſslicher Schwarzſchlund. W.

*Habitat in montibus* Jamaicae *inque* Braſilia *ad portum* Rio di Janeiro. ♄

*54. MELASTOMA *capitata.*

M. foliis quinquenerviis lato-lanceolatis integerrimis, capitulis terminalibus involucratis, ramis tetragonis, filamentis appendiculatis. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 45. *

Kopfblütiger Schwarzſchlund. W.

*Habitat in* India *occidentali.* ♄

*55. MELASTOMA *ſplendens.*

M. foliis quinquenerviis integris oblongis acuminatis utrinque glabris, ſuperne nitidis, paniculis terminalibus erectis, floribus ſubumbellatis. *Swartz prod.* 70. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 789. *

Groſſularia plantaginis folio lato, fructu minimo coeruleo. *Plum. ſpec.* 18. *t.* 140. *Tournef. inſt.* 640.

Leuchtender Schwarzſchlund. W.

*Habitat in ſylvis montium* Jamaicae. ♄

56. MELASTOMA *laevigata.*

M. foliis integerrimis quinquenerviis ovato-oblongis laeviuſculis acuminatis: margine laevibus. *Sp. pl.* 559. *Swartz obſ.* 176. *

Melaſtoma fruticoſa minor, foliis tenuibus ovatis, racemis terminalibus. *Brown. jam.* 219.

Groſſularia fructu non ſpinoſo malabathri folio oblongo, floribus herbaceis racemoſis, fructu nigro. *Sloan. cat.* 165. *hiſt.* 2. *p.* 140. *Raj. hiſt.* 2. *dend.* 26. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 628.

Polirter Schwarzſchlund. W.

*Habitat in* America. ♄

*Folia tenuiora et minus conſiſtentia. Racemi terminales compoſiti Floribus minutis.*

57. MELASTOMA *criſpata.*

M. foliis integerrimis quinquenerviis quaternis, ramis criſpatis. *Sp. pl.* 560. †

Funis muraenarum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 66. *t.* 35.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 631.
Krauſsſtieliger Schwarzſchlund. W.
*Habitat in* Amboina. ♄

* * * * * * *Octandrae, foliis trinerviis.*

*58. MELASTOMA *hirſuta.*
M. foliis trinerviis ſubdenticulatis lato-lanceolatis attenuatis hirſutis, pedunculis axillaribus divaricatis trifidis, floribus octandris. *Swartz prod.* 72. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 801.
Raucher Schwarzſchlund. W.
*Habitat in montibus* Jamaicae *auſtralis ad thermas prope* Bath. ♄

*59. MELASTOMA *microphylla.*
M. foliis trinerviis ſubdenticulatis ovatis obtuſis ſuperne hiſpidis, ſubtus tomentoſis ferrugineis, pedunculis trifidis axillaribus, floribus octandris. *Swartz prod.* 72. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 813.
Kleinblättriger Schwarzſchlund. W.
*Habitat in* Jamaicae *auſtralis paroecia* St. Thomae *in valle.* ♄
*Differt a M. hirſuta, cui proxima:* foliis *ovatis obtuſis minoribus, nec attenuato-acuminatis, ſuperne hiſpidis, infra tomentoſo-hirſutis,* floribus *minoribus;* pedunculis *plerumque ſimplicibus.* Swartz l. c.

*60. MELASTOMA *micrantha.*
M. foliis trinerviis denticulatis oblongis utrinque acutis glabris, racemis axillaribus reclinatis, floribus acuminatis octandris. *Swartz prod.* 71. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 803.
Kleinblütiger Schwarzſchlund. W.
*Habitat in montibus altioribus* Jamaicae *occidentalis.* ♄

*61. MELASTOMA *capillaris.*
M. foliis trinerviis ſubdenticulatis lato-lanceolatis attenuatis glabris, pedunculis capillaribus axillaribus trifloris, floribus octandris. *Swartz. prod.* 71. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 808.
Haarſtieliger Schwarzſchlund. W.
*Habitat in montibus* Jamaicae *auſtralis.* ♄
*A congeneribus diſcrepat:* foliis *in longum acumen attenuatis,* pedunculis *capillaribus.* Swartz l. c.

*62. MELASTOMA *rubens.*
M. foliis trinerviis denticulatis ovato-lanceolatis glaberrimis, ramis petiolisque coloratis, racemo terminali,

floribus confertis dioicis octandris. *Swartz prod.* 71. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 797. *

M. foliis ovatis nitidis minutiſſime denticulatis, venis et ramulis purpuraſcentibus. *Brown. jam.* 219.

Röthlicher Schwarzſchlund. W.

*Habitat in alpibus* Jamaicae *auſtralis.* ♄

*Diſtincta, omnibus fere partibus purpuraſcentibus, ſiccatis atreſcentibus, floribus dioicis. Numerus denarius rarior.* Swartz. l. c.

*63. MELASTOMA *glabrata.*

M. foliis trinerviis ſubdenticulatis ovatis acutis glabris coriaceis, pedunculis terminalibus ſolitariis unifloris, floribus octandris. *Swartz prod.* 71. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 806. *

Einblütiger Schwarzſchlund. W.

*Habitat in alpibus* Jamaicae *auſtralioris.* ♄

*64. MELASTOMA *glanduloſa.*

M. foliis trinerviis integerrimis ovatis, ſuperne ſtrigoſo-ſcabris, ſubtus hirſuto-hiſpidis glanduloſis, racemis terminalibus, floribus confertis octandris. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 799. *

Drüſiger Schwarzſchlund. W.

*Habitat in ſummis montibus* Jamaicae. ♄

*65. MELASTOMA *hirtella.*

M. foliis trinerviis integerrimis, margine hiſpido-piloſis, pedunculis breviſſimis axillaribus trifloris, floribus octandris. *Swartz prod.* 72. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 810. *

Gefranzter Schwarzſchlund. W.

*Habitat in montibus elevatioribus* Jamaicae. ♄

*66. MELASTOMA *triflora.*

M. foliis trinerviis elliptico-lanceolatis integerrimis, ramis petiolis calycibusque ſtrigoſis, floribus axillaribus ſubpedunculatis ternis. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 46. *

Dreyblütiger Schwarzſchlund. W.

*Habitat in* Caribaeis. ♄

67. MELASTOMA *octandra.*

M. foliis integerrimis trinerviis ovato-lanceolatis glabris, margine nervisque ſubtus hiſpidis, floribus terminalibus. W.

M. foliis integerrimis trinerviis ovatis glabris margine hiſpidis. *Fl. zeyl.* 173. *

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 630.

Achtfädiger Schwarzſchlund. W.

*Habitat in* Zeylona. ♄ (v. f.)
*Diſtinctiſſima a M. repente.* W.

*68. MELASTOMA *divaricata.* W.
M. foliis trinerviis integerrimis ovatis acutis ſubtus puberſcentibus, panicula terminali divaricata, floribus octandris. W.
Ausgebreitetblütiger Schwarzſchlund. W.
*Habitat in* India *orientali.* ♄ (v. f.)
Rami *ſeniores nigricantes teretes glabri, juniores ferrugineo-tomentoſi.* Folia *oppoſita petiolata ovata, breviſſime acuminata, integerrima trinervia, ſuperne nitida glabra, inferne tomento fuſco tenui tecta.* Panicula *terminalis divaricata.* Pedunculi *fuſco-tomentoſi.* Calyx *urceolatus truncatus tomentoſus.* Petala *quatuor ovata acuta.* Antherae *ſubſeſſiles vel breviſſimis filamentis ſuffultae.* Fructus *Piperis magnitudine.* W.

*69. MELASTOMA *tetrandra.*
M. foliis trinerviis integerrimis oblongis baſi emarginatis convexiuſculis glabris, racemo erecto terminali, floribus tetrandris. *Swartz prod.* 72. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 795. *
Vierfadiger Schwarzſchlund. W.
*Habitat in cacumine montium coeruleorum* Jamaicae *auſtralis.* ♄

*70. MELASTOMA *faſcicularis.*
M. foliis trinerviis integerrimis ovatis acutis ſcabris, ramis floriferis, floribus confertis pedunculatis octandris. *Swarz prod.* 71. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 801. *
Büſchelblütiger Schwarzſchlund. W.
*Habitat in ſylvis montium* Jamaicae *interioris.* ♄

*71. MELASTOMA *anguſtifolia.*
M. foliis trinerviis lineari-lanceolatis integerrimis ſubtus incanis, ramis virgatis, paniculis terminalibus, floribus erectis octandris. *Swartz prod.* 71. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 796. *
Schmalblättriger Schwarzſchlund. W.
*Habitat in* Jamaica *inque inſula* St. Johannis. ♄

*72. MELASTOMA *purpuraſcens.*
M. foliis trinerviis integerrimis oblongis acutis ſtriatis glaberrimis, racemis lateralibus tripartitis patulis, floribus octandris. *Swartz prod.* 71. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 804. *
Geſtreifter Schwarzſchlund. W.

*Habitat in montibus excelsis* Jamaicae. ♄

Folia *fere triplinervia.* Species *a reliquis facile distinguenda:* foliis *parallele striatis glaberrimis*, racemis *lateralibus subpaniculatis.* Swartz l. c.

*73. MELASTOMA *alpina.*

M. foliis trinerviis integerrimis ovatis coriaceis glabris, paniculis simpliciter trichotomis, floribus distinctis octandris. *Swartz prod.* 71. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 800.*

Alpen Schwarzschlund. W.

*Habitat in regione muscosa montis la* Soufriere *insulae* Guadeloupe. ♄

******* *Octandrae, foliis triplinerviis.*

*74. MELASTOMA *verticillata.*

M. foliis triplinerviis oblongis attenuatis denticulatis villosis, supra scabris, racemis axillaribus, floribus verticillatis. *Vahl eclog.* 1. *p.* 47. *

Wirtelblütiger Schwarzschlund. W.

*Habitat in* Caribaeis. ♄

*75. MELASTOMA *acuminata.*

M. foliis triplinerviis ovatis extrorsum denticulatis acuminatis subtus incanis, corymbis terminalibus fastigiatis. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 47. *t.* 7.*

M. (*cinnamomifolia*) foliis subintegerrimis triplinerviis lanceolatis acuminatis. *Iacq. collect.* 2. *p.* 111. *t.* 6. *f.* 2?

Langzugespitzter Schwarzschlund. W.

*Habitat in* Montserrat. ♄

*76. MELASTOMA *lateriflora.*

M. foliis obovatis acuminatis setacco-subserratis glabris, pedunculis infrafoliaceis aggregatis unifloris. *Vahl eclog.* 1. *p.* 48. *

Seitenblütiger Schwarzschlund. W.

*Habitat versus cacumina montium insulae* Montserrat. ♄

*77. MELASTOMA *elacagnoides.*

M. foliis triplinerviis integerrimis lato-lanceolatis subtus albido-tomentosis, pedunculis terminalibus trichotomis, floribus solitariis. *Swartz prod.* 72. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 815.*

Oleasterblättriger Schwarzschlund. W.

*Habitat in insula* St. Johannis Americes. ♄ (v. s.)

78. MELASTOMA *ſcabroſa.*

M. foliis triplinerviis denticulatis ovatis ſcabris hirſutis, floribus axillaribus aggregatis ſeſſilibus octandris. *Swartz obſ.* 174. *

M. foliis denticulatis quinquenerviis cordatis ſcabris ſubtus tomentoſis, ramis tomentoſo-villoſis. *Sp. pl.* 558.

M. ſubhirſuta, foliis cordatis ſcabris minutiſſime denticulatis reticulatis, racemis minoribus alaribus. *Brown. jam.* 219. *t.* 24. *f.* 3.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 622.

Gehäuftblütiger Schwarzſchlund. W.

*Habitat in* Jamaicae *montibus frigidioribus.* ♄

*79. MELASTOMA *virgata.*

M. foliis triplinerviis integerrimis ovato-lanceolatis acuminatis glaberrimis, ramis virgatis floriferis, racemis decuſſatis diffuſis ſparſis, floribus octandris. *Swartz prod.* 72. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 816. *

Ruthenförmiger Schwarzſchlund. W.

*Habitat in* Jamaicae *ſylveſtribus montium.* ♄

******** *Octandrae, foliis quinquenerviis.*

*80. MELASTOMA *umbroſa.*

M. foliis quinquenerviis lato-ovatis acuminatis utrinque hirtis, ramulis floriferis, racemis dichotomis patentibus, floribus octandris. *Swartz prod.* 72. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 817. *

Schattenliebender Schwarzſchlund. W.

*Habitat in inſula* St. Chriſtophori *aliisque inſulis* Caribaeis. ♄

*Diſtinctiſſima:* foliis *maximis,* ramis*que patentiſſimis.* Swartz l. c.

*81. MELASTOMA *hiſpida.*

M. foliis quinquenerviis ſubdenticulatis ovatis acutis, ſuperne ſtrigoſo-hirſutis, ſubtus reticulato-tomentoſis, paniculis terminalibus divaricatis, floribus octandris. *Swartz prod.* 72. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 821. *

Netzblättriger Schwarzſchlund. W.

*Habitat in* Jamaicae *montibus.* ♄

*82. MELASTOMA *ſeſſiliflora.*

M. villoſo-ſubtomentoſa, foliis quinquenerviis lanceolato-ovatis denticulatis ſubpetiolatis, floribus axillaribus ſeſſilibus ſubverticillatis. *Vahl eclog.* 1. *p.* 49. *

Stiellosblütiger Schwarzſchlund. W.
*Habitat in* America *meridionali.* ♄

*83. MELASTOMA *piloſa.*
M. foliis quinquenerviis ſubdenticulatis oblongis acutis, nervis ſubtus, ramulis racemisque lateralibus piloſo-hirſutis, floribus octandris. *Swartz prod.* 72. *Fl. ind.* 2. *p.* 819.
Dünnhaariger Schwarzſchlund. W.
*Habitat in ſylvis montium* Jamaicae. ♄
*M. micranthae proxima, diverſa tamen:* foliis *quinquenerviis ſubtus* ramis*que piloſo-hirſutis;* racemis *erectiuſculis nec reclinatis lateralibus* (*nec axillaribus*) *hirſutis;* petalis *ſubrotundis.* Swartz l. c.

84. MELASTOMA *diſcolor.*
M. foliis quinquenerviis ſubintegerrimis oblongis acuminatis glabris ſubtus flavo-incanis, racemis cymoſis, floribus octandris. *Swartz obſ.* 178.
M. foliis integerrimis quinquenerviis oblongo-ovatis glabris margine laevibus. *Sp. pl.* 560.
M. floribus octandris, foliis quinquenerviis. *Iacq. amer.* 230. *t.* 84.
Groſſularia plantaginis folio apicibus candidis et falcatis. *Plum. ic. t.* 42. *f.* 1.
Groſſulariae fructu non ſpinoſo malabathri foliis ſubtus niveis, fructu racemoſo umbellae modo diſpoſito. *Sloan. jam.* 165. *hiſt.* 2. *p.* 86. *t.* 198. *f.* 1.
Arbor americana quinquenervia comantibus floſculis, foliis ampliſſimis glabris prona parte albicantibus. *Pluk. alm.* 40. *t.* 264. *f.* 4.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 629.
Zweyfarbiger Schwarzſchlund. W.
*Habitat in* America *calidiore.* ♄

*85. MELASTOMA *coccinea.*
M. foliis quinquenerviis elliptico-ovatis acuminatis glabris integerrimis, thyrſo terminali, pedunculis pedicellisque nodoſis hiſpidis. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 48.
M. (*coccinea*) nodoſo-teres, foliis ovatis anguſto-acuminatis integris lucidis quinquenerviis, racemis ſubſeſſilibus laxifloris coccineis. *Act. Soc. hiſt. nat. pariſ.* 1. *p.* 109. ?
Scharlachrother Schwarzſchlund. W.
*Habitat in inſula* Montſerrat. ♄
*Variat flore albo.* Vahl. l. c.

## *863. MERIANIA.

*Swartz Fl. ind. occid.* 823.

*Cal.* 5-fidus campanulatus. *Petala* 5, calyci inſerta. *Stam.* declinata. *Capſ.* 5-locul. polyſperma.

*1. MERIANIA *leucantha.*

M. foliis oblongis nitidis, floribus bracteis geminis. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 826. *

Rhexia (*leucantha*) foliis oppoſitis cartilagineo-denticulatis coriaceis nitidis, ramulis tetragonis, floribus terminalibus decandris. *Swartz prod.* 61.

Weiſsblütige Merianie. W.

*Habitat in montibus altiſſimis* Jamaicae. ♄

*2. MERIANIA *purpurea.*

M. foliis ovato-lanceolatis, floribus bracteis quaternis. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 829. *

Rhexia (*purpurea*) foliis oppoſitis denticulatis coriaceis, ramulis teretibus, floribus axillaribus decandris. *Swartz prod.* 61.

Rothblütige Merianie. W.

*Habitat in ſummis montibus* Jamaicae. ♄

## 864. KALMIA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 743.

*Cal.* 5-partitus. *Cor.* hypocrateriformis: limbo ſubtus quinquecorni. *Capſ.* 5-locularis.

1. KALMIA *latifolia.*

K. foliis ovato-ellipticis ternis ſparſisque, corymbis terminalibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 64. *Willd. arb.* 161. *

K. foliis ovatis, corymbis terminalibus. *Amoen. acad.* 3. *p.* 13. * *Kalm. it.* 2. *p.* 43. *et* 3. *p.* 148. *Mill. dict. n.* 1. *Wang. amer.* 64. *t.* 24. *f.* 50. *

Andromeda foliis ovatis obtuſis, corollis corymboſis infundibuliformibus, genitalibus declinatis. *Gron. virg.* 160.

Chamae Daphne foliis tini, floribus bullatis. *Cateſb. car.* 2. *p.* 98. *t.* 98.

Ledum floribus bullatis confertis in ſummis caulibus. *Trew. ehret. t.* 38. *f.* 1.

Ciſtus Chamae Rhododendros mariana laurifolia, floribus expanſis ſummo ramulo in umbellam plurimis. *Pluk. alm.* 49. *t.* 379. *f.* 6.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 549.
Breitblättrige Kalmie. W.
*Habitat in* Marilandia, Virginia, Penſylvania. ♄ (v. v.)

2. KALMIA *anguſtifolia.*
K. foliis lanceolatis, corymbis lateralibus. *Amoen. acad.* 3. *p.* 14. *Kalm. it.* 3. *p.* 147. *Mill. dict. n.* 2. *Curt. mag.* 331. *Wangh. amer.* 65. *t.* 24. *f.* 51. * *Willd. arb.* 162. *
Azalea foliis lanceolatis integerrimis non nervoſis glabris, corymbis terminalibus. *Gron. virg.* 21.
Chamae Daphne ſempervirens, foliis oblongis anguſtis, foliorum faſciculis oppoſitis. *Cateſb. car.* 3. *p.* 17. *t.* 17. *f.* 1.
Ledum floribus bullatis faſciculatis ex alis oppoſitis foliorum. *Trew. ehret. t.* 38. *f.* 2.
Ciſtus ſempervirens laurifolia, floribus eleganter bullatis. *Pluk. alm.* 106. *t.* 161. *f.* 3.
Anonyma. *Cold. noveb.* 100.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 551.
Schmalblättrige Kalmie. W.
*Habitat in* Penſylvania, Nova Caeſarea, Noveboraco. ♄ (v. v.)
*Variat floribus rubris et cernuis.* Ait. Kew. 2. *p.* 64.

*3. KALMIA *glauca.*
K. foliis oppoſitis oblongis laevigatis ſubtus glaucis, margine revolutis, corymbis terminalibus, ramulis ancipitibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 64. *t.* 8. *Willd. arb.* 162. *
K. (*polifolia*) foliis lanceolatis revolutis, corymbis terminalibus ſpicatis *Wangh. Act. Soc. nat. ſcrut. Berol.* 8. *p.* 129. *t.* 5.*
Graue Kalmie. W.
*Habitat in* Terra Nova. ♄ (v. v.)

*4. KALMIA *hirſuta.*
K. foliis oppoſitis alternisque ellipticis hirſutis, pedunculis axillaribus uniſloris. W.
K. foliis ovato-lanceolatis hirſutis ſparſis, floribus racemoſis. *Curt. mag.* 138. *
K. ſuffruticoſa hirſuto-hiſpida, foliis ſublanceolatis revolutis alternis, floribus ſolitariis axillaribus. *Lamarck encycl.* 3. *p.* 333.*

K. foliis parvis lanceolatis hirſutis, floribus ſolitariis axillaribus, caule ſuffruticoſo villoſo. *Walt. carol.* 158.
Haarige Kalmie. W.
*Habitat in* Carolina *meridionali.* ♄

## 865. LEDUM.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 744.

*Cal.* 5-fidus. *Cor.* plana, 5-partita. *Capſ.* 5-locularis, baſi dehiſcens.

### 1. LEDUM *paluſtre.*

L. foliis linearibus margine revolutis ſubtus tomentoſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 65. *Willd. arb.* 167. *

Ledum. *Fl. lapp.* 160. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 352. *Mat. med.* 115. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 127. *Mill. dict. Reyg. ged.* 1. *p.* 113. *Du Roi. harbk.* 1. *p.* 361. *Mattuſch. ſil.* 1. *n.* 289. *Hoffm. germ.* 142. *Roth. germ. I.* 182. *II.* 465.

α. *erectum*, bipedale erectum. *Ait. l. c.*

L. foliis linearibus ſubtus hirſutis, floribus corymboſis. *Fl. ſuec.* 1. *n.* 341, 352.

Ciſtus Ledon foliis roſmarini ferrugineis. *Bauh. pin.* 467. *Du Ham. arb.* 13.

Roſmarinum ſylveſtre. *Cam. epit.* 546.

β. *decumbens*, ſpithamaeum decumbens. *Ait. l. c.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 552.

Sumpf Porſt. W.

*Habitat in* Europae *ſeptentrionalis paludibus uliginoſis*, β. *in ſinu* Hudſonis. ♄ (v. v.)

### *2. LEDUM *latifolium.*

L. foliis oblongis margine revolutis ſubtus tomentoſis, floribus ſubpentandris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 65. *Willd. arb.* 168. * *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 464. *collect.* 2. *p.* 308. *

L. (*groenlandicum*) foliis ellipticis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Retz. prod. Fl. ſcand. ed.* 2. *n.* 493. *Gunn. norv. n.* 1067. *Fl. dan.* 567.

Breitblättriger Porſt. W.

*Habitat in uliginoſis* Groenlandiae, *ſinus* Hudſonis *littoris* Labrador, Terrae novae, *et* Novae Scotiae. ♄

### *3. LEDUM *buxifolium.*

L. foliis ovato-oblongis planis glabris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 65.

Ledum buxifolium. *Berg. Act. petrop.* 1777. *p.* 213. *t.* 3. *f.* 2. *

Buchsbaumblättriger Porſt. W.
*Habitat in* Carolina *et* Nova Caeſarea. ♄ (v. ſ.)

## 866. RHODORA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 745.

*Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 3-petala. *Stam.* declinata. *Capſ.* 5-locul.

1. RHODORA *canadenſis.*

R. canadenſis. *Sp. pl.* 561. *Herit. ſtirp. nov.* 1. *p.* 141. *t.* 68. * *Willd. arb.* 287. *
Chamaerhododendros. *Duhamel. ſem. app.* 10. *t.* 27. *f.* 2.
Canadiſche Rhodore. W.
*Habitat in* Canada *et* Terra Nova. ♄ (v. v.)

Frutex *bipedalis.* Folia *alterna elliptica integerrima margine revoluta ſuperne glabra nitida, inferne palli-diora ſubpubeſcentia.* Flores *terminales umbellati.* W.

## 867. RHODODENDRON.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 746.

*Cal.* 5-partitus. *Cor.* ſubinfundibuliformis. *Stam.* declinata. *Capſ.* 5-locularis.

1. RHODODENDRON *ferrugineum.*

R. foliis glabris ſubtus leproſis, corollis infundibuliformibus. *Mill. dict. n.* 2. *Iacq. obſ.* 1. *p.* 26. *t* 16. *auſtr. t.* 255. *Scop. carn. n.* 479. *Willd. arb.* 284. *
R. foliis ellipticis, glabris, ſubtus rubiginoſis. *Hall. helv. n.* 1015.
Azalea maculis ferrugineis ſubtus adſperſa, floribus decandris. *Lemonier. Sauv. monſp.* 57.
Ledum alpinum, foliis ferrea rubigine nigricantibus. *Bauh. pin.* 468. *Raj. hiſt.* 1005.
Evonymus theophraſti. *Dalech. hiſt.* 27.
Montana allobrogum lentiſcifolia. *Lob. ic.* 366.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 553.
Roſtfarbiger Alpbalſam. W.
*Habitat in alpibus* Helveticis, Allobrogicis, Pyrenaeis, Sibiricis. ♄ (v. ſ.)

Corolla *declinata, inaequalis:* Petalis 2 *inferioribus anguſtioribus.*

Floribus *albis rara varietas. Hall. l. c.* R.

## 2. RHODODENDRON *dauricum.*

R. foliis glabris punctatis nudis, corollis rotatis. *Sp. pl.* 562. *Pall. ross.* 1. *p.* 47. *t.* 32. *

R. (*dauricum*) foliis glabris utrinque nudis, petiolis longissimis, corollis violaceis foliis amplioribus, rotatis. *Andrews repos. bot.* 4. *t.* 4.

Andromeda foliis ovatis utrinque punctatis. *Gmel. sib.* 4. *p.* 124. *n.* 10.

Chamaerododendros folio glabro majusculo, amplo flore roseo. *Amm. ruth.* 181. *t.* 27.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 555.

Davurischer Alpbalsam. W.

*Habitat in* Dauria. ♄

Caulis *nudus*, *proliferus*, *apice foliosus.* Folia *petiolata*, *oblonga*, *supra nuda*, *confertim utrinque punctata*, *subtus confertissime ferrugineo-punctata.* Corollae *violaceae*, *foliis ampliores.* Stamina *patentia*, *longitudine corollae.* Stylus *sanguineus.* Similis *Azaleae lapponicae.*

## *3. RHODODENDRON *camtschaticum.*

R. foliis obovatis acutis ciliatis nudis, corollis rotatis, petalis acutis. W.

R. (*camtschaticum*) foliis ciliatis nervosis, corollis rotatis, calycibus foliaceis. *Pall. ross.* 1. *p.* 48. 33. *

Chamaerhododendron berberis folio, flore amplo roseo. *Gmel. sib.* 4. *p.* 126. *n.* 13.

Camtschatischer Alpbalsam. W.

*Habitat in* Camtschatca *locis montosis lutosis versus mare* Ochotense *et in insula* Beringii. ♄

Folia *petiolata obovata acuta venosa* (*nec nervosa*) *ciliata*, *utrinque viridia.* Flores *magnitudine fere R. pontici rosei*, *pedunculati terminales subsolitarii.* Petala *ovata acuta.* W.

## 4. RHODODENDRON *hirsutum.*

R. foliis ellipticis acutiusculis ciliatis subtus punctatis, corollis infundibuliformibus. W.

R. foliis ciliatis nudis, corollis infundibuliformibus. *Mill. dict. n.* 1. *Iacq. austr. t.* 98. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 480.

R. foliis ovatis, ciliatis, subtus punctatis. *Hall. helv. n.* 1016.

Ledum alpinum hirsutum. *Bauh. pin.* 468. *Raj. hist.* 1005.

Nerium alpinum quibusdam, aliis Ledum hirsutum.
*Bauh. hist.* 3. *p.* 21 22. *Hall.* R.
Ledum alpinum. *Clus. hist.* 1. *p.* 82.
Balsamum alpinum. *Lob. ic.* 468.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 555.
Gefranzter Alpbalsam. W.
*Habitat in alpibus* Helveticis, Austriacis, Stiriacis. ♄ (v. f.)

5. RHODODENDRON *Chamaecistus.*

R. foliis ellipticis acutiusculis glanduloso-ciliatis nudis, corollis rotatis, petalis obtusis. W.
R. foliis ciliatis, corollis rotatis. *Iacq. austr. t.* 217. *Stop. carn. ed.* 2. *n.* 481.
Ledum foliis serpylli ad margines cilii instar pilosis, flore purpureo. *Mich. gen.* 225. *t.* 106.
Chamae Cistus hirsuta. *Bauh. pin.* 466.
Chamae Cistus VIII. *Clus. hist.* 1. *p.* 76.
Cistus pumilus montis Baldi. *Bauh. hist.* 2. *p.* 19. *Raj. hist.* 1005.
Cistus Chamaerhododendros foliis confertis ferrea rubigine nitentibus margine pilosis. *Pluk. alm.* 106. *t.* 25. *f.* 4.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 556.
Drüsiger Alpbalsam. W.
*Habitat in* Baldo *et prope* Salisburgum, *inque* Austria, Carniolia. ♄ (v. f.)

*6. RHODODENDRON *caucasicum.*

R. foliis scabris subtus ferrugineo-tomentosis, umbellis terminalibus, corollis rotatis, petalis subrotundis. W.
R. (*caucasicum*) foliis ovatis scabris, margine inflexis, subtus tomentoso-pallidis, umbellis terminalibus albifloris, bracteis elongatis. *Pall. ross.* 1. *p.* 46. *t.* 31.*
Caucasischer Alpbalsam. W.
*Habitat in summis alpibus* Caucasi *in regione nivali.* ♄
*Valde affine sequenti, cujus forte varietas, nisi differret:* foliis *subtus tomentosis et* floris *colore qui albus quandoque rubicundus est.* W.

7. RHODODENDRON *Chrysanthum.*

R. foliis oblongis scabris, subtus discoloribus glabris, umbellis terminalibus, corollis rotatis, petalis obovatis irregularibus. W.
R. foliis oblongis impunctatis supra scabris venosissimis,

corolla rotata irregulari, gemma florifera ferrugineo-tomentosa. *Lin. suppl.* 237.

R. foliis ovatis scabris, margine reflexis, subtus glabris, umbellis terminalibus, corollis flavis irregularibus. *Pall. ross.* 1. *p.* 44. *t.* 30. *

Rhododendron Chrysanthum. *Pall. it.* 3. *p.* 369. *app.* 724. *n.* 87. *t. N. f.* 1. 2. *Koelpin monogr.*

Rhododendron aureum. *Georgi itin. p.* 214.

Andromeda foliis ovatis utrinque venosis, corollis campanulatis obliquis. *Gmel. sib.* 4. *p.* 121. *t.* 54.

Gelber Alpbalsam. W.

*Habitat in* Siberiae *alpibus praesertim* Davuriae, *ad lacum* Baical *inque* Camtschatca *et insula* Beringii. ♄

Frutex *parvus diffusus, cortice fusco.* Folia *oblonga utrinque attenuata venoso-reticulata margine reflexo, subtus pallidiora.* Rami *inter folia squamis stipulaeformibus ferrugineis tecti, et terminantur pedunculis pluribus ex axillis superiorum squamarum uniforis.* Flos *magnus luteus rotatus nutans, figura R. daurici.*

*A R. daurico toto coelo distinctum.* W.

8. RHODODENDRON *ponticum.*

R. foliis oblongis glabris utrinque concoloribus, corymbis terminalibus, corollis campanulato-rotatis, petalis lanceolatis. *Willd. arb.* 285.*

R. foliis nitidis lanceolatis utrinque glabris, racemis terminalibus. *Sp. pl.* 562. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 78. *Pall. ross.* 1. *p.* 43. *t.* 29. *

Chamaerhododendros pontica maxima, folio lauroceraſi. *Tournef. cor,* 42. *it.* 2. *p.* 99.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 557.

Pontiſcher Alpbalſam. W.

*Habitat in* Oriente, Gibraltariae *ſubhumidis umbroſis.* *Alſtroemer.* ♄ (v. v.)

Folia *Prunii Lauroceraſi, perennia, acuta: Petiolis brevibus, glabris.* Racemus *terminalis, longitudine pedicellorum ſ. foliorum: Pedicellis alternis, nudis.* Calyx *minutiſſimus.* Corolla *campanulata, magnitudine Nerii, purpurea.* Stamina *declinata, longitudine corollae.*

*Similitudo cum* Azalea pontica, *ſed differt numero ſtaminum.* Schreb. *in nov. Act. Upſ.* 1. *p.* 90. R.

9. RHODODENDRON *maximum.*

R. foliis oblongis glabris ſubtus diſcoloribus, umbellis

terminalibus, corollis rotatis, petalis ſubrotundis. *Willd. arb.* 286.*

R. foliis nitidis ovalibus obtuſis venoſis margine acuto reflexo, pedunculis unifloris. *Sp. pl.* 563. *Trew. ehret. t.* 66. *Wangh. amer. p.* 63. *t.* 23. *f.* 49.

Ledum lauroceraſi folio. *Amoen. acad.* 2. *p.* 200.

Kalmia foliis lanceolato-ovatis nitidis ſubtus ferrugineis, corymbis terminalibus. *Mill. dict. t.* 329.

Chamaerhododendros, lauri folio, ſempervirens, floribus bullatis corymboſis. *Cateſb. car.* 3. *p.* 17. *t.* 17. *f.* 2.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 559.

Groſser Alpbalſam. W.

*Habitat in* Virginia. *Collinſon.* ♄ (v. v.)

Rami *et Folia magnitudine et conſiſtentia Padi Lauroceraſi dicti, venis reticulatis inſcripta, margine reflexa.* Lacinia *infima corollae maculata eſt.*

*10. RHODODENDRON *punctatum.*

R. foliis oblongis glabris, ſubtus reſinoſo-punctatis, umbellis terminalibus, corollis infundibuliformibus. W.

Rhododendron punctatum. *Dom ind. horti cantab.* 49.

Punctirter Alpbalſam. W.

*Habitat in* America *boreali.* ♄ (v. ſ.)

*Habitus praecedentis ſed* folia *inferne et coſta media punctis reſinoſis adſperſa et* corollae *infundibuliformes.* W.

## 868. ANDROMEDA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 747.

*Cal.* 5-partitus. *Cor.* ovata: ore 5-fido. *Capſ.* 5-locularis, valvulis diſſepimento contrariis.

1. ANDROMEDA *tetragona.*

A. foliis imbricatis carinatis margine nudis, pedunculis ſolitariis axillaribus, corollis campanulatis. W.

A. pedunculis ſolitariis lateralibus, corollis campanulatis, foliis oppoſitis imbricatis obtuſis revolutis. *Sp. pl.* 563. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 120. *n.* 5. *Pall. roſſ.* 2. *p.* 56. *t.* 73. *f.* 4.*

A. foliis quadrifariam imbricatis obtuſis. *Fl. ſuec.* 338, 356.

A. foliis quadrifariam imbricatis obtuſis, ex alis florens. *Fl. lapp.* 166. *t.* 1. *f.* 4. *Hort. cliff.* 163.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 563.
Viereckige Andromede. W.
*Habitat in alpibus* Lappónicis, Sibiricis. ♄ (v. f.)

*2. ANDROMEDA *ericoides.*

**A.** foliis imbricatis convexis margine ſetaceo-ciliatis, pedunculis ſolitariis axillaribus, corollis globoſis. W.
A. (*ericoides*) pedunculis lateralibus, floribus globoſis octandris, foliis quadrifariam imbricatis ciliatis. *Pall. roſſ.* 2. *p.* 56. *t.* 73. *f.* 3. *
Heideartige Andromede. W.
*Habitat in* Camtſchatca *et in ſummis alpibus* Davuriae. ♄
Capſula *quoad valvularum ſtructuram adhuc ignota.*
*Forte Ericae ſpecies.* W.

3. ANDROMEDA *hypnoides.*

**A.** foliis imbricatis ſubulatis glabris, pedunculis ſolitariis terminalibus, corollis globoſo-campanulatis. W.
**A.** pedunculis ſolitariis terminalibus, corollis campanulatis, foliis confertis ſubulatis. *Sp. pl.* 563. *Oed. dan. t.* 10. *Pall. it.* 3. *p.* 34.
**A.** foliis aciformibus confertis. *Fl. lapp.* 165. *t.* 1. *f.* 3. *Fl. ſuec.* 337, 355.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 564.
Moosartige Andromede. W.
*Habitat in alpibus* Lapponicis, Sibiricis. ♄ (v. f.)
Antherae *ariſtatae.*

*4. ANDROMEDA *lycopodioides.*

**A.** foliis imbricatis ſubulatis glabris, pedunculis ſubgeminatis axillaribus, corollis campanulatis. W.
A. (*lycopodioides*) pedunculis ſolitariis lateralibus, floribus campanulatis octandris, foliis quadrifariam imbricatis. *Pall. roſſ.* 2. *p.* 55. *t.* 73. *f.* 1. *
Erica foliis aceroſis glabris imbricatis ſquamatim caules amplexantibus, corollis campanulatis nutantibus, antheris bicornibus. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 130. *t.* 57. *f.* 1.
Bärlappenartige Andromede. W.
*Habitat in* Camtſchatcae *montibus circa mare* Ochotenſe *et in inſula* Beringii. ♄
*Simillima praecedenti, ſed* pedunculorum *ſitu atque* corolla *majori campanulata, ut et* ramis *tenuioribus* foliis*que brevioribus diverſa.* Capſulae *ſtructura adhuc ignota.* W.

*5. ANDROMEDA *empetrifolia.*
A. foliis oblongis obtusis integerrimis, pedunculis solitariis axillaribus, corollis globosis. W.
A. (*empetrifolia*) foliis minutis oblongo-ovatis sparsis, pedunculis lateralibus solitariis unifloris, corollis globosis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 154. *
Rauschbeerenblättrige Andromede. W.
*Habitat in freti* Magellanici *locis Sphagno repletis.* ♄

*6. ANDROMEDA *Myrsinites.*
A. foliis ovatis argute serratis, pedunculis solitariis axillaribus, corollis globoso-campanulatis. W.
A. (*Myrsinites*) foliis minutis ovato-lanceolatis serratis sparsis, pedunculis solitariis axillaribus brevissimis unifloris. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 154. * *illust. gen. t.* 365. *f.* 2.
Myrsineblättrige Andromede. W.
*Habitat in freti* Magellanici *sylvaticis montosis.* ♄
*Habitu simillima Arbuto microphyllae.* W.

7. ANDROMEDA *mariana.*
A. pedunculis aggregatis rameis, corollis ovato-cylindricis, foliis oblongo-ovatis integerrimis deciduis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 67.
A. pedunculis aggregatis, corollis cylindricis, foliis alternis ovatis integerrimis. *Sp. pl.* 564. *Mill. dict. n.* 2. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 465. *Collect.* 2. *p.* 326. *
A. foliis ovatis, pedunculis fasciculatis, capsulis pentagonis apice dehiscentibus. *Gron. virg.* 49.
α. foliis ovalibus.
Arbuscula mariana, brevioribus evonymi foliis pallide virentibus, floribus arbuteis ex eodem nodo plurimis, spicatim uno versa erumpentibus. *Pluk. mant.* 25. *t.* 448.
β. foliis oblongis.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 565.
Marilandische Andromede. W.
*Habitat in* Virginia. ♄
Antherae *muticae.* Corollae *cylindrico-campanulatae.*

*8. ANDROMEDA *ferruginea.*
A. pedunculis aggregatis axillaribus, corollis subglobosis, foliis ellipticis integerrimis subtus squamoso-farinosis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 67.
Rostfarbige Andromede. W.
*Habitat in* America *boreali.* ♄ (v. s.)

*9. ANDROMEDA *fasciculata.* †
A. pedunculis aggregatis, foliis alternis ovato-lanceolatis obtusis subcrenatis coriaceis. *Swartz prod.* 73. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 836. *
Büschelblütige Andromede. W.
*Habitat in montibus* Jamaicae *australioris.* ♄
*Distinguitur ab A. mariana*: foliis *longioribus obtusioribus aveniis coriaceis.* Swartz l. c.

*10. ANDROMEDA *jamaicensis.*
A. pedunculis aggregatis, corollis ovatis diaphanis, foliis alternis lato-lanceolatis obtusis integerrimis subtus cinereis. *Swartz prod.* 73. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 838. *
Westindische Andromede. W.
*Habitat in summis montibus* Jamaicae. ♄
*Affinis A. marianae, sed differt*: habitu, foliis *angustioribus subtus cinereo-ferrugineis*, floribus *minoribus ovatis diaphanis.* Swartz l. c.

*11. ANDROMEDA *octandra.*
A. pedunculis aggregatis, corollis cylindricis quadrifidis, foliis alternis ovato-lanceolatis integris. *Swartz prod.* 73. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 840. *
Achtfädige Andromede. W.
*Habitat in montibus altissimis* Jamaicae *australis.* ♄
*An forte Menziesiae species?* W.

*12. ANDROMEDA *pulverulenta.* †
A. pedunculis aggregatis, corollis campanulatis, foliis ovatis dentatis. W.
Andromeda pulverulenta. *Bartram. it. ed. germ. p.* 453. *t.* 8.
Bestäubte Andromede. W.
*Habitat in* Florida. ♄

13. ANDROMEDA *polifolia.*
A. pedunculis aggregatis, corollis ovatis, foliis alternis lanceolatis revolutis. *Mill. dict. n.* 1. *Gmel. sib.* 4. *p.* 119. *Hall. helv. n.* 1017. *Pollich. pal. n.* 394. *Hoffm. germ.* 142. *Mattusch. sil. n.* 290. *Fl. dan. t.* 54. *Roth. germ. I.* 182. *II.* 466. *Iacq. Collect.* 2. *p.* 37. *
α. *latifolia* foliis oblongis, corollis ovatis incarnatis, laciniis calycinis patentibus ovatis albis interdum apice rubicundis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 68.
β. *media*, foliis lanceolatis, corollis oblongo-ovatis rubicundis, laciniis calycinis magis erectis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 68.

A. foliis alternis lanceolatis margine reflexis. *Fl. lapp.* 173. *t.* 1. *f.* 3. *Fl. suec.* 335, 353. *Hort. cliff.* 163. *Roy. lugdb.* 440. *Hall. opusc.* 140.
Rhododendron polifolium. *Scop. carn. n.* 482.
Polifolia. *Buxb. act.* 2. *p.* 345. *cent.* 5. *p.* 28. *t.* 49. *f.* 1.
Vitis idaeae affinis polifolia montana. *Bauh. hist.* 1. *P.* 1. *p.* 525.
Erica humilis, rosmarini foliis, unedonis flore, capsula cistoide. *Pluk. alm.* 136. *t.* 175. *f.* 1.
γ. *angustifolia*, foliis lanceolato-linearibus, laciniis calycinis oblongis rubris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 68.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 566.
Poleiblättrige Andromede. W.
*Habitat in turfosis uliginosis* α. *in* America *boreali.* β. *in* Europa *et* Asia *boreali* γ. *in* Terra nova *et littore* Labrador. ♄ (α. β. v. v.)
Antherae *aristatae.*

*14. ANDROMEDA *salicifolia.*
A. racemis secundis nudis, corollis subcylindricis, foliis lanceolatis acutis integerrimis. *Smith. ic. pl. incd.* 1. *p.* 58. *t.* 58. *
A. (*salicisfolia*) arborescens, racemis terminalibus, floribus sparsis erectis, foliis peracute lanceolatis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 158. *
β. foliis ovato-lanceolatis. *Lamarck l. c.*
Weidenblättrige Andromede. W.
*Habitat in insula* Mauritii. ♄
Folia *subtus alba, et quod memoratu dignum, trinervia.* W.

*15. ANDROMEDA *buxifolia.*
A. racemis secundis nudis, corollis subcylindricis, foliis cordato-ovatis integerrimis mucronulatis. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 59. *t.* 59. *
A. fruticosa, racemis terminalibus erectis, floribus sparsis nutantibus ovatis, foliis, abstracto apiculo terminali, cordato-ovatis obtusissimis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 158. *
Buchsbaumblättrige Andromede. W.
*Habitat in insula* Barboniae. W.

*16. ANDROMEDA *japonica.*
A. racemis secundis paniculatis terminalibus, foliis lanceolato-obovatis acutis apice serrulatis. W.
A. (*japonica*) racemis paniculatis cylindricis bracteatis,

foliis ellipticis reflexis apice ſerratis. *Thunb. jap.* 181. *t.* 22. *

Japaniſche Andromede. W.

*Habitat in* Japonia. ♄

17. ANDROMEDA *paniculata.*

A. racemis terminalibus paniculatis, corollis ſubrotundis, foliis ovatis integriuſculis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 69.

A. racemis ſecundis nudis paniculatis, corollis ſubcylindricis, foliis alternis oblongis crenulatis. *Sp. pl.* 564. *Mill. dict. n.* 3.

A. foliis ovatis acutis crenulatis planis alternis, floribus racemoſis. *Hort. cliff.* 162. *Gron. virg.* 48.

Vitis idaea americana, longiori mucronato et crenato folio, floribus urceolatis racemoſis. *Pluk. alm.* 391.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 569.

Riſpenblütige Andromede. W.

*Habitat in* Virginia. ♄ (v. ſ.)

Antherae *ariſtatae.*

18. ANDROMEDA *arborea.*

A. paniculis terminalibus, corollis ſubpubeſcentibus, foliis ellipticis acuminatis denticulatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 69.

A. racemis ſecundis nudis, corollis rotundo-ovatis. *Sp. pl.* 565. *Mill. dict. n.* 4.

A. arborea, foliis oblongo-ovatis integerrimis, floribus paniculatis nutantibus, racemis ſimpliciſſimis. *Gron. virg.* 48.

Frutex foliis oblongis acuminatis, floribus ſpicatis uno verſu diſpoſitis. *Cateſb. car.* 1. *p.* 71. *t.* 71.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 570.

Baumartige Andromede. W.

*Habitat in* Virginia, Carolina. ♄ (v. ſ.)

19. ANDROMEDA *racemoſa.*

A. racemis terminalibus ſimplicibus bracteatis, corollis cylindricis, foliis oblongo-lanceolatis ſerratis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 69. *Willd. arb.* 21. *

A. racemis ſecundis bracteatis, corollis gibboſo-cylindricis, foliis alternis oblongis ſerratis. *Sp. pl.* 564. *Wangh. amer.* 104.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 570.

Traubenblütige Andromede. W.

*Habitat in* Penſylvania, *et* Marilandia. ♄ (v. v.)

*Haec differt a priori*: 1. *Racemis minus paniculatis.* 2. *Bractea ſub ſingulo flore lineari-lanceolata,*

*ſtricta, flore longiore, viridi, decidua; in praecedenti nulla bractea. 3. Capſulis retinentibus ſtylum, quem antecedens dimittit. 4. Foliis magis ſerratis.*

*20. ANDROMEDA *Cateſbaei.*

A. racemis terminalibus axillaribusve ſecundis, corollis ventricoſo-tubuloſis, foliis oblongo-lanceolatis tenuiſſime ſerrulatis. W.

A. (*Cateſbaei*) racemis ovatis axillaribus, corollis ventricoſo-tubuloſis bracteatis, foliis alternis petiolatis ovato-lanceolatis ſerrulatis craſſis perennantibus. *Walt. carol.* 137.

Frutex foliis ſerratis, floribus longioribus ſpicatis ſubviridibus, capſula pentagona. *Cateſb. carol.* 2. *p.* 43. *t.* 43.

Grünblütige Andromede. W.

*Habitat in* Virginia, Carolina. ♄

*21. ANDROMEDA *axillaris.*

A. racemis axillaribus ſimplicibus, corollis oblongis, foliis ovatis acutis ſerrulatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 69.

Winkelblütige Andromede.

*Habitat in* Carolina. ♄ (v. f.)

*22. ANDROMEDA *coriacea.*

A. racemis axillaribus ſimplicibus, foliis ovatis integerrimis nitidiſſimis, ramulis triquetris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 70.

Lederblättrige Andromede. W.

*Habitat in* America *boreali.* ♄ (v. f.)

*25. ANDROMEDA *acuminata.*

A. racemis axillaribus ſimplicibus, foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſerratis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 70. *Willd. arb.* 22. *

A. (*lucida*) racemis ſecundis nudis patentiſſimis, corollis ſubcylindricis, foliis integerrimis. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 79. *Collect.* 1. *p.* 95. *

Zugeſpitzte Andromede. W.

*Habitat in* America *boreali.* ♄

*24. ANDROMEDA *rupeſtris.*

A. racemis ſimpliciſſimis bracteatis, corollis campanulatis, foliis alternis oblongis ſerrulatis. *Forſt. prod. n.* 195.

A. foliis oblongis alternis ſerrulatis. *Lin. ſuppl.* 237.

Felſen Andromede. W.

*Habitat in* Nova Zeelandia. ♄

25. ANDROMEDA *anastomosans.*

A. foliis ovatis subserratis, subtus anastomosibus punctatis. *Lin. suppl.* 237.

Vieladrige Andromede. W.

*Habitat in* Nova Granada. *Mutis.* ♄

Frutex *determinate ramosus, ramis pilosis.* Folia *alterna conferta subpetiolata ovata acuta lucida, vix manifeste serrata, subtus venis anastomosantibus puncto elevato.* Racemi *ad genicula annotina conferti congesti ex racemis foliaceis, foliolis caulinis similibus, sed parvis.* Corollae *ovatae.* Antherae *aristis duabus, singulis iterum biaristatis.* Capsulae *obtusae, angulis dehiscentibus.*

26. ANDROMEDA *calyculata.*

A. pedunculis solitariis axillaribus secundis, bracteis binis, foliis ovalibus squamoso-punctatis obsolete serrulatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 70.

A. racemis secundis foliaceis, corollis subcylindricis, foliis alternis lanceolatis obtusis punctatis. *Fl. suec.* 2. *n.* 357. *Gort. inar.* 64. *Mill. dict. n.* 5.

α. *ventricosa,* corollis globosis, foliis oblongo-lanceolatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 70.

Chamaedaphne. *Buxb. in comment. petrop.* 1. *p.* 241. *t.* 8. *f.* 1.

β. *latifolia,* corollis oblongo-cylindraceis, foliis oblongo-ovalibus obtusis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 70. *Willd. arb.* 22.

γ. *angustifolia,* corollis oblongo-ovalibus, foliis oblongo-lanceolatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 70.

Andromeda. *Gmel. sib.* 4. *p.* 119. *n.* 4.

Cistus Ledon f. Andromeda, floribus monopetalis parvis albis tubulosis spicatim in summis ramulis dispositis, foliis et facie vitis idaeae, capsula minima sicca quinquepartita. *Gron. virg.* 2.?

Hydragonum. *Siegesb. petrop.* 56.

*Houttuyn Lin. Pfl.* Syst. 3. *p.* 571.

Rostblättrige Andromede. W.

*Habitat* α. *in* Russia β. *in* Terra nova. γ. in Europa *et* America *boreali inque* Sibiria. ♄ (β. v. v. γ. v. f.)

Frutex *foliis ovali-lanceolatis, coriaceis, myricae consistentia, obtusis, margine recurvis, adspersis punctis vix conspicuis, callosis, ab utraque parte.* Racemi *ex ramis propriis, foliolis ovalibus alternis, in*

*quorum ala Flos solitarius, pedicellatus.* Calyx *a basi tegitur duobus foliolis ovatis.* Flores *ad unum latus nutant.* Stamina 10, *antheris oblongis, muticis, bifidis.*

*Quoad floris structuram est Gaultheria, sed fructus Andromedae.* W.

## 869. EPIGAEA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 748.

*Cal.* exterior 3-phyllus: interior 5-partitus. *Cor.* hypocrateriformis. *Capf.* 5-locularis.

1. EPIGAEA *repens.*

E. foliis cordato-ovatis integerrimis, corollis cylindricis. *Swartz prod.* 74.

Epigaea repens. *Sp. pl.* 565. *Lamarck illust. gen. t.* 367. *f.* 1.

Epigaea. *Amoen. acad.* 3. *p.* 17. *Mill. dict. n.* 1.

Memecylum. *Mich. gen.* 13.

Arbutus foliis ovatis integris, petiolis laxis longitudine foliorum. *Gron. virg.* 49.

Pyrolae affinis repens fruticosa, foliis rigidis scabritie exasperatis, flore pentapetaioide fistuloso. *Pluk. alm.* 309. *t.* 107. *f.* 1. *Raj. suppl.* 596.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 572.

Kriechender Grundstrauch. W.

*Habitat in* Virginiae, Canadae *pinetis.* ♄ (v. s.)

*2. EPIGAEA *cordifolia.*

E. foliis cordatis subrotundis serratis convexis hispidis rigidis, corollis ovatis. *Swartz prod.* 73. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 842.

Epigaea. *Lamarck illust. gen. t.* 367. *f.* 2.

Gaultheria (*sphagnicola*) erecta, ramis parciusque foliis hirsutis, foliis subrotundo-cordatis convexis rigidis, serris setigeris. *Richard. in Act. Parisi. hist. nat.* 1. *p.* 109.

Herzblättriger Grundstrauch. W.

*Habitat in summitate montium* Guadeloupae, *inque* Cajenna. ♄

## 870. GAULTHERIA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 749.

*Cal.* exterior 2-phyllus; interior 5-fidus. *Cor.* ovata. *Nectarium* mucronibus 10. *Capſ.* 5-locularis, veſtita calyce interiore baccata.

### 1. GAULTHERIA *procumbens.*

G. foliis oblongo-obovatis mucronatis dentatis confertis, caule procumbente. W.

Gaultheria. *Kalm. Amoen. acad.* 3. *p.* 14.* *Duham. arb.* 1. *p.* 286. *t.* 113. *Mill. dict. Willd. arb.* 125.*

Vitis idaea canadenſis, pyrolae folio. *Tournef. inſt.* 608.

Anonyma pedunculis arcuatis. *Gold. noveb.* 98.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 573.

Niederliegende Gaultherie. W.

*Habitat in* Canadae *ſterilibus arenoſis.* ♄ (v. v.)

### *2. GAULTHERIA *antipoda.*

G. foliis ſparſis ſubrotundis ſerrato-dentatis, caule fruticoſo diffuſo. *Forſt. prod. n.* 196.

Südliche Gaultherie. W.

*Habitat in* Nova Zeelandia. ♄

## 871. ARBUTUS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 750.

*Cal.* 5-partitus. *Cor.* ovata: ore baſi pellucida. *Bacca* 5-locularis.

### 1. ARBUTUS *Unedo.*

A. caule arboreo, foliis glabris obtuſe ſerratis, panicula terminali, baccis polyſpermis. *Lin. ſuppl.* 238.

A. caule arboreo, foliis glabris ſerratis, baccis polyſpermis. *Hort. cliff.* 163. *Roy. lugdb.* 440. *Sauv. monſp.* 59. *Gron. orient.* 157. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 66. *Knorr. del.* 1. *t. E.* 1. *a. Seeligm. av.* 5. *t.* 1.

A. folio ſerrato. *Bauh. pin.* 460. *Mill. dict. n.* 1. *et ic. t.* 48. *f.* 1. 2.

Arbutus. *Cam. epit.* 168.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 575.

Erdbeerartige Sandbeere. W.

*Habitat in* Europae *auſtralis*, Hiberniae *occidentalis*, Orientis, *ſylvis.* ♄ (v. v.)

Baccae *polyſpermae, tuberculis ſeminum exaſperatae.* *Variat flore albo, rubro et pleno.* W.

2. ARBUTUS *laurifolia.*

A. arborea, foliis oblongis utrinque acuminatis acute ſerratis glabris, racemis axillaribus ſecundis ſeſſilibus ſolitariis. *Lin. ſuppl.* 238.

Lorbeerblättrige Sandbeere. W.

*Habitat in* America *ſeptentrionali.* ♄

*Simillima A. Unedoni, ſed differt:* ſerraturis *acutis cuſpidatis*, racemis *axillaribus ſimpliciſſimis ſecundis folio brevioribus.*

3. ARBUTUS *Andrachne.*

A. caule arboreo, foliis glabris integerrimis ſerratisque, baccis polyſpermis. *Mill. dict. n.* 2.

Andrachne fruteſcens, ſpica erecta, foliis ovatis integerrimis et ſerratis. *Ehret act. angl.* 1767. *Vol.* 57. *p.* 114. *t.* 6. *opt.*

A. folio non ſerrato. *Bauh. pin.* 460.

Andrachne theophraſti. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 48.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 576.

Candiſche Sandbeere. W.

*Habitat in* Oriente. ♄ (v. ſ.)

Panicula *erecta pedunculis hiſpidis.* Simillima *A. Unedoni, ſed foliis nonnullis integerrimis et paniculae viſcido-pubeſcente, quae in Unedone laevis.*

4. ARBUTUS *ferruginea.*

A. arboreſcens, foliis oblongis obtuſis glabris integerrimis, racemis terminalibus. *Lin. ſuppl.* 238.

Roſtfarbene Sandbeere. W.

*Habitat in* America. *Mutis.* ♄

Rami *angulati ſimplices glabri.* Folia *alterna petiolata.* Racemi *in axillis foliorum ramum terminantes ſolitarii.* Pedicelli *ramoſi patentes, in medio bracteis binis oppoſitis ovatis glabris.* Flores *remoti nutantes.* Calyx *quinquedentatus patentiuſculus.* Corolia *magis quam in reliquis ſpecibus elongata fere ut in Andromeda.* Piſtillum *corolla longius.* Flores *ſiccati nigreſcentes. Suaſu Mutiſii, qui dixit fructum baccam eſſe, ad hoc genus amandavi.*

5. ARBUTUS *acadienſis.*

A. caulibus procumbentibus, foliis ovatis ſubſerratis, floribus ſpartis, baccis polyſpermis. *Mill. dict. n.* 3.

Vitis idaea acadienſis, foliis alaterni. *Tournef. inſt.* 608.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 577.
Acadiſche Sandbeere. W.
*Habitat in* Acadia. ♄

6. ARBUTUS *alpina.*

A. caulibus procumbentibus, foliis rugoſis ſerratis. *Fl. lapp.* 161. *Fl. ſuec.* 340, 359. *Hort. cliff.* 163. *Roy. lugdb.* 440. *Hall. helv. n.* 1019. *Mill. dict. n.* 4. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 118. *n.* 2. *Fl. dan. t.* 83.
Vitis idaea foliis oblongis albicantibus. *Bauh. pin.* 470.
Vitis idaea. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 61.
Vua urſi Galeni. *Zanon. t.* 178. *Hall.* R.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 578.
Alpen Sandbeere. W.
*Habitat in alpibus* Lapponiae, Helvetiae, Sibiriae, Angliae. ♄ (v. ſ.)

7. ARBUTUS *Uva urſi.*

A. caulibus procumbentibus, foliis integerrimis. *Fl. lapp.* 162. *t.* 6. *f.* 3. *Fl. ſuec.* 339, 358. *Mat. med.* 115. *Hort. cliff.* 163. *Roy. lugdb.* 440. *Hall. helv. n.* 1018. *Mill. dict. n.* 5. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 118. *n.* 1. *Scop. carn. n.* 483. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 69. *Fl. dan. t.* 33. *Blackw. t.* 592. *Knoph. cent.* 9. *n* 10. *Hoffm. germ.* 143. *Roth. germ. I.* 183. *II.* 466. *Willd. arb.* 24.*
Uva urſi. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 63.
Radix idaea putata et Uva urſi. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 524.
Arbutus noveboracenſibus Bearberry. *Cold. nov.* 104.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 578.
Gemeine Sandbeere. W.
*Habitat in* Europa *frigida*, Canada. ♄ (v. v.)
Baccae 5-*ſpermae, ut in A. alpina.*

8. ARBUTUS *mucronata.*

A. caule fruticoſo, foliis alternis ovatis ſerratis mucronatis, pedunculis axillaribus unifloris. *Lin. ſuppl.* 239. *Forſt. Comment. goett.* 9. *p.* 31.* *Lamarck. illuſt. gen. t.* 366. *f.* 2.
Spitzblättrige Sandbeere. W.
*Habitat in* Tierra del Fuego. ♄
Frutex *rigidiſſimus.* Folia *alterna breviſſime petiolata ovata plana rigida, margine cartilagineo ſerrato, ſerraturis utrinque quatuor, acuta, mucrone pungente, aveniа.* Gemmae *in axillis foliorum, ſquamis paucioribus concavis imbricatis, unde exeunt pedunculi ſolitarii, interdum ſquamoſi uniflori.* Flores *cernui.*

*9. ARBUTUS *microphylla.*

A. caule fruticoſo, foliis ovatis ſerratis muticis, pedunculis axillaribus unifloris. *Forſt. Comment. goett.* 9. *p.* 32.*

A. (*ſerpillifolia*) caulibus ſuffruticoſis hiſpidis, foliis ovatis ſubdentatis coriaceis glabris, floribus ſubſeſſilibus. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 226. * *illuſt. gen. t.* 366. *f.* 3.

Kleinblättrige Sandbeere. W.

*Habitat in* Tierra del Fuego. ♄

10. ARBUTUS *pumila.*

A. caulibus diffuſis, foliis alternis diſtichis oblongis integerrimis, floribus lateralibus ſolitariis. *Lin. ſuppl.* 239.

A. caulibus proſtratis, foliis alternis diſtichis oblongis integerrimis, pedunculis axillaribus unifloris elongatis. *Forſt. Comment. goett.* 9. *p.* 32. *

Niedrige Sandbeere. W.

*Habitat in* Tierra del Fuego. ♄

Planta *pumila fruticoſa.* Folia *nimutiſſima fere Empetri ſupra glaberrima, ſubtus carinata.* Pedunculi *e ſquamis gemmae axillaris nudi elongati uniflori.* Flores *cernui.*

## 872. CLETHRA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 751.

*Cal.* 5-partitus. *Pet.* 5. *Stigma* 3-fidum. *Capſ.* 3-locularis 3-valvis.

1. CLETHRA *alnifolia.*

C. foliis obovatis ſerratis ſubtus ſubpubeſcentibus, racemo ſimplici bracteato. W.

C. fruticoſa, foliis obovato-lanceolatis, racemis ſpiciformibus, calycibus acutis, bracteis perſiſtentibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 73. *Willd. arb.* 68. *

Clethra alnifolia. *Sp. pl.* 566.

*α. denudata*, foliis utrinque nudis. *Ait. l. c.*

Clethra. *Gron. virg.* 47. *Duham. arb.* 1. *p.* 176. *t.* 71. *Mill. dict. et ic. t.* 28. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 153.

Alnifolia americana ſerrata, floribus pentapetalis albis in ſpicam diſpoſitis. *Pluk. alm.* 18. *t.* 115. *f.* 1. *Catesb. car.* 1. *p.* 66. *t.* 66.

β. *pubescens*, foliis subtus tomentosis. *Ait. l. c.*
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 580.
Ellerblättrige Clethra. W.
*Habitat in* Carolina, Virginia, Pensylvania. ♄ (v. v.)

*2. CLETHRA *paniculata.*

C. foliis lanceolato-obovatis serratis glabris, panicula angustata bracteata. W.
C. fruticosa, foliis lanceolatis utrinque nudis, floribus paniculatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 73.
Rispenblütige Clethra. W.
*Habitat in* America *boreali.* ♄ (v. s.)
Panicula *non e racemis composita angusta et elongata.* Pedunculi *ut in praecedente albo-pubescentes.* W.

*3. CLETHRA *arborea.*

C. foliis oblongis acuminatis serratis glabris, racemis paniculatis, florentibus ebracteatis, pedunculis hirsutis. W.
C. arborea, foliis oblongo-lanceolatis utrinque glabris, racemis spiciformibus, calycibus obtusis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 73.
Baumartige Clethra. W.
*Habitat in* Madera. ♄ (v. s.)

4. CLETHRA *tinifolia.*

C. foliis oblongis integerrimis subtus incanis, racemis paniculatis, florentibus ebracteatis, pedunculis tomentosis. W.
C. arborea, foliis oblongo-lanceolatis integerrimis subtus incanis, racemis paniculatis spiciformibus tomentosis. *Swartz prod.* 74. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 845. *
Tinus occidentalis. *Sp. pl.* 530.
Volkameria arborea, foliis oblongo-ovatis alternis supernc glabris, subtus subvillosis et nervosis, spicis ramosis et terminalibus. *Brown. jam.* 214. *t.* 21. *f.* 1.
Baccifera arbor calyculata, foliis laurinis, fructu racemoso. *Sloan. hist.* 2. *p.* 86. *t.* 198. *f.* 2. (*icon nec descriptio.*)
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 546.
Lorbeerblättrige Clethra. W.
*Habitat in montibus altioribus* Jamaicae *australis.* ♄

## 873. PYROLA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 572.

*Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Capſ.* 5-locularis, angulis dehiſcens.

1. **PYROLA** *rotundifolia.*

P. ſtaminibus adſcendentibus, piſtillo declinato. *Fl. ſuec.* 330, 360. *Mat. med.* 116. *Amoen. acad.* 1. *p.* 156. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 128. *Pall. it.* 3. *p.* 287. *Poll. pal. n.* 395. *Fl. dan. t.* 110. *Blakw. t.* 594. *Retz. obſ.* 1. *p.* 17. *Hoffm. germ.* 143. *Roth. germ. I.* 181. *II.* 462.

P. ſtaminibus et piſtillis declinatis. *Fl. lapp.* 169.

P. foliis ſubrotundis, tubis recurvis. *Hall. helv. n.* 1010.

P. foliis integerrimis. *Vir. cliff.* 37. *Roy. lugdb.* 440.

P. foliis ſubrotundis, ſcapo racemoſo. *Hort. cliff.* 162.

P. rotundifolia major. *Bauh. pin.* 191.

P. noveboracenſis. *Cold. noveb.* 99.

P. folio rotundo. *Riv. t.* 135. R.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 503.

Rundblättriges Wintergrün. W.

*Habitat in* Europa *ſeptentrionaliore*, Virginia, Braſilia. ♃ (v. v.)

2. **PYROLA** *minor.*

P. floribus racemoſis diſperſis, ſtaminibus piſtillisque rectis. *It. gotl.* 206. *Fl. ſuec.* 331, 361. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 128. *Gort. ingr.* 65. *Scop. carn. n.* 484. *Pollich. pal. n.* 396. *Flor. dan. t.* 55. *Kniph. cent.* 2. *n.* 82. *Hoffm. germ.* 143. *Roth. germ. I.* 181. *II.* 463.

P. foliis ſubrotundis, ſcapo undique racemoſo, genitalibus rectis. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 192.

P. foliis ſubrotundis racemoſis, tubis rectis. *Hall. helv. n.* 1009. *opuſc.* 82.

P. minor. *Riiv. pent.* 149. *Raj. angl.* 3. *p.* 363.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 504.

Kleines Wintergrün. W.

*Habitat in* Europa *frigidiore.* ♃ (v. v.)

3. **PYROLA** *ſecunda.*

P. racemo unilaterali. *Fl. ſuec.* 332, 362. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 129. *t.* 56. *f.* 2. *Scop. carn. n.* 485. *Pollich. pal. n.* 397. *Fl. dan. t.* 402. *Hall. helv. n.* 1008. *Hoffm. germ.* 143. *Roth. germ. I.* 181. *II.* 463.

P. floribus uno verſu ſparſis. *Fl. lapp.* 168.

P. folio mucronato ſerrato. *Bauh. pin.* 181.
P. 2. tenerior. *Cluſ. pan.* 506.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 504.
Einſeitiges Wintergrün. W.
*Habitat in* Europae *borealis ſylvis.* ♄ (v. v.)

## 4. PYROLA *umbellatá.*

P. pedunculis ſubumbellatis. *Fl. ſuec.* 333, 563. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 129. *n.* 18. *Pollich. pal. n.* 398. *Hoffm. germ.* 144. *Roth. germ. I.* 151. *II.* 464.
P, fruteſcens, arbuti flore. *Bauh. pin.* 191.
P. 3. fruticans. *Cluſ. pan.* 507.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 505.
Doldentragendes Wintergrün. W.
*Habitat in* Europae, Aſiae et Americae *ſeptentrionalis ſylvis.* ♄ (v. v.)

## 5. PYROLA *maculata.*

P. pedunculis biflоris. *Mill. dict. n.* 4.
P. petiolis apice biflоris vel triflоris. *Gron. virg.* 48.
P. marilandica minor, folio mucronato arbuti. *Pet. muſ.* 675.
P. mariana, arbuti foliis anguſtioribus, trifoliata ad medium nervum linea alba utrinque per longitudinem diſcurrente. *Pluk. mant.* 157. *t.* 349. *f.* 4.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 505.
Geflecktes Wintergrün. W.
*Habitat in* Americae *ſeptentrionalis ſylvis.* ♄

## 6. PYROLA *uniflora.*

P. ſcapo unifloro. *Fl. lapp.* 167. *Fl. ſuec.* 334, 364. *Hall. helv. n.* 1011. *it. harc. n.* 21. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 129. *Gort. ingr.* 66. *Pall. it.* 3. *p.* 287. *Scop. carn. n.* 486. *Pollich. pal. n.* 399. *Fl. dan. t.* 8. *Hoffm. germ.* 144. *Roth. germ. I.* 181. *II.* 464.
P. rotundifolia minor. *Bauh. pin.* 191.
Singulari flore ampliore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 505. *ſ.* 12. *t.* 10. *f.* 2.
Pyrola IV. *Cluſ. pan.* 508, 509.
P. flore ſingulari. *Riv. pent. irr. t.* 137.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 506.
Einblumiges Wintergrün. W.
*Habitat in* Europae *borealis ſylvis.* ♃ (v. v.)

## 874. STYRAX.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 753.

*Cal.* inferus. *Cor.* infundibulif. *Drupa* 2-sperma.

1. STYRAX *officinale.*

S. foliis ovatis subtus villosis, racemis simplicibus folio brevioribus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 75.

S. foliis ovatis integerrimis subtus tomentosis. *Cavan. Diss.* 6. *p.* 338. *t.* 188 *f.* 2. *

Styrax officinale. *Sp. pl.* 635.

Styrax. *Hort. cliff.* 187. *Hort. upsal.* 122. *Mat. med.* 116. *Roy. lugdb.* 265. *Sauv. monsp.* 306. *Gron. orient.* 147. *Mill. dict. et ic. t.* 260. *Regn. bot.*

Styrax folio mali cotonei. *Bauh. pin.* 452.

Styrax. *Cam. epit.* 48. *Matth. in dioscor. lib.* 1. *cap.* 68. *Lob. ic.* 151. *Tournef. inst.* 598. *t.* 369.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 633.

Echter Storax. W.

*Habitat in* Syria, Iudaea, Italia. ♄ (v. s.)

Germen *omnino superum nec inferum est, et* staminum *numerus naturalis* 10. *Ab* Halelia *diversum.*

*2. STYRAX *grandifolium.*

S. foliis obovatis subtus villosis, pedunculis inferioribus axillaribus solitariis unifloris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 75.

S. (*officinale*, foliis rotundatis integris subtus tomentosis, floribus racemosis terminalibus, racemis longis basi foliosis apice nudis. *Walt. carol.* 140.

Grofsblättriger Storax. W.

*Habitat in* Carolina *australi.* ♄

*3. STYRAX *Benzoin.*

S. foliis obiongis acuminatis subtus tomentosis, racemis compositis longitudine foliorum. *Dryand. in Act. angl.* 77. *p.* 308. *t.* 15. *

Laurus Benzoin. *Houttuyn in Act. harlem.* 21. *p.* 265. *t.* 7.

Arbor Benzoini. *Grimm. in Eph. A. N. C. dec.* 1. *ann.* 1. *p.* 370. *fig.* 31.

Benjui. *Garcias ab Horto in Clus. exot. p.* 155.

Benzoin Storax. W.

*Habitat in* Sumatra. ♄

Folia *ovata acuminata integerrima.* Panicula *axil-*

*laris longitudine foliorum. Hujus et praecedentium folia sunt integerrima, Jequentis vero dentata.* W.
*Ex hac arbore venit resina Benzoin dicta.* W.

*4. STYRAX *laevigatum.*
S. foliis oblongis utrinque glabris, pedunculis axillaribus uniflori: solitariis binisve. *Ait. Kew. 2. p. 75.*
S. (*glabrum*) foliis subovatis glaberrimis denticulatis, floribus axillaribus cernuis. *Cavan. diss. 6. p. 340. t. 188. f. 1.* *
S. (*americana*) foliis ovato-lanceolatis subdentatis, floribus octandris. *Lamarck. encycl. 1. p. 81.* *
S. (*laeve*) foliis ovatis utrinque acuminatis serrulatis laevibus, racemis lateralibus foliosis brevibus. *Walt. carol. 140.*
Glattblättriger Storax. W.
*Habitat in* Carolina *australi.* ♄ (v. s.)

## 875. INOCARPUS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 754.*

*Cal.* bifidus. *Cor.* infundibuliformis. *Stam.* duplici serie. *Drupa* monosperma.

1. INOCARPUS *edulis.*
I. edulis. *Lin. suppl. 239. Forst. gen. n. 33. prod. n. 197. pl. escul. p. 50.* * *Thunb. Diss. Nov. gen. pl. 2. p. 46.* *
Gujanus. *Rumph. amb. 1. p. 170. t. 65.*
Eßbare Faserfrucht. W.
*Habitat in* Java, Celebe, Amboina, Banda, *inque* novis Hibridibus, *insulis* Societatis *et* Amicorum. ♄
Arbor. Folia *alterna dodrantalia oblonga subcordata, brevissime petiolata integerrima glabra venosa.* Spicae *axillares solitariae parvae hirsutae.* Flores *parvi alterni, bracteis parvis suffulti.*

## 876. SAMYDA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 744.*

*Cal.* 5-partitus, coloratus. *Cor.* nulla. *Nectar.* campanulatum staminiferum. *Caps.* intus baccata, 4-valvis, 1-locularis. *Sem.* nidulantia.

1. SAMYDA *nitida.*
S. floribus octandris, foliis cordatis glabris. *Sp. pl. 557.*

S. foliis nitidis cordatis, laeviſſime crenatis, rudimentis mollibus rubentibus, racemis tenuioribus alaribus.
*Brown. jam.* 217. *t.* 23. *f.* 3.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 582.
Glänzende Samyde. W.
*Habitat in* America. ♄

*2. SAMYDA *macrophylla*. W.
S. floribus octandris, foliis ovatis acutis glabris, axillis venarum ſubtus villoſis, corymbo terminali. W.
Groſsblättrige Samyde. W.
*Habitat in* India *orientali*. ♄ (v. f.)
Rami *glabri teretes a foliorum caſu cicatriſati flaveſcentes*. Folia *ampla ſaepius ſemipedalia et ultra, ovata acuta, margine obſolete crenulata, utrinque glabra, ſubtus vero in venarum axillis et ad coſtam mediam villoſa*. Flores *parvi in corymbo pedunculato ſubterminali*. Calyx *campanulatus, limbo quinquefido revoluto*. Corolla *nulla*. Nectarium *campanulatum gerens* Filamenta *octo minutiſſima ſubulata*. Antherae *fuſcae*. Germen *ovatum*. Stylus *ſubulatus*. Stigma *piloſum*. Fructus *ignotus*. W.

*3. SAMYDA *multiflora*.
S. floribus octandris, foliis oblongis dentatis utrinque attenuatis, ſubtus tomentoſis, pedunculis unifloris aggregatis axillaribus. W.
S. (*multiflora*) floribus octandris, foliis ovatis utrinque acutis, inferne tomentoſis. *Cavan. ic.* 1. *p.* 48. *t.* 67. *
Vielblütige Samyde. W.
*Habitat in inſula* St. Dominici. ♄

*4. SAMYDA *villoſa*.
S. floribus decandris, foliis oblongis ſubſerratis baſi obliquis, ſericeis, ſubtus villoſis, pedunculis ſolitariis axillaribus. *Swartz prod.* 68. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 758. *
Rauhe Samyde. W.
*Habitat in montibus* Jamaicae. ♄

*5. SAMYDA *glabrata*.
S. floribus decandris, foliis ovato-lanceolatis integerrimis nitidis, pedunculis axillaribus unifloris. *Swartz prod.* 68. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 760. *
Glatte Samyde. W.
*Habitat in altis montibus* Jamaicae *auſtralis*. ♄
*Cum S. nitida non confundenda, cui* folia *cordata et* ſtamina *octo*. Swartz l. c.

*6. SAMYDA *spinescens.*

S. floribus decandris terminalibus, foliis lanceolato-ovatis obtusis crenatis glabris, ramis patulis spinescentibus. *Swartz prod.* 68. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 762. *

Dornige Samyde. W.

*Habitat in* Hispaniola. ♄

Calyx *hujus pentaphyllus, tamen* nectario *truncato cylindrico instructus.* W.

7. SAMYDA *pubescens.* †

S. floribus dodecandris, foliis ovatis subtus tomentosis. *Sp. pl.* 557.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 583.

Behaarte Samyde. W.

*Habitat in* America. ♄

*Planta obscura.* Swartz obs. 179.

8. SAMYDA *serrulata.*

S. floribus dodecandris, foliis ovato-oblongis serrulatis. *Sp. pl.* 558. *Mill. dict. n.* 1. *Iacq. Collect.* 2. *p.* 328. *t.* 17. *f.* 1. *

S. floribus dodecandris. *Iacq. amer.* 132.

Guidonia ulmi folio, flore roseo niveo. *Plum. gen.* 4. *ic.* 146. *f.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 584.

Gesägte Samyde. W.

*Habitat in* America. ♄

*9. SAMYDA *polyandra.* W. †

S. floribus polyandris. W.

Melistaurum distichum. *Forst. gen. n.* 72. *prod. n.* 570.

Vielfädige Samyde. W.

*Habitat in* Nova Caledonia. ♄

## *877. CASEARIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 756.

*Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 0. *Nectar.* 4-5-phyllum cum staminibus alternans. *Caps.* intus baccata 3-valvis 1-locularis. *Sem.* indulantia.

1. CASEARIA *spinosa.*

C. floribus octandris, foliis ovatis serratis glabris, pedunculis axillaribus unifloris, ramis spinosis. W.

C. (*aculeata*) aculeata, floribus octandris. *Iacq. amer.* 133. *

Samyda (*ſpinoſa*) floribus octandris, ramis ſpinoſis. *Sp. pl.* 557. *Swartz obſ.* 179.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. p.* 583.
Dornige Caſearie. W.
*Habitat in montoſis* Domingo. ♄

*2. CASEARIA *nitida.*

C. floribus octandris, foliis ovatis crenatis glabris, cymis pedunculatis axillaribus. W.
C. (*nitida*) inermis, floribus octandris. *Iacq. amer.* 132. *
*Act. helv.* 8. *p.* 58. *t. f.* 1.
Glänzende Caſearie. W.
*Habitat in* Carthagenae *fruticetis.* ♄
*Diverſiſſima a Samyda nitida.* W.

*3. CASEARIA *ramiflora.*

C. floribus octandris, foliis ellipticis ſerratis utrinque glabris, ramis floriferis. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 50. *
Iroucana gujanenſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 329. *t.* 127. *
Athenaea. *Schreb. gen. pl. n.* 661.
Aſtblütige Caſearie. W.
*Habitat in inſula* St. Crucis *et ad littora maris* Gujaniae, Cajennae. ♄

*4. CASEARIA *hirta.*

C. floribus octandris, foliis ovatis ſerratis ſubtus hirtis. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 756. *
Samyda (*tomentoſa*) floribus octandris, foliis ovatis ſerratis ſubtus tomentoſis. *Swartz prod.* 68.
Haarige Caſearie. W.
*Habitat in paſcuis ſylvaticis* Jamaicae. ♄

5. CASEARIA *parviflora.*

C. floribus decandris, foliis oblongis acuminatis crenulatis utrinque glabris nitidis, pedunculis confertis axillaribus unifloris. W.
Samyda (*parviflora*) floribus decandris, foliis ovato-oblongis utrinque glabris. *Sp. pl.* 557. *Loeſl. itin.* 260. *Mill. dict. n.* 2. *Swartz obſ.* 178. *
Samyda foliis ovatis cum acumine, fructibus plurimis minoribus confertis. *Brown. jam.* 217.
Arbor baccifera, foliis oblongis acuminatis, floribus confertim ex alis foliorum erumpentibus, fructu minimo croceo. *Sloan. jam.* 137. *hiſt.* 2. *p.* 108. *t.* 211. *f.* 2. *Raj. dend.* 108.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. p. 581.*
Kleinblütige Caſearie. W.
*Habitat in fruticetis* Americae *calidioris.* ♄ (v. f.)

*6. CASEARIA *parvifolia.* W.
C. floribus decandris, foliis ovatis acuminatis ſerratis glabris pedunculis unifloris aggregatis lateralibus. W.
C. (*decandra*) floribus decandris. *Iacq. amer.* 133. *t.* 85.*
Kleinblättrige Caſearie. W.
*Habitat in montibus ſylvaticis* Martinicae. ♄
*Diverſiſſima a praecedente*: foliis *multo minoribus ovatis nec oblongis*, floribus *lateralibus, id eſt in ramis aphyllis, nec axillaribus, denique* calycibus *reflexis.* W.

*7. CASEARIA *ſylveſtris.*
C. floribus decandris, foliis ovatis acuminatis integerrimis, ramis virgatis, pedunculis axillaribus confertiſſimis. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 752.*
Wald Caſearie. W.
*Habitat in ſylvis montoſis* Indiae *occidentalis, in* Jamaica *vulgaris.* ♄

*8. CASEARIA *macrophylla.*
C. floribus decandris ſubtomentoſis, foliis ellipticis acuminatis ſubcrenatis. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 32.*
Pitumba gujanenſis. *Aubl. guj.* 2. *app.* 29. *t.* 385.
Groſsblättrige Caſearie. W.
*Habitat in* Cajenna. ♄
Rami *teretes glabri griſeo-punctati.* Folia *petiolata alterna ſex-vel octopollicaria utrinque glabra, transverſim ſimpliciter venoſa perforata, ſubtus pallidiora ſubcoſtata, coſtis ſubpurpuraſcentibus, acuminata integerrima, extrorſum verſus crenata, crenae interdum obſcuriores.* Pedunculi *axillares breviſſime uniflori aggregati.* Vahl. l. c.
*Valde affinis C. parviflorae.* W.

*9. CASEARIA *ſerrulata.*
C. floribus decandris, foliis ovato-lanceolatis obtuſis ſerrulatis, ramulis flexuoſis, pedunculis axillaribus confertiſſimis. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 754.*
Feingeſägte Caſearie. W.
*Habitat in* Indiae *occidentalis inſula* Nevis. ♄

*10. CASEARIA *elliptica.* W.
C. floribus decandris, foliis elliptico-lanceolatis obtuſis

subserratis, junioribus subtus pubescentibus, pedunculis axillaribus confertis. W.

Anavinga (*lanceolata*) foliis alternis lanceolatis leviter serratis, subtus subpubescentibus, baccis ovalibus pedunculo longioribus. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 146. * *illust. gen. t.* 355. *f.* 1.

Elliptische Casearie. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄ (v. s.)

*11. CASEARIA *ovata.* †

C. foliis subrotundo-ovatis acuminatis serratis glabris, pedunculis axillaribus multifloris. W.

Anavinga (*ovata*) foliis alternis ovatis acuminatis serrulatis, baccis globosis pedunculo aequalibus. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 147. *

Anavinga. *Rheed. mal.* 4. *p.* 101. *t.* 49.

Eyförmige Casearie. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄

Flores *sunt quadrifidi secundum Rheede, an itaque octandri?* W.

*12. CASEARIA *hirsuta.*

C. floribus decandris, foliis ovatis acuminatis dentato-serratis hirtis, subtus villosis, pedunculis lateralibus confertis. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 755. *

Rauhe Casearie. W.

*Habitat in montibus* Jamaicae *et* Hispaniolae. ♄

## *878. AQUILARIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 1753.

*Cal.* campanulatus 5-fidus. *Cor.* 0. *Nectar.* campanulat. 5-fidum interne staminiferum. *Caps.* 2-locul. 2-valvis lignosa. *Sem.* solitaria.

*1. AQUILARIA *ovata.*

A. ovata. *Cavan. diss.* 7. *p.* 377. *t.* 224. *

Aquilaria malacensis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 49. * 2. *p.* 603. *

Agallochum secundarium. *Rumph. amb.* 2. *p.* 34. *t.* 10.

Sinkoo. *Kaempf. amoen.* 903.

Eyblättriges Adlerholz. W.

*Habitat in montibus* Malaccae. ♄

Arbor *cortice cinereo.* Folia *alterna petiolata oblongo-ovata acuminata glabra integerrima tenuiſſime venoſa.* W.

## *879. AUGEA.

*Thunb. prod. capenſ. n.* 33.

*Cal.* 5-partitus. *Cor.* o. *Nectar.* 10-dentatum. *Capſ.* 10-locularis.

*1. AUGEA *capenſis.*

A. capenſis. *Thunb. prod.* 80.

Capiſche Augea. W.

*Habitat ad* Cap. b, ſpei.

## 880. COPAIFERA.

*Gen. pl. edit. Schreb. n.* 757.

*Cal.* o. *Petala* 4. *Legumen* ovatum. *Sem.* 1, arillo ovato.

1 COPAIFERA *officinalis.*

Copaiva. *Mat. med.* 115. *Iacq. amer.* 133. *t.* 86. *Mill. dict.*

Coapoiba. *Marcgr. braſ.* 130. *Piſ. braſ.* 56. *Raj. hiſt.* 1593.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 638. *t.* 10. *f.* 1.

Weſtindiſcher Copaivabaum. W.

*Habitat in* Braſilia, Antillis. ♄

Folia *alterna, pinnata, quadrijuga: foliolis altero latere anguſtioribus, alternis, exceptis ultimis.*

## 881. BUCIDA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 758.

*Cal.* 5-dentatus, ſuperus. *Cor.* o. *Bacca* 1-ſperma.

1. BUCIDA *Buceras.*

B. ſpicis elongatis, foliis cuneiformibus glabris. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 50.

Bucida Buceras. *Sp. pl.* 556. *Swartz obſ.* 180. *

Bucida. *Amoen. acad.* 5. *p.* 397. *

Buceras ramulis flexuoſis tenuioribus, foliis obovatis con-

fertis, ſpicis plurimis terminalibus. *Brown. jam.* 221. *t.* 23. *f.* 1.

Mangle Inlifera, foliis ſubrotundis verſus ſummitatem latiſſimis confertim naſcentibus, cortice ad coria denſanda utili. *Sloan jam.* 156. *hiſt.* 2. *p.* 67. *t.* 189. *f.* 3. *Raj. dendr.* 116. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 1. *p.* 643.

Glattblättriger Kuhhornbaum. W.

*Habitat in* Jamaica. ♄ (v. ſ.)

*Affinis Rhizophorae.*

* 2. BUCIDA *capitata.*

B. floribus capitato-ſpicatis, foliis cuneiformibus margine villoſo-ciliatis. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 50. *t.* 8. *

Behärtblättriger Kuhhornbaum. W.

*Habitat in* Montſerrat. ♄

# *D I G Y N I A.*

## 882. ROYENA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 759.

*Cal.* urceolatus. *Cor.* 1-petala, limbo revoluto. *Capſ.* 1-locularis, 4-valvis.

1. ROYENA *lucida.*

R. foliis ovatis ſcabriuſculis. *Hort. cliff.* 149. *Roy. lugdb.* 411. *Mill. dict. n.* 1. *Kniph. cent.* 10. *n.* 74.

R. foliis ovatis villoſis. *Thunb. prod.* 80.

Staphylodendron africanum ſempervirens, foliis ſplendentibus. *Comm. hort.* 1. *p.* 187. *t.* 96.

Staphylodendrum africanum, folio ſingulari lucido. *Herm. parad.* 232. *t.* 232.

Piſtacia africana. *Pluk. alm.* 298. *t.* 63. *f.* 4. *t.* 317. *f.* 5. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 585.

Glänzende Royene. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

2. ROYENA *villoſa.*

R. foliis cordatis oblongis ſubtus tomentoſis. *Sp. pl.* 568. *Thunb. prod.* 80.

R. ſcabra. *Burm. prodr.* 13. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 586.

Langhaarige Royene. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. *Dav. Royen.* ♄

Similis *R. lucidae, ſed* Rami *villoſi.* Folia *elliptica ſ. oblonga, baſi cordata, ſubtus tomentoſa, obtuſiuſcula, breviter petiolata: petiolis villoſis.* Flores *axillares, nutantes, ſolitarii: pedunculis villoſis longitudine florum.* Bracteae 2, *oppoſitae, ovatae, acutae, pubeſcentes, calyce majores eique ſubjectae, deciduae.*

*3. ROYENA *pallens.*

R. foliis oblongo-obovatis obtuſis glabris. W.

R. (*pallens*) foliis oblongis obtuſis glabris, margine revolutis. *Thunb. prod.* 80.

Bleiche Royene. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

4. ROYENA *glabra.*

R. foliis lanceolatis glabris. *Roy. prodr.* 441. *Mill. dict. n.* 2. *Burm. cap.* 144.

R. foliis oblongis acutis glabris planis. *Thunb. prod.* 80.

R. foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 149.

Vitis idaea aethiopica, buxi minoris folio, floribus albis. *Comm. hort.* 1. *p.* 125. *t.* 65.

Vitis idaea aethiopica, myrti foliis, floſculis dependentibus. *Pluk. alm.* 391. *t.* 321. *f.* 4.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 586.

Glatte Royene. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

5. ROYENA *hirſuta.*

R. foliis oblongo-lanceolatis villoſiuſculis. W.

R. foliis lanceolatis hirſutis. *Roy. lugdb.* 441. *Mill. dict. n.* 3. *Thunb. prod.* 80. *Iacq. collect. ſuppl.* 110. *t.* 13. *f.* 1. *

Arbutus foliis lanceolatis integerrimis hirſutis. *Hort. cliff.* 163.

Staphylodendrum africanum, folio lanuginoſo roſmarini latiore. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 235.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 587.

Haarige Royene. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

6. ROYENA *polyandra.*

R. foliis ellipticis, floribus polyandris polygamis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 76.

R. foliis ovatis ſubtus tomentoſis, ſtaminibus plurimis. *Lin. ſuppl.* 240. *Thunb. prod.* 80.

Vielfädige Royene. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

*7. ROYENA *anguſtifolia.* W.

R. foliis lanceolatis acutis ſubtus piloſiuſculis. W.
Schmalblättrige Royene. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

*Ab omnibus hucusque notis ſpeciebus diverſiſſima,* foliis *anguſtis lanceolatis utrinque acutis ſubtus piloſiuſculis.* W.

## 833. HYDRANGEA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 760.

*Cal.* ſuperus 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 2-locularis, 2-roſtris, foramine inter cornua dehiſcens.

1. HYDRANGEA *arboreſcens.*

H. cymis nudis, foliis oblongo-ovatis acuminatis dentatis glabris. W.
H. foliis ovatis glabris, ſtaminibus alternis longioribus. *Smith. ic. pictae.* 1. *p.* 12. *Will'd. arb.* 145. *
Hydrangea arboreſcens. *Sp. pl.* 568. *Lamarck illuſt. gen. t.* 370. *f.* 1.
Hydrangea. *Gron. virg* 50. *Duham. arb.* 1. *p.* 298. *t.* 118. *Mill. dict. et ic. t.* 251. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 309. *Wangenh. amer.* 107.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 538.
Baumartige Hydrangea. W.
*Habitat in* Virginia. ♄ (v. v.)

Frutex *ex ordine Arbuſtivarum XIX, foliis oppoſitis, floribus in cymam digeſtis.*

Stamina *octo ad decem. Du Roi. l. c.* R.

*2. HYDRANGEA *hortenſis.*

H. cymis radiatis, foliis ellipticis utrinque attenuatis dentatis glabris. W.
H. foliis ellipticis ſerratis glaberrimis, ſtaminibus aequalibus. *Smith. ic. pictae.* 1. *p.* 12. *t.* 12. *
Primula (*mutabilis*) caule fruticoſo multiplici, foliis ovatis ſerratis, floribus nudis. *Loureiro cochin. p.* 127.
Viburnum (*ſerratum*) foliis oblongis ſerratis baſi integris ſubtus pallidis. *Thunb. jap.* 124?

Hortenſia. *Iuſſ. gen. ed. Uſt. p.* 237. *Lamarck illuſt. gen. t.* 380.
Sijo. *Kaempf. amoen.* 854.
Schönblühende Hydrangea. W.
*Habitat culta in hortis* Chinae, Japoniae. ♄ (v. v.)

*3. HYDRANGEA *radiata.*
H. cymis radiatis, foliis cordatis dentatis. W.
Hydrangea. *Lamarck illuſt. gen. t.* 370. *f.* 2.
H. (*radiata*) caule ſuffruticoſo quinquepedali ramoſo, foliis latis cordatis acuminatis ſerratis petiolatis oppoſitis, pagina inferiore argentea lanoſa. *Walt. carol.* 251?
Herzblättrige Hydrangea. W.
*Habitat in* Carolina. ♄

*4. HYDRANGEA *quercifolia.*
H. cymis radiatis, foliis oblongis ſinuato-lobatis dentatis. W.
Hydrangea quercifolia. *Bartram. itin. ed. germ. p.* 366. *t.* 7.*
H. (*radiata*) foliis lobatis ſubtus tomentoſis. *Smith ic. pictae. p.* 12.
Eichenblättrige Hydrangea. W.
*Habitat in* Florida. ♄
*Synonymum Walteri, ſub hac ſpecie a Clariſſ. Smith citatum, ad praecedentem ſine dubio petinet.* W.

## 884. CUNONIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 761.

*Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* bilocularis, acuminata, polyſperma. *Styli* flore longiores.

1. CUNONIA *capenſis.*
C. capenſis. *Sp. pl.* 569. *Thunb. prod.* 81.
Oofterdykia floribus ſpicatis pentapetalis, foliis oblongis ſubincanis ſerratis. *Burm. afr.* 259. *t.* 96.
Arbuſcula, arbuti alatis foliis, africana. *Pluk. alm.* 45. *t.* 141. *f.* 4.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 589.
Capiſche Cunonie. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ. ſ. ſ.)
Folia *oppoſita, pinnata cum impari ſeſſili, nec longiore. Foliola ſaepe ſeptem, lanceolata, glabra, ſer-*

*rata.* Glandulae *ſpathiformes, axillares, petiolatae.* Racemi *terminales, bini, ſimplices: pedicelli ex ſingulis punctis ſparſis plures, uniflori.*

## 885. TRIANTHEMA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 762.*

*Cal.* ſub apice mucronatus. *Cor.* 0. *Stam.* 5 ſ. 10. *Germen* retuſum. *Capſ.* circumſciſſa.

### 1. TRIANTHEMA *monogyna.*

T. floribus pentandris monogynis. *Mant.* 69.

T. Portulacaſtrum. *Spec. pl.* 2. *p.* 335. *Sauv. meth.* 117. *Kniph. orig.* 4. *praef.*

Portulaca curaſſavica procumbens, capparidis folio, flore muſcoſo, capſula bifurca. *Herm. par.* 213. *t.* 213. *Raj. ſuppl.* 506.

Portulacae affinis, folio ſubrotundo, flore pentapetalo dilute purpureo. *Sloan. jam.* 89. *hiſt.* 1. *p.* 205. *Raj. ſuppl.* 506.

Kali curaſſavicum procumbens, foliis ſubrotundis. *Pluk. alm.* 202. *t.* 95. *f.* 4.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 507.

Portlacblättrige Dreyblume. W.

*Habitat in* Jamaica, Curaſſao. ⊙ (v. ſ.)

Caules *depreſſi, ſubdichotomi, articulati, laeves, latere ſuperiore pubeſcentes.* Folia *oppoſita, petiolata, ovalia, obtuſa, integerrima margine rubro: altero folio ſemper minore.* Petioli *bidentati, folio breviores.* Flores *axillares, ſeſſiles.* Calyx *perianthium diphyllum: foliolis ſubulatis, perſiſtentibus, vel potius Bracteae.* Petala 5, *ovalia, ſub apice mucronata, quaſi ex calyce et petalis ſimul nata.* Filamenta 6-10, *corolla breviora.* Antherae *ovales, didymae.* Germen *ſemiinferum, retuſum, bicorne.* Stylus *filiformis, hinc hiſpidus, longitudine corollae.* Stigma *ſimplex.*

Genus *vix aliud magis difforme, ideoque niſi ſpecialis character habeatur, facile ſpecies confunduntur.* H. V.

### *2. TRIANTHEMA *cryſtallina.*

T. floribus pentandris monogynis congeſtis, foliis ovalibus, caule fruticoſo. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 52. *

Papularia (*cryſtallina*) monogyna, calyce nullo, corolla monopetala. *Forſk. deſcr.* 69. *

Cryſtallene Dreyblume. W.
*Habitat in* Arabia *et* India *orientali.* ♄ (v. ſ.)

3. TRIANTHEMA *pentandra.*
T. floribus pentandris digynis. *Mant.* 70.
Raco:na. *Forſkoehl. aegypt. p.* 71. R.
Portulacae affinis polygonoides, bliti folio et facie maderaſpatenſis. *Pluk. alm.* 304. *t.* 120. *f.* 3.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 508.
Fünffädige Dreyblume. W.
*Habitat in* Arabia. ⊙ (v. ſ.)

Caulis *pedalis, teres, erectus, ſcabriuſculus.* Folia *oppoſita, petiolata, elliptica, obtuſiuſcula, integerrima, erecto-patentia, oleracea.* Rami *alterni breviores.* Flores *axillares, alterius ſ. alterius alae, inter ramum, et caulem: ſubſeſſiles, plures, congeſti; intus pallidi, extus vireſcentes.* Calyx *monophyllus, campanulatus, 5-partitus, intus purpuraſcens: laciniis lanceolatis, ſub apice mucronatis, perſiſtens.* Corolla *nulla.* Filamenta 5, *ſetacea, erecta, diſtantia, longitudine corollae.* Germen *ſuperum, obtuſiſſimum, rubrum.* Styli 2, *longitudine germinum, recurvati, ſupra longitudinaliter pubeſcentes.* Stigma *ſimplex.* Fructus *ut in congeneribus.* H. V.

*4. TRIANTHEMA *fruticoſa.*
T. fruticoſa monogyna, filamentis alternis antheriferis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 32. *
Gymnocarpos decandrum. *Forſk. deſcript.* 65. *tab.* 10. *
Strauchartige Dreyblume. W.
*Habitat in* Aegypto *in deſertis* Kahirinis *inque regno* Tunetano. ♄

*5. TRIANTHEMA *humifuſa.*
T. monogyna, foliis lanceolatis, caule fruteſcente tereti. *Thunb. prod.* 80.
Liegende Dreyblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

*6. TRIANTHEMA *anceps.*
T. monogyna, foliis lanceolatis, caule fruteſcente anciti. *Thunb. prod.* 80.
Zweykantige Dreyblume. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

7. TRIANTHEMA *decandra.*
T. floribus ſubdecandris digynis. *Mant.* 70.
Zaleia decandra. *Burm. ind.* 110. *t.* 31. *f.* 3.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. p.* 509.
Zehnfädige Dreyblume. W.
*Habitat in* India. ⊙ (v. ſ.)

*Herba ſtatura Glini.* Caulis *herbaceus, diffuſus, alternatim diffuſus.* Folia *oppoſita, petiolata, elliptica, integerrima, glabra.* Petioli *utrinque membranacei.* Bracteae *membranaceae.* Flores *axillares, breviter pedunculati.* Calyx *pentaphyllus, perſiſtens, foliolis ovalibus, margine membranaceis, intus alis exterioribus ſub apice mucronatis.* Corolla *nulla.* Filamenta 10, *rarius* 1, *capillaria, longitudine calycis.* Antherae *ſubrotundae.* Germen *ſuperum, retuſum.* Styli 2, *filiformes, patuli.* Stigmata *obtuſa.* Fructus *ut in congeneribus.*

## 886. CHRYSOSPLENIUM.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 763.

*Cal.* 4 ſ. 5-fidus, coloratus. *Cor.* 0. *Capſ.* biroſtris, 1-locularis, polyſperma.

### 1. CHRYSOSPLENIUM *alternifolium.*

C. foliis alternis. *Fl. ſuec.* 316, 365. *It. ſcan.* 16. *Oed. dan. t.* 366. *Hall. helv. n.* 1548. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 29. *Willich. obſ.* 12. *Scop. carn. n.* 487. *Pollich. pal. n.* 400. *Moench. haſſ. n.* 345. *Leers herb. n.* 312. *Doerr. naſſ. p.* 81. *Hoffm. germ.* 144. *Roth. germ. I.* 171. *II.* 447.
Chryſoſplenium. *Hort. cliff.* 149. *Roy. lugdb.* 209.
C. foliis amplioribus auriculatis. *Rudb. lapp.* 97. *Fl. lapp.* 151.
C. foliis pediculis oblongis inſidentibus. *Tournef. inſt.* 146.
Saxifraga aurea, foliis pediculis oblongis inſidentibus. *Raj. hiſt.* 206.
Sedum paluſtre luteum majus, foliis pediculis longis inſidentibus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 477. *ſ.* 12. *t.* 8. *f.* 8.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 510.
Wechſelblättriges Milzkraut. W.
*Habitat in* Sueciae, Germaniae, Angliae *opacis humentibus.* 4 (v. v.)

*Flos primarius Decandrus, reliqui Octandri. Phil. Bot.* 178.

Flos *etiam primarius plerumque* 4-*fidus, octandrus.* *Leers. l. c.* Flores *semper* 4-*fidi.* *Moench. Doerrien.* R.

2. CHRYSOSPLENIUM *oppositifolium.*

C. foliis oppositis. *Savi. monsp.* 128. *Hall. helv. n.* 1549. *Oed. dan. t.* 365. *Pollich. pal. n.* 401. *Neck. gallob.* 190. *Leers. herb. n.* 313. *Moench. hass. n.* 346. *Sabb. hort.* 2. *t.* 51. *Reich. flor. n.* 985. *Hoffm. germ.* 144. *Roth. germ. I.* 171. *II.* 448.

C. foliis ampliоribus auriculatis. *Tournef. inst.* 146.

Chrysosplenium l. Saxifraga aurea. *Tabern. hist.* 1224.

Saxifraga aurea. *Dod. pempt.* 316. *Lob hist.* 336. *ic.* 312.

Saxifraga rotundifolia aurea. *Bauh. pin.* 309.

Saxifraga romanorum. *Dalech. hist.* 1114.

Sedum palustre luteum, foliis subrotundis sessilibus. *Morif. hist.* 3. *p.* 477. *s.* 12. *t.* 8. *f.* 7.

Alchimilla rotundifolia aurea hirsuta. *Herm. lugdb.* 14. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 510.

Paarblättriges Milzkraut. W.

*Habitat in* Belgio, Anglia, Canada, *etc. locis umbrosis humentibus.* 4 (v. v.)

*Affinis nimium praecedenti.*

Flores *semper* 4-*fidi, octandri.* Leers *l. c.* Flos *primarius* 5-*fidus.* Moench *l. c.* R. *Ego nullum certe florem* 5-*fidum et decandrum vidi, licet multa examinaverim specimina.* R.

## 887. SAXIFRAGA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 764.

*Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Caps.* 2-rostris 1-locularis, polyspermа.

1. SAXIFRAGA *Cotyledon.*

S. foliis radicalibus aggregatis lingulatis cartilagineo-dentatis, caule paniculato folioso, calycibus glanduloso-pilosis. W.

S. foliis radicalibus aggregatis lingulatis cartilagineo-serratis, caule paniculato. *Mill. dict. n.* 2. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 489. *Mattusch. sil. n.* 298. *Kniph. cent.* 1. *n.* 79. *Iacq. Collect.* 4. *p.* 291.

S. foliorum ora cartilaginea serrata, petiolis paucifloris, petalis punctatis. *Hall. helv.* 978.

S. foliis lingulatis radicalibus margine cartilagineo acute serratis, floribus paniculatis. *Fl. suec.* 356, 366.

S. foliorum marginibus cartilagine crenatis. *Hort. cliff.* 168. *Roy. lugdb.* 453.
Sanicula montana crenata, folio longiore, pediculo folioso. *Pluk. alm.* 331. *t.* 222. *f.* 1.
Sedum ferratum. *Bauh. hist.* 3. *p.* 689. R.
Sedum ferratum album bicorne, marginibus argenteis. *Morif. hist.* 3. *p.* 478. *f.* 12. *t.* 9. *f.* 19. 20.
Cotyledon media, foliis oblongis ferratis. *Bauh. pin.* 285.
ε. Cotyledon minor, foliis subrotundis ferratis. *Bauh. pin.* 285. *prodr.* 133. *Hall. helv. n.* 978. β.
γ. Saxifraga, ſedi folio, flore albo, multiflorum. *Tournef. inſt.* 252.
S. foliorum ora cartilaginea, caule triplicato ramoſo, petalis immaculatis. *Hall. helv. n.* 977.
Saxifraga Cotyledon. *Fl. dan. t.* 241.
Sedum ferratum, flore albo, multiflorum. *Dodon. pem. p.* 131.
δ. Saxifraga ſedi folio, pyrenaica, ferrata. *Tournef. inſt.* 252.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 513.
Nabelkrautartiger Steinbrech. W.
*Habitat in alpibus* Europae. 4 (v. v.)

Panicula *ramoſiſſima multiflora et ſubramoſa pauciflora.* Petala *immaculata et punctata, idque conſtanter.*

*Varietas γ. videtur ſpecie a reliquis differre, ob caulem conſtanter magis compoſitum et petala immaculata. Planta Halleri n.* 977. *videtur adhuc diverſa a norvegica in Fl. dan. t.* 241. *depicta. In Halleri planta ſunt petala linearia baſi ſubciliata, in planta Florae danicae vero ſubrotunda, diſtinguant alii, quid ſit varietas vel ſpecies.* W.

## *2. SAXIFRAGA *Aizoon.*

S. foliis radicalibus aggregatis lingulatis cartilagineo-dentatis, caule ſimplici racemoſo folioſo, calycibus glabris. W.
S. (*Aizoon*) foliis radicatis aggregatis lingulatis cartilagineo-ſerratis, caule ſubracemoſo, calyce glabro. *Murr. ſyſt. ed.* 14. *p.* 411. *Iacq. auſtr.* 5. *t.* 438.
Saxifraga Cotyledon ε. *Sp. pl.* 570.
S. foliis radicalibus in orbem politis, ſerraturis cartilagineis. *Fl. lapp.* 177. *t.* 2. *f.* 2.
S. ſedi folio anguſtiore ſerrato. *Seguier. ver.* 448. *t.* 9. *f.* 1.

Cotyledon pyramidale lato crenato et retuſo folio polyanthos. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 109. *t.* 86.
Traubenblütiger Steinbrech. W.
*Habitat in alpibus* Europae. 4 (v. ſ.)

*Differt a praecedente,* caule *racemoſo et* calyce *glabro.* W.

3. SAXIFRAGA *mutata.*

S. foliis radicalibus aggregatis lingulatis margine cartilagineis repandis caule racemoſo folioſo, calycibus glanduloſo-piloſis, petalis lineari-lanceolatis. W.

S. foliis radicalibus aggregatis lingulatis cartilagineo-ferratis, caule racemoſo folioſo. *Sp. pl.* 570. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 466. *Collect.* 1. *p.* 284. *Curt. mag.* 351.

S. foliorum ora cartilaginea, rariſſime dentata, petalis maculoſis. *Hall. helv. n.* 979. *t.* 16. *Seguier. ver.* 3. *p.* 199. *Burſ. XVI.* 98.

Geum alpinum majus viſcoſum, foliis oblongo-rotundis, atrorubentibus et croceis floribus. *Scheuchz. it.* 2. *p.* 124. *Hall.* R.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 514.
Veränderter Steinbrech. W.
*Habitat in alpibus* Helvetiae, Carnioliae, Italiae. 4 (v. ſ.)

*Hybrida quaſi apparet haec planta. S. Cotyledoni affinis, ſed diſtincta.* Folia *Radicalia aggregata, lingulata, cartilagine ſerrata, verſus baſin ciliato-villoſa.* Caulis *firmior, ſimplex foliis copioſioribus, magis viſcidus.* Racemi *alterni, breves.* Flores *quadruplo majores: Petalis lanceolatis, longis, diverſiſſimis, croceis nec albis.*

4. SAXIFRAGA *penſylvanica.*

S. foliis oblongo-lanceolatis piloſiuſculis denticulatis, caule nudo, pedunculis alternis corymboſo-capitatis W.

S. foliis lanceolatis denticulatis, caule nudo paniculato, floribus ſubcapitatis. *Sp. pl.* 570. *Mill. dict. n.* 8.

S. foliis radicalibus lanceolatis denticulatis, caule ſubnudo piloſo ramoſo, floribus confertis capitatis. *Gron. virg.* 49.

S. noveboracenſis. *Cold. noveb.* 105.

S. penſylvanica, floribus muſcoſis racemoſis. *Dill. elth.* 337. *t.* 253. *f.* 328.

Sanicula virginiana alba, folio oblongo mucronato. *Pluk. alm.* 331. *t.* 59. *f.* 1. *et t.* 222. *f.* 5.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 515.
Penſylvaniſcher Steinbrech. W.
*Habitat in* Virginia, Penſylvania, Canada. 24 (v. f.)
Folia *ſuperne et margine, ut caulis, pilis articulatis brevibus tecta.* W.

*5. SAXIFRAGA *hieracifolia.*
S. foliis oblongo-lanceolatis glabris repando-dentatis, caule nudo, pedúnculis unifloris aggregatis. W.
Saxifraga hieracifolia. *Waldſtein et Kitaibel plantae rariores Hungariae.*
Habichtskrautblättriger Steinbrech. W.
*Habitat in alpibus* Carpathicis. 24 (v. f.)
*Simillima praecedenti ut primo intuitu vix diverſa videatur, ſed re vera diſtincta, modo florendi.* Folia *oblongo-lanceolata repando-dentata utrinque glabra, margine tenuiſſime ciliata, pilis brevibus articulatis.* Caulis *nudus pedalis ſimpliciſſimus teres pubeſcens.* Pedunculi *uniflori quatuor vel ſex aggregati alternatim per intervalla et* bractea *lanceolata ſuffulti.* Flores *ſuperiores ſubſeſſiles magis conferti.* W.

6. SAXIFRAGA *androſacea.*
S. foliis lanceolatis obtuſis piloſis, caule nudo bifloro. *Plum. alm.* 331. *t.* 222. *f.* 2. *Iacq. auſt. t.* 389.
S. foliis hirſutis, ellipticis et tridentatis, caule paucifloro. *Hall. helv. n.* 984. *opuſc. tot. p.* 292. *t.* 2.
Saxifraga pyrenaica. *Scop. carn. n.* 498. *t.* 16.
Sedum alpinum tertium. *Col. ecphr.* 2. *p.* 66. *t.* 67. *f. ultima.*
Saxifraga alpina, habitu androſaces, villoſa. *Hall. comm. nor.* 1746. *t.* 1. *f.* 3.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 515.
Mannsſchildartiger Steinbrech. W.
*Habitat in* Sibiria, Helvetia, Auſtria, Carniolia. 24 (v. f.)

7. SAXIFRAGA *caeſia.*
S. foliis linearibus perforato-punctatis aggregatis recurvatis, caule multifloro. *Iacq. auſtr. t.* 374. *Scop. carn. n.* 495. *t.* 15.
S. foliis craſſis duris recurvis, ſubtus ſulcatis, baſi ciliatis. *Hall. helv. n.* 982.
Sedi ſpecies minima. *Geſn. faſc.* 24. *t.* 11. *f.* 30.

Saxifraga alpina minima, foliis caesiis deorsum incurvis, *Tournef. inst.* 253. *Segu. veron.* 449. *t.* 9. *f.* 2.
Sedum alpinum album, foliis compactis. *Bauh. pin.* 284. *Morif. hist.* 3. *f.* 12. *t.* 7. *f.* 32.
Sedum alpinum minimum, foliis cinereis, flore candido. *Scheuch. alp.* 341, 141. *t.* 21. *f.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 516.
Bläulicher Steinbrèch. W.
*Habitat in alpibus* Helveticis, Auftriacis, Pyrenaicis, Baldo. 4 (v. f.)
Foliorum *basis ciliata.*
Varietas *ex alpibus italicis: cujus* Caulis *duplo major, hirsutus, viscosus.* Calyces *magni, hirsuti.* Folia *quadruplo majora, patentia, fere S. Cotyledonis, dignoscenda punctis pertusis.*

8. SAXIFRAGA *burseriana.*

S. foliis aggregatis imbricatis triquetris subulatis laevibus, caule subnudo unifloro. *Syst. nat.* 303. *Wulf. in Iacq. misc.* 1. *p.* 152. *t.* 17. *f.* 3.
S. foliis compactis, plicatis, pungentibus, caule viscido, paucifloro. *Hall. helv. n.* 983. *Act. helv.* 6. *p.* 10. *n.* 39.
S. alpina, foliis glaucis acutis, monanthos, caule folioso. *Segu. ver.* 3. *p.* 201. *t.* 5. *f.* 2.
Sedum alpinum saxifragae albae flore. *Bauh. pin.* 284. *Burs.* XVI. 6.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 517.
Burserscher Steinbrech. W.
*Habitat in* Taurero Raftadienfi, *montibus* Leffanenfibus. 4 (v. f.)
Facies *Sedi minoris.* Folia *juniperina, dense imbricata, acuta, carinata, glabra.* Caulis *vix digitalis, rufescenti-hispidus f. glutinosus, foliolis* 3 *f.* 4, *alternis, linearibus.* Florēs *lactei lineis pallidis.*
Varietatem *hujus caulibus* 5*-floris: floribus fastigiatis e monte Canzo Italiae.* Vandelli.
Saxifraga burseriana *caule unifloro est, et varietas illa, de qua hic loquitur Linnaeus, distincta species est caule multifloro; huic addendum* Synonymon Hallerianum. *Iacq. l. c.* R.

9. SAXIFRAGA *sedoides.*

S. foliis aggregatis alternis oppositisque sublanceolatis,

flore pedunculato. *Sp. pl.* 572. *Iacq. misc.* 2. *p.* 134. *t.* 21. *f.* 22. *

Saxifraga muscoides. *Allion. ped. n.* 1528. *t.* 61. *f.* 2.

Saxifraga trichodes. *Scop. carn. n.* 496. *tab.* 15.

S. foliis mollibus ellipticis subhirsutis, caule pauciflore. *Hall. helv. n.* 985.

S. alpina minima, foliis lingulatis in orbem actis, flore ochroleuco. *Segu. veron.* 450. *t.* 9. *f.* 3.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 517.

Sedumartiger Steinbrech. W.

*Habitat in alpibus* Tridentinis, Carinthiacis. 4 (v. f.)

Caulis *ramosissimus*, *filiformis*, *depressus*, *apicibus terminatis*. Foliis *aggregatis*, *linearibus*, *laevibus*. Pedunculus *saepe* 1-*florus*, *rarius* 2-*s.* 3-*florus*. Flos *superus*.

*10. SAXIFRAGA *tenella*.

S. foliis lanceolatis mucronatis basi ciliatis imbricatis, caule nudiusculo pauciflore, calycibus mucronatis. W.

S. (*tenella*) stolonibus prostratis imbricato-foliosis e latere cauliferis, caulibus erectis subnudis pauciforis, foliis linear-subulatis ciliatis spinula terminatis. *Wulfen in Iacq. Collect.* 3. *p.* 144. *t* 17. *

Zarter Steinbrech. W.

*Habitat in* Carinthiae *alpibus* 4 (v. f.)

*Accedit ad sequentem sed* flores *quadruplo minores*, calyx *mucronatus et* germen *inferum glanduloso-pilosum*. W.

11. SAXIFRAGA *bryoides*.

S. foliis lanceolatis mucronatis margine cartilagineis ciliatis, caule nudiusculo pauciflore, calycibus obtusis. W.

S. foliis ciliatis inflexis imbricatis, caule nudiusculo pauciflore. *Sp. pl.* 572. *Scop. carn. n.* 497. *t.* 15. *Iacq. misc.* 2. *p.* 49. *t.* 5. *f.* 1. *

S. foliis lanceolatis, ciliatis, compactis, caule unifloro. *Hall. helv. n.* 969.

S. pyrenaica minima lutea musco similis. *Tournef. inst.* 253.

Sedum muscosum. *Bauh. hist.* 3. *p.* 695. *Scheuch. alp.* 142. *t.* 21. *f.* 2.

Sedum ejusdem alpinum quartum. *Col. ecphr.* 2. *p.* 66. *t.* 67. *f.* 1. 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 518.

Moosartiger Steinbrech. W.

*Habitat in alpibus* Helveticis, Pyrenaicis, Auſtriacis.
24 (v. f)

Folia *ſerrata, baſi ciliata, ſerraturis ſaepe apice calloſis.* Folia radicalia *in orbem digeſta*; caulina 5 *f.* 6, *alterna, tenera.* Caulis *pubeſcens.* Flores 1 *f. pauci*: Petala *flava maculis fulvis.*

12. SAXIFRAGA *bronchialis.*

S. foliis imbricatis ſubulatis ciliatis ſpinoſis, caule ſubnudo multifloro. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 164. *t.* 65. *f.* 2.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 519.
Vielblütiger Steinbrech. W.
*Habitat in* Sibiria.

Stolones *oblongi confertim imbricati*: *Foliis planis, ſubulatis, mucronato-ſpinoſis, ſpinoſo-ciliatis.* Caulis *altus, nudiuſculus*: *foliis aliquot minimis mucronatis margine laevibus.* Panicula *parva.*

13. SAXIFRAGA *ſtellaris.*

S. foliis ſerratis, caule nudo ramoſo, petalis acuminatis. *Oed. dan. t.* 23. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 163. *n.* 75. *Scop. carn. n.* 492. *t.* 13. *Iacq. Collect.* 1. *p.* 202. *t.* 13. *
S. foliis rhomboideis, acute ſerratis, caule nudo ramoſo. *Hall. helv. n.* 973.
S. foliis lanceolatis dentato-ſerratis, caule nudo ſimplici. *Fl. ſuec.* 335, 367.
S. caule nudo ſimplici, foliis lanceolatis dentatis, petalis acutis. *Fl. lapp.* 175.
Sanicula myoſotis, floribus albicantibus fere umbellatis. *Pluk. alm.* 331. *t.* 58. *f.* 2. *et t.* 222. *f.* 4.
Sedum montanum hirſutum, mucronato et dentato folio, flore albo guttato. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 478. *ſ.* 12. *t.* 9. *f.* 13.
Sanicula alpina aliquatenus affinis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 708. R.
Sanicula montana minor. *Cluſ. pann.* 441. *Haller.*
*β. comoſa* panicula foliacea.
Saxifraga. *Fl. lapp.* 175. *t.* 2. *f.* 3.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 519.
Sternförmiger Steinbrech. W.
*Habitat in alpibus* Spitzbergenſibus, Lapponicis, Helveticis, Styriacis, Weſtmorlandicis. 24 (v. ſ.
Calyx *reflexus.*

14. SAXIFRAGA *craſſifolia.*

S. foliis ovalibus retuſis obſolete ſerratis petiolatis, caule

nudo, panicula conglomerata. *Linn. dec.* 2. *p.* 27. *t.* 14.

S. foliis ovalibus crenulatis, caulibus nudis. *Gmel. sib.* 4! *p.* 166. *t.* 66.

Geum saxatile rotundifolium majus flore purpureo. *Amm. ruth. n.* 90.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 520.

Dickblättriger Steinbrech. W.

*Habitat in alpibus* Sibiriae. 4 (v. v.)

Radix *crassitie fere digiti.* Folia *bina, palmaria, coriacea, ovalia, retusa, repando-crenata, glabra, foliatione involuta.* Gemmae *maximae foliolis 2 s. 3, ovatis, concavis, quorum unum scapo adhaerens attollitur.* Scapus *nudus, pedalis, crassitie digiti, subpaniculatus ramis pedatis.* Flores *superi submutantes, campanulati: petala obovata, ruberrima.*

15. SAXIFRAGA *nivalis.*

S. foliis obovatis crenatis subsessilibus, caule nudo, floribus congestis. *Mill. dict. n.* 9. *Gunn. norv. n.* 545. *Lightf. scot.* 1. *p.* 221. *Fl. dan. t.* 98. *t.* 12. *Vahl. in Act. Soc. Hist. Nat. Haf.* 2. 1. *p.* 52. *

S. foliis subovatis crenatis, caule nudo, floribus capitatis. *Fl. suec.* 354, 368.

S. caule nudo simplici, foliis elliptico-subrotundis crenatis, floribus capitatis. *Fl. lapp.* 176. *t.* 2. *f.* 5. 6.

S. foliis cordato-ovalibus crenatis, corolla alba, caule hirsuto aphyllo. *Gron. virg.* 160.

S. foliis oblongo-rotundis dentatis, floribus compactis. *Raj. angl.* 3. *p.* 354. *t.* 16. *f.* 1.

Sempervivum minus dentatum. *Mart. spitzb.* 43. *t. F. f. A. Pluk. phyt.* 222. *f.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 520.

Schnee Steinbrech. W.

*Habitat in summis alpibus* Spitzbergensibus, Lapponicis, Arvonicis, Virginia, Canada. 4 (v. l.)

*16. SAXIFRAGA *Bellardi.*

S. acaulis, foliis subrotundis repandis flore sessili. W.

S. (*Bellardi*) acaulis foliis cuneiformibus trilobis et quinquelobis. *Allion. ped. n.* 1536. *t.* 88. *f.* 1. *

Kleinster Steinbrech. W.

*Habitat in rupibus humidis* Pedemontanis. 4

*17. SAXIFRAGA *davurica.*

S. foliis cuneiformi-rhombeis apice dentatis glabris petiolatis, caule nudo. W.

Saxifraga punctata. *Pall. itin. 3. app. n. 91. t. P. fig. 2.** Davuriſcher Steinbrech. W.
*Habitat in ſummis alpibus* Davuriae *ſub nive.* 4

18. SAXIFRAGA *ſarmentoſa.*
S. foliis ſubrotundis dentatis piloſis, ſtolonibus reptantibus, petalis duobus elongatis. *Ait. Kew. 2. p. 79.*
S. (*ſarmentoſa*) foliis radicalibus ſubrotundis cordatis crenatis, ſarmentis axillaribus radicantibus, corolla irregulari, racemo compoſito. *Lin. ſuppl.* 240. *Schreb. monog. Dionaeae. p.* 16. *t.* 2. 3.
S. foliis inciſo-lobatis piloſis, caule ſubnudo erecto paniculato. *Thunb. jap.* 182. *
S. (*ſtolonifera*) foliis ſubrotundis baſi cordatis crenatis ſarmentis axillaribus, corollis inaequalibus. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 80. *Miſc.* 2. *p.* 327. * *Meerb. ic.* 23.
S. (*ligulata*) foliis ſubrotundis ſubtus papillosis, panicula ſecunda, petalis binis inferioribus longiſſimis. *Murr. in comment. goett.* 1781. *p.* 26. *t.* 1.
Schkika. *Kaempf. am.* 870.
Wuchernder Steinbrech. W.
*Habitat in* China, Japonia. 4 (v. v.)
Statura *plantae ommino Heucherae.* Folia *radicalia petiolata cordato-ſuborbiculata piloſa crenata lobulis obtuſis, oleracea, ſupra venis albis, ſubtus hepatici coloris.* Petioli *teretiuſculi folio longiores.* Stipulae *nullae.* Caulis *herbaceus teres ſesquipedalis fere aphyllus, uti tota herba pilis extantibus pubeſcens, totus racemus compoſitus, racemis partialibus ante antheſin apice cernuis.* Sarmenta *ramoſa e ſingulis foliorum radicalium alis longiſſima copioſa radicantia propaginibus.* Petala *tria minora albida rubro inquinata; duo majora alba.* Nectarium *luteum.* Stamina *alba ſuperne craſſiora longitudine minorum petalorum.* Styli *longitudine minorum petalorum.* Stamina *duo deflorata reflectuntur pone corollam.*

19. SAXIFRAGA *punctata.*
S. foliis ſubrotundis dentatis longius petiolatis, caule nudo. *Sp. pl.* 574. *Mill. dict. n.* 7.
Sedum bicorne ſerratum, pallidiore folio rotundiore, floribus punctatis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 478. *ſ.* 12. *t.* 9. *f.* 17.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 521.
Punctirter Steinbrech. W.
*Habitat in* Sibiria. 4 *Georgi it* 1. *p.* 215.

Folia *ſubrotunda, dentibus inciſa, ut fere lobata absque ora cartilaginea, minime retuſa, dentibus acutis; Petioli laeves foliis triplo longiores, ſuperne ſenſim dilatati in folium.* Flores *minores quam in S. Geo, fere inferi.*

20. SAXIFRAGA *umbroſa.*

S. foliis obovatis ſubretuſis cartilagineo-crenatis, caule nudo paniculato. *Sp. pl.* 574. *Mill. ic.* 141. *f.* 2.
S. foliis cuneiformibus retuſis radicalibus ſinuato-ſerratis margine acutis, caule paniculato. *Hort. upſ.* 108. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 522.
Schattenliebender Steinbrech. W.
*Habitat in montibus apud* Cantanbros. 24 (v. v.)

*Affinis nimium S. Geo; Folia baſi minime cordata, crenis angulatis; petiolis ciliato-villoſis.* Flores *inferi.*

21. SAXIFRAGA *hirſuta.*

S. foliis cordato-ovalibus retuſis cartilagineo-crenatis, caule nudo paniculato. *Mill. dict. n.* 6.
Geum folio circinato acute crenato, piſtillo floris rubro. *Magn. hort.* 87. *t.* 87.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 522.
Haarigſtieliger Steinbrech. W.
*Habitat in* Pyrenaeis. 24 (v. v.)

*Affinis nimium S. Geo, ſed folia ovalia, nec reniformia.* Calyx *reflexus.*

22. SAXIFRAGA *cuneifolia.*

S. foliis cuneiformibus obtuſiſſimis repandis, caule nudo paniculato. *Sp. pl.* 574. *Scop. carn. n.* 490. *t.* 15.
Saxifraga punctata. *Gunn. norv. n.* 1076. *Act. Haf.* 10. *p.* 445. *t.* 3. *f.* 10.
S. foliis petiolatis obtuſis, caule fragili nudo ramoſo. *Hall. helv. n.* 974.
Cotyledon altera olim matthioli. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 684.
Cotyledon aut Sedi ſpecies quaedam. *Geſn. faſc.* 19. *t.* 12. *f.* 57. *bene.*
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 523.
Keilblättriger Steinbrech. W.
*Habitat in alpibus* Styriae, Gotthardo. *Gerard.* 24 (v. f.)

*Simillima S. umbroſae, ſed Foliorum margo non crenatus, at obtuſiſſime repandus, ut et folia longe minora.* Calyx *reflexus.*

23. SAXIFRAGA *Geum.*

S. foliis reniformibus dentatis, caule nudo paniculato. *Pall. it.* 2. *p.* 35. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 491.

Geum folio subrotundo minori, pistillo floris rubro. *Magn. hort.* 88. *t.* 88.

Sanicula montana rotundifolia minor. *Bauh. pin.* 243.

Sedum montanum rotundifolium minus album non guttatum. *Morif. hist.* 3. *p* 478. *f.* 12. *t.* 9. *f.* 12.

*Houttuyn Lin. Syst.* 6. *p.* 523.

Niedenblättriger Steinbrech. W.

*Habitat in alpibus* Europae. 24 (v. v.)

Calyx *reflexus.*

** *Foliis indivisis, caule folioso.*

24. SAXIFRAGA *oppositifolia.*

S. foliis caulinis ovatis oppositis imbricatis: summis ciliatis. *Fl. suec.* 359, 369. *Gmel. sib.* 4. *p.* 168. *Mill. dict n.* 11. *Gunn. norv.* 53. *Fl. dan. t.* 34. *Hohenwarth et Reiner it.* 1. *p.* 135. *t.* 3. * *Vahl. in Act. Hist. Nat.* 2. 1. *p.* 51. *Allion. pedem. n.* 1529. *t.* 21. *f.* 3.

S. caulibus repentibus surculiferis, foliis obovatis margine leproso-cartilagineis ciliatisque, surculorum quadrifariam imbricatis, pedunculorum oppositis. *Wulf. in Iacq. Collect.* 2. *p.* 286. *

S. foliis ovatis quadrangulo imbricatis, ramis procumbentibus. *Fl. lapp.* 179. *t.* 2. *f.* 1.

S. caule repente, foliis quadrifariam imbricatis, cartilagineis, ciliatis. *Hall. helv. n.* 980.

Sedum alpinum ericoides purpurascens. *Bauh. pin.* 284. *prodr.* 132. *Morif. hist.* 1. *p.* 480. *f.* 12. *t.* 10. *f.* 36.

Sedum montanum erioides. *Bauh. prodr.* 132. *Hall.* R.

β. Saxifraga biflora. *Allion. ped. n.* 1530. *t.* 21. *f.* 1.

S. (*biflora*) caulibus repentibus surculiferis, foliis omnibus oppositis obovatis ciliatis, surculorum rariter imbricatis, pedunculis subtrifloris, calycinis segmentis ovato-obtusis, petalis lanceolatis. *Hohenwarth et Reiner. it.* 1. *p.* 138. *t.* 2. *f.* 2. *

S. foliis imbricatis ovatis, caulibus reptantibus bifloris. *Hall. helv. n.* 981.

γ. Saxifraga purpurea. *Allion. ped. n.* 1531. *t.* 21. *f.* 2.

S. (*retusa*) propaginibus prostratis, foliis oppositis quadrifariam imbricatis punctatis triquetris acutis planoexstantibus, floribus terminalibus geminatis. *Gouan. illust.* 28. *t.* 18. *f.* 1.

S. alpina ericoides flore purpuraſcente. *Tournef. inſt.* 253.
Sedum alpinum ericoides coeruleum. *Bauh. prodr.* 132. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 694.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 524.
Paarblättriger Steinbrech. W.
*Habitat in rupibus alpium* Spitzbergenſium, Lapponicarum, Pyrenaicarum, Helveticarum. 4 (v. f.)
Caules *filiformes, dependentes, repentes.* Folia *ovata, quadrifariam imbricata, oppoſita, ſeſſilia, ciliata.* Flos *terminalis, ſolitarius, ſeſſilis.*
Varietas *ſterilis Geſn. faſc.* 26. *t.* 9. *f.* 3.

25. SAXIFRAGA *aſpera.*

S. foliis caulinis lanceolatis alternis ciliatis, caulibus procumbentibus. *Ger. prov.* 423. *Iacq. auſt.* 5. *p.* 44. *t. app.* 31. *Mill. dict. n.* 14.
S. foliis duris, ciliatis, caule ramoſo, pauciflora. *Hall. helv. n.* 970.
S. ſedi foliis crenatis aſperis T. *Scheuch. it.* 2. *p.* 140. *t.* 20. *f.* 3.
Sedum alpinum, foliis crenatis aſperis. *Bauh. pin.* 284. *prodr.* 132. *Geſn. faſc.* 22. *t.* 6. *f.* 27.
Sedum alpinum hiſpidum fere ſpinoſum, flore pallido. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 695. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 479. *ſ.* 12. *t.* 10. *f.* 25.
Sedum minimum alpinum villoſum alterum. *Park. theatr.* 738.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 525.
Scharfer Steinbrech. W.
*Habitat in alpibus* Helveticis. 4 (v. f.)
Flores *ſuperi*, 3 *ſ.* 4. Petala *albida unguelutео, apice mucronata. Haller.*

26. SAXIFRAGA *Hirculus.*

S. foliis caulinis lanceolatis alternis nudis inermibus, caule erecto. *Fl. ſuec. n.* 370. *Flor. dan. t.* 200. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 165. *t.* 65. *f.* 3. *Weber ſpicil. fl. goett. p.* 13. *Hoffm. germ.* 144. *Roth. germ. I.* 184. *II.* 468.
S. foliis ellipticis, caule unifloro. *Hall. helv. n.* 972. *t.* 11.
Gemm paluſtre luteum bicorne, nardi celticae ſimilis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 477.
Chamae Ciſtus friſicus, foliis nardi celticae. *Bauh. pin.* 466.

Hirculus qui Chamae Cisti genus. *Cluſ. cur.* 5.
Saxifraga anguſtifolia autumnalis, flore luteo guttato. *Breyn. cent.* 106. *t.* 48.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 526.
Ciſtenblütiger Steinbrech. W.
*Habitat in* Suecia, Helvetia, Lapponia, Sibiria, Germania. 24 (v. f.)
Caulis *purpureus, ſimplex, ſaepe biflorus.* Pedunculi *pubeſcentes.* Calyx *reflexus.* Folia *non ciliata.* Petala *nervoſa, flava punctis fulvis.*

27. SAXIFRAGA *Aizoides.*
S. foliis caulinis lineari-ſubulatis ſparſis nudis inermibus, caulibus decumbentibus. *Willich. illuſtr. n.* 25. *Gunn. norv. n.* 541. *Flor. dan. t.* 72.
S. foliis linearibus ſparſis glabris. *Fl. ſuec.* 357, 371.
S. foliis ſubulatis ſparſis. *Fl. lapp.* 178.
Sedum alpinum, flore pallido. *Bauh. pin.* 284. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 477. *ſ.* 12. *t.* 6. *f.* 3.
Sedum minus VI. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 60.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 526.
Immergrüner Steinbrech. W.
*Habitat in alpibus* Lapponicis, Styriacis, Weſtmorlandicis, Baldo. 24 (v. f.)
Flores *magis ſuperi, quam inferi.* Calyx *patens, longitudine corollae.* Petala *flava punctis croceis.*

28. SAXIFRAGA *autumnalis.*
S. foliis caulinis linearibus alternis ciliatis: radicalibus aggregatis. *Mill. dict. n.* 10. *Iacq. vind.* 37. *Scop. carn. n.* 493. *t.* 14.
S. foliis ellipticis ciliatis, caule ſimplici, folioſo, pauciflöro. *Hall. helv. n.* 971.
Sedum alpinum, floribus luteis maculoſis. *Bauh. pin.* 284.
Sedum anguſtifolium autumnale, flore luteo guttato. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 477. *ſ.* 12. *t.* 8. *f.* 6.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 527.
Herbſt Steinbrech. W.
*Habitat in humentibus* Boruſſiae, Helvetiae. 24 (v. f.)
Calyx *corolla longe brevior et viridis eſt.* Flores *inferi.*
Varietas *S. aizoidis ex mente Halleri et Iacquini, ſed in hac folia mucronata, quod non in praecedente. Variat S. autumnalis floribus purpureis.* W.

29. SAXIFRAGA *rotundifolia.*

S. foliis caulinis reniformibus dentatis petiolatis, caule paniculato. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 162. *Mill. dict. n.* 5. *et ic. t.* 141. *Scop. carn.* 2. *n.* 488.

S. foliis reniformibus, acute ſerratis, hirſutis, petiolatis, caule ramoſo. *Hall. helv. n.* 975.

S. foliis reniformibus acute crenatis, caule ramoſo folioſo. *Hort. cliff.* 167. *Roy. lugdb.* 453.

Sanicula montana rotundifolia major. *Bauh. pin.* 243.

Sanicula alpina. *Cam. epit.* 764. *Geſn. faſc.* 19. *t.* 10. *f.* 25.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 528.

Rundblättriger Steinbrech. W.

*Habitat in alpibus* Helveticis, Auſtriacis, 4 (v. v.)

*Flores inferi.*

* * * *Foliis lobatis, caulibus erectis.*

30. SAXIFRAGA *granulata.*

S. foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoſo, radice granulata. *Hort. cliff.* 167. *Fl. ſuec.* 350, 372. *Mat. med.* 116. *Roy. lugdb.* 453. *Pollich. pal. n.* 402. *Flor. dan. t.* 514. *Blackw. t.* 56. *Ludw. ect. t.* 120. *Kniph. cent.* 1. *n.* 80. *Hoffm. germ.* 145. *Roth. germ. I.* 184. *II,* 468.

S. foliis radicalibus reniformibus, obtuſe dentatis, caulinis palmatis. *Hall. helv. n.* 976.

S. rotundifolia alba. *Bauh. pin.* 309.

S. alba. *Dod. pempt.* 316.

Saxifraga IV. *Cam. epit.* 719.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 528.

Körniger Steinbrech. W.

*Habitat in* Europae *apricis.* 4 (v. v.)

Germen *inferum.*

31. SAXIFRAGA *bulbifera.*

S. foliis palmato-lobatis: caulinis ſeſſilibus, caule ramoſo bulbifero. *Sp. pl.* 577. *Gunn. norv. n.* 1006. *Fl. dan. t.* 390.

S. bulboſa altera bulbifera montana. *Col. ecphr.* 1. *p.* 318. *t.* 317.

S. ad folia bulbos gerens. *Bauh. pin.* 309.

Sedum bicorne rotundifolium erectum, radice granulata, et ad caulem tubercula proferens. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 474. *ſ.* 12. *t.* 9. *f.* 24.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 529.

Zwiebelntragender Steinbrech. W.
*Habitat in* Italiae *pratis ſaxoſis umbroſis, inque* Norvegia. 24 (v. f.)
Germen *inferum.*
*Varietas potius praecedentis, quam ſpecies. Segu. ver. 3. p.* 207.

32. SAXIFRAGA *cernua.*
S. foliis caulinis palmatis petiolatis, caule ſimpliciſſimo unifloro bulbifero. *Oed. dan. t.* 22. *Gunn. norv. n.* 528. *t.* 8. *f.* 2.
S. foliis palmatis, caule ſimplici unifloro. *Fl. lapp.* 172. *t.* 2. *f.* 4. *Hort. cliff.* 167. *Fl. ſuec.* 351. 373.
β. S. foliis reniformibus acutis digitatis, caule ramoſo foliioſo. *Gmel. ſib* 4. *p.* 163. *n.* 74.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 530.
Hängender Steinbrech. W.
*Habitat in alpibus* Lapponicis *frequens.* 24 (v. f.)
Flos *parum nutat.* Folia *caulina glabra, magis palmata et germen ſupra receptaculum, magis quam in antecedente, ut diſtinctiſſima a priore planta. Videtur tamen affinis S. ſibiricae, licet et ab hac diſtincta.* Variat *caule ramoſo.*

33. SAXIFRAGA *rivularis.*
S. foliis caulinis palmatis: ſummo florali ovato, caule ſimplici ſubbifloro. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 170. *Gunn. norv. n.* 479. *Flor. dan. t.* 118.
S. foliis radicalibus quinquelobis, florali ovato. *Fl. lapp.* 174. *t.* 2. *f.* 7. *Fl. ſuec.* 352, 374.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 530.
Bach Steinbrech. W.
*Habitat ad alpium* Lapponicarum *latera et rivulos.* ⊙ (v. f.)

34. SAXIFRAGA *geranioides.*
S. foliis radicalibus reniformibus quinquelobis multifidis, caulinis linearibus, caule ſubnudo ramoſo. *Amoen. acad.* 4. *p.* 271. * *Gmel. ſib.* 4. *p.* 171. *n.* 83.
S. foliis radicalibus palmato-quinquelobis, trifidis, lateralibus coaleſcentibus, rameis ſubulatis, laciniis calycinis dilatatis. *Gouan. illuſtr.* 28. *t.* 18. *f.* 2. R
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 531.
Storchſchnabelartiger Steinbrech. W.
*Habitat in* Pyrenaeis. *Burſ. XVI.* 86. 24 (v. f.)

*Absoluta floreſcentia* Calycis *folia elongantur fructu fere longiora. Gouan.* Flores *albi.*

35. SAXIFRAGA *ajugifolia.*

S. foliis radicalibus palmato-quinquepartitis, caulinis linearibus indiviſis, caulibus adſcendentibus multiflo-ris. *Amoen. acad.* 4. *p.* 271.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 531.
Günfelblättriger Steinbrech. W.
*Habitat in* Galloprovinciae *montibus.*

Folia *ad radicem palmata quinque partita, lobis ovato-lanceolatis, petiolata.* Caules *adſcendentes filiformes, foliis duobus vel tribus linearibus acutis indiviſis.* Flores *in ſummo caule tres ad quinque pedunculati.* Stolones *antequam folia emittat hirſuti.* Amoen. acad.

36. SAXIFRAGA *ſibirica.*

S. foliis reniformibus palmatis piloſis, caule pedunculisque filiformibus. *Sp. pl.* 577.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 532.
Sibiriſcher Steinbrech. W.
*Habitat in* Sibiria.

Radiculae *capillares.* Folia *radicalia petiolata, reniformia, ſeptemloba ſ. palmata: lobis ovatis, pilis raris adſperſa, petiolis hirſutis.* Caulis *filiformis, adſcendens, ſemipedalis, debilis, Foliis* 2 *ſ.* 3. *ſeſſilibus, palmatis.* Pedunculi *terminales et laterales longiſſimi, filiformes, bifidi, nudi.* Flos *majuſculus, albus, inferus.*

37. SAXIFRAGA *rupeſtris.* W.

S. foliis caulinis cuneiformibus trilobis dentatis glanduloſo-hirſutis, pedunculis unifloris longiſſimis, caule adſcendente baſi ramoſo. W.

S. (*petraea*) foliis petiolatis palmato-tripartitis, laciniis ſubtrifidis, caule flaccido ramoſiſſimo decumbente, pedunculis longiſſimis monofloris, petalis emarginatis. *Wulfen in Iacq. Collect.* 1. *p.* 200. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 81. *Hoffm. germ.* 145.
Saxifraga geranioides. *Hoſt. ſynop.* 231.
Felſen Steinbrech. W.
*Habitat in* Carinthiae *alpibus.* ⊙ (v. ſ.)

*Planta foliorum pedunculorum ut et petalorum forma a S. geranioide et adſcendente diſtinctiſſima, etiam a S. tridactylite et petraea, licet forma foliorum et peta-*

*lorum quodammodo conveniat, diverſa, ut ex deſcriptione bona Wulfenii et icone optima Iacquini patet.* W.

## 38. SAXIFRAGA *Tridactylites.*

S. foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoſo. *Fl. ſuec.* 353, 375. *Gunn. norv. n.* 544. *Scop. carn. n.* 550. *Pollich. pal. n.* 403. *Hoffm. germ.* 145. *Roth. germ. I.* 184. *II.* 469.

S. foliis trifidis baſi anguſtis, caule erecto. *Roy. lugdb.* 457. *Sauv. monſp.* 208.

S. foliis omnibus trilobis baſi anguſtis, caule erecto. *Fl. lapp.* 173. *Hort. cliff.* 168.

S. foliis petiolatis, trilobatis, caule erecto, ramoſo et folioſo. *Hall. helv. n.* 986.

Sedum tridactylites tectorum. *Bauh. pin.* 285.

Paronychia altera. *Dod. pempt.* 113. tertia. *Tabern.* 805.

Paronychia rutaceo folio. *Blackw. t.* 212.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 532.

Dreytheiliger Steinbrech. W.

*Habitat in* Europae *arenoſis, et alpibus.* ⊙ (v. v.)

## 39. SAXIFRAGA *petraea.*

S. foliis cuneiformibus, radicalibus integris tridentatisque, caulinis quinquedentatis, ſuperioribus trifidis, pedunculis ſubtrifloris. *Vahl. in Act. Hiſt. Nat. Haf.* 2. 1. *p.* 10. *

S. foliis caulinis palmato-tripartitis: laciniis ſubtrifidis, caule ramoſiſſimo laxo. *Sp. pl.* 578. *Gunn. norv. n.* 427. *t.* 9. *f.* 1-3. *Fl. dan. t.* 680.

Saxifraga tridactylites ß. *Sp. pl. ed.* 1. *p.* 404. *Fl. ſuec.* 353, 375. *Fl. lapp.* 173.

S. (*adſcendens*) caule erecto firmo foliisque ſubcoriaceis cuneiformibus, apice tri aut quinquedentatis villoſo-viſcidis. *Wulfen in Iacq. Collect.* 1. *p.* 197. *t.* 11. *et* 12. *f.* 1. 2. *

Saxifraga adſcendens. *Allion. pedem. n.* 1537. *t.* 22. *f.* 3.

Saxifraga hypnoides. *Scop. carn. n.* 499. *t.* 16.

S. (*Scopolii*) foliis inferioribus integris, caulinis trifidis, caule ſuberecto. *Villars proſp.* 47.

S. foliis palmatis, caule denſe folioſo et florigero. *Allion. ſpec. ped. p.* 17. *t.* 3. *f.* 1.

S. caule folioſo multifloro, foliis palmatis hirſutis. *Hall. helv. n.* 987.

S. pyrenaica tridactylites latifolia. *Tournef. inſt.* 253.

Sedum tridactylites alpinum caule folioſo. *Bauh. pin.* 284.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 6. p.* 533.
Klippen Steinbrech. W.
*Habitat in alpibus* Lapponiae, Norvegiae, Helvetiae, Salisburgi, Sabaudiae, Carinthiae. ⊙ (v. ſ.)
*Affinis nimium S. tridactyliti, etiam viſcida, ſed Caulis ramoſiſſimus. Folia lata, palmata, tripartita, inciſa. Corollae quadruplo majores.*

## 40. SAXIFRAGA *adſcendens.*

S. foliis palmato-tripartitis, laciniis ſubtrifidis, caule ramoſo adſcendente. *Vahl. in Act. Hiſt. Nat. Haf. c. 1. p.* 12.*
S. foliis caulinis cuneiformibus apice dentatis, caule adſcendente ſubvilloſo. *Sp. pl.* 579.
S. (*petraea*) foliis radicalibus palmato-quinquepartitis, lobis lateralibus coaleſcentibus multifidis, caule paniculato laxo. *Gouan. illuſt.* 29. *t.* 17. *f.* 3. *mala.*
Saxifraga decipiens. *Ehrh. Beitr.* 6. *p.* 31. *Hoffm. germ.* 145.
S. caule folioſo ramoſo, foliis glabris palmatis. *Hall. helv. n.* 990.
S. alba petraea. *Pon. bald. in Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 337.
Sedum tridactylites alpinum majus album 1. *Bauh. prod.* 131. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 479. *ſ.* 12. *t.* 9. *f.* 28.
Sedum tridactylites alpinum majus. 3. *Bauh. prodr.* 131. *Burſ. XVI.* 89.
Sanicula aizoides alpina trifido folio major alba. *Pluk. alm.* 331. *t.* 222. *f.* 3.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 534.
Aufwärtsſteigender Steinbrech. W.
*Habitat in* Pyrenaeis, Baldo, Taurero Raſtadienſi, Hercynia. 4 (v. v.)

Planta *viſcoſa, undique folioſa, caulibus floriferis tantum e ſummitate, nec ut S. petraeae* (*cui proxima*) *undique ramoſiſſima in faſciculum.*

Stolones *in hac ſpecie ſemper obſervavi ut in S. hypnoide, quas nunquam in petraea vidi; praeterea multo robuſtior,* floribus *copioſioribus majoribus, plerumque brevius pedunculatis.* Vahl. l. c.

*Figura Gouani non optima vix a S. geranioide diverſa. Ceterum haec valde S. hypnoidi affinis.* W.

## *41. SAXIFRAGA *moſchata.*

S. foliis radicalibus aggregatis integris trifidisque acutis linearibus, caule viſcoſo ſubracemoſo, petalis calyci aequalibus. W.

S. (*moſchata*) foliis radicalibus aggregatis linearibus integris trifidisque una cum caule glutinoſis hirſutis, floribus longe pedunculatis. *Murr. ſyſt. veg.* 14. *p.* 414. *Wulfen in Iacq. miſc.* 2. *p.* 128. *t.* 21. *f.* 21. *

S. (*exarata*) foliis palmato-trifidis, ſuperne lineatis hirſutis, caule adſcendente multifloro petalis trinervoſis. *Villars proſp.* 47. *Allion. ped. n.* 1539. *t.* 88. *f.* 2.

Sedulum quod Moſchatella alpina lutea vocari poteſt. *Geſn. faſc.* 25. *t.* 6. *f.* 31.

Tridactylites alpina. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 754.

Biſamduftiger Steinbrech. W.

*Habitat in alpibus* Carinthiacis, Salisburgenſibus, Sabaudicis *et* Delphinatus. 24 (v. ſ.)

## *42. SAXIFRAGA *muſcoides.*

S. foliis radicalibus aggregatis integris trifidisque oblongis obtuſis, caule filiformi ſubbifloro, petalis vix calyce longioribus. W.

S. (*muſcoides*) foliis radicalibus aggregatis linearibus integris trifidisque, ſcapo gracili ſuberecto paucifloro, floribus citrinis ſubſeſſilibus. *Wulfen in Iacq. miſc.* 2. *p.* 125. *

Saxifraga ceſpitoſa. *Scop. carn. n.* 494. *t.* 14.

S. foliis integris et trifidis, caule ſubnudo paucifloro. *Hall. helv. n.* 988.

S. pyrenaica foliis partim integris, partim trifidis. *Hall. opuſc.* 292. *tab.* 1. *Segu. veron.* 3. *p.* 205. *et* 1. *p.* 451. *t.* 9. *f.* 4.

Lebermoosartiger Steinbrech. W.

*Habitat in alpibus* Carnioliae, Helvetiae, *inque* Pyrenaeis. 24 (v. ſ.)

*A. S. caeſpitoſa licet ſimillima diſtincta*: foliis *tenuioribus*, caule *filiformi et* parvitate *floris*. W.

## 43. SAXIFRAGA *caeſpitoſa.*

S. foliis radicalibus aggregatis linearibus obtuſis trifidis inciſis, caule erecto ſubmultifloro, petalis calyce duplo longioribus. W.

S. foliis radicalibus aggregatis linearibus integris trifidisque, caule erecto, ſubnudo ſubbifloro. *Fl. ſuec.* 2. *n.*

376. *Oed. dan t.* 71. *Gunn. norv. n.* 1047. *t.* 7. *f.* 3. 4. *Wulfen in Iacq. Collect.* 1. *p.* 290. *

S. foliis petiolatis trifidis, caule ſubfolioſo viſcido. *Hall. helv. n.* 989.

Sedum tridactylites alpinum minus. *Bauh. pin.* 284. *prodr.* 131.

β. S. (*groenlandica*) foliis caulinis palmato-multifidis ſparſis: laciniis acutis, caule erecto. *Sp. pl.* 578. *Gunn. norv. n.* 689. *t.* 7. *f.* 1.

S. tridactylites groenlandica, caulibus valde folioſis. *Dill. elth.* 337. *t.* 353. *f.* 3. 9.

γ. S. (*pedemontana*) caule erecto ſubnudo, foliis trilobis et tridentatis, caulinis palmatis. *Allion. pedem. n.* 1540. *t.* 21. *f.* 5. 6. *

Saxifraga hypnoides. *Allion. pedem. n.* 1538. *t.* 21. *f.* 4. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 534, 535.

Raſen Steinbrech. W.

*Habitat in ſummis* Europae *alpibus*, *inque* Groenlandia. 4 (v. ſ.).

*44. SAXIFRAGA *tricuſpidata.*

S. foliis radicalibus aggregatis cuneiformibus ciliatis acute tridentatis, caule adſcendente racemoſo, petalis lanceolatis calyce triplo longioribus. W.

S. foliis lanceolatis, radicalibus congeſtis tricuſpidatis, caulibus adſcendentibus multifloris. *Retz. prod. Fl. ſcand. ed.* 2. *n.* 522.

S. foliis radicalibus denſiſſime imbricatis concavo-cuneiformibus ciliatis tricuſpidatis, caule adſcendente nudiuſculo paniculato. *Rottb. Act. Hafn.* 10. *p.* 446. *t.* 6. *Fl. dan. t.* 976. *Gunn. norv. n.* 1046.

Dreyſpitziger Steinbrech. W.

*Habitat in* Groenlandia. 4

*Accedit parum, quoad foliorum formam, ad praecedentem, ſed florem fert S. Hirculi.* W.

**** *Foliis lobatis; Caulibus procumbentibus.*

45. SAXIFRAGA *Cymbalaria.*

S. foliis caulinis cordatis trilobis integrisque, caulibus procumbentibus. *Sp. pl.* 579.

S. exigua, foliis cymbalariae. *Buxb. cent.* 2. *p.* 40. *t.* 45. *f.* 2.

Geum orientale Cymbalariae folio molli et glabro, flore magno albo. *Tournef. Cor.* 18. *itin. ed. germ.* 3. *p.* 348. *t.* 32. *

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. p. 536.*
Cymbelblättriger Steinbrech. W.
*Habitat in* Oriente.

46. SAXIFRAGA *hederacea.*
S. foliis caulinis ovatis lobatis, caule filiformi flaccido. *Sp. pl.* 579.
S. cretica annua minima, hederaceo folio. *Tournef. cor.* 18. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 536.
Epheublättriger Steinbrech. W.
*Habitat in* Creta. ⊙

*47. SAXIFRAGA *orientalis.*
S. foliis ſubrotundis quinquelobis caule ramoſiſſimo procumbente. W.
S. foliis radicalibus rameisque quinquelobis ſeptemlobisve, ſummis integerrimis bifidisve, caule ramoſiſſimo baſi procumbente. *Iacq. obſ.* 2. *p.* 9. *t.* 34. *
Geum orientale rotundifolium ſupinum flore aureo. *Tournef. cor.* 18.
Orientaliſcher Steinbrech. W.
*Habitat in* Oriente.
*Similis S. Cymbalariae, tamen diverſa; an veroſatis diſtincta a S. hederacea?* W.

*48. SAXIFRAGA *cuneata.* W.
S. foliis inferioribus petiolatis cuneiformibus quinquelobis, caulinis ſeſſilibus lanceolatis, caule adſcendente paniculato. W.
S. (*cuneifolia*) foliis cuneatis quinquelobis, caulinis lanceolatis, floribus paniculatis. *Cavan. ic.* 3. *p.* 25. *t.* 248. *
Dreyeckiger Steinbrech. W.
*Habitat in* Hiſpaniae *montibus frigidis prope Caſtellfort.* 4
Corolla *alba.* Germen *inferum.* W.

49. SAXIFRAGA *hypnoides.*
S. foliis caulinis linearibus integris trifidisve, ſtolonibus procumbentibus, caule erecto nudiuſculo. *Oed. dan. t.* 348. *Mill. dict. n.* 12.
S. procumbens, foliis linearibus integris trifidisque. *Hort. cliff.* 168. *Roy. lugdb.* 453. *Sauv. monſp.* 208. *Gort. gelr.* 248.
Sedum alpinum trifido folio. *Bauh. pin.* 284. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 479. *ſ.* 12. *t.* 9. *f.* 26.
Sedum alpinum VII. *Cluſ. pann. p.* 491. R.

β. Saxifraga procumbens, foliis linearibus integris trifidis et quinquefidis. *Roy. lugdb.* 454. *Sauv. monſp.* 208. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 536.
Liegender Steinbrech. W.
*Habitat in alpibus* Helveticis, Auſtriacis, Pyrenaicis, Weſtmorlandicis. 24 (v. ſ.)
Planta *viſcoſa.* Folia *longius petiolata.* Stolonibus *gemmiferis variat.*

## 888. TIARELLA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 765.

*Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala, calyci inſerta: petalis integris. *Capſ.* 1-locularis, 2-val. vis: valvula altera majore.

1. TIARELLA *cordifolia.*
T. foliis cordatis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 17. *Mill. dict. n.* 1.
Mitella nudo ſcapo. *Hort. cliff.* 167. * *Roy. lugdb.* 459. *Gron. virg.* 160.
Cortuſa americana, flore ſpicato, petalis integris. *Herm. par.* 129. *t.* 129.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 539.
Herzblättriger Spitzhut. W.
*Habitat in* America *et* Aſia *ſeptentrionali.* 24

2. TIARELLA *trifoliata.*
T. foliis ternatis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 17. *Mill. dict. n.* 2.
Mitella foliis ternatis. *Amoen. acad.* 2. *p.* 351.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 540.
Dreyblättriger Spitzhut. W.
*Habitat in* Aſia *boreali. G. Demidoff.* 24

## 889. MITELLA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 766.

*Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala, calyci inſerta: petalis pinnatifidis. *Capſ.* 1-locularis, 2-valvis: valvulis aequalibus.

1. MITELLA *diphylla.*
M. foliis cordatis ſubtrilobis dentatis, ſcapo diphyllo. W.
M. ſcapo diphyllo. *Hort. cliff.* 167. * *Roy. lugdb.* 459. *Cold. noveb.* 96. *Mill. dict. n.* 1. *Kniph. cent.* 1. *n.* 59.

Cortuſa americana altera, floribus minutim fimbriatis. *Mentz. pug. t.* 10.
Cortuſa americana, ſpicato flore, petalis fimbriatis. *Herm. par.* 130.
Sanicula ſ. Cortuſa indica, flore ſpicato fimbriato. *Dodart. mem.* 299.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 540.
Zweyblättriger Biſchofshut. W.
*Habitat in* America *ſeptentrionali.* 24 (v. v.)

*2. MITELLA *cordifolia.*

M. foliis cordatis ciliato-dentatis, ſcapo ſubnudo. W.
M. (*cordifolia*) ſcapo ſubnudo, foliis cordatis crenato-dentatis hiſpidis. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 185. * *illuſt. gen. t.* 373. *f.* 3.
Herzblättriger Biſchofshut. W.
*Habitat in* Aſia *boreali?* 24

3. MITELLA *nuda.*

M. foliis reniformibus repandis ciliatis, ſcapo nudo. W.
M. ſcapo nudo. *Amoen. acad.* 2. *p.* 352. *Amm. Act. petrop.* 2. *p.* 352. *Mill. dict. n.* 2.
M. (*reniformis*) repens, ſcapo nudo, foliis reniformibus. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 185. * *illuſt. gen. t.* 373. *f.* 2.
M. ſcapo nudo, corollarum petalis fimbriatis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 175. *t.* 63. *f.* 2.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 541.
Nacktſtieliger Biſchofshut. W.
*Habitat in* Aſia *boreali.* 24

## 890. SCLERANTHUS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 767.

*Cal.* 1-phyllus. *Cor.* nulla. *Sem.* 2, calyce incluſa.

1. SCLERANTHUS *annuus.*

S. calycibus fructus patulis. *Fl. ſuec.* 348, 377. *Oed. dan. t.* 504. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 39. *t.* 6. *f.* 2. *R. Leers. herb. n.* 310. *Pollich. pal. n.* 404. *Hoffm. germ.* 145. *Roth. germ. I.* 183. *II.* 467.
S. floribus patulis. *Hall. helv. n.* 1551.
Scleranthus. *Hort. cliff.* 166. *Roy. lugdb.* 215.
Knauel annuum. *Scop. carn. n.* 501. *Rupp. jen.* 3.

Polygonum, gramineo folio, majus erectum. *Bauh. pin.* 281.
Polygonum, anguſtiſſimo et gramineo folio, minus repens. *Bauh. pin.* 281. (*ſed mixtum*)
Polygonum minus alterum. *Tabern. hiſt.* 1217.
Polygonum Germanis Knawel. *Trag.* 393.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 542.
Jähriger Knauel. W.
*Habitat in* Europae *arvis arenoſis.* ☉ (v. v.)
Calycinis *laciniae acutae, vix albido-marginatae.* Stamina 5 *ſ.* 7. Leers *l. c.*

## 2. SCLERANTHUS *perennis.*

S. calycibus fructus clauſis. *Fl. ſuec.* 349, 378. *Gmel. ſib.* 3. *t.* 6. *f.* 1. *Pollich. pal. n.* 405. *Leers. herb.* 311. *Kniph. cent.* 10. *n.* 76. *Flor. dan. t.* 563. *Hoffm. germ.* 145. *Roth. germ. I.* 183. *II.* 468.
S. floris ſegmentis erectis. *Hall. helv. n.* 1550.
Knauel incanum, flore majore, perenne. *Raj. angl.* 3. *p.* 160. *t.* 5. *f.* 1.
Polygonum minus polycarpon. *Tabern. hiſt.* 1215.
Alchimilla gramineo folio, majori flore. *Vaill. pariſ.* 4. *t.* 1. *f.* 5.
*?.* Polygonum cocciferum. *Cam. epit.* 691. R.
Polygonum polonicum cocciferum. *Bauh.* 3. *p.* 378. R.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 543.
Dauernder Knauel. W.
*Habitat in* Europae *campis apricis arenoſis.* ♃ (v. v.)
Calycis *laciniae obtuſae, albido-marginatae.* Semen *conſtanter unicum in hoc et praecedente, nec duo.* Leers *l. c.*

## 3. SCLERANTHUS *polycarpus.*

S. calycibus fructus patentiſſimis ſpinoſis, caule ſubvilloſo. *Amoen. acad.* 4. *p.* 313. *
Polycarpus. *Dalech. hiſt.* 444.
Polygonum montanum, vermiculatae foliis. *Bauh. pin.* 281.
Vermiculata nova planta. *Col. ecphr.* 1. *p.* 295. *t.* 294.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 543.
Vielſaamiger Knauel. W.
*Habitat* Monſpelii *et in* Italia. ☉

## 891. GYPSOPHILA.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 768.

*Cal.* 1-phyllus, campanulatus, angulatus. *Petala* 5, ovata, ſeſſilia. *Capſ.* globoſa, 1-locularis.

### 1. GYPSOPHILA *repens.*

G. foliis lanceolatis, ſtaminibus corolla emarginata brevioribus. *Ger. prov.* 409. *t.* 15. *f.* 2. *Hoffm. germ.* 146. *Iacq. auſtr.* 5. *p.* 4. *t.* 407. *Roth. germ. I.* 185. *II.* 471.

Saponaria radice lignoſa, maxima, foliis pulpoſis, petalis emarginatis. *Hall. helv. n.* 905.

Saponaria caule ſimplici, foliis ſubulatis planis, ex alis ramuloſa. *Hort. cliff.* 166.

Saponaria foliis glaucis pulpoſis anguſtis heteromallis. *Hall. Rupp. jen.* 117.

Alſine orientalis altiſſima, gramineo folio, flore albo. *Buxb. cent.* 3. *p.* 32. *t.* 60.

Caryophyllus alpinus Linariae foliis, floribus variegatis. *Boccon. muſ.* 23. *t. Hall.* R.

Caryophyllus ſaxatilis, foliis gramineis minor. *Bauh. pin.* 211. *Burſ. XI.* 126.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 544.

Kriechendes Gypskraut. W.

*Habitat in* Sibiriae, Auſtriae, Helvetiae, Pyrenaeorum *montibus.* 4 (v. l.)

### 2. GYPSOPHILA *proſtrata.*

G. foliis lanceolatis laevibus, caulibus diffuſis, piſtillis corolla campanulata longioribus. *Mill. dict. n.* 3.

Alſine anguſtifolia caryophylloides multiflora glabra purpuraſcens, radice aſtragaliti. *Pluk. alm.* 22. *t.* 75. *f.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 545.

Liegendes Gypskraut. W.

*Habitat in alpibus* Europaeis? 4 (v. f.)

Caules *plures*, *diffuſi*, *laeves*, *teretes*, *ſubpedales*, *ad genicula rufeſcentes.* Folia *lanceolata*, *glabra.* Panicula *brachiata*, *trichotoma*: *pedunculo intermedio ſimpliciore ad triangulum recto.* Corolla *alba*: *Petalis obtuſis*, *patentibus*, *apice canaliculatis.* Stamina *corolla dimidio breviora.* *Antherae flavae.* Styli *corolla paullo longiores.* *Simillima G. repenti*, *ſed* dif-

fert *Radice vix repente; Caulis geniculis minus purpurascentibus. Calycis foliolis non carinatis. Corollis minoribus albis, nec subrubentibus. Antheris flavis. Stylis divergentibus, petalo longioribus. Foliis minus carnosis.*

## 3. GYPSOPHILA *paniculata.*

G. foliis lineari-lanceolatis, inferioribus scabris, staminibus minutis, stylis corolla longioribus. *Ait. Kew. 2. p. 84.*

G. foliis lanceolatis scabris, corollis revolutis, floribus dioicis. *Amoen. acad. 3. p. 23. Mill. dict. n. 5. Kniph. cent. 10. n. 50. Iacq. austr. 5. p. 26. t. app. 1.*

Alsine fruteſcens, caryophylli folio, flore parvo albo. *Gerb. tanaiſ. 15.*

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 6. p. 546.*

Rispenblütiges Gypskraut. W.

*Habitat in* Sibiriae, Tatariae *desertis sabulosis*, Tawrow, Bielogrod. 4 (v. v.)

Folia *margine scabra, acuta.* Stamina *in fundo floris sterilia latent.* Petala *revoluta, minora quam in congeneribus.* Styli *longiores corolla, incurvi. Mas mihi non visus.*

## *4. GYPSOPHILA *viscosa.*

G. foliis ovato-lanceolatis laevibus basi cordatis amplexicaulibus, internodiis ramorum medio viscosis, petalis retusis. *Ait. Kew. 2. p. 85.*

G. (*viscosa*) foliis lanceolatis, internodiis caulis, ramorum et pedunculorum medio viscosis, petalis emarginatis. *Murr. comment. goetting. 1783. p. 9. t. 3.* *

Klebriges Gypskraut. W.

*Habitat in* Oriente. ⊙ (v. v.)

## *5. GYPSOPHILA *adscendens.*

G. foliis lanceolato-linearibus, caulibus prostratis, corolla staminibus et pistillis ejusdem longitudinis. *Murr. syst. veg. ed. 14. p. 415. Iacq. hort. 2. t. 138.*

Aufwärtssteigendes Gypskraut. W.

*Habitat* - - - - - -

## 6. GYPSOPHILA *altissima.*

G. foliis lanceolatis subtrinerviis, caulibus rectis. *Sp. pl. 582.*

Lychnis caulibus dichotomis, corymbis fastigiatis, foliis lanceolatis trinerviis. *Gmel. sib 4. p. 443. t. 60.*

Saponaria calycibus pentaphyllis, corymbis faſtigiatis, foliis lanceolatis, caule adſcendente. *Hort. upſ.* 107.
Caryophyllus alpinus craſſo linariae folio. *Bocc. muſ.* 23. *t.* 5. *f.* 3.
Caryophyllus ſaxifragus, foliis gramineis minor. *Bauh. pin.* 211.
Lychnis alpina linifolia, multiflora, perampla radice. *Tournef. inſt.* 328.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 546.
Höchſtes Gypskraut. W.
*Habitat in* Sibiria. 24 (v. ſ.)

*Differt a G. Struthio magnitudine dupla vel quadrupla omnium partium: ſtructura eadem, tamen diverſa ſpecies. Caulis erectus, ſeſquipedalis. Folia longitudine et latitudine digiti.*

*7. GYPSOPHILA *arenaria.*
G. foliis linearibus ſubcarnoſis glabris planis, caule corymboſo, petalis integris. W.
Gypſophila arenaria. *Waldſtein et Kitaibel. pl. rar. Hung.*
Sand Gypskraut. W.
*Habitat in arenoſis* Hungariae. 24 (v. ſ.)

*Praecedenti ſimillima, ſed* folia *anguſtiora linearia avenia, et* petala *integra; ceterum habitu convenit. Conſtanter vero faciem ſervat. Deſcriptionem hujus fuſiorem expectamus in opere futuro praetioſo de Waldſtein et Kitaibel, qui ambo multa nova obſervarunt vegetabilia in itineribus per Hungariam quotannis inſtitutis.* W.

8. GYPSOPHILA *Struthium.*
G. foliis linearibus carnoſis: axillaribus confertis teretibus. *Loefl. it.* 73.
Saponaria caule ſimplici, foliis linearibus ex alis foliorum confertis teretibus. *Hort. cliff.* 166. *Roy. lugdb.* 444.
Saponaria lychnidis folio, floſculis albis. *Bauh. pin.* 206.
Lychnis hiſpanica Kali folio, multiflora. *Tournef. inſt.* 338.
Kali vermiculatum, albo globoſo flore. *Barr. rar.* 64. *t.* 119. *Bocc. muſ.* 2. *p. t.* 122.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 547.
Salzkrautblättriges Gypskraut. W.
*Habitat in* Hiſpania. 24 (v. ſ.)

Caulis *inferne fruticosus; ex alis foliorum rudimenta foliacea.* Folia *carnosa, semiteretia internodiis longiora. Saponis loco Veteribus et hodie Hispanis.*

9. GYPSOPHILA *fastigiata.*

G. foliis lanceolato-linearibus obsolete triquetris laevibus obtusis secundis. *Amoen. acad. 3. p. 23. Fabric. helmst. 2. p. 189. Mill. dict. n. 2. Mattusch. sil. n. 302. Hoffm. germ. 146. Roth. germ. I. 185. II. 471.*

Saponaria foliis pulposis, linearibus, caule umbellato erecto, petalis ovatis. *Hall. helv. n. 906.*

Lychnis gypsophila. *Gmel. sib. 4. p. 144. t. 61. f. 1.*

Saponaria calycibus pentaphyllis, corymbis fastigiatis, foliis linearibus, caule adscendente. *It. gotl. 282. Fl. suec. 346, 379. Sauv. monsp. 145.*

Saponaria petalis ovatis, foliis glaucis pulposis linearibus. *Hall. jen. 117. t. 2. f. 1.*

Caryophyllus saxatilis, floribus gramineis, umbellatis corymbis. *Bauh. pin. 211.*

Polygonum majus erectum angustifolium, floribus candidis. *Mentz. pug. t. 2. f. 2.*

Symphytum petraeum. *Thal. harc. 115.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 6. p. 548.*

Langstieliges Gypskraut. W.

*Habitat in* Gothlandiae, Borussiae, Helvetiae, Harcyniae *rupibus.* 4 (v. s.)

Caulis *in hac, non in* G. prostrata, *ante florescentiam procumbit, hinc folia secunda.*

10. GYPSOPHILA *perfoliata.*

G. foliis ovato-lanceolatis semiamplexicaulibus. *Mill. dict. n. 4.*

Saponaria foliis lanceolatis, calycibus campanulatis angulatis. *Hort. cliff. 165.*

Spergula multiflora, foliis inferioribus saponariae, superioribus behen similibus. *Dill. elth. 368. t. 276. f. 357.*

β. Gypsophila (*tomentosa*) foliis lanceolatis subtrinerviis tomentosis, caule pubescente. *Sp. pl. 583. Amoen. acad. 4. p. 271.*

Linum sylvestre latifolium, flore albicante. *Barr. ic. t. 1002.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 6. p. 548.*

Durchwachsenes Gypskraut. W.

*Habitat in* Hispania *et* Oriente. 4

Folia *oleracea*, *ſubcarnoſa*, *lanceolata*: *inferiora ſcabra*; *ſuperiora glaberrima.*

11. GYPSOPHILA *muralis.*

G. foliis linearibus planis, calycibus aphyllis, caule dichotomo, petalis crenatis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 23. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 125. *Pollich. pal. n.* 406. *Kniph. cent.* 12. *n.* 51. *Hoffm. germ.* 146. *Roth. germ. I.* 185. *II.* 471.

Saponaria foliis filiformibus, caule diffuſo, brachiato. *Hall. helv. n.* 903.

G. foliis linearibus planis, pedunculis ſimplicibus capillaribus longis unifloris, petalis emarginatis. *Gerard. prov.* 408.*

Saponaria calycibus pentaphyllis, corollis crenato-emarginatis, foliis ſubulatis planis. *Fl. ſuec.* 347, 380.

Saponaria foliis linearibus. *Fl. lapp.* 171.

Caryophyllus minimus muralis. *Bauh. pin.* 211.

Lychnis parva paluſtris, foliis acutis lanceolatis, floſculis purpureis. *Mentz. pug. t.* 7. *f.* 4.

Spergula folio Knawel, flore purpuraſcente minor. *Eph. Nat. Cur. cent.* 6. *p.* 273. *t.* 4. R.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 549.

Gemeines Gypskraut. W.

*Habitat in* Germania, Suecia, Helvetia *ad vias et inter ſtipulas.* ♂ (v. v.)

Similis *G. Saxifragae*, *at caret ſquamis calycinis.*

12. GYPSOPHILA *rigida.*

G. foliis linearibus planis, caule dichotomo; pedunculis bifloris, petalis emarginatis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 24. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 142. *n.* 39.

Saponaria caule dichotomo, foliis ſubulatis planis. *Hort. cliff.* 445. *Roy. lugdb.* 445.

Saponaria caule brachiato, capillaceo folio, calyce campanulato, floribus ſparſis. *Sauv. monſp.* 145.

Tunica minima. *Dalech hiſt.* 1191.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 550.

Steifes Gypskraut. W.

*Habitat* Monſpelii *et forte in* Belgio. 24 (v. ſ.)

13. GYPSOPHILA *Saxifraga.*

G. foliis linearibus, calycibus angulatis: ſquamis quatuor, corollis emarginatis. *Willich. obſ. n.* 64. *Hoffm. germ.* 146. *Roth, germ. I.* 185. *II.* 472.

Tunica calycibus pelviformibus. *Hall. helv. n.* 902.

Tunica Saxifraga. *Scop. carn. n.* 506.
Dianthus Saxifragus. *Spec. pl.* 1. *p.* 413.
Dianthus radice repente, ramis decumbentibus, foliis ſubulatis. *Roy. lugdb.* 444.
Betonica coronaria ſ. Tunica minima. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 337. *Hall.*
Caryophyllus ſaxifragus ſtrigoſior ſ. Caryophyllus ſylveſtris, flore minimo. *Bauh. pin.* 211.
Lychnis pumila caryophyllata, flore rubello, italis Haemorrhoidalis aldrovando. *Barr. rar.* 64. *t.* 998.
*Houttuyn Lin. Pſl.* Syſt. 6. *p.* 550.
Steinbrechartiges Gypskraut. W.
*Habitat in* Auſtria, Helvetia, Gallia. 24 (v. v.)
Caulis *palmaris*, *erectus*, *filiformis*, *dichotomus*. Folia *linearia*, *acuta*. Calyx *cinctus foliolis* 4, *tubo dimidio brevioribus*. Petala *integerrima*, *emarginata*, *incarnato-pallida*, *baſi ſtriis* 3 *purpureis*, *obſoletis*.

## 892. SAPONARIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 769.

*Cal.* 1-phyllus, nudus. *Petala* 5, unguiculata. *Capſ.* oblonga, 1-locularis.

1. SAPONARIA *officinalis*.

S. calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 165. *Hort. upſ.* 106. *Mat. med.* 117. *Roy. lugdb.* 444. *Gron. virg.* 160. *Gort. gelr.* 245. *Flor. dan. t.* 543. *Ludw. ect. t.* 170. *Knorr. del.* 1. *t. S.* 17. *Pollich.* 473. *pal. n.* 407. *Hoffm. germ.* 147. *Roth. germ. I.* 185. *II.*
S. major laevis. *Bauh. pin.* 206.
S. vulgaris. *Cam. epit.* 152. *Blackw. t.* 113.
S. foliis ovato-lanceolatis, trinerviis, floribus tubuloſis umbellatis. *Hall. helv. n.* 908.
Lychnis (*officinalis*) floribus digynis, corymboſis; capſulis quadrivalvibus. *Scop. carn. n.* 510.
Bootia vulgaris. *Neck. gallob. p.* 193.
β, Saponaria *hybrida*. *Mill. dict. n.* 2.
S. concava anglica. *Bauh. pin.* 206. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 548. *ſ.* 5. *t.* 22. *f.* 52.
Gentiana folio convoluto. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 521.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 552.
Gemeines Seifenkraut. W.

*Habitat in* Europa *media.* 2l (v. v.)

Hybrida *varietas ſingularis, inſtar alterius* **Peloriae** *Antirrhini, qua ex Saponaria tranſit in monopetalam Gentianam, reperta in Spineis, Lichbarrow, Northamtonſhire Angliae, a Gerardo, amplius ibi non occurrit teſte Mortono, forte etiammum alicubi in Hortis Curioſorum aſſervata, quae ſemine non propagatur.*

2. SAPONARIA *Vaccaria.*

S. calycibus pyramidatis quinquangularibus, foliis ovatis acuminatis ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 166. *Hort. upſ.* 107. *Roy. lugdb.* 443. *Guett. ſtamp.* 287. *Sauv. monſp.* 153. *Pollich. pal.* 408. *Hoffm. germ.* 147. *Roth. germ. I.* 186. *II.* 473.

S. calycibus pyramidatis, quinquangularibus, foliis ovatis, connatis. *Hall. helv. n.* 907.

Lychnis Vaccaria. *Scop. carn.* 2. *n.* 511.
Saponaria ſegetalis. *De Neck. gallob. p.* 194.
Myagrum Vaccaria quorundam. *Tabern. p.* 866.
Lychnis ſegetum rubra, foliis perfoliatis. *Bauh. pin.* 204.
Vaccaria. *Dod. pempt.* 104.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 554.
Acker Seifenkraut W.

*Habitat inter ſegetes* Galliae, Germaniae, Helvetiae, Orientis. ⊙ (v. v.)

3. SAPONARIA *cretica.*

S. calycibus quinquangularibus ſtriatis, caule erecto ſubdichotomo, foliis ſubulatis. *Sp. pl.* 584.

Saxifraga altera. *Alp. exot.* 292. *t.* 291.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 554.
Cretiſches Seifenkraut. W.

*Habitat in* Cretae *aridis.*

Caulis *brachiatus ſ. dichotomus, teres, villoſo-viſcidus anguſtus, pedalis.* Folia *lineari-ſubulata, laevia.* Pedunculi *axillares, ſolitarii, uniflori, ſtricti.* Flos *erectus.* Calyx *quinquangularis angulis ſtriis tribus, monophyllus, oblongus, acutus, inter dentes membranaceus.* Petala *parva, integra.*

4. SAPONARIA *porrigens.*

S. calycibus cylindricis pubeſcentibus ramis divaricatiſſimis, fructulis pendulis. *Syſt. Nat.* 347. *Iacq. hort.* 2. *p.* 49. *t.* 109.

Silene porrigens. *Syſt. Nat.* 3. *p.* 230.
Silene (*porrigens*) caule paniculato villoſo, pedunculis

axillaribus filiformibus ſolitariis patentibus. *Gouan. illuſtr.* 29.

Lychnis chalepenſis annua, foliis parum hirtis anguſtis, carneis, pediculis infirmis triuncialibus, capſulis fere rotundis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 541. *fig. mala.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 555.

Weitäſtiges Seifenkraut. W.

*Habitat in* Oriente. ⊙ (v. v.)

Caulis *bipedalis*, *erectus*, *articulatus*, *rigidulus*, *inferne glaber*, *ſuperne pubeſcenti-viſcidus*: Ramis *divaricatiſſimis*. Folia *lanceolata*: *inferiora glabra*; *ſuperiora ſub ramificationibus pubeſcentia viſcida*. Pedunculi *axillares*, *ſolitarii*, *uniflori*, *capillares*, *laxi*, *patentes*, *glabri*, *longitudine foliorum*; *dum fructiferi penduli*. Calyx *oblongus*, *tubuloſus*, *pubeſcenti-viſcidus*. Petala *absque corona*, *ſubincarnata*, *emarginata laciniis brevibus*. Stamina *alba*, *tubo breviora*. Germen *ovatum*. Styli *diſtantes*. Stigmata *ſimplicia*.

5. SAPONARIA *illyrica*.

S. calycibus ſubcylindricis, caule erecto viſcido purpuraſcente: ramis alternis, corollis punctatis. *Mant.* 70.

S. caule dichotomo hirſuto, floribus faſtigiatis, corollis patentibus, petalis integris tripunctatis. *Ard. ſpec.* 2. *p.* 24. *t.* 9.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 556.

Illyriſches Seifenkraut. W.

*Habitat in* Illyria. *D. Arduini.*

Planta *erecta ſpithamaea*, *tenera*, *viſcoſo-pubeſcens*. Folia *lineari-lanceolata*, *glabra*. Calyces *ſemiquinquefidi*, *margine membranacei*. Petala *integra*, *alba*: *punctis* 3 *purpureis*. Antherae *violaceae*.

6. SAPONARIA *Ocymoides*.

S. calycibus cylindricis villoſis, caulibus dichotomis procumbentibus. *Sp. pl.* 585. *Iacq. auſtr.* 5. *p.* 39. *tab. app.* 23. *Cavan. ic.* 2. *p.* 29. *t.* 134. *

S. caulibus decumbentibus, nodoſis, foliis ovato-lanceolatis, calycibus tubuloſis hirſutis. *Hall. helv. n.* 909.

S. minor quibusdam. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 344.

Lychnis vel Ocymoides repens montanum. *Bauh. pin.* 206. *Scheuch. alp.* 7. *p.* 514.

Ocymoides repens, polygoni folio. *Lob. ic. p.* 341.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 556.

Rundblättriges Seifenkraut. W.

*Habitat in* Helvetiae, Italiae, Monſpelii *petroſis, umbroſis.* 4 (v. ſ.)

7. SAPONARIA *orientalis.*

S. calycibus cylindricis villoſis, caule dichotomo erecto patulo. *Hort. upſ.* 106. *n.* 2.* *Mill. dict. n.* 5.

S. caule dichotomo, foliis lanceolatis petiolatis, floribus ſolitariis pedunculatis. *Roy. lugdb.* 445.

Lychnis orientalis. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 512.

Lychnis orientalis annua ſupina, antirrhini folio, flore minimo purpuraſcente. *Tournef. cor.* 25. *Dill. elth.* 205. *t.* 167. *f.* 204.

*Houttuyn Lin. Pfl.* Syſt. 6. *p.* 557.

Orientaliſches Seifenkraut. W.

*Habitat in* Oriente, Carniolia. ⊙ (v. ſ.)

*Similis praecedenti; huic Folia lineari-lanceolata, illi lanceolato-ovata.* Calyces *fructus ovati, adſperſi punctis elevatis piliferis.* Petala *acute emarginata abſque coronula.*

8. SAPONARIA *lutea.*

S. calycibus teretibus cauleque hirtis, petalis obovatis integerrimis, floribus corymboſis, foliis lineari-lanceolatis canaliculatis. *Smith. ſpicil. bot. tab.* 5.*

S. calycibus teretibus, corollis coronatis, floribus ſubumbellatis, foliis ſublinearibus canaliculatis. *Sp. pl.* 585. *Allion. pedem. n.* 1560. *t.* 23. *f.* 1.

S. foliis gramineis, congeſtis, floribus umbellatis, petalis ovatis. *Hall. helv. n.* 904.

Lychnis floribus umbellatis ochroleucis, petalis ovatis, filamentis nigris. *All. ſpecim. pedem.* 29. *t.* 5. *f.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 557.

Gelbes Seifenkraut.

*Habitat in alpibus* Helvetiae, Sabaudiae, *inque monte* Ceniſio. 4 (v. ſ.)

Folia *ſuperiora, inprimis calyces pubeſcunt.*

*9. SAPONARIA *bellidifolia.*

S. calycibus teretibus hirtis, caule glabro, petalis linearibus crenatis, foliis ſpathulatis. *Smith. ſpicil. bot.* 5.

Lychnis lutea montana globulariae capite et facie. *Barr. ic.* 498.

Lychnis rubra globulariae capite et facie montana. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 75. *t.* 62. *f.* 1.

Globularia lutea montana. *Colum. ecphr.* 1. *p.* 152. *t.* 153.

Bellis montana, globoso luteo flore. *Bauh. pin.* 262.
Maßlieblättriges Seifenkraut.
*Habitat in* Italiae *montium jugis altissimis.* 4
Folia *radicalia spathulata sunt cum mucrone, Globulariae simillima.* Caules *S. lutea triplo altiores glabri.* Stamina *flava nec violacea.* Petala (*ex icone Columnae*) *linearia emarginato-crenata.* Smith l. c.

## 893. DIANTHUS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 770.

*Cal.* cylindricus, 1-phyllus: basi squamis 4. *Petala* 5, unguiculata. *Caps.* cylindrica, 1-**locularis.**

### * *Flores aggregati.*

1. DIANTHUS *barbatus.*
**D.** floribus aggregatis fasciculatis, squamis calycinis ovato-subulatis tubum aequantibus, foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 155. *Hort. upsal.* 165. *Roy lugdb.* 444. *Sauv. monsp.* 144. *Mill. dict. n.* 7. *Hoffm. germ.* 147. *Roth. germ. I. p.* 186. *II.* 474.
Tunica barbata. *Scop. carn. n.* 502.
Caryophyllus hortensis barbatus latifolius *Bauh. pin.* 208.
Thyrsis. *Renal. spec.* 47.
*β.* Caryophyllus barbatus hortensis angustifolius. *Bauh. pin.* 209.
Armerius flos alter. *Dod. pempt.* 176.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 559.
Bart Nelke. W.
*Habitat in* Carniolia, Germania. 4 (v. v.)

2. DIANTHUS *carthusianorum.*
**D.** floribus subaggregatis, squamis calycinis ovatis aristatis tubo brevioribus, involucro oblongo aristato capitulo breviore, foliis linearibus trinerviis. W.
**D.** floribus subaggregatis, squamis calycinis aristatis tubo brevioribus, foliis linearibus trinerviis. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 299.
**D.** floribus subaggregatis, squamis calycinis ovatis aristatis tubum subaequantibus, foliis trinerviis. *Hort. upsal.* 105. *Pollich. pal. n.* 409. *Kniph. cent.* 7. *n.* 22. *Hoffm. germ.* 147. *Roth. germ. I.* 186. *II.* 475.

Tunica fasciculis trifloris ramos terminantibus, stipulis aristatis maximis. *Hall. helv. n.* 899.
Tunica carthusianorum. *Scop carn. n.* 504.
Dianthus floribus aggregatis, squamis calycinis lanceolatis, corollis crenatis. *Guett. stamp.* 284.
Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius. *Bauh. pin.* 209.
Caryophyllus arvensis, calyculo florum numeroso. *Loes. pruss.* 37. *f.* 7.
Caryophyllus montana. 1. *Tabern.* 287.
β. Caryophyllus sylvestris, flore rubro plurimo de summo caule prodeunte. *Segu. ver.* 434. *t.* 8. *f.* 2.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 560.
Feld Nelke. W.
*Habitat in* Germaniae, Italiae, Sibiriae, Helvetiae, Carnioliae, Siciliae *sterilibus apricis.* 4 (v. v.)
*Differt a D. barbato Foliis dimidio angustioribus, rigidioribus, trinerviis nec uninerviis. Caule parum scabro, nec laevissimo. Petalis distantibus, supra villosis, nec glabris. Pistillis tubo longioribus.*

*3. DIANTHUS *atrorubens.*
D. floribus aggregatis capitatis, squamis calycinis ovatis aristatis tubo brevioribus, involucro ovato aristato longitudine capituli, foliis lineari-lanceolatis enerviis. W.
D. (*atrorubens*) floribus aggregatis, squamis calycinis ovatis aristatis tubo brevioribus, foliis connatis striatis. *Allion. ped. n.* 1545. * *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 467.
Caryophyllus sylvestris, flore rubro plurimo de summo caule prodeunte. *Segu. veron.* 1. *p.* 434. *t.* 7. *f.* 2. *
Kopfförmige Nelke. W.
*Habitat in* Italiae *et* Tauriae *aridis apricis.* 4 (v. v.)
*Simillimus D. Carthusianorum, differt vero:* floribus *dense capitatis subsessilibus,* foliis *involucri ovatis aristatis longitudine floris interdum et capitulo longioribus, nec oblongis aristatis flore brevioribus,* petalis *glabris nec pilosis,* foliis *latioribus enerviis, siccatis tantum striatis, nunquam vero trinerviis, denique* caule *altiore.* W.

4. DIANTHUS *ferrugineus.*
D. floribus aggregatis, petalis bifidis: laciniis tridentatis. *Mant.* 563. *Mill. ic. t.* 81. *f.* 2.
Caryophyllus montanus umbellatus, floribus variis luteis ferrugineis italicus. *Barr. rar.* 648. *t.* 497.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 561.
Roſtfarbene Nelke. W.
*Habitat in* Aprutio Italiae. ♂

Simillimus *D. praecedenti, ſed caule angustiore; foliis magis gramineis et magis carinatis; Flores ſimiliter faſciculati calyce communi ſcarioſo. Sed differt:* 1. Squamis *his cum ariſtis longitudine corollae* (*in carthuſiano brevioribus.*) 2. Petalis *bifidis, utrinque tridentatis, ſubtus rufis, intus flavicantibus: laminis longitudinem calycis non aequantibus; at D. carthuſianorum Petala non emarginata, ſ. bifida, ſed rotundata, dentata, utrinque laete purpurea.*

## 5. DIANTHUS *Armeria.*

D. floribus aggregatis faſciculatis: ſquamis calycinis lanceolatis villoſis tubum aequantibus. *Hort. cliff* 165. *Fl. ſuec.* 345. 381. *It. gotl.* 301. *Roy. lugdb.* 443. *Sauv. monſp.* 144. *Mill. dict. n* 6. *Pollich. pal. n.* 410. *Flor. dan. t.* 230. *Hoffm. germ.* 147. *Roth. germ. I.* 187. *II.* 475.
Tunica floribus umbellatis ſquamis calycinis hirſutis mucronatis, tubum aequantibus. *Hall. helv. n.* 900.
Caryophyllus barbatus. *Seguier. t.* 7. *f.* 4.
Caryophyllus barbatus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 208.
Armeria ſylveſtris altera. *Lob. ic.* 448.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 562.
Büſchel Nelke. W.
*Habitat in ſterilibus* Gotlandiae, Germaniae, Galliae, Italiae, Helvetiae, Daniae. ⊙ (v. v.)
*Petala acuminata, uno alterove dente notata.*

## *6. DIANTHUS *japonicus.*

D. floribus aggregatis faſciculatis, ſquamis calycinis acutis ciliatis tubo brevioribus. *Thunb. jap.* 183. *t.* 23. *
Japaniſche Nelke. W.
*Habitat in* Japonia. ♃ (v. f. f. A.)
*Ab omnibus diſtinctus foliis ovatis.* W.

## 7. DIANTHUS *prolifer.*

D. floribus aggregatis capitatis, ſquamis calycinis ovatis obtuſis muticis tubum ſuperantibus. *Oed. dan. t.* 221. *Pollich. pal. n.* 411. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 135. *Mill dict. n.* 8. *Kniph. cent.* 7. *n.* 23. *Hoffm. germ.* 148. *Roth. germ. I.* 187. *II.* 476.
Tunica prolifera. *Scop. carn. n.* 503.
Dianthus floribus aggregatis, capitulo magno, ſquamis

calycinis obtusis magnis. *Hort. upsal.* 106. *Sauv. monsp.* 144.
Caryophyllus sylvestris prolifer. *Bauh. pin.* 209. *Segu. veron.* 26. *t.* 7. *f.* 1.
Caryophyllus sylvestris annuus, multis capsulis simul junctis donatus. *Morisi. hist.* 2. *p.* 563.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 562.
Sprossende Nelke. W.
*Habitat in* Germaniae *et australioris* Europae *pascuis sterilibus.* ⊙ (v. v.)
*Cum sequenti ab Hallero conjungitur.* R.

** *Flores solitarii, plures in eodem caule.*

8. DIANTHUS *diminutus.*

D. floribus solitariis: squamis calycinis octonis florem superantibus. *Leers herb. n.* 322. *Mill. dict. n.* 14. *Hoffm. germ.* 143. *Roth. germ. I.* 187. *II.* 477.
Caryophyllus sylvestris prolifer, flore singulari. *Tournef. inst.* 352. *Dillen. giess.* 148. *Reyg. ged. p.* 117.
Caryophyllo prolifero affinis, unico ex quolibet capitulo flore. *Bauh. pin.* 219.
Caryophyllus sylvestris minimus. *Tabern. hist.* 290.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 563.
Kleinblütige Nelke. W.
*Habitat in* Germania, Helvetia. ⊙ (v. s.)
Nata *D. proliferi, eique nimis affinis, an prò Specie agnoscenda?* Folia *angustiora.* Caulis *ramosus. Flores terminales simplices, nec aggregati.* Calyx *paribus* 4 *squamarum, quarum interiores per gradus majores obtusiores.* Corolla *brevissima, vix extra tubum prominens; adeoque fructificatio D. proliferi, sed non aggregata, verum simplex.*
*Est forte sola varietas praecedentis.* W.

9. DIANTHUS *Caryophyllus.*

D. floribus solitariis: squamis calycinis ovatis acutis brevissimis, petalis crenatis imberbibus. W.
D. floribus solitariis, squamis calycinis subrhombeis brevissimis, petalis crenatis imberbibus. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 299.
D. floribus solitariis: squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis crenatis. *Hort. cliff.* 164. *Hort. upsal.* 104. *Mat. med.* 117. *Roy. lugdb.* 443. *Sauv. monsp.* 143. *Mill. diot. n.* 5. *Regn. bot.*

α. Dianthus *coronarius.*
Caryophyllus hortenſis ſimplex, flore majore. *Bauh. pin.* 208. *Blackw. t.* 85.
β. Caryophyllus altilis major. *Bauh. pin.* 207.
γ. Caryophyllus maximus ruber et variegatus. *Bauh. pin.* 209.
δ. Dianthus *imbricatus.*
Caryophyllus - - - flore pleno ex ſquamis calycinis longiſſime imbricatis. *Hort cliff. l. c. Knorr. del.* 1. *t. N.* 12.
Caryophyllus ſpicam frumenti referens. *E. N. C. cent.* 3. *p.* 368. *t.* 9. *Hort. cliff.* 164. *Phil. bot.* 8.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 564.
Garten Nelke. W.
*Habitat in* Italia. 24 (v. v.)
*Varietas* δ. *maxime ſingularis eſt.*

*10. DIANTHUS *ſylveſtris.*
D. floribus ſolitariis, ſquamis calycinis breviſſimis ovatis, exterioribus acutis, interioribus obtuſiſſimis, petalis crenatis imberbibus. W.
D. (*ſylveſtris*) caulibus ſubunifloris, ſquamis calycinis ſubovatis breviſſimis, corollis crenatis, foliis anguſtiſſimis rigidis ſubulatis ſupra ſulcatis. *Wulfen in Iacq. Collect.* 1. *p.* 237. * *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 82.
Dianthus Caryophyllus ε. inodorus. *Sp. pl.* 588.
Tunica ramis uni- et bifloris, petalis laevibus, ſtipulis calycinis breviſſimis. *Hall. helv. n.* 896.
Caryophyllus ſylveſtris biflorus. *Bauh. pin.* 209. *prod.* 104.
Caryophyllus ſylveſtris flore rubro inodoro, calyce oblongo cum brevibus unguibus. *Segu. veron.* 435. *t.* 7. *f.* 3.
Wilde Nelke. W.
*Habitat in alpibus* Helvetiae, Carnioliae, Carinthiae. 24 (v. ſ.)

11. DIANTHUS *pomeridianus.*
D. floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ovatis acutis breviſſimis, tubo apice tantum ſtriato, petalis emarginatis ſubintegerrimis. *Smith Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 300.
D. floribus ſolitariis: ſquamis calycinis binis cordatis breviſſimis, corollis emarginatis ſubintegerrimis. *Sp. pl.* 1673.

Caryophyllus ſylveſtris et ſaxatilis, flore magno lacteo ſubtus ad ſpadiceum vergente. *Tournef. cor.* 23.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 565.
Orientaliſche Nelke. W.
*Habitat* Conſtantinopoli. *Forskoehl; in* Palaeſtina. *Haſſelquiſt.* 4

Herba *ſimillima D. Caryophyllo.* Radix *vix ſe multiplicans.* Caulis *ramis tribus quatuorve ſimplicibus, longis, unifloris.* Calycis *ſquamae tantum duae, breves acutae non acuminatae.* Corolla *lutea, ſubtus vireſcenti-albida.* Petala *lateribus revoluta, hinc convexa nec dilatata, ſed diſtantia, calycis tubo breviora, obtuſiſſima, parum emarginata, linea exarata.* Stamina *longitudine calycis, alba.* Piſtilla *demum excreſcunt in longitudinem corollae.* Flos *aperitur hora diei duodecima cum dimidia, clauditur noctis hora decima.*

## 12. DIANTHUS *deltoides.*

D. floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ovato-lanceolatis acutis ſubbinis, foliis obtuſiuſculis ſubpubeſcentibus, petalis crenatis. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 300.

D. floribus ſolitariis: ſquamis calycinis lanceolatis binis, corollis crenatis. *Hort. cliff.* 164. *Fl. ſuec.* 342, 382. *Sauv. monſp.* 143. *Mill. dict. n.* 1. *Pollich. pal. n.* 412. *Hoffm. germ.* 148. *Roth. germ. I.* 187. *II.* 477.

D. floribus ſubſolitariis, ſquamis calycinis tubo parum minoribus, corollis ſerratis punctatis. *Zinn. goett.* 196.

Caryophyllus minor repens noſtras. *Raj. hiſt.* 988. *Dill. elth.* 402.

Caryophyllus ſimplex ſupinus latifolius. *Bauh. pin.* 209.

Betonica coronaria ſ. Caryophyllus minor, folio viridi nigricante, repens. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 329.

β. D. (*glaucus*) floribus ſolitariis ſquamis calycinis lanceolatis quaternis brevibus, corollis crenatis. *Hort. cliff.* 164. *Hort. upſ.* 104. *Mill. dict. n.* 3. *Willich. obſ. n.* 65. *Pall. it.* 1. *p.* 193.

Tunica ramoſior, flore candido cum corona purpurea. *Dill. elth.* 400. *t.* 298. *f.* 348.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 595. 596.

Deltafleckige Nelke. W.

*Habitat in paſcuis et nemoribus* Europae. 4. (*vere*)

## *13. DIANTHUS *albens*.

D. floribus solitariis, squamis calycinis lanceolatis quaternis brevibus, corollis emarginatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 90.

D. (*incurvus*) floribus solitariis, squamis calycinis quaternis ovatis brevissimis, petalis integris. *Thunb. prod.* 81.

Weifsliche Nelke. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 24 (v. s.)

Petala *supra alba, subtus ex viridi albentia, apice utrinque violacea. Differt a D. deltoide* β. petalis *vix crenatis et absentia circuli purpurei.* Ait. l. c.

## *14. DIANTHUS *crenatus*.

D. floribus solitariis, squamis calycinis senis lanceolatis, corollis crenatis. *Thunb. prod.* 81.

Gekerbte Nelke. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 24

## 15. DIANTHUS *chinensis*.

D. floribus solitariis, squamis calycinis subulatis patulis foliaceis tubum aequantibus, petalis crenatis, foliis lanceolatis. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 300.

D. floribus solitariis: squamis calycinis subulatis patulis tubum aequantibus, corollis crenatis. *Hort. cliff.* 164. *Hort. upsal.* 104. * *Roy. lugdb.* 443. *Mill. dict. n.* 10.

Caryophyllus sinensis supinus, leucoii folio, flore unico. *Tournef. act.* 1705. *p.* 348. *f.* 5. *Mill. ic.* 81. *f.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 567.

Chinesische Nelke. W.

*Habitat in* China. ⊙

## 16. DIANTHUS *monspeliacus*.

D. floribus solitariis, squamis calycinis subulatis rectis tubo parum brevioribus, corollis multifidis caule erecto. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 300.

D. floribus solitariis, squamis calycinis subulatis longitudine tubi, corollis multifidis, caule erecto. *Syst. nat.* 13. *p.* 308.

D. floribus solitariis: squamis calycinis subulatis tubum aequantibus, petalis multifidis. *Amoen. acad.* 4. *p.* 313. * *Sp pl.* 2. *p.* 588.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 567.

Französische Nelke. W.

*Habitat* Monspelii, Veronae. 24

*17. DIANTHUS *libanotis.*

D. floribus subsolitariis, squamis calycinis senis lanceolatis patulis tubo brevioribus, petalis multifidis barbatis, foliis lanceolatis, caule erecto. W.

D. floribus subaggregatis, squamis calycinis senis acuminatis recurvis, corollis multifido-capillaribus fauce barbatis, caule erecto. *Billard. pl. syriae* 1. *p.* 14. *t.* 5.*

Libanons Nelke. W.

*Habitat in altis montibus* Libani. 4

18. DIANTHUS *plumarius.*

D. floribus solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis obtusissimis muticis, corollis multifidis. *Smith Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 300.

D. floribus solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis multifidis fauce pubescentibus. *Mill. dict. n.* 4. *Gmel. sib.* 4. *p.* 135. *Weig. rug. n.* 278. *Scop. carn. n.* 505. *Hoffm. germ.* 148. *Roth. germ. I.* 187. *II.* 478.

Tunica foliis glaucis patentibus, floribus serratis, faucibus lanuginosis. *Hall. helv. n.* 897.

D. floribus solitariis, petalis multifidis, basi canaliculatis. *Hort. upsal.* 105.* *Sauv. monsp.* 143.

D. floribus solitariis, corollis lacero-partitis, squamis calycinis ovatis acutis. *Fl. suec.* 344.

D. petalis multifidis. *Fl. lapp.* 170. *Hort. cliff.* 174. *Roy. lugdb.* 443.

Caryophyllus sylvestris flore laciniato sine corniculis odoro. *Bauh. pin.* 210.

Caryophyllus barbatus angustifolius. *Seguier. t.* 8? *Hall.* R.

Caryophyllus sylvestris, floribus lanuginosis hirsutis. *Bauh. pin.* 210.

Caryophyllus sylvestris V. species alia, *Clus. hist.* 1. *p.* 284.

*Houttuyn Lin. Pst. Syst.* 6. *p.* 568.

Feder Nelke. W.

*Habitat in* Europae *et* Canadae *pascuis nemorosis.* 4 (v. v.)

Folia *rore caesio glauca.*

*19. DIANTHUS *crinitus.*

D. floribus solitariis, squamis calycinis ovalibus mucronatis subdivergentibus tubo triplo brevioribus, petalis

multifidis imberbibus. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 300.
Caryophyllus orientalis minimus tenuiſſime laciniatus, flore purpureo. *Tournef. cor.* 23.
Haarförmige Nelke. W.
*Habitat in* Oriente. W.
*Variat flore albo.* Tournefort.

Caules *ſpithamaei laeves.* Folia *linearia anguſtiſſima breviſſima obtuſiuſcula laevia.* Flores *duo vel quatuor in caule erecti.* Calyx *tubo gracili ſtriato, dentibus lanceolatis rectis acutiſſimis, ſquamis ad baſin quatuor exacte ovalibus, dorſo ſtriatis, mucrone brevi patente.* Petala *anguſta, limbo ad baſin usque irregulariter multifido-capillaceo, imberbi.* Smith. l. c.

## 20. DIANTHUS *ſuperbus.*

D. floribus ſolitariis paniculatis, ſquamis calycinis breviſſimis acuminatis, petalis multifido-capillaribus, caule erecto. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 301.
D. floribus paniculatis, ſquamis calycinis brevibus acuminatis, corollis multifido-capillaribus, caule erecto. *Amoen. acad.* 4. *p.* 272. * *Fl. ſuec.* 2. *p.* 383. *Iacq. obſ.* 1. *p.* 40. *t.* 25. *Oed. dan. t.* 578. *Mill. dict. n.* 13. *Pall. it.* 2. *p.* 569. *Pollich. pal. n.* 413. *Hoffm. germ.* 148. *Kniph. cent.* 11. *n.* 39. *Roth. germ. I.* 188. *II.* 478.
Tunica petalis minutiſſime laciniatis. *Hall. helv. n.* 898.
Tunica montana altiſſima, flore tenuiſſime laciniato. *Rupp. jen.* 2. *p.* 118.
Caryophyllus ſimplex alter, flore laciniato odoratiſſimo. *Bauh. pin.* 210.
Caryophyllus ſylveſtris VI. *Cluſ. hiſt.* 284.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 569.
Stolze Nelke. W.
*Habitat in* Gallia, Germania, Dania. ♂ (v. v.)
Flores *fragrantiſſimi, imprimis nocte.*

## *21. DIANTHUS *attenuatus.*

D. floribus ſolitariis, ſquamis calycinis brevibus lanceolatis acuminatis ſubſenis, tubo apice attenuato, petalis crenatis. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 301.
Verdünnte Nelke. W.
*Habitat in maritimis* Galliae *meridionalis.* 4
Caules *diffuſi baſi lignoſi tortuoſi ramoſiſſimi, rami floriferi adſcendentes pedales folioſi teretes glabri, apice in ramulis* 2 *vel* 3 *diviſi, uniflori.* Folia *ſubula-*

*ta mucronato-pungentia glauca margine ſcabra, caulina internodiis breviora.* Flores *carnei inodori.* Calyx *ſquamis ſex ad baſin, quarum interiores ſaepe margine membranaceae, tubo ſtriato, apicem verſus ſenſim attenuato, dentibus erectis margine membranaceis.* Corolla *parva crenata imberbis.* Smith. l. c.

22. DIANTHUS *pungens.*

D. floribus ſolitariis, caulibus paucifloris, ſquamis calycinis breviſſimis mucronatis patentibus, tubo gibbo, petalis integris. *Smith. Act. Soc. Linn. Lond.* 2. *p.* 301.

D. caule ſuffruticoſo, foliis lineari-ſubulatis, petalis integris. *Mant.* 240.

D. maritimus, foliis pungentibus. *Du Cheſne mſs.*

β. D. (*hiſpanicus*) caule ſubumbifloro, ſquamis calycinis ovatis, petalis linearibus integerrimis. *Aſſo ſynop. n.* 371. *t.* 3.

*Houttuyn Lin. Pfl.* Syſt. 6. *p.* 573.

Stechende Nelke. W.

*Habitat in* Hiſpaniae *maritimis.* 4 (v. v.)

Caules *ſuffruticoſi alternatim denſe ramoſi.* Folia caulina *baſi connato-vaginantia conferta, vaginis tegentia ramulos*; ramea *leviter connexa, vaginis diſtantibus*: omnia *linearia planiuſcula anguſta acuminata ſubpungentia.* Pedunculi *ex apice ramulorum lateralium, pedicellis* 1-3 *floris.* Calycis *ſquamae* 4 *lanceolatae, calyce paulo breviores.* Petala *integerrima: laminis longitudine unguium.*

23. DIANTHUS *virgineus.*

D. floribus ſolitariis, caulibus paucifloris, ſquamis calycinis breviſſimis obtuſiſſimis binis, petalis crenatis. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 302.

D. caule ſubumbifloro, corollis crenatis, ſquamis calycinis breviſſimis, foliis ſubulatis. *Sp. pl.* 590. *Mill. dict. n.* 2. *Pall. itin.* 1. *p.* 43. *Iacq. auſt.* 5. *p.* 34. *tab. app.* 15.

D. (*rupeſtris*) floribus ſolitariis, ſquamis calycinis obtuſiſſimis binis, petalis crenatis. *Lin. ſuppl.* 240.

Caryophyllus ſylveſtris repens multiflorus. *Bauh. pin.* 209. *Burſer XI.* 99.

Armerius flos tertius. *Dod. pempt.* 176.

*Houttuyn Lin Pfl. Syſt.* 6. *p.* 591.

Jungfern Nelke. W.

*Habitat* Monſpelii, *inque* Auſtria, Sibiria. 2 (v. f.)

Radix *perennis*. Folia *radicalia copioſa erecta, in ceſpitem imbricata acuminata, facie Statices ferme.* Caules *aliquot ſpithamaei, 4 articulis ſimpliciſſimis conſtantes, foliis minoribus et ſummis minimis ex vagina perfoliata ortis.* Calycis *ſquamae latae ovatae acutae breviſſimae, paribus remotis.* Corollae *limbus dimidio brevior tubo calycis, rotundatus crenatus.* Flos *unicus in caule, interdum et alter ex ala folii ſupremi.* Folia *linearia anguſtiſſima triquetra canaliculata rigidula, in ceſpitem comata, margine carinaque ſcabra.* Caulis *filiformis proſtratus uni-ſ. biflorus.* Flores *remoti odori.* Calyci *ſquamae tantum duae orbiculatae appreſſae.* Petala *ſanguinea crenata, nec plumoſa aut villoſa.* Styli *duo exſerti recurvati.* Lin. ſuppl.

* * * Caule *unifloro herbaceo.*

24. DIANTHUS *arenarius.*

D. caulibus ſubunifloris: ſquamis calycinis ovatis obtuſis, corollis multifidis, foliis linearibus. *It. gotl.* 318. *Fl. ſuec.* 343, 384. * *Mill. dict. n.* 11. *Grim. iſen. in Nov. Act. A. M. C. vol.* 3. *app. p.* 312. *Hoffm. germ.* 148. *Roth germ. I.* 188 *II.* 479.

D. caule ſimplici unifloro. *Monnier. obſ.* 152.

D. foliis brevibus, ſquamis muticis, caule unifloro. *Sau. meth.* 143.

Tunica arenaria. *Scop. carn. n.* 508.

Caryophyllus ſylveſtris. 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 282. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 596.

Sand Nelke. W.

*Habitat in* Europae *frigidioris arena mobili.* 2 (v. f.)

*Affinitatem hujus ſummam cum D. plumario docet* Petalorum *faux*; Petala *magis oblonga, diviſa et lacera ultra medium diſci (illi vero tantum multifida) baſi macula livida acuta, pilis purpuraſcentibus adſperſa.*

*25. DIANTHUS *repens.* W.

D. caule unifloro, ſquamis calycinis binis ovatis acuminatis patulis longitudine fere tubi, petalis dentatis, radice repente. W.

Kriechende Nelke. W.

*Habitat in* Sibiria. 2 (v. f.)

Radix *filiformis horizontalis repens per intervalla ſemiuncialia faſciculos foliorum et caules emittens.* Fo-

lia *linearia margine ſcabra ut in reliquis ſpeciebus.* Flos *in caule digitali ſimpliciſſimo unicus terminalis.* Calyx *brevis ſtriatus, baſi ſquamis binis ovatis acuminatis, longitudine fere tubi calycini, apice patulis, munitus.* Petala *calyce duplo longiora, longe unguiculata, dentata glabra.* W.

*26. DIANTHUS *caeſius.*

D. caulibus ſubunifloris, ſquamis calycinis ſubrotundis brevibus, petalis crenatis pubeſcentibus, foliis margine ſcabris. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 302. *Sowerb. bot. angl. t.* 62.

Dianthus glaucus. *Hudſ. angl.* 185.

Tunica rupeſtris, folio caeſio molli, flore carneo. *Dill. elth.* 401. *t.* 298. *t.* 385.

Armeriae ſpecies flore in ſummo caule ſingulari. *Raj. ſynop.* 336.

Graublättrige Nelke. W.

*Habitat in montoſis* Angliae, Helvetiae. 4

Radix *lignoſa.* Caules *plures ſpithamaei erecti ſimplices glabri quadranguli, conjugationibus foliorum duabus vel tribus, uniflori vix unquam biflori.* Folia *lineari-lanceolata obtuſiuſcula glauca margine ſcabra.* Calycis *ſquamae tubo triplo breviores ovato-ſubrotundae obtuſe mucronatae ſtriatae.* Petala *carnea obtuſe duplicato-crenata, baſi lineata atque barbata.* Smith l. c.

*27. DIANTHUS *ceſpitoſus.*

D. caulibus unifloris, corollis integris, calycinis ſquamis quatuor lanceolatis, foliis trigonis. *Thunb. prod.* 81.

Raſen Nelke. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

*28. DIANTHUS *ſcaber.*

D. caulibus unifloris, ſquamis calycinis quaternis lanceolatis, petalis crenatis. *Thunb. prod.* 81.

Scharfe Nelke. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

29. DIANTHUS *alpinus.*

D. caule unifloro, petalis crenatis, ſquamis calycinis exterioribus foliaceis tubum ſubaequantibus. *Smith. Act. Soc. Linn. Lond.* 2. *p.* 302.

D. caule unifloro, corollis crenatis: ſquamis calycinis exterioribus tubum aequantibus, foliis linearibus obtu-

fis. *Mill. dict. n.* 12. *Iacq. auſtr. t.* 52. *Pall. it.* 3. *p.* 34.
Caryophyllus pumilus latifolius. *Bauh. pin.* 209. *prodr.* 104. *Burſ. XI.* 95.
Caryophyllus ſylveſtris, flore magno inodoro hirſuto. *Bauh. pin.* 209.
Caryophyllus ſylveſtris 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 283. *f.* 1. *bon.*
ß. D. (*glacialis*) floribus ſolitariis ſubacaulibus, ſquamis calycinis elongatis acuminatis tubum ſuperantibus, foliis linearibus flore longioribus. *Haenke in Iacq. Collect.* 2. *p.* 84. *
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 570.
Alpen Nelke. W.
*Habitat in* Stiria, Auſtria, Sibiria. 4 (v. f.)
Radix *lignoſa, exſerens caules plures.* Caulis *longitudine digiti, articulis tribus conſtans.* Folia *caulis linearia, obtuſiuſcula, plana, obtuſa, vel verſus terram, ubi ceſpites conſtituunt, lanceolato-linearia.* Calycis *ſquamae exteriores longitudine tubi calycis: interiores dimidio breviores.* Corolla *magna.* Petala *calycis longitudine, rotunda, dentibus breviſſimis numeroſis crenata, fauce parum villoſa.*

## *50. DIANTHUS *pumilus.*

D. acaulis, foliis linearibus. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 32. *
D. (*uniflorus*) ſcapo breviſſimo unifloro, foliis linearibus. *Forſk. cat. pl. arab. p.* 111. *n.* 284.
Niedrige Nelke. W.
*Habitat in* Arabia *felici.* 4
Planta *caeſpitoſa.* Folia *ad terram congeſta linearia acuta plabra ſemipollicaria.* Scapus *ſubnullus.* Flores *ſeſſiles ſolitarii.* Calyx *longitudine foliorum glaber ſtriatus, ſquamis* 6 *oblongis acuminatis flore brevioribus, exterioribus minoribus.* Petala *dentata.* Vahl. l. c.

### **** *Fruteſcentes.*

## 31. DIANTHUS *arboreus.*

D. caule fruticoſo, foliis oblongis ſubcarnoſis, ſquamis calycinis numeroſis obtuſis arcte imbricatis-breviſſimis. *Smith Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 303.
D. caule fruticoſo, foliis ſubulatis, petalis ſerratis. *Sp. pl.* 590.
Caryophyllus arboreſcens creticus, *Bauh. pin.* 208. *prodr.* 104.

Betonica coronaria arborea cretica. *Bauh. hist.* 3. *p.* 328.

ß. D. (*fruticosus*) caule fruticoso, foliis lanceolatis. *Sp. pl.* 591.

Caryophyllus graecus arboreus, leucoii folio peramaro. *Tournef. cor.* 23. *itin.* 1. *p.* 183. *t.* 9.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 572.

Baumartige Nelke. W.

*Habitat in* Creta, Graecia. ♄ (v. f.)

*32. DIANTHUS *juniperinus.*

D. caule fruticoso, foliis subulatis, squamis calycinis subquaternis obovatis mucronato-pungentibus patulis tubo duplo brevioribus. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 303.

Caryophyllus creticus arboreus, juniperi folio. *Tournef. cor.* 23.

Caryophyllus sylvestris arboreus. *Alp. exot.* 39. *t.* 38?

Wachholderblättrige Nelke. W.

*Habitat in* Creta. ♄ (v. f.)

Caulis *fruticosus, cortice rimoso lacero, ramosissimus.* Ramuli *apice dense folioso, floriferi elongati, cum oppositionibus* 2 *vel* 3 *tantum foliorum, internodiis multo breviorum; teretes glabri.* Folia *subulata angustissima, mucronato-pungentia canaliculata, margine laevi.* Flores *bini vel terni in apicibus ramulorum pedicellati parvi.* Calycis *squamae obovatae obtusae, vix striatae, margine apiceque membranaceae, mucrone pungenti divaricato brevi terminatae, tubo duplo breviores; tubus striatus dentibus acutis, haud membranaceis.* Petala *crenata et incisa.* Styli *exserti capillares.* Smith. l. c.

# *TRIGYNIA.*

## 894. CUCUBALUS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 771.

*Cal.* inflatus. *Petala* 5, unguiculata, absque corona ad faucem. *Capf.* 3-locularis.

1. CUCUBALUS *Behen.*

C. calycibus subglobosis glabris reticulato-venosis, capsulis trilocularibus, corollis subnudis. *Fl. suec.* 360, 385.

*Mill. dict n.* 4. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 136. *Pollich. pal. n.* 415. *Leers herb. n.* 333. *Gunn. norv. n.* 8. *Hoffm. germ.* 149. *Kniph. cent.* 12. *n.* 36. *Roth. germ. I.* 191. *II.* 491.

C. floribus trigynis, calycibus glabris, capſulis trilocularibus. *Hort. cliff.* 176. *Roy. lugdb.* 448.

C. calycibus ovatis hermaphroditis. *Fl. lapp.* 180.

Viſcago caule brachiato, nodoſo, calycibus inflatis venoſis. *Hall. helv. n.* 913.

Lychnis floribus trigynis pendulis; calycibus ovatis, inflatis, venoſis; capſula ſemitriloculari. *Scop. carn. ed.* 1. *p.* 502. *n.* 4. *ed.* 2. *n.* 514.

Lychnis ſylveſtris, quae Behen album vulgo. *Bauh. pin.* 205. *Knorr. del.* 2. *t. L.* 4. *Blakw. t.* 268.

Papaver ſpumeum. *Lob. ic.* 340.

Herba articularis. *Tabernaem.* 298. R.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 575.

Aufgeblaſener Taubenkropf. W.

*Habitat in* Europae *ſeptentrionalis pratis ſiccis.* 4 (v. v.)

*Varietas* Feminea *in Hortoupſalienſi frequens. Haec hermaphrodito minor.* Calyces *exacte ovati, magis obſcuri, nec oblongo-ovati.* Corolla *minor.* Stamina *corolla dimidio breviora terminata tuberculo absque antheris.* Styli 3. *ſ.* 5. *corolla longiores, declinati.* Planta *utraque fertilis.*

Calyces *venis nonnunquam deſtituti tuncque fere albi.* *Gmel.* Capſula *ſexfariam apice dehiſcit.* Leers l. c.

## 2. CUCUBALUS *fabarius.*

C. foliis obovatis carnoſis. *Roy. lugdb.* 448. *Mill. dict. n.* 5.

Lychnis maritima ſaxatilis, folio anacampſerotis. *Tournef. cor.* 24. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 214.

Behen album ſ. Polemonium ſaxatile, fabariae folio, ſiculum. *Bocc. muſ.* 133. *t.* 92.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 576.

Dickblättriger Taubenkropf. W.

*Habitat in* Sicilia. 4

## 3. CUCUBALUS *viſcoſus.*

C. floribus lateralibus undique decumbentibus, caule indiviſo, foliis baſi reflexis. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 386. * *Scop. carn. n.* 518. *Hoffm. germ.* 150.

C. foliis amplexicaulibus, floribus verticillatis, pedunculis erectis. *Roy. lugdb.* 448?
Lychnis montana viscosa noctiflora hirsuta latifolia alba, floribus absque appendicibus. *Till. pis.* 105.
Lychnis orientalis maxima, buglossi folio undulato. *Tournef. cor.* 24. *itin.* 2. *p.* 361. *t.* 361.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 577.
Klebriger Taubenkropf. W.
*Habitat in* Suecia, Italia, Anglia, Ararat, Carniolia.
♂ (v. s.)

4. CUCUBALUS *stellatus.*

C. foliis quaternis. *Hort. upsal.* 110. *Mill. dict. n.* 7.
Drypis foliis quaternis. *Cold. noveb.* 106.
Silene foliis quaternis. *Gron. virg.* 50.
Lychnis caryophyllaeus virginianus, gentianae foliis glabris quatuor ex singulis geniculis caulem amplexantibus, flore amplo fimbriato. *Raj. hist.* 1895.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 578.
Sternblättriger Taubenkropf. W.
*Habitat in* Virginia, Canada. 4 (v. s.)
Petala, *absque corona, quadrifida, lobis bipartitis.*

5. CUCUBALUS *aegyptiacus.*

C. floribus erectis, petalis emarginatis retroflexis: utrinque denticulo notatis. *Mant.* 385. *Hasselq.*
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 579.
Aegyptischer Taubenkropf. W.
*Habitat in* Aegypto.
Caulis *debilis, ramosus, ad terram sparsus.* Folia *linearia (non glabra:) juniora basi ciliata.* Flores *axillares, solitarii, sessiles.* Calyx *cylindricus: in fructu obovatus,* 10-*gonus interstitiis membranaceis, dentibus parvis.* Petala *minuta, vix calyce longiora.* Styli *saepe* 4. *Latourelle.*

6. CUCUBALUS *italicus.*

C. petalis semibifidis, calycibus clavatis, panicula dichotoma erecta, genitalibus déclinatis, caule erecto. *Iacq. obs.* 4. *p.* 12. *t.* 79.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 579.
Italiänischer Taubenkropf. W.
*Habitat in* Italia. ♂ (v. v.)
Folia *lanceolata, obtusiuscula, secunda.* Caulis *praesertim inferne, tomento vix conspicuo incanus.* Panicula *dichotoma, floribus pedunculatis, erectis.* Ca-

lyces *erecti*, *clavati*, *exarati ſulcis decem.* Petala *ſemibifida*, *latiuſcula*, *alba*, *ſubtus plumbea.* Stamina *alba.*

*7. CUCUBALUS *multiflorus.*

C. petalis bifidis, caule ſimpliciſſimo, corymbis multifloris oppoſitis, calycibus clavatis ſtriatis, foliis ſcabris, caulinis linearibus, radicalibus ſpathulatis. W.

C. (*multiflorus*) foliis ſcabris, radicalibus ſubſpathulatis, panicula elongata contracta ſtricta, floribus hermaphroditis, calyce clavato, deorſum pubeſcente, pedunculo longiore, petalis bifidis, capſula longitudine thecapodii. *Ehrh. Beitr.* 7. *p.* 142.

Vielblütiger Taubenkropf. W.

*Habitat in* Hungaria. ♂ (v. v.)

Caulis *apex refert paniculam ſtrictam verticillatam, e corymbis compoſitam. In planta ſpontanea corymbi ſunt pauciflori.* Calyx *eſt ſcaber.* Capſula *globoſa longiſſime pedicellata, pedicello longitudine capſulae.* W.

*8. CUCUBALUS *fruticuloſus.*

C. petalis bifidis revolutis, pedunculis alternis unifloris, foliis lineari-lanceolatis, caule fruteſcente. W.

Cucubalus fruticuloſus. *Pall. itin.* 2. *app. n.* 110. *tab. T.**

Strauchartiger Taubenkropf. W.

*Habitat in montibus* Altaicis Sibiriae. ♄

9. CUCUBALUS *tataricus.*

C. petalis bipartitis, floribus ſecundis decumbentibus, pedunculis oppoſitis ſolitariis erectis, caule ſimpliciſſimo. *Hort. upſ.* 111. * *Gort. ingr.* 68. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 139.

Lychnis ſeptentrionalium, foliis byſſopi, floribus uno verſu poſitis albis. *Hall. goett.* 33. *

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 579.

Tatariſcher Taubenkropf. W.

*Habitat in* Tartaria, Ruſſia. ♃ (v. v.)

10. CUCUBALUS *ſibiricus.*

C. petalis emarginatis, floribus ſubverticillatis: verticillis umbellatis aphyllis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 140. *n.* 34.

Viſcago foliis imis petiolatis ovatis, floribus paniculatis, petalis emarginatis. *Hall. goett.* 1. *p.* 150. *fig. bona.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 580.

Sibiriſcher Taubenkropf. W.

*Habitat in defertis* Tacorow; *inter* Woroniz *et* Bielgrod. 24 (v. f.)
*Stamina flore longiora.*

11. CUCUBALUS *catholicus.*

C. petalis bipartitis, floribus paniculatis, ftaminibus longis, foliis lanceolato-ovatis. *Hort. upf* 111.*
C. (*glutinofus*) petalis bipartitis, calycibus clavatis, panicula dichotoma patentiffima, genitalibus rectis. *Retz. obf.* 2. *p.* 18?
Silene foliis ovatis utrinque acutis, caule paniculato, floribus nutantibus tenuiffimis. *Roy. lugdb.* 447.
Lychnis viffofa altiffima, flore muffofo, ocymaftri facie. *Cupan. cath.* 110.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syft.* 6. *p.* 581.
Sicilianifcher Taubenkropf. W.
*Habitat in* Italia, Sicilia. 24 (v. f.)
*Calyces fufci, nitidi.*
*Cucubalus glutinofus Retzii parum ab hoc differre videtur.* W.

12. CUCUBALUS *molliffimus.*

C. petalis femibifidis, panicula dichotoma, caule foliisque holofericeis: radicalibus fpatulatis. *Sp. pl.* 593.
Lychnis maritima pulverulenta, folio carnofo. *Tournef. inft.* 338.
Lychnis erecta, veronicae foliis. *Bocc. muf.* 170. *t.* 118?
*Houttuyn Lin. Pfl. Syft.* 6. *p.* 581.
Weichblättriger Taubenkropf. W.
*Habitat in* Italiae *maritimis.* 24
Panicula *viffcida ramulis trifloris.* Flores *erecti, albi.* Ungues *corollae calyce longiores.*

13. CUCUBALUS *Otites.*

C. petalis linearibus indivifis undulatis glabris, floribus dioicis, pedunculis glabris, caule paniculato. W.
C. floribus dioicis, petalis linearibus indivifis. *Hort. cliff.* 272. *Roy. lugdb.* 445. *Gmel fib.* 4. *p.* 141. *Mill. dict. n.* 9. *Scholl. barb. n.* 346. *Oed dan. t.* 518. *Knipb. cent.* 12. *n.* 37. *Hoffm. germ.* 150. *Roth. germ. I.* 192. *II.* 492.
C. (*Otites*) foliis fubfpathulatis fcabris, caule paniculato, pedicellis umbellatis glabris calyce longioribus, floribus dioicis, petalis linearibus indivifis undulatis nudis. *Ehrh. Beitr.* 7. *p.* 142. *

Viſcago floribus verticillatis, ſpicatis, ſexu diſtinctis, petalis linearibus, *Hall. helv. n.* 920.
Lychnis Otites. *Scop. carn. n.* 515.
Lychnis viſcoſa, flore muſcoſo. *Bauh. pin.* 206.
Lychnis ſylveſtris ſeſamoides minor, flore muſcoſo. *Mentz. pug. t.* 3. *f.* 2.
Seſamoides magnum ſalmanticum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 295. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 582.
Acker Taubenkropf. W.
*Habitat in* Germania, Valleſia, Anglia, Helvetia, Gallia, Sibiria. 24 (v. v.)
*Mas.* Flore *majore, calyce ſubrubro. Otites Lychnitis, ſylveſtris genus. Tabern.* 820.
*Femina.* Flore *minori, calyce viridi. Lob. adverſ.* 370. *ic.* 453.
Hermaphroditam *plantam legit* Scholler *eamque ex Tataria habuit.* Haller. R.

*14. CUCUBALUS *parviflorus.*
C. petalis linearibus indiviſis planis ciliatis, floribus dioicis, pedunculis pubeſcentibus, caule paniculato. W.
C. (*parviflorus*) foliis lanceolatis ſcabris, caule paniculato, pedicellis umbellatis pubeſcentibus calyce longioribus, floribus dioicis, petalis linearibus indiviſis planis ciliatis. *Ehrh. Beitr.* 7. *p.* 143.
Kleinblütiger Taubenkropf. W.
*Habitat in* Hungaria. 24 (v. v.)
*Simillimus praecedenti, tamen characteribus indicatis conſtanter diverſus.* W.

15. CUCUBALUS *reflexus.*
C. floribus ſpicatis alternis ſecundis ſubſeſſilibus, petalis ſubbipartitis obſoletis. *Sp. pl.* 594.
Silene floribus ſpicatis alternis ſecundis ſubſeſſilibus, corollis obſoletis nudis. *Hort. upſ.* 112.
Lychnis ſylveſtris alba, ſpica reflexa. *Magn. monſp.* 171. *t.* 170.
Lychnis meridionalium annua hirſuta, floribus uno verſu diſpoſitis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 544. *Raj. hiſt.* 996. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6 *p.* 583.
Zurückgebogener Taubenkropf. W.
*Habitat* Monſpelii. 24
*Confer.* Silene mutabilis, *cujus an ſola varietas?*

16. CUCUBALUS *Saxifragus.*
C. petalis bifidis, calycibus ſtriatis, terminalibus ſubſeſ-

filibus; lateralibus pedunculatis. *Mant.* 71. *Schreb. dec.* 9. *t.* 5.

Lychnis orientalis minima, caryophylli folio, calyce purpurascente striato. *Tournef. cor.* 24.

*Houttuyn Lin. Pfl.* Syst. 6. *p.* 584.

Steinbrechartiger Taubenkropf. W.

*Habitat in* Oriente. 4 (v. s.)

Caulis palmaris, *foliolis linearibus.* Flos *terminalis, sessilis.* Flores *laterales oppositi, pedunculati.* Calyx *omnis inter duo foliola sessilis, e quorum alis saepe novi petioli prodeunt, ideoque non squamis* 2 *more Dianthi.*

*17. CUCUBALUS *spergulifolius.* W.

C. petalis bifidis, calycibus inflatis striatis glandulososcabris, panicula secunda, foliis linearibus verticillatis. W.

Lychnis orientalis caryophylli holostei folio. *Tournef. cor.* 24.

Sparkblättriger Taubenkropf. W.

*Habitat in* Armenia. 4 (v. s.)

Caulis *fere sexuncialis teres nodosus pubescens.* Folia *verticillata linearia villoso-mucronata, mucrone obtuso, margine scabra, basi ciliata.* Panicula *terminalis secunda.* Calyces *ovati inflati striati angulati pubescentes glandulis breve pedicellatis scabri.* Petala *bifida alba, ut in sicco specimine videtur non coronata. A Silene polyphylla abunde distinctus.* W.

*18. CUCUBALUS *polygonoides.* W.

C. petalis emarginatis, calyce cylindraceo pentagono piloso, floribus capitatis, foliis ellipticis utrinque acutis. W.

Lychnis graeca pumila umbellifera, polygoni folio, flore albo cum circulo purpureo. *Tournef. cor.* 24.

Knötrigartiger Taubenkropf. W.

*Habitat in insula* Naxo. 4 (v. s.)

Radix *crassa ratione plantae.* Caules *decumbentes ramosi.* Rami *sesquiunciales erecti teretes hirti.* Folia *utrinque piloso-hirta, inferiora lanceolata, reliqua elliptica, magnitudine Serpilli sed angustiora, utrinque attenuata acuta.* Flores *in ramorum apice sessiles capitati.* Capitula 3-*ad sexflora.* Calyx *hirsutus cylindraceus quinquangularis.* Petala *emarginata. Nul-*

*lam coronam ad petalorum baſin in ſicco ſpecimine obſervavi.* W.

## 895. SILENE.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 772.

*Cal.* ventricoſus. *Petala* 5, unguiculata, coronata ad faucem. *Capſ.* 3-locularis.

* *Floribus ſolitariis lateralibus.*

### 1. SILENE *anglica.*

S. hirſuta, petalis integerrimis, floribus erectis, fructibus reflexis pedunculatis alternis. *Hort. upſ.* 113. *Kniph. cent.* 8. *n.* 87.

Viſcago ceraſtii foliis, vaſculis pendulis anglica. *Dill. elth.* 417. *t.* 309. *f.* 398.

Lychnis ſylveſtris hirſuta annua, flore minore albo. *Vaill. pariſ.* 121. *t.* 16. *f.* 12.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 585.

Engliſche Silene. W.

*Habitat in* Anglia, Gallia. ⊙

Petala *in hac non crenata, in ſequente et emarginata et crenata.* Folia *inferiora obovato-lanceolata verſus baſin ciliata.* Calyces *non piloſi, ſed angulis muricatis: aculeis reflexis vix conſpicuis.*

### 2. SILENE *luſitanica.*

S. hirſuta, petalis dentatis indiviſis, floribus erectis, fructibus divaricato-reflexis alternis. *Hort. upſ.* 113. *Hort. cliff.* 172.

S. floribus alternis, petalorum limbis integris crenatis. *Hort. cliff.* 172.

Viſcago hirſuta luſitánica, ſtellato flore. *Dill. elth.* 420. *t.* 311. *f.* 401.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 586.

Portugiſiſche Silene. W.

*Habitat in* Luſitania. ⊙ (v. v.)

Calyces *fructus horizontaliter reflexi, valde piloſi.* Corolla *indiviſa, crenata, incarnata.*

### 3. SILENE *quinquevulnera.*

S. petalis integerrimis ſubrotundis, fructibus erectis alternis. *Hort. cliff.* 171. *Hort. upſ.* 113. *Roy. lugdb.* 446. *Mill. dict. n.* 1. *Hoffm. germ.* 151.

S. ſpica incurva uno verſu florida, foliis imis ſpathulatis. *Sauv. monſp.* 146.
Lychnis vulnerata. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 524.
Lychnis ſylveſtris lanuginoſa minor. *Bauh. pin.* 206.
Lychnis hirſuta, flore eleganter variegato. *Raj. hiſt.* 997.
Lychnis hirſuta minor, flore variegato. *Dod. mem.* 4. *p.* 291.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 586.
Fünffleckige Silene. W.
*Habitat in* Hiſpania, Luſatia, Italia, Gallia, Sibiria, Carniolia. ⊙ (v. v.)
Calyces *fructus erecti; piloſi, viſcidi.* Petala *obtuſa, vix emarginata, integerrima, purpurea margine pallido.*

*4. SILENE *ciliata.* W.
S. petalis bipartitis obtuſis, calycibus clavatis pubeſcentibus apice ciliatis alternis erectis. W.
Lychnis parvo flore calyce ſtriato purpuraſcente. *Tournef. cor.* 24.
Gefranzte Silene. W.
*Habitat in* Creta. (v. ſ.)
Radix *ſimplex perpendicularis filiformis.* Caules *ſubramoſi plures e radice adſcendentes digitales teretes pubeſcentes.* Folia *radicalia ſubrotundo-ſpathulata pubeſcentia.* Folia *caulina oblonga acuta pubeſcentia.* Flores *erecti axillares alterni breviſſime pedunculati.* Calyx *pubeſcens clavatus decemſtriatus, dentibus margine ciliato-piloſis.* Petala *calyce majora profunde bipartita, laciniis obovatis.* Corona *bipartita.* Capſula *elliptica pedicellata.* Flos *major praecedente.* W.

*5. SILENE *ſericea.*
S. petalis bifidis, floribus oppoſitis pedunculatis erectis, foliis oblongo-ſpathulatis ſericeo-incanis. W.
S. (*ſericea*) foliis acuminatis ſuccolentis hirſutis lucidis, flore carneo. *Allion. pedem. n.* 1573. *t.* 79. *f.* 3.
Seidenartige Silene. W.
*Habitat in maritimis ſabuloſis agri* Pedemontani. ⊙

6. SILENE *nocturna.*
S. floribus ſpicatis alternis ſecundis ſeſſilibus, petalis bifidis. *Mill. dict. n.* 2.
S. foliis lanceolatis, caule ramoſo et floribus ſecundis erectis, calycibus hirſutis. *Roy. lugdb.* 447.
Viſcago hirta noctiflora, floribus obſoletis ſpicatis. *Dill. elth.* 420. *t.* 310. *f.* 400.

Lychnis ſylveſtris hirſuta elàtior ſpicata lini colore. *Barr. ic.* 10. *t.* 27. *f.* 1.
Lychnis ſylveſtris nocturna piloſa, floribus unius ordinis dilute purpureis. *Cup. cath.* 119. *Raj. ſuppl.* 480.
Lychnis ſegetum meridionalium annua hirta, floribus albis uno verſu diſpoſitis. *Morif. hiſt.* 2. *p.* 346. *ſ.* 5. *t.* 36. *f.* 7.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 587.
Nächtliche Silene. W.
*Habitat in* Hiſpania, Monſpelii, Penſylvania. ⊙ (v. v.)

Folia *inferiora obovata, concava, rigida.* Flores *ſeſſiles, ex bracteis oppoſitis alterni, alternatim florentes.* Petala *alba, bifida, majuſcula, ſubtus vireſcentia, nec poſt antheſin rubra. Similis Cucubalo reflexo, ſed caule ramoſiore altiore, Petalis extra calycem patentibus.*

7. SILENE *gallica.*

S. floribus ſubſpicatis alternis ſecundis, petalis indiviſis, fructibus erectis. *Sp. pl.* 595.
Viſcago foliis ellipticis, calycibus lineatis, viſcidis, petalis ovatis. *Hall. helv. n.* 914.
Viſcago hirta gallica, flore parvo carneo, petalis integris. *Dill. hort. elth.* 419. *t.* 310. *f.* 399.
Silene hirſuta, foliis ſeſſilibus oblongo-cuneiformibus obtuſis, calycibus ſtriatis, fructibus erectis alternis. *Dalib. pariſ.* 129.
Lychnis ſylveſtris hirſuta annua, flore minore carneo. *Vaill. pariſ.* 121. *t.* 16. *f.* 12.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 588.
Franzöſiſche Silene. W.
*Habitat in* Helvetia, Gallia. ⊙ (v. v.)

8. SILENE *ceraſtoides.*

S. hirſuta, petalis emarginatis, fructificationibus erectis, calycibus ſubſeſſilibus ſubpiloſis. *Sp. pl.* 595.
Lychnis ceraſtoides. *Scop. carn. n.* 522.
Silene hirſuta, petalis emarginatis, fructibus erectis alternis hirſutis ſeſſilibus. *Sp. pl.* 1. *p.* 417.
S. rigidula. *Amoen. acad.* 4. *p.* 313. *
Viſcago ceraſtii foliis, vaſculis erectis ſeſſilibus. *Dill. elth.* 416. *t.* 309. *f.* 307.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 588.
Hornkrautartige Silene. W.
*Habitat in* Europa *auſtrali.* ⊙

** *Floribus lateralibus confertis.*

9. SILENE *mutabilis.*

S. petalis bifidis, calycibus angulatis pedunculatis, foliis lanceolato-linearibus. *Amoen. acad* 4. *p.* 314. *

Lychnis flore albo minimo. *Raj. hiſt.* 906.

Lychnis arvenſis minor anglica. *Raj. hiſt.* 1004.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 589.

Veränderliche Silene. W.

*Habitat in* Europa *auſtrali.* ⊙

*Affinis* Cucubalo *reflexo, cum qua conjungit Raj. hiſt.* 664, *ſed ſata utraque diverſam ſeſe mihi oſtendebat.*

*10. SILENE *chlorantha.* W.

S. petalis linearibus bifidis, floribus lateralibus ſecundis cernuis, foliis radicalibus margine ſcabris. W.

S. (*chlorantha*) radice perenni, foliis oblongis acutis glabris margine ſcabris, radicalibus petiolatis, panicula elongata nutante, calyce cylindraceo glabro, laciniis obtuſiuſculis, petalis linearibus bifidis, capſula thecaphoro longiore. *Ehr. Beitr.* 7. *p.* 145.

Cucubalus (*chloranthus*) ſcapis ſubaphyllis, floribus ſecundis, petalis linearibus bifidis, foliis radicalibus petiolatis oblongis acutis. *Willd. prod. Fl. berol. n.* 477. *t.* 5. *f.* 9. * *Hoffm. germ.* 150. *Roth. germ. I.* 193. *II.* 492.

Viſcago nocturna non viſcoſa herbaceo flore. *Dill. elth.* 425. *t.* 316. *f* 408.

Lychnis ſylveſtris ſeſamoides major, flore obſoleto viridi. *Menz. pug. t.* 2. *f.* 1. *mala.*

Grüne Silene. W.

*Habitat in* Marchia Electorali. 4 (v. v.)

11. SILENE *nutans.*

S. petalis bifidis, floribus lateralibus ſecundis cernuis, panicula nutante. *Oed. dan. t.* 242. *Pollich. pal. n.* 417. *Reyg ged.* 2. *p.* 84. *Gunn. norv. n.* 1109. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 138. *Leers. herb. n.* 333. *Hoffm. germ.* 151. *Roth. germ. I.* 192. *II.* 494.

Viſcago foliis lanceolatis hirſutis, floribus paniculatis nutantibus. *Hall. helv. n.* 915.

Silene foliis lanceolatis, caule paniculato, floribus nutantibus, calyce ſtriato, corolla involuta. *Hort. cliff.* 171. *Fl. ſuec.* 366, 588. *

Lychnis nutans. *Scop. carn.* 2. *n.* 525.

Lychnis montana viſcoſa alba latifolia. *Bauh. pin.* 205.

Lychnis ſylveſtris, albo flore. *Tabern.* 295. *Cluſ. pann.* 328. *hiſt.* 290, 291. R.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 589.
Hängende Silene. W.
*Habitat in* Europae *pratis aridis.* 4 (v. v.)
Petala *apice crenata.* Datur *varietas pleno flore.*
Capſula *ſexfariam dehiſcit.* Leers. *l. c.*

12. SILENE *amoena.*

S. petalis bifidis: coronula ſubcoadunata, floribus ſecundis, pedunculis oppoſitis trifloris, ramis alternis. *Sp. pl.* 596.
S. petalis bifidis coronatis: corolla coadunata, calycibus erectis raris piloſis. *Hort. upſ.* 114.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 590.
Angenehme Silene. W.
*Habitat in* Tataria. 4
Caules *diffuſi, laeviuſculi, adſcendentes. Rami alterni, divaricati, breviores.* Folia *ſupra glabra.* Racemus *ſecundus: pedunculis oppoſitis, triſloris.* Calyces *angulis* 10 *purpuraſcentibus villoſis.* Petala *alba, ſemibifida: Nectarii lamellis bifidis, patulis, ſtria alba.*

13. SILENE *paradoxa.*

S. floribus racemoſis, calycibus decem-ſulcatis viſcidis, floribus aliis ſtaminibus exſertis, aliis incluſis. *Sp. pl.* 1673.
Lychnis viſcoſa peregrina noctiflora odorata. *Zanon. hiſt. t.* 109.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 591.
Sonderbare Silene. W.
*Habitat in* Italia. 4 (v. v.)
Statura *Silenes nutantis, ſed quadruplo major.* Folia *lineari-lanceolata, canaliculata.* Caules *ſubincani: alii florentes ſesquipedales; alii ſteriles brevesque pro futuro anno.* Flores *racemoſi:* Pedunculis *lateralibus triſloris, viſcidis.* Calyces *ſubcylindrici, decemſulcati angulis viſcidis.* Corollae *purpuraſcentes, aliis albidae, noctu explicatae et odorae:* Petala *bifida, ſubcrenata: corona acuta, ſubſerrata.* Piſtilla *et ſtamina cum antheris in aliis plantis primum prodeunt iisque divaricatis. In aliis plantis Piſtilla mox prodeunt, ſtamina vero inter tubum floris effoeta haerent.* Rami *inter flores valde viſcoſi.*

14. SILENE *fruticosa.*

S. petalis bifidis, caule fruticoso, foliis lato-lanceolatis, panicula trichotoma. *Mill. dict. n.* 4. *Kniph. cent.* 5. *n.* 84.

S. caule folioso fruticoso, foliis lineari-lanceolatis acutis glabris, capsulis ovatis. *Vir. cliff.* 38. *Hort. cliff.* 171. *n.* 4. *Hort. upsal.* III. *n.* 2. *Roy. lugdb.* 446.

Lychnis myrtifolia behen albo similis. *Bauh. pin.* 205.

Ocymoides fruticosum. *Cam. hort. t.* 33.

Saponaria frutescens, acutis foliis, ex sicilia. *Bocc. sic.* 58. *t.* 30.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 592.

Strauchartige Silene. W.

*Habitat in* Sicilia. ♄ (v. v.)

15. SILENE *bupleuroides.*

S. petalis bifidis, floribus pedunculatis oppositis bractea brevioribus, foliis lanceolatis acutis glabris. *Sp. pl.* 598. *Mill. dict. n.* 17.

S. caule folioso herbaceo, foliis lanceolatis acutis glabris, calycibus erectis. *Hort. cliff.* 171. *Roy. lugdb.* 446.

Lychnis orientalis, bupleuri folio. *Tournef. cor.* 2. *it.* 2. *p.* 139. *t.* 154.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 546.

Hasenöhrleinartige Silene. W.

*Habitat in* Persia. ♂ (v. v.)

*16. SILENE *longiflora.*

S. petalis bifidis, floribus paniculatis erectis, pedunculis oppositis bractea longioribus, calycibus longissimis glabris. W.

S. (*longiflora*) radice perenni, foliis lanceolato-linearibus glabris, caulibus paniculatis glabris, pedunculis calyce brevioribus, calyce subclavato glabro basi exciso, petalis bifidis, capsula thecaphoro breviore. *Ehr. Beitr.* 7. *p.* 144.

S. *juncea*) petalis bipartitis integris laciniis divaricatis, fructibus oppositis clavatis erectis. *Roth. catalect.* 1. *p.* 54. *

Langblütige Silene. W.

*Habitat in* Hungaria. 2ℓ (v. v.)

17. SILENE *gigantea.*

S. petalis bifidis, foliis radicalibus cochleariformibus obtusissimis, floribus subverticillatis. *Mill. dict. n.* 13.

S. foliis obverſe ovatis craſſis, limbis corollae bifidis a ſole revolutis. *Wach. ultr.* 391.
Lychnis graeca, ſedi arboreſcentis folio et facie, flore albo. *T. Walth hort.* 32. *t.* 11.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 593.
Hohe Silene. W.
*Habitat in* Africa. ♂, *f.* ♄ (v. v.)

Folia *prioris anni, maxima.* Caulis *poſterioris anni, bipedalis, ſimplex: articulis inferioribus brevibus, villoſis; ſuperioribus longiſſimis, nudis, viſcoſo-glutinoſis.* Folia *inferiora obovata, carnoſa, fragilia, concava, pubeſcentia, ſeſſilia.* Pedunculi *communes oppoſiti, horizontaliter patentes, breviſſimi, dichotomi.* Calyces *pubeſcentes.* Corollae *virides corona obſoleta, ut fere nulla quaſi Cucubali generis, ſed tamen aliquali.* Flores *noctu tantum explicati.*

18. SILENE *craſſifolia.*

S. petalis emarginatis, foliis ſuborbiculatis carnoſis hirſutis, racemo ſecundo. *Sp. pl.* 597.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 594.
Dickblättrige Silene. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♂

Caulis *bipedalis, firmus, hirſutus: Ramis alternis.* Folia *orbiculata ſ. obovata, obtuſiſſima, Portulacae, craſſa, carnoſa, utrinque piloſa: vix extimi pollicis magnitudine.* Racemus *terminalis, ſecundus, Flores* 8 *ſ.* 12, *triſti colore; calycibus hirſutis: bracteis ovatis. Petala emarginata, rite coronata. Piſtillatria.*

19. SILENE *viridiflora.*

S. petalis ſemibifidis, foliis ovatis ſcabriuſculis acutis, panicula elongata ſubaphylla. *Mill. dict. n.* 5. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 142. *Kniph. cent.* 12. *n.* 89.
S. foliis lanceolatis, caule paniculato nudo, floribus erectis. *Hort. cliff.* 171. *Roy lugdb.* 446.
Lychnis ocymaſtri facie, flore viridi. *Herm. parad.* 199. *t.* 199.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 594.
Grünblütige Silene. W.
*Habitat in* Luſitania. ♂ (v. v.)

Planta *pedalis et ultra.* Caules *erecti, teretes, pubeſcentes, geniculis incraſſatis.* Folia *lanceolato-ovata, pubeſcentia, viridia, acuta* Rami *alterni.* Panicula *brachiata pedunculis dichotomis, pauciſloris.*

Calyces *nutantes, cylindrici, angulis decem viſcoſis, uti pedunculi.* Flores *albido-vireſcentes: petalis ſemibifidis lobis recurvatis, linearibus.* Stamina *longitudine tubi,* Piſtilla *longitudine petalorum.*

*** *Floribus ex dichotomia caulis.*

20. SILENE *conoidea.*

S. calycibus fructus globoſis acuminatis ſtriis triginta, foliis glabris, petalis integris. *Hort. upſ.* 110. *Sauv. monſp.* 146. *Mill. dict. n.* 6. *Hoffm. germ.* 151. *Roth. germ. I.* 193. *II.* 494.

Cucubalus calycibus conicis ſtriatis. *Hort. cliff.* 171. *Roy. lugdb.* 448.

Lychnis glabra annua, foliis oblongis mucronatis, flore amplo rubello, capſula oblonga pyramidali. *Moriſ. hiſt. 2. p.* 542. *ſ.* 5. *t.* 36. *f.* 6.

Lychnis ſylveſtris latifolia, calycibus turgidis ſtriatis. *Bauh. pin.* 205.

Lychnis ſylveſtris 2. *Cluſ. hiſt. 1. p.* 288.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 595.

Halbkegelförmige Silene. W.

*Habitat inter ſegetes* Hiſpaniae. ☉ (v. v.)

21. SILENE *conica.*

S. calycibus fructus conicis ſtriis triginta, foliis mollibus, petalis bifidis. *Hort. upſ.* 110. *Iacq. vind.* 77. *obſ.* 38. *auſtr. t.* 253. *Scop. carn. n.* 521. *Pollich. pal. n.* 418. *Hoffm.* 151. *Roth. germ. I.* 193. *II.* 495.

Lychnis ſylveſtris anguſtifolia, calycibus turgidis ſtriatis. *Bauh. pin.* 205.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 596.

Kegelfrüchtige Silene. W.

*Habitat in* Germania, Hiſpania, Galloprovincia, Oriente. ☉ (v. v.)

*22. SILENE *bellidifolia.*

S. calycibus cylindraceo-conicis pubeſcentibus erectis, petalis bifidis, racemis geminatis terminalibus ſecundis, flore intermedio pedunculato, foliis lanceolatis pubeſcentibus. W.

S. calycibus fructus ovatis villoſis, foliis piloſis ſubaſperis, petalis bifidis. *Murr. ſyſt. veg. ed.* 14. *p.* 421. *Iacq. hort.* 3. *t.* 81.

Maſſlieblättrige Silene. W.

*Habitat* - - - - ☉ (v. v.)

*23. SILENE *dichotoma.*

S. calycibus ovatis viscoso-pilosis erectis, petalis bifidis, racemis geminatis terminalibus secundis, flore intermedio pedunculato, foliis petiolatis ovato-lanceolatis, basi ciliatis. W.

S. foliis ellipticis subquinquenerviis petiolatis scabris, caule dichotomo deorsum pubescente, flore primario ex dichotomia, reliquis spicato-racemosis solitariis secundis nutantibus, calyce decangulari scabro, petalis bifidis crenatis, capsula erecta thecaphoro longior. *Ehr. Beitr. 7. p.* 144.

Gabelförmige Silene. W.

*Habitat in* Hungaria. ⊙ ♂ (v. v.)

*24. SILENE *vespertina.*

S. calycibus clavatis pubescentibus erectis, petalis bifidis, corona connata, racemis geminatis terminalibus secundis, flore intermedio pedunculato, foliis obovato-lanceolatis basi ciliatis. W.

S. petalis bifidis, nectario connato, floribus alternis. *Retz. obs. 3. p.* 31. *

Abend Silene. W.

*Habitat* - - - - ⊙ (v. s.)

25. SILENE *Behen.*

S. calycibus glabris ovatis venoso-reticulatis, capsulis trilocularibus. *Sp. pl.* 599.

Lychnis vesicaria cretica, parvo flore purpurascente. *Dill. elth.* 427. *t.* 317. *f.* 409.

Lychnis cretica, parvo flore, calyce striato purpurascente. *Tournef. cor.* 24.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 596.

Aufgeblasene Silene. W.

*Habitat in* Creta. ⊙ (v. v.)

*Differt a Cucubalo Behen corona corollae, petalorum laminis vix $\frac{1}{3}$ longitudine calycis, radice annua, corollis purpurascentibus, antheris albis. Calyx obtusus. Flores nutantes, pedunculo e dichotomia, flore ipso breviore.*

26. SILENE *stricta.*

S. petalis emarginatis, calycibus glabris reticulato-venosis acuminatis pedunculo longioribus, caule dichotomo stricto. *Amoen. acad.* 4. *p.* 314. *

S. caule subdichotomo, floribus erectis subsessilibus, foliis lanceolatis piloso-viscidis. *Amoen. acad.* 1. *p.* 158.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. p.* 597.
Steife Silene. W.
*Habitat in* Hiſpania *et* Toloſae. ⊙

27. SILENE *pendula.*

S. calycibus fructiferis pendulis inflatis: angulis decem ſcabris. *Hort. upſ.* 109. * *Mill. dict. n.* 7.
Cucubalus floribus trigynis erectis, fructibus pendulis, calycibus ſtriis decem criſpis. *Hort. cliff.* 170.
ß. Cucubalus floribus trigynis erectis, calycibus fructus pendulis anguloſis. *Hort. cliff.* 171.
Viſcago hirſuta ſicula, lychnidis aquaticae facie, ſupina. *Dill. elth.* 421. *t.* 312. *f.* 404.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 597.
Hängende Silene. W.
*Habitat in* Creta *et* Sicilia. ⊙ (v. v.)

28. SILENE *baccifera.*

S. calycibus fructiferis cernuis inflatis laevibus, capſulis coloratis, ramis divaricatis. W.
Silene baccifera. *Roth. germ. I.* 192. *II.* 493.
Cucubalus (*baccifer*) calycibus campanulatis, petalis diſtantibus, pericarpiis coloratis, ramis divaricatis. *Sp. pl.* 591. *Mill. t.* 112. *Pollich. pal. n.* 414. *Hoffm. germ.* 149.
Cucubalus caule ramoſo, floribus trigynis, fructu colorato globoſo. *Hort. cliff.* 170. *Hort. upſ.* 109. *Roy. lugdb.* 448. *Sauv. monſp.* 152.
Viſcago baccifera, petalis ſerratis. *Hall. helv. n.* 912.
Lychnis baccifera. *Scop. carn. n.* 517.
Lychnanthus volubilis. *Gmel. act. petrop.* 1759. *vol.* 14. *p.* 525. *t.* 17. *f.* 1.
Alſine ſcandens baccifera. *Bauh. pin.* 250.
Alſine repens. *Dod. pempt.* 403.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 574.
Beerentragende Silene. W.
*Habitat in* Tatariae, Germaniae, Galliae, Helvetiae, Italiae *nemoribus, ſepibus.* 4 (v. v.)

*29. SILENE *maritima.* W.

S. calycibus fructiferis erectis inflatis reticulato-ſtriatis, petalis bifidis, caule repente. W.
S. (*uniflora*) petalis bifidis crenatis, calycibus inflatis teretibus glabris venoſo-reticulatis, pedunculis terminalibus ſolitariis unifloris. *Roth. catalect.* 1. *p.* 52. *
Silene amoena. *Hudſ. angl.* 188.
Cucubalus littoralis. *Donn. ind. horti cantab. p.* 51.
Cucubalus Behen ß. *Sp. pl.* 591. *Fl. dan. t.* 857.

Lychnis maritima repens. *Bauh. pin.* 205. *Itin. gotl.* 192.
Lychnis maritima anglicana. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 357.
Lychnis perennis anguſtifolia marina anglica procumbens. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 535. *ſ.* 5. 20. *f.* 2.
Meerſtrands Silene. W.
*Habitat in maritimis* Angliae, Norvegiae, Gotlandiae.
4 (v. v.)
*Locis ſterilibus apex ramorum eſt uniflorus, fertilioribus vero triflorus, cum flore pedunculato in dichotomia caulis. Similis Cucubalo Beheni, tamen pluribus notis diverſa.* W.

* 30. SILENE *procumbens.*
S. calycibus inflatis ſubdecemangularibus ſcabris, petalis emarginatis, caule procumbente, foliis ſeſſilibus lineari-lanceolatis. W.
S. calycibus ovatis inflatis erectis obſolete decemangularibus, petalis ſubauriculatis bifidis, caule procumbente. *Murr. comment. goett.* 1784. *et* 1785. *p.* 83. *t.* 2. *
S. petalis emarginatis, calycibus inflatis angulosis rugoſis ſcabris, pedunculis terminalibus. *Roth. catal. bot.* 1. *p.* 55. *
Liegende Silene. W.
*Habitat in* Sibiria. 4

31. SILENE *noctiflora.*
S. calycibus decemangularibus: dentibus tubum aequantibus, caule dichotomo, petalis bifidis. *Mill. dict. n.* 8. *Pollich. pal. n.* 419. *Hoffm. germ.* 151. *Roth. germ. I.* 193. *II.* 495.
Viſcago foliis ovato-lanceolatis, hirſutis, caule brachiato, calycibus venoſis. *Hall. helv. n.* 911.
Cucubalus calycibus, fructus ovatis erectis: angulis decem alternis venoſis. *Hort. upſ.* 109. * *Fl. ſuec.* 2. *n.* 389. *Sauv. monſp.* 146.
Lychnis noctiflora. *Schreb. ſpic. p.* 31. *Bauh. pin.* 205. *Raj. hiſt.* 994.
Ocymoides noctiflorum. *Comm.* 109. *t.* 34.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 598.
Nachtblütige Silene. W.
*Habitat in* Suecia, Germania. ⊙ (v. v.)
*Hanc plantam pro* Lychnide calyculis ſtriatis *Bauhinum habuiſſe ſuſpicatur cl. la Chenal, qui iſtam minquam repererit. Hall. l. c.* R.
Calyces *admodum viſcidi dentibus longioribus, quam in reliquis.*

*32. SILENE *ornata*.

S. calycibus fructus oblongis carinatis pilosis, petalis bifidis, foliis lanceolatis pubescentibus viscosis planis, caule viscido. *Ait. Kew.* 2. *p.* 96. *Curt. mag.* 382.

Dunkelfarbige Silene. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♂ (v. v.)

Corolla *saturate sanguinea*. W.

*33. SILENE *undulata*.

S. calycibus fructus clavato-cylindricis pilosis, petalis bifidis, foliis lanceolatis pubescentibus undulatis, caule adscendente. *Ait. Kew.* 2. *p.* 96.

Wellenblättrige Silene. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. ♂ (v. v.)

34. SILENE *virginica*.

S. calycibus floris cylindricis villosis, panicula dichotoma. *Sp. pl.* 600.

Lychnis flore simplici speciosо coccineo, foliis oblongis acuminatis adversis, caule viscoso. *Gron. virg.* 151.

Lychnis viscosa virginiana, flore amplo coccineo f. Muscipula regia. *Pluk. alm.* 231. *t.* 203. *f.* 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 598.

Virginische Silene. W.

*Habitat in* Virginia. 4

Planta *polymorpha*. *Flores facie* Lychnis *dioicae albae, at saturate rubri*; *Calyces angustiores quam in congeneribus, hirsuti*. Stamina *cum stylis extra florem prominentia*. Caulis *nunc simplex digiti longitudine, terminatus floribus in fasciculum collectis, nunc pedalis apice trichotomus, pedunculo intermedio semper unifloro*. Folia *oblonga s. lato-lanceolata, ut in Gomphrena globosa*.

35. SILENE *antirrhina*.

S. foliis lanceolatis subciliatis, pedunculis trifidis, petalis emarginatis, calycibus ovatis. *Roy. lugdb.* 447.

S. petalis bilobis coronatis, floribus erectis, foliis subciliatis. *Hort. upsal.* 114.

S. corymbo dichotomo, floribus pedunculatis, ramis alternis erectis, foliis lanceolatis integerrimis. *Gron. virg.* 50.

Viscago americana noctiflora, anthirrhini folio. *Dill. elth.* 442. *t.* 313. *f.* 403.

*Houttuyn Lin Pfl. Syst.* 6. *p.* 599.

Löwenmaulartige Silene. W.

*Habitat in* Virginia, Carolina. ⊙ (v. v.)

* 36. SILENE *sedoides.*

S. glanduloso-pilosa, calycibus clavatis, petalis emarginatis foliis oblongo-obovatis subcarnosis. W.

Silene sedoides. *Iacq. collect. suppl.* 112. *t.* 14. *f.* 1. *

Lychnis cretica maritima minima portulacae sylvestris folio. *Tournef. cor.* 24.

Sedumartige Silene. W.

*Habitat in* Cretâ. ⊙ (v. v.)

* 37. SILENE *apetala.* W.

S. calycibus ovatis pubescentibus, floribus apetalis, foliis lanceolatis pubescentibus. W.

Blumenblattlose Silene. W.

*Habitat* - - - - ⊙ (v. v.)

*Ab omnibus Silenes speciebus floribus clandestinis defectu petalorum distincta. Tota pubescens.* Caulis *teres sexuncialis ramis simplicibus oppositis.* Folia *inferiora obovato-lanceolata, superiora lanceolata, summa linearia.* Pedunculi *solitarii in dichotomia caulis longitudine calycis.* Calyx *erectus oblongo-ovatus decemstriatus.* Capsula *breve pedicellata.* W.

38. SILENE *rubella.*

S. erecta laevis, calycibus subglobosis glabris venosis, corollis inapertis. *Hort. upsl.* 112. *

Viscago lusitanica, flore rubello vix conspicuo. *Dill. elth.* 324. *t.* 314. *f.* 406.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 599.

Röthliche Silene. W.

*Habitat in* Lusitania, Oriente. ⊙

39. SILENE *inaperta.*

S. caule dichotomo paniculato, calycibus laevibus, petalis brevissimis emarginatis, foliis glabris lanceolatis. *Sp. pl.* 600.

Viscago laevis, inaperto flore. *Dill. elth.* 424. *t.* 315. *f.* 407.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 600.

Ungeöffnete Silene. W.

*Habitat in* Europa *australi.* ⊙ (v. f.)

*Stamina saepe* 5 *et corolla absque limbo.*

* 40. SILENE *clandestina.*

S. calycibus ovatis decemangulatis pubescentibus, petalis bifidis erectis calyce parum longioribus, foliis oblongo-lanceolatis ciliatis. W.

Silene clandeſtina. *Iacq. collect. ſuppl.* III. *t.* 3. *f.* 3. *
Heimlichblühende Silene. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ☉
*Similis S. apetalae ſed diverſa* calyce *angulato*, praeſentia *petalorum et* foliis *ciliatis*. W.

41. SILENE *portenſis.*

S. caule dichotomo paniculato, calycibus ſtriatis, petalis bifidis, foliis linearibus. *Sp. pl.* 600.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 600.
Porter Silene. W.
*Habitat in* Luſitania. *Loeſl.* ☉
*Habitus S. inapertae, at Folia anguſtiora et Calyces longitudinaliter ſtriati.* Planta *ſpithamaea, brachiata, dichotoma.* Folia *linearia, acuta, glabra.* Pedunculi *filiformes, anguſtiſſimi, longi, erecti, e dichotomia caulis uniflori.* Calyces *clavati, longi, purpuraſcentes, ſtriis alternis albis.* Stamina *longitudine fere corollae. An Silenes inapertae ſola varietas? Amoen. acad.* 3. *p.* 409.

42. SILENE *cretica.*

S. erecta laevis, calycibus erectis decemangularibus, petalis bifidis. *Hort. upſ.* 112. *
Viſcago foliis inferioribus bellidis, ſuperioribus tunicae, calyce ſtrictiore et turgidiore. *Dill. elth.* 422. *t.* 314. *f.* 404, 405.
Lychnis viſcoſa, foliis inferioribus bellidi ſimilibus, flore minimo carneo ſ. rubro. *Magn. hort.* 126.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 601.
Cretiſche Silene. W.
*Habitat in* Creta. ☉ (v. v.)
Caulis *dichotomo-paniculatus, patens, filiformis: articulis viſcidis.* Calyces *glabri.* Flores *amoene purpurei petalis ſemibifidis, erecto-patulis.*

43. SILENE *Muſcipula.*

S. petalis bifidis, caule dichotomo, floribus axillaribus ſeſſilibus, foliis glabris. *Mill. dict. n.* 1. *Pall. it.* 2. *p.* 110.
S. floribus triſtylis, foliis lanceolatis ſeſſilibus, capſulis trilocularibus, floribus ternis. *Sauv. monſp.* 145.
Lychnis ſylveſtris viſcoſa rubra alterna. *Bauh. pin.* 205.
Lychnis ſylveſtris 3. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 289.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 601.

Fliegenfangende Silene. W.
*Habitat in* Hiſpania, G. Narbonenſi.

44. SILENE *polyphylla.*

S. foliis faſciculatis ſetaceis: ramorum florentium oppoſitis. *Sp. pl.* 601. *Roy. lugdb.* 447.
Lychnis ſylveſtris, plurimis foliolis ſimul junctis. *Bauh. pin.* 205.
Lychnis ſylveſtris VIII. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 290.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 602.
Vielblättrige Silene. W.
*Habitat in* Pannonia, Auſtria, Bohemia. 24 (v. ſ.)

* * * * *Floribus terminalibus.*

45. SILENE *Armeria.*

S. floribus faſciculatis faſtigiatis, foliis ſuperioribus cordatis glabris, petalis integris. *Hort. upſ.* 110. *Oed. dan. t.* 559. *Mill. dict. n.* 12. *Kniph. cent.* 8. *n.* 88. *Roth. germ. I.* 293. *II.* 496. *Hoffm. germ.* 151.
Viſcago foliis glabris, ovato-lanceolatis, floribus umbellatis. *Hall. helv. n.* 916.

S. foliis lanceolato-ovatis glabris, floribus terminalibus faſciculatis faſtigiatis. *Hort. cliff.* 172. *Roy. lugdb.* 446. *Sauv. monſp.* 153.
Lychnis viſcoſa purpurea latifolia laevis. *Bauh. pin.* 205.
Armerius flos quartus. *Dod. pempt.* 176.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 602.
Garten Silene. W.
*Habitat in* Anglia, Gallia, Helvetia. ⊙ (v. v.)

46. SILENE *orchidea.*

S. petalis bilobis, laminis baſi utrinque proceſſus ſubulato-auctis, foliis laevibus, inferioribus ſubrotundo-ſpathulatis, petiolis ciliatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 98.

S. floribus faſciculatis faſtigiatis, petalis quadrifidis, foliis ovatis glabris. *Lin. ſuppl.* 241.

S. (*Atocion*) calycibus fructigeris clavatis, petalis ſemibilobis, faſciculo florum terminali dichotomo, foliis ovatis. *Murr. ſyſt. veg.* 14. *p.* 421. *Iacq. hort.* 3. *p.* 19. *t.* 32.
Lychnis graeca bellidis folio verna, flore parvo dilute purpuraſcente. *Tournef. cor.* 24.
Ragwurzblütige Silene. W.
*Habitat in* Oriente. ⊙ (v. v.)

Caulis *erectus dichotomus ſuperne ſubviſcoſus inferne*

*ramosus.* Folia *oleracea glabra, inferiora spathulata glanduloso-ciliata, superiora sessilia.* Flores *terminales dichotomi fasciculati fastigiati.* Calyx *erectus clavatus.* Corolla *amoene purpurea, fascia alba, fauce coronata.* Petala *ovata bifida, basi utrinque ad fauces dente s. lacinia teniore.*

47. SILENE *aegyptiaca.*

S. petalis emarginatis utrinque dentatis, foliis subtomentosis. *Lin. suppl.* 241.

Aegyptische Silene. W.

*Habitat in* Aegypto.

Caulis *herbaceus palmaris brachiatus leviſſime tomentosus.* Folia *obovata, basi angustata vix carnosa laevia acutiuscula.* Flores *terminales, unus alterve, pedunculati erecti.* Calyx *clavatus subpubescens, dentibus brevibus.* Petala *obcordata s. emarginata obtusa incarnata calyce breviora, dente utrinque acuto, adeoque quadrifida.* Coronula *breviſſima obtusa emarginata.* Stamina *decem in fauce.* Styli *tres obliqui.*

*48. SILENE *Catesbaei.*

S. calycibus cylindraceis, petalis quadrifidis acutis, panicula terminali, foliis lanceolatis. W.

S. (*Catesbaei*) floribus magnis purpureo-rubris, petalis laciniatis, calycibus cylindricis, panicula subtrichotoma, foliis laevibus lato-lanceolatis. *Walt. carol.* 141.

Lychnis viscosa virginiana flore amplo coccineo, seu Muscipula regia. *Pluk. phytog. t.* 203. *f.* 1. *Catesb. carol. 2. p.* 54. *t.* 54.

Schlitzblättrige Silene. W.

*Habitat in* Carolina. 4

Petala *profunde bifida et utrinque ad latus dente instructa.* W.

*49. SILENE *cordifolia.*

S. calycibus pubescentibus angulatis cylindraceis, petalis bifidis, floribus terminalibus, foliis subrotundis acutis nervosis pilosis. W.

S. (*cordifolia*) caule simplici, foliis ovatis acutis, floribus subsessilibus terminalibus, petalis semibifidis. *Allion. pedem. n.* 1581. *t.* 23. *f.* 3.

Herzblättrige Silene. W.

*Habitat in saxosis* Pedemontani *et* Nicaeensis *comitatus.* 4

*50. SILENE *chloraefolia.*

S. calycibus glabris clavatis, petalis semibifidis, foliis glaucis, inferioribus ovalibus summis cordatis amplexicaulibus. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 15. *t.* 13.*

Lychnis orientalis viscosa centaurei lutei folio, flore longissimo. *Tournef. cor.* 24.

Chlorablättrige Silene. W.

*Habitat in* Armenia. 24 (v. f.)

51. SILENE *alpestris.*

S. petalis quadridentatis, caule dichotomo, capsulis ovato-oblongis, foliis lineari-lanceolatis glabris erectis, pedunculis viscidis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 98.

Silene alpestris. *Jacq. austr.* 1. *p.* 60. *t.* 96.

Lychnis (*alpestris*) petalis quadrifidis coronatis, foliis recurvis. *Lin. suppl.* 244.

Lychnis quadrifida. *Scop. carn. n.* 519.

Lychnis viscosa alba angustifolia major. *Bauh. pin.* 205.

Lychnis sylvestris decima. *Clus. hist.* 1. *p.* 291.

Caryophyllus minimus humilis alter exoticus, flore candido amoeno. *Lob. ic.* 445.

Alpen Silene. W.

*Habitat in* Austriae *alpibus.* 24 (v. f.)

Radix *perennis.* Caules *spithamaei erecti laeves.* Folia *lineari-lanceolata laevia.* Flores *e panicula dichotoma.* Calyx *laevis, dentibus obtusis.* Petala *quadrifida alba longitudine calycis.* Capsula *calyce longior.*

52. SILENE *rupestris.*

S. floribus erectis, petalis emarginatis, calycibus teretibus, foliis lanceolatis. *Fl. suec.* 367, 390. *It. W. goth.* 144. * *Gmel. sib.* 4. *p.* 139. *Hoffm. germ.* 151. *Jacq. Collect.* 2. *p.* 85.*

S. floribus erectis laxe distantibus, caule dichotomo. *Fl. lapp.* 183.

Viscago foliis lanceolatis, caulibus brachiatis, calycibus infundibuliformibus, floribus laxe umbellatis, erectis. *Hall. helv. n.* 917.

Alsine alpina glabra. *Bauh. pin.* 251. *prodr.* 118. *Oed. dan. t.* 4. *Raj. hist.* 1003, 1031.

Auricula muris alpina glabra. *Bauh. hist.* 3. *p.* 560.

β. Caryophyllus holosteus alpinus gramineus. *Bauh. pin.* 210. *prodr.* 104. *Burs. Al.* 117.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 603.

Felsen Silene. W.

*Habitat in montibus aridis* Sueciae, Helvetiae. ♂ (v. f.)
*Varietas β. foliis linearibus in umbra nata.*

## 53. SILENE *Saxifraga.*

S. caulibus subunifloris, pedunculis longitudine caulis, foliis glabris, floribus hermaphroditis femineisque, petalis bifidis. *Sp. pl.* 602. *Iacq. collect.* 2. *p.* 37. *

Lychnis floribus trigynis erectis, capsulis trilocularibus, foliis linearibus. *Scop. carn.* 1. *p.* 503. *n.* 6. *ed.* 2. *n.* 520.

Caryophyllus saxifragus. *Bauh. pin.* 211.

Saxifraga antiquorum quibusdam. *Bauh. hist.* 3. *p.* 338.

Lychnis minor saxifraga. *Segu. ver.* 431. *t.* 6. *f.* 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 604.

Steinbrechartige Silene. W.

*Habitat in montibus cretaceis* Galliae, Italiae, Carnioliae. 2 (v. f.)

Radix *lignosa, ramosa.* Caules *plures, digitales, glabri.* Folia *opposita, linearia, acuta, glabra, per 4 ad 6 oppositiones.* Pedunculus *terminalis, filiformis longitudine caulis; raro pedunculus alter lateralis.* Flos *unicus.* Calyx *clavatus, glaber.* Petala *bifida limbo calyce breviore, subtus rubro.*

## 54. SILENE *vallesia.*

S. caulibus subunifloris decumbentibus, foliis lanceolatis tomentosis longitudine calycis. *Sp. pl.* 603. *Mill. dict. n.* 9. *Allion. pedem. n.* 1574. *t.* 23. *f.* 2.

Viscago foliis ovato-lanceolatis, tomentosis, caulibus unifloris. *Hall. helv. n.* 910.

Lychnis pumila saxatilis alpina, flore carneo, folio crasso molli tomentoso. *Amoen. acad.* 1. *p.* 158. *Bocc. mus.* 65. *t.* 54.

Lychnis maritima pinguis e corsica. *Bocc. mus. t.* 34? *cui folia latiora breviora.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 604.

Walliser Silene. W.

*Habitat in alpibus* Vallesiacis, Valdensibus. 2 *Allioni.* (v. f.)

Caules *procumbentes, palmares, filiformes, lignosi.* Folia *lanceolata, superne latiora consistentia, acuta, tomentosa, glutinosa, confertim opposita.* Pedunculus *terminalis, solitarius, uniflorus, longitudine floris.* Flos *erectus*: Petala *bifida, basi limbi subauriculata, noctu odora.* Calyx *clavatus striis* 10 *elevatis*

*fuſceſcentibus: dentes parvi, obtuſi; abſoluta floreſcentia triplo major clavatus ſcarioſus inflatus ut Behen.*

55. SILENE *pumilio.*

S. caulibus unifloris ſubdiphyllis, petalis repandis, foliis lineari-lanceolatis. W.

S. (*pumilio*) caulibus unifloris, floribus maximis, calyce ſubcoriaceo, ventricoſo-campanulato hirſuto. *Wulfen. in Iacq. collect.* 2 *p.* 126 *t.* 10. * *Iacq. auſt.* 5. *app. t.* 2.

Cucubalus (*pumilio*) caulibus unifloris flore brevioribus. *Mant.* 71.

Lychnis pumilio. *Scop. carn. n.* 513.

Betonica coronaria. *Bauh. hiſt* 3. *p.* 537.

Caryophyllus ſylveſtris VII. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 285.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 584.

Niedrige Silene. W.

*Habitat in alpibus* Italiae, Moraviae, Carinthiae. 4 (v. f.)

Folia *radicalia in ceſpitem congeſta linearia obtuſa laevia.* Caules *ſimpliciſſimi breviſſimi uniflori, ſaepe triarticulati.* Calyx *oblongus campanulatus patulus obtuſus pubeſcens longitudine caulis.*

56. SILENE *acaulis.*

S. acaulis depreſſa, petalis emarginatis. *Fl. lapp.* 184. *Fl. ſuec.* 368, 387. *Oed. dan. t.* 21. *Hoffm. germ.* 151. *Allion. pedem. n.* 1583. *t.* 79. *f.* 1.

Viſcago foliis gramineis, caule breviſſimo unifloro. *Hall. helv. n.* 919.

Lychnis acaulis. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 516.

Cucubalus acaulis. *Gunn. norv. n.* 117.

Lychnis alpina pumila, folio gramineo. *Bauh. pin.* 206. *Dill. elth.* 206. *t.* 167. *f.* 206.

Muſcus alpinus, lychnidis flore. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 767.

Caryophyllus pumilus alpinus VII. *Cluſ. pann.* 329. *Hall.*

Lychnis ocymoides muſcoſa, ſtrictiore, et latiore folio. *Barr. ic.* 379. 380. *Hall.*

ß. S. (*exſcapa*) flore ſeſſili fructibus ſubrotundis. *Allion. pedem.* 1584. *t.* 79. *f.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 605.

Stielloſe Silene. W.

*Habitat in alpibus* Lapponicis, Auſtriacis, Helveticis, Pyrenaeis. 4 (v. f.)

Herba *Bryo ſimilis.*

## 896. STELLARIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 773.*

*Cal.* 5-phyllus, patens. *Petala* 5, bipartita.
*Capſ.* 1-locularis, polyſperma.

### 1. STELLARIA *nemorum.*

S. foliis cordatis petiolatis, panicula pedunculis ramoſis. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 591. *Scop. carn. n.* 532. *Kniph. cent.* 10. *n.* 86. *Flor. dan.* 271. *Hoffm. germ.* 152. *Roth, germ. I.* 190. *II.* 485.

Myoſotis foliis petiolatis, cordatis, tubis ternis. *Hall. helv. n.* 886. *a.*

Alſine nemorum. *Schreb. ſpicil.* 30.

Alſine altiſſima nemorum. *Bauh. pin.* 250.

Alſine montana hederacea maxima. *Col. ecphr.* 1. *p.* 289. *t* 290.

*β.* Alſine montana latifolia, flore laciniato. *Bauh. pin.* 250. *Rupp. jen.* 109.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 606.

Wald Sternmiere. W.

*Habitat in* Europae *nemoribus.* 24 (v. v.)

Affinis *Ceraſtii aquatici.*

### 2. STELLARIA *dichotoma.*

S. foliis ovatis ſeſſilibus, caule dichotomo, floribus ſolitariis, pedunculis fructiferis reflexis. *Sp. pl.* 603. *Pall. it.* 1. *p.* 72. *it.* 3. *p.* 343. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 14. *t.* 14.*

Alſine petalis emarginatis, folils ex cordato-ovatis acutis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 149.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 606.

Gabeläſtige Sternmiere. W.

*Habitat in alpibus* Sibiricis. ⊙

*Rami divaricati, dichotomi. Pedunculi fructiferi toti reflexi.*

Facies *fere Alſines mediae.* Petala *longitudine calycis.* W.

### 3. STELLARIA *radians.*

S. foliis lanceolatis ſerrulatis, petalis quinquepartitis. *Sp. pl.* 603.

Alſine foliis ſalignis margine ſcabris, petalis ſemiquinquefidis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 146.

Alſine ſaxatilis, anguſto et oblongo ſalicis folio, flore albo tenuiſſime laciniato. *Amm. ruth.* 83. *t.* 10.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 607.
Strahlenblütige Sternmiere. W.
*Habitat in* Sibiriae *uliginoſis.*

*4. STELLARIA *bulboſa.*

S. foliis ovato-lanceolatis ſubtus aveniis, caule ſubramoſo, pedunculo unifloro, radice filiformi repente bulbifera. W.

S. *(bulboſa)* foliis lanceolato-ovatis, caule ſubdichotomo, pedunculis unifloris, radice repente bulbifera. *Wulfen in Jacq. collect.* 3. *p.* 21. * *Jacq. ic. rar.* 3. *t.* 468. *Hoffm. germ.* 153.
Zwiebeltragende Sternmiere. W.
*Habitat in alpibus* Carinthiae *locis umbroſis humidis.* 24 (v. f.)
Planta *primo intuitu ſimillima Trientali europaeae.* Caulis *quandoque uno alterove ramo inſtructus.* Folia *ſuperne venoſa inferne avenia.* Pedunculi *uniflori longi, plerumque terminales, interdum et unus alterve axillaris obſervatur.* W.

5. STELLARIA *Holoſtea.*

S. foliis lanceolatis ferrulatis, petalis bifidis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 145. *Pollich. pal. n.* 420. *Fl. dan. t.* 698. *Kniph. cent.* 10. *n.* 85. *Scop. carn. n.* 534. *Hoffm. germ* 152. *Roth. germ. I.* 191. *II.* 486.
Alſine foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 172. *Fl. ſuec.* 371, 392.
Alſine foliis gramineis ciliatis. *Hall. helv. n.* 884.
Caryophyllus holoſteus arvenſis, flore majore. *Bauh. pin.* 210.
Gramen. *Fuchſ. hiſt.* 136.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 608.
Grofsblütige Sternmiere. W.
*Habitat in* Europae *nemoribus.* 24 (v. v.)
Caulis *ſuperne dichotomo-paniculatus.* Pedunculi *uniflori e dichotomia caulis.* Petala *calyce triplo longiora.* W.

6. STELLARIA *graminea.*

S. foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis, petalis calycis longitudine. W.

S. foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 145. *t.* 61 *f.* 2. *Pollich. pal. n.* 421. *Fl. dan. t.* 414. *et* 415. *Kniph. cent.* 10. *n.* 84. *Scop. carn. n.* 535. *Roth. germ. I.* 191. *II.* 487.

S. (*arvenſis*) foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis minoribus, petalis ultra medium bipartitis. *Hoffm. germ.* 152. *Ehrh. herb.* 126.

Alſine foliis linearibus. *Fl. lapp.* 189, 393. *Fl. ſuec.* 372. *Hort cliff.* 172. *Roy. lugdb.* 449.

Alſine foliis lanceolatis, lineatis, petiolis ramoſis. *Hall. helv. n.* 882.

Gramini Fuchſii Leucanthemo affinis et ſimilis herba. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 361. R.

Caryophyllus arvenſis glaber, flore minore. *Bauh. pin.* 210.

Gramen floridum minus. *Tabern. ic.* 232.

ß. S. (*Dilleniana*) caule flaccido, foliis lineari-lanceolatis, pedunculis terminalibus bifloris, petalis bipartitis. *Moench. haſſ. n.* 364. *t.* 6.* *Fl. dan. t.* 414. *Hoffm. germ.* 152. *Roth. germ. I.* 191. *II.* 489.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 608.

Grasartige Sternmiere. W.

*Habitat in ſiccis juniperetis ſepibus tectis* Europae. 4 (v. v.)

* 7. STELLARIA *paluſtris.*

S. foliis lineari-lanceolatis integerrimis, floribus paniculatis, petalis bipartitis calyce majoribus. *Retz. prod. Fl. ſcand. ed.* 2. *n.* 548.

S. (*paluſtris*) foliis linearibus integerrimis, floribus duplo majoribus ſemibifidis. *Hoffm. germ.* 152.

Stellaria graminea ß. *Sp. pl.* 604.

Alſine folio gramineo anguſtiore paluſtris. *Dill. app.* 69.

Caryophyllus holoſteus arvenſis medius. *Raj. ſynop.* 347.

Waſſer Sternmiere. W.

*Habitat in paludibus* Europae. 4 (v. v.)

Folia *glauca.* Flores *majores quam in praecedente ſpecie.* W.

* 8. STELLARIA *craſſifolia.*

S. foliis oblongo-lanceolatis craſſiuſculis glaucis, pedunculis unifloris ſolitariis axillaribus, petalis calyce majoribus, caule erecto. W.

S. (*craſſifolia*) foliis ovato-lanceolatis ſeſſilibus integerrimis craſſiuſculis glabris, pedunculis ſolitariis ex dichotomiis, florentibus erectis, fructiferis reflexis, foliolis calycinis ovato-lanceolatis petalis multo brevioribus. *Ehrh. Beitr.* 3. *p.* 60. *Timm. prod. n.* 299. *Hoffm. germ.* 153.

Dickblättrige Sternmiere. W.

*Habitat in pratis humidis* Germaniae. ⊙ (v. f.)

*9. STELLARIA *Alsine.*

S. foliis oblongo-lanceolatis, pedunculis subgeminatis uni-multifiorisve, petalis calyce brevioribus, caule decumbente. W.

S. (*Alsine*) caule diffuso ramoso, foliis sessilibus, pedunculis lateralibus, petalis calyce brevioribus angustissimis bipartitis. *Hoffm. germ.* 153. *t.* 5.

S. (*fontana*) foliis oppositis ovali-lanceolatis, petalis bipartitis calyce brevioribus, pedunculis unifloris. *Wulfen in Iacq. Collect.* 1. *p.* 327. *

S. (*uliginosa*) caule diffuso procumbente ramosissimo, foliis lanceolatis basi ciliatis angustioribus, pedunculis ternis lateralibus, intermedio unifloro, lateralibus dichotomis paucifloris. *Roth. germ. I.* 191. *II.* 489.

S. (*aquatica*) foliis lanceolatis, petalis bipartitis calycem longitudine aequantibus. *Poll. palat. n.* 422.

S. (*Dilleniana*) foliis lanceolatis integerrimis, caule procumbente. *Leers. herb. n.* 331.

S. (*hypericifolia*) foliis ovato-lanceolatis integerrimis, pedunculis solitariis. *Wigg. primit. p.* 34. *Allion. pedem. n.* 1720.

Stellaria graminea γ. *Sp. pl.* 604.

Stellaria lateriflora. *Krock. sile. n.* 673. *t.* 4.

Alsine foliis lanceolatis, petalis bipartitis, petiolis unifloris. *Hall. helv. n.* 881.

Alsine foliis lanceolatis, caulibus procumbentibus ramosissimis. *Gerard. prov.* 403.

Alsine hypericifolia. *Vaill. paris.* 9.

Alsine aquatica media. *Bauh. pin.* 251.

Alsine longifolia uliginosis proveniens locis. *Bauh. hist.* 3. *p.* 365.

Caryophyllus holosteus angustifolius. *Bauh. pin.* 210. *prod.* 104. *n.* 6. *Burs. XI.* 2.

Sumpf Sternmiere. W.

*Habitat in* Germaniae, Austriae, Helvetiae, Galliae, Italiae, Angliae *paludibus.* ⊙ (v. v.)

*10. STELLARIA *undulata.*

S. foliis oblongis undulatis, caule angulato, floribus axillaribus. *Thumb. jap.* 185.

Wellenblättrige Stemmiere. W.

*Habitat in* Japonia *juxta vias.*

Caulis *decumbens herbaceus tenellus.* Rami *angulati*

*erecti parum ramulosi debiles glabri palmares.* Folia *opposita sessilia oblonga acuta undulata glabra, longitudine internodiorum semiunguicularia.* Flores *axillares et terminales bini ternique pedunculati.* Pedunculi *capillares uniflori foliis longiores.* Calyx *glaber.* Thunb. l. c.

11. STELLARIA *cerastoides.*

S. foliis oblongis pubescentibus, caule decumbente, pedunculis unifloris geminatis erectis, petalis calyce majoribus. W.

S. foliis oblongis, pedunculis subbifloris. *Fl. suec.* 2. *n.* 394. * *Gunn. norv. n.* 951. *t.* 6. *f.* 2. *Fl. dan.* 92. *Act. hafn.* 10. *t.* 3. *f.* 12. *Vahl. symb.* 3. *p.* 59. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 15. *t.* 15. *

Cerastium refractum. *Allion. pedem. n.* 1728.

Cerastium (*trigynum*) foliis lineari-ellipticis hirsutis, caule suberecto bifloro, floribus trigynis. *Vill. delph.* 3. *p.* 645. *t.* 46.

Myosotis foliis glabris lanceolatis, petiolis infractis *Hall. helv. n.* 890.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 609.

Hornkrautartige Sternmiere. W.

*Habitat in alpibus* Lapponiae, Helvetiae, Galliae. 24 (v. s.)

*12. STELLARIA *multicaulis.* W.

S. foliis lanceolatis glabris, ramis erectis simplicissimis, pedunculo subsolitario terminali, petalis calyce majoribus. W.

S. (*cerastoides*) foliis subpulposis obtuse lanceolatis, caulibus prostratis, iterato radicatis, ramis annuis erectis subtrifloris, pedunculis tandem infractis. *Wulfen in Jacq. Collect.* 1. *p.* 254. *t.* 19. *

Vielstielige Sternmiere. W.

*Habitat in alpibus* Carinthiae. 24 (v. s.)

Planta *a praecedente diversissima.* Radix *repens filiformis.* Rami *vel* caules *simplicissimi erecti numerosi e radice.* Folia *glabra.* Pedunculi *terminales solitarii gemini vel terni erecti. Differt praecipue a praecedente:* glabritie *foliorum et* pedunculis *terminalibus, quum illa pedunculos binos sub apice caulis procumbentis erectos proferat, denique* habitu *distincta.* W.

*13. STELLARIA *humifusa.*

S. foliis ovatis subsecundis sessilibus, caulibus procum-

bentibus tetragonis, pedunculis solitariis abbreviatis. *Swartz Nov. Act. holm.* 1789. *p.* 111. *t.* 4. *f.* 1. *

S. (*humifusa*) caulibus pluribus in orbem sparsis procumbentibus, foliis secundis ovatis apice conniventibus. *Rottb. Act. Haf.* 10. *p.* 447. *t.* 4. *Fl. dan. t.* 978.

S. (*humifusa*) foliis ovatis, floribus solitariis breviter pedunculatis, petalis bifidis, caulibus diffusis procumbentibus. *Retz. prod. Fl. scand. ed.* 2. *n.* 550.

Liegende Sternmiere. *W.*

*Habitat in alpibus* Sueciae, Norvegiae. ⊙

Petala *calyce paulo majora.* W.

## 14. STELLARIA *biflora*

S. foliis subulatis, ramis bipartitis, petalis emarginatis, calycibus striatis. *Swärz Nov. Act. holm.* 1788. *p.* 36. *t.* 1. *f.* 1. *

S. foliis subulatis, scapis subbifloris, petalis emarginatis, germinibus oblongis, calycibus striatis. *Fl. succ.* 2. *n.* 395. *

Sagina ramis erectis bifloris. *Fl. lapp.* 158. *Fl. dan. t.* 12. *Rottb. Act. Haf.* 10. *t.* 3. *f.* 11.

Moehringia scapis bifloris. *Fl. suec.* 1. *n.* 316? *Amoen. acad.* 2. *p.* 264?

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 609.

Zweyastige Sternmiere. W.

*Habitat in alpibus* Lapponicis. 2 (v. s.)

Planta *parva, facie Saginae.* Folia *radicalia subulata, in acervum congesta.* Caules *digitales, stiliformes, maxima parte nudi: superne bifidi in* 2 *pedunculos subjecto pari foliorum: altero pedunculo, in medio, foliolis duobus.*

Petala *leviter tantum emarginata, itaque arenariis proxima, magnitudine calycis.* W.

## 15. STELLARIA *groenlandica.*

S. caulibus decumbentibus subbifloris, foliis linearibus basi subciliatis, petalis emarginatis, fructibus globosis. *Retz. prod. Fl. scand. ed.* 2. *n.* 552.

Groenländische Sternmiere. W.

*Habitat in* Groenlandia.

Planta *pollicaris.* Folia *subcarnosa, nonnulla e caulibus margine pilis longis ciliata.* Flores *ratione plantae magni.* Calyces *nudi, foliolis ovatis obtusis.* Petala *minime bifida, vix emarginata.* Retz. l. c.

16. STELLARIA *Arenaria.*

S. foliis ſpathulatis, caule erecto bifido, ramis alternis, petalis emarginatis. *Sp. pl.* 604.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 610.
Sandkrautartige Sternmiere. W.
*Habitat in* Hiſpania. ⊙

Radix *fibroſa.* Caulis *erectus, teres, ſpithamaeus, pilis patulis pubeſcens et ſubglutinoſus.* Rami *alterni, longitudine fere caulis.* Folia *ſeſſilia, ſpathulata, apice ovato, baſin verſus linearia anguſtiora, ſubtus et margine piloſa, ſupra vero vix manifeſte. Primus* flos *e dichotomia caulis: reliqui ex alis ramorum alterni. Omnes majuſculi.* Pedunculi *recti, foliis longiores.* Calyx *viſcoſus uti tota planta, apicibus purpuraſcens, uti etiam folia floralia.* Corolla *campanulata, calyce longior, alba, obtuſiſſima petalis vix manifeſte emarginatis.* Stamina *alba, longitudine calycis. Antherae caeruleſcentes.* Germen *globoſum.* Styli *tres, longitudine ſtaminum.*

*17. STELLARIA *ſcapigera.*

S. acaulis, foliis lineari-lanceolatis trinerviis, pedunculis radicalibus unifloris. W.
Stielloſe Sternmiere. W.
*Habitat* - - - - 24 (v. ſ.)

*Accepi ſub hoc nomine ſpecimen hujus plantae, cujus patria mihi ignota.* Folia *ſunt ad radicem confertа ſemiuncialia lineari-lanceolata acuminata leviſſime trinervia, margine ſcabra.* Pedunculi *radicales erecti ſesquiunciales filiformes uniflori.* Calycis *foliola lanceolata margine ſubmembranacea acuta trinervia.* Petala *linearia ad baſin usque bifida longitudine calycis.* Stamina *petalis breviora.* Germen *globoſum.* Styli *tres filiformes.* Flos *ceterum magnitudine Stellariae graminеae.* W.

## 897. ARENARIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 774.

*Cal.* 5-phyllus, patens. *Petala* 5, integra. *Capſ.* 1-locularis, polyſperma.

1. ARENARIA *peploides.*

A. foliis ovatis acutis carnoſis. *Fl. ſuec.* 375, 396. *Fl.*

*lapp.* 149. *It. oel.* 151. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 160. *t.* 64. *Fabric. helmſt. p.* 184. *Reyg. ged.* 1. *p.* 119. *Hoffm. germ.* 153. *Roth. germ. I.* 183. *II.* 480.

Honkenya peploides. *Ehrh. Beitr.* 2. *p.* 181.

Alſine litoralis, foliis portulacae. *Bauh. pin.* 251. *Loeſ. pruſſ.* 12. *t.* 2.

Telephium maritimum, portulacae folio. *Buxb. act. petrop.* 3. *p.* 271.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 611.

Dickblättriges Sandkraut. W.

*Habitat ad littora maris* Europaei *borealia.* 24 (v. v.)

Glandulae *receptaculo.*

2. ARENARIA *tetraquetra.*

A. foliis ovatis carinatis recurvis quadrifariam imbricatis. *Sp. pl.* 605. *Allion. pedem. n.* 1718. *t.* 89. *f.* 1.

Caryophyllus ſaxatilis ericaefolius ramoſus repens. *Bauh. pin.* 211. *prodr.* 125. *Burſ. XI.* 135.

β. Gypſophila (*aggregata*) foliis mucronatis recurvatis, floribus aggregatis. *Sp. pl.* 2. *p.* 581. *Amoen. acad.* 3. *p.* 25. *Schreb. in Nov. Act. Acad. N. C. IV. p.* 140. *Mill. dict. n.* 1.

Saponaria calycibus pentaphyllis, floribus aggregatis, foliis mucronatis, canaliculatis, recurvis. *Hort. upſ.* 107.

Caryophyllus ſaxatilis, ericae foliis, umbellatis corymbis. *Bauh. pin.* 211. *prodr.* 105. *Raj. hiſt.* 1053. *Magn. monſp.* 53. *t.* 5.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 612.

Viereckiges Sandkraut. W.

*Habitat in* Pyrenaeis, Monſpelii. 24 (v. f.)

Caules *digitales, plures, ſimpliciſſimi.* Folia *carinata, recurvata, canaliculata, mucronata, margine cartilaginea, ſtriata, glabra, breviſſima, approximata, baſi ſubciliata et connata.* Capitulum *florum pedunculatum, faſtigiatum, ſubquinqueflorum floribus ſeſſilibus.* Calyx 5-*phyllus: foliolis lanceolatis: exterioribus majoribus.* Petala 5, *ſeſſilia, oblonga, obtuſa lineata.* Styli 3. Capſ. 1-*locularis,* 5-*valvis.* Semina *plura.* D. Schreber.

3. ARENARIA *biflora.*

A. foliis obovatis obtulis, caulibus procumbentibus, pedunculis bifloris lateralibus. *Mant.* 71. *Gouan. illuſtr.* 30. *Allion. ped. n.* 1699. *t.* 44. *f.* 1. *et t.* 64. *f.* 3.

A. foliis subcoriaceis obovatis basi ciliatis, caulibus prostratis ramosissimis diffusis, pedunculis lateralibus subbifloris, petalis calyce longioribus. *Wulfen in Iacq. Collect.* 1. *p.* 250. * *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 83. *Reiner et Hohenwarth. it.* 1. *p.* 158. *

Alsine caule erecto prostrato, foliis ovatis. *Hall. helv. n.* 877.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 612.

Zweyblütiges Sandkraut. W.

*Habitat in* Europae *australis alpinis.* 4 (v. f.)

Caules *procumbentes.* Folia (*Serpilli*) *subrotunda s. obovata, laevia, obtusa.* Pedunculi *laterales, foliis duplo longiores, bifidi et biflori:* Bracteis 2, *linearibus ad divisionem, ut et in altero pedicello.* Calyces *ovati.* Petala *alba.* Capsulae *subglobosae.*

## 4. ARENARIA *lateriflora.*

A. foliis ovatis obtusis, pedunculo laterali bifloro. *Sp. pl.* 615. *Gmel. sib.* 4. *p.* 159. *n.* 68.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 612.

Seitenblütiges Sandkraut. W.

*Habitat in* Sibiria.

Caulis *digitalis, filiformis, simplicissimus.* Folia *ovata, obtusa, subpetiolata, glabra.* Pedunculus *axillaris unicus, longus, bifidus.* Corolla *calyce longior.*

## 5. ARENARIA *trinervia.*

A. foliis ovatis acutis petiolatis nervosis. *Hort. cliff.* 173. *Fl. suec.* 374, 397. * *Roy. lugdb.* 471. *Oed. dan. t.* 429. *Gort. ingr.* 71. *Pollich. pal. n.* 425. *Hoffm. germ.* 154. *Roth. germ. I.* 188. *II.* 480.

Alsine foliis ovato-lanceolatis, trinerviis. *Hall. helv. n.* 878.

Alsine plantaginis folio. *Bauh. hist.* 3. *p.* 364.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 613.

Dreynerviges Sandkraut. W.

*Habitat in* Europae *sylvis.* ⊙ (v. v.)

## 6. ARENARIA *ciliata.*

A. foliis ovatis nervosis ciliatis acutis. *Sp. pl.* 608. *Oeder. dan. t.* 346. *Iacq. misc.* 2. *p.* 367. *

A. foliis oblongo-obovatis subpetiolatis ciliatis, corollis calyce majoribus, perianthii foliolis lanceolatis subnervosis. *Wulfen in Iacq. Collect.* 1. *p.* 245. *t.* 16. *f.* 2. * *Reiner et Hohenwarth. it.* 1. *p.* 162. *

Alsine serpilli folio, multicaulis et multiflora. *Segu. ver.* 1. *p.* 421. *t.* 5. *f.* 2.

β. Arenaria norvegica. *Gunn. norv. n.* 1100. *t.* 9. *f.* 7. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 614.

Gefranztes Sandkraut. W.

*Habitat in alpibus* Rhaeticis *et* Leontinis. 4 (v. f.)

*Cum* A. multicauli *combinat Haller.*

7. ARENARIA *balearica.*

A. foliis ovatis lucidis subcarnosis, caule repente, pedunculis unifloris. *Syst. nat.* 12. *app.* 230. *L'Herit. stirp.* 1. *p.* 29. *t.* 15.*

A. muscosa. *Medic. in Act. palat. vol.* 3. *phys. p.* 202. *t.* 12.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 614.

Moosartiges Sandkraut. W.

*Habitat in insulis* Balearibus. *Gerard. Zoega.* 4 (v. v.)

Caules *prostrati, repentes, radicantes, subpubescentes, ramosi, pollicares.* Folia *petiolata, confertiuscula, patentia, ovata, subcarnosa, enervia, lucida a pilis raris vix conspicuis paginae superioris.* Pedunculi *solitarii, e ramificationibus caulis, erecti, caule vix longiores, subpubescentes; inferne instructi pari foliorum.* Calyx *concavus, rufescens, pubescens.* Corolla *magnitudine et facie Spergulae nodosae.* Petala *obovata, integerrima, obtusa, patentia, unguiculata.* Stamina *et* Pistilla *etiam alba, longitudine calycis s. petalis dimidio breviora.* Germen *globosum, viride.*

Media *quasi inter* A. ciliatam *et* multicaulem, *sed* Pedunculi *longi,* Fructus *cernui.*

8. ARENARIA *multicaulis.*

A. foliis ovatis enerviis, sessilibus acutis: corollis calyce majoribus. *Sp. pl.* 605.

A. foliis pulposo-subcoriaceis ovato-lanceolatis sessilibus ciliatis, corollis calyce majoribus, perianthii foliolis ovato-lanceolatis subenerviis. *Wulfen. in Jacq. Collect.* 1. *p.* 248. *t.* 17. *f.* 1.*

A. foliis ovatis nervosis. *cet. Amoen. acad.* 1. *p.* 162. *n.* 155.

Alsine foliis ovato-lanceolatis ciliatis, petalis calyce majoribus. *Hall. helv. n.* 876. *t.* 17.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 615.

Vielstieliges Sandkraut. W.

*Habitat in alpibus* Helveticis, Auſtriacis, Pyrenaeis. 24 (v. ſ.)

Folia *magis minusve ciliata.* Flos *maximus. Iacq.* Arenariae *ciliatae varietatem faciunt Haller, Gerard.*

## 9. ARENARIA *ſerpillifolia.*

**A.** foliis ſubovatis acutis ſeſſilibus, corollis calyce brevioribus. *Fl. ſuec.* 373, 398. *Hort. cliff.* 173. *Roy. lugdb.* 451. *Pollich. pal. n.* 424. *Leers herb. n.* 325. *Gunn. norv. n.* 564. *Hoffm. germ.* 154. *Roth. germ. I.* 189. *II.* 481.

Alſine foliis ovato-lanceolatis, ſubhirſutis, petalis calyce brevioribus. *Hall. helv. n.* 875.

Stellaria ſerpillifolia. *Scop. carn. ed. 2. n.* 544.

Alſinanthemum. *Mich. hort.* 109.

Alſine minor multicaulis. *Bauh. pin.* 251.

Alſine minor. *Fuchſ. hiſt.* 23. *Tabernaem. p.* 708. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 615.

Quendelblättriges Sandkraut. W.

*Habitat in* Europae *ſylvis glareoſis.* ⊙ (v. v.)

*In hac et in* A. *trinervia* Petala *calyce dimidio breviora;* Capſula *cernua pedunculo horizontali, ut in Stellariis, apice ſexfariam dehiſcens.* Leers. l. c.

## *10. ARENARIA *procumbens.*

**A.** foliis lineari-lanceolatis, caulibus proſtratis villoſis, petalis calyce brevioribus. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 50. *t.* 33.*

**A.** (*geniculata*) foliis linearibus, floribus paniculatis pubeſcentibus, petalis calyce brevioribus. *Poiret. it. ed. germ.* 2. *p.* 196.*

Cherleria ſedoides. *Forſk. cat. pl. aegypt. p.* 66. *n.* 241.

Liegendes Sandkraut. W.

*Habitat in ruderatis* Tuneti *inque* Aegypto. 24 (v. ſ.)

*Ab A. montana differt:* caulibus *omnibus floriferis proſtratis, nec floriferis erectis,* corollis *quadruplo minoribus,* petalis *calyce brevioribus.* Vahl. l. c.

## *11. ARENARIA *polygonoides.*

**A.** foliis linearibus, caulibus procumbentibus, pedunculis biſloris terminalibus erectis, calycum ſubviſcidorum foliolis enerviis. *Wulfen in Iacq. Collect.* 1. *p.* 241. *t.* 15.* *Reiner et Hohenwarth. it.* 1. *p.* 165.*

Stellaria ciliata. *Scop. carn. n.* 536. *t.* 17.

Alſine foliis linearibus obtuſis, calycibus viſcidis. *Hall. helv. n.* 863.

Alsine polygonoides, foliis brevibus, flore albo. *Segu. veron.* 3. *p.* 177. *t.* 4. *f.* 1.
Knöterigartiges Sandkraut. W.
*Habitat in alpibus* Helvetiae, Carinthiae. ⊙ (v. f.)

12. ARENARIA *triflora.*

A. foliis lanceolato-subulatis ciliatis, ramis subtrifloris, petalis lineatis obtusis. *Mant.* 240. *Cavan. ic.* 3. *p.* 26. *t.* 249. *f.* 2. *
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 616.
Dreyblütiges Sandkraut. W.
*Habitat in* Europa *australi.* 4

Caules *palmares, copiosi, diffusi, adscendentes, teretes, subpubescentes: ramis alternis, erectis.* Folia *lanceolato-subulata (juniperina), patentia, acuminata, ciliata, subtus pubescentia: Floralia ovato-lanceolata, subtus pilosa.* Pedunculi *terminales, plures, teretes, pubescentes, articulis caulinis longiores, triflori.* Pedicellus *intermedius aphyllus: laterales longiores.* Bracteae 2, *ovatae, ciliatae; extus pubescentes.* Calyx *ovatus, acutus, erectus, pubescens.* Petala *obovata, oblonga, calyce duplo longiora, patentia, obtusa, alba, linerata.* Stamina *alba.* Pistillum *viride staminibus brevius.*

13. ARENARIA *montana.*

A. foliis lineari-lanceolatis scabris, caulibus sterilibus longissimis procumbentibus. *Amoen. acad.* 1. *p.* 272. *
Alsine foliis linearibus acuminatis, petalis florum integris calyce duplo longioribus. *Hom. obs.* 127.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 616.
Berg Sandkraut. W.
*Habitat in* Galliae *australis montibus.* 4 (v. f.)
Flores *maximi.* Fructus *penduli.*
*Allionii planta est diversa.* W.

14. ARENARIA *rubra.*

A. foliis filiformibus, stipulis membranaceis vaginantibus. *Fl. suec.* 376, 399. *Neck. gallob. p.* 198. *Pall. it.* 1. *p.* 170. *Pollich. pal. n.* 425. *Moench. hass. n.* 359.
Alsine foliis linearibus, stipulis ovato-lanceolatis argenteis. *Hall. helv. n.* 872.

*v.* A. *rubra, campestris.*

A. (*rubra*) caulibus prostratis, foliis oppositis filiformibus in ramulis duplo brevioribus, calycibus capsulis

aequalibus. *Roth. germ. I.* 189. *II.* 481. *Hoffm. germ.* 154.

Alsine, spergulae facie, minor s. Spergula minor, subcaeruleo flore. *Bauh. pin.* 251. *prodr.* 119.

Polygonum foliis gramineis, spergulae capitulis. *Loes. pruss.* 203. *t.* 63.

Spergula purpurea. *Bauh. hist.* 3. *p.* 722. Hall. R.

β. A. *rubra, marina.* *Flor. dan. t.* 740.

A. (*marina*) caulibus prostratis, foliis oppositis linearibus carnosis longitudine internodiorum, calycibus capsula dimidio brevioribus. *Roth. germ. I.* 189. *II.* 482. *Hoffm. germ.* 154.

Arenaria foliis linearibus longitudine internodiorum. *Hort. cliff.* 173. *Gron. virg.* 161. *Roy. lugdb.* 451.

Spergula marina nostras. *Raj. hist.* 1024.

Alsine spergulae facie media. *Bauh. pin.* 251.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 617.

Rothblühendes Sandkraut. W.

*Habitat* α *in* Europae *arenosis collibus*, β *in litoribus maritimis.* ☉ (v. v.)

Varietas β. *glabra, foliis pedunculisque pubescenti-viscidis.* Evigilat *hora* 9. Calyx *tegit dimidiam capsulam.*

Stamina 4, 5, 7, 8, 10 *observantur.* R.

Varietas a. *campestris, pistilla* 3 *et* 5, *stamina* 5; *antheris gemellis. Hall. l. c. et Fabric. butisb. p.* 59. R.

15. ARENARIA *media.* †

A. foliis linearibus carnosis, stipulis membranaceis, caulibus pubescentibus. *Sp. pl.* 606. *Ait. Kew.* 2. *p.* 102. *Houttuyn Lin. Pfl.* Syst. 6. *p.* 618.

Mittleres Sandkraut. W.

*Habitat in* Gallia, Anglia. ☉

*Simillima* A. rubrae maritimae, *sed minus ramosa, caulibus magis adscendentibus, pubescentibus.* Folia *carnosa, linearia, acutiuscula, supra depressiuscula, subtus convexa, pubescentia.* Flores *albi, petalis calyce vix majoribus.* Semina *margine membranaceo cincta.*

*Dubie propono plantam, quam Botanici germanici, ob synonyma falsa, cum Spergula pentandra conjunxere, et quam Hudsonius in Flora anglica p.* 193. *pro varietate Arenariae rubrae declarat; videtur tamen a binis nominatis plantis diversa.* W.

16. ARENARIA *bavarica.*

A. foliis ſemicylindricis carnoſis obtuſis, petalis lanceolatis, pedunculis terminalibus ſubbinatis. *Amoen. acad.* 4. *p.* 315. *

Alſine alpina, foliis teretibus obtuſis, flore albo. *Segu. veron.* 1. *p.* 429.

Saxifraga bavarica. *Raj. hiſt.* 1053.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 618.

Bayerſches Sandkraut. W.

*Habitat in* Bavaria, Baldo, Sibiria. 4

17. ARENARIA *gypſophiloides.*

A. foliis linearibus: radicalibus ſetaceis, panicula ſubpubeſcente, petalis lanceolatis. *Schreb. Act. Nov. Acad. N. C. tom. IV. p.* 139. *

Alſine orientalis, caryophylli folio, flore parvo albo. *Tournef. cor.* 17.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 619.

Gypſkrautartiges Sandkraut. W.

*Habitat in* Oriente. 4

Statura *A. ſaxatilis.* Caulis *erectus, ſemipedalis, laevis, articuli* 7 *ſ.* 8. Folia radicalia *copioſa, tenuiſſima ſ. ſetacea:* Caulina *majora, linearia, articulis longiora.* Panicula *terminalis, brachiata, dichotoma, ſubfaſtigiata, pedicellis ultimis ſubvilloſis.* Calyx *ovatus, duriuſculus, mucronatus.* Petala *lanceolata, alba, calyce triplo longiora.*

*18. ARENARIA *cucubaloides.*

A. foliis linearibus margine ſcabris, panicula dichotoma pubeſcente, petalis obovatis. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 17. *t.* 17. *

Alſine orientalis caryophylli folio, viſcoſa, flore magno albo. *Tournef. cor.* 17.

Alſine viſcoſa, longiſſimis et anguſtiſſimis foliis. *Amman. ruth.* 66?

Taubenkropfartiges Sandkraut. W.

*Habitat in* Armenia. 4 (v. ſ.)

*Differt ab A. gypſophiloide,* floribus *triplo majoribus*, petalis *obovatis nec lanceolatis.* Smith. l. c.

*19. ARENARIA *dianthoides.*

A. foliis linearibus margine ſcabris, bracteis ventricoſis pedunculos ſuperantibus. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 16. *t.* 16. *

Alsine orientalis caryophylli folio, flore magno in capitulum congesto. *Tournef. cor.* 17.
Nelkenartiges Sandkraut. W.
*Habitat in* Armenia. 24 (v. s.)

20. ARENARIA *saxatilis.*
A. foliis subulatis, caulibus paniculatis, calycis foliolis ovatis obtusis. *Sp. pl.* 607.
Alsine foliis linearibus, petalis calyce longioribus. *Hall. helv. n.* 867.
Arenaria foliis subulatis, calycinis laciniis membrana ipsis latiore acutis obtusis. *Guett. stamp.* 2. *p.* 281.
Spergula foliis aciformibus densis, ramis ramosis subnudis. *Sauv. monsp.* 45.
Alsine saxatilis et multiflora, capillaceo folio. *Vaill. paris.* 7. *t.* 2. *f.* 3. *Hall. opusc.* 113.
Alsine caryophylloide tenuifolia, flore albo punctato. *Pluk. alm.* 22. *t.* 7. *f.* 3.
Anthyllis lychnitis annua. *Barr. ic.* 580.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 619.
Felsen Sandkraut. W.
*Habitat in* Germania, Helvetia, Gallia, Sibiria. 24

*21. ARENARIA *caespitosa.*
A. foliis subulatis, caulibus paniculatis, calycis foliolis striatis acuminatis margine membranaceis, pedunculis pubescentibus. W.
Arenaria cespitosa. *Ehrh. herb.* 55. *Hoffm. germ.* 155.
Arenaria saxatilis. *Roth. germ. I.* 190. *II.* 484.
Alsine saxatilis et multiflora capillaceo folio. *Hall. goett. it. hercyn.* 15.
Alsine foliis conjugatis angustis linearibus, petalis integris. *Zinn. goett.* 195.
Rasenbildendes Sandkraut. W.
*Habitat in* Hercynia *in rupibus schisti* Goslariensibus. 24 (v. v.)
*Distinguo hanc cum Ehrharto a praecedente, cui simillima, ob* calyces *acuminatos, nec obtusos.* W.

22. ARENARIA *verna.*
A. foliis subulatis, caulibus paniculatis, calycibus acuminatis striatis. *Mant.* 72. *Iacq. aust.* 5. *p.* 2. *t.* 404.
Alsine glabra, tenuissimis foliis, floribus albis. *Herm. parad.* 12. *t.* 12.
Alsine pusilla, pulchro flore, tenuissima. *Raj. hist.* 1033.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 620.

Frühlings Sandkraut. W.
*Habitat in alpibus* Europae *auſtralioris.* 2l (v. v.)
*Differt ab A. ſaxatili* Caulibus *vix palmaribus, pilis raris adſperſis*; Pedunculis *piloſis*; Calycibus *acutis.*

23. ARENARIA *hiſpida.*
A. foliis ſubulatis ſubtus hiſpidis. *Sp. pl.* 608.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 620.
Rauhes Sandkraut. W.
*Habitat* Monſpelii *in monte calcaris.*
Habitus *Spergulae.* Caules *ſimplices, pilis raris adſperſi.* Folia *oppoſita, ſubulata, plana, ſubtus pilis raris hiſpida.* Panicula *primum dichotoma, mox alternis pedunculis ramoſa.*

*24. ARENARIA *verticillata.* W.
A. foliis ſubulatis ſpinoſis floribusque verticillatis. W.
Alſine orientalis fruticoſa ſaxatilis foliis et floribus verticillatis. *Tournef. cor.* 18.
Wirtelblütiges Sandkraut. W.
*Habitat in* Armenia *inter* Ezeram *et* Tocat. ♄ (v. f.)
Rami *teretes lignoſi pubeſcentes nodoſi.* Folia *ſubulata rigida apice mucronata* 3 *vel* 4 *confertim ex uno puncto provenientia, hinc faſciculata, et faſciculi ſunt oppoſiti, inde facies verticillata.* Pedunculi *quadriflori ſubcapitati axillares, ex oppoſitis foliorum faſciculis, formant verticillum.* Calycis *foliola linsari-ſubulata pungentia.* Petala *alba lanceolata.* W.

25. ARENARIA *juniperina.*
A. foliis ſubulatis ſpinoſis, caulibus erectis, calycibus ſtriatis, capſulis oblongis. *Mant.* 72. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 35. *t.* 35. *
Alſine orientalis fruticoſa camphoratae folio. *Tournef. cor.* 18.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 621.
Wachholderartiges Sandkraut. W.
*Habitat in* Armenia. 2l (v. f.)
Facies *A. ſaxatilis.* Caules *ſemipedales, ſtricti, laeves.* Folia *ſubulata, rigida, ſtricta, mucronato-ſpinoſa.* Flores *paniculati.* Calyces *oblongi, acuti, quinquenervii.* Petala *lanceolata, alba.* Capſulae *oblongae, calyce paulo longiores.*

26. ARENARIA *tenuifolia.*
A. foliis ſubulatis, caule paniculato, capſulis erectis, petalis calyce brevioribus lanceolatis. *Pollich. pal. n.*

427. *Fl. dan. t.* 389. *Hoffm. germ.* 155. *Roth. germ. I.* 190. *II.* 485.

Arenaria foliis subulatis, calycinis laciniis membrana ipsis angustiore auctis acutissimis. *Guett. stamp.* 2. *p.* 282.

Alsine tenuifolia. *Bauh. hist.* 3. *p.* 364. *Vaill. paris.* 7. *t.* 3. *f.* 1.

β. Alsine (*viscosa*) caule paniculato foliisque pubescentibus, petalis capsulisque calyce pubescente brevioribus *Schreb. spicil. p.* 30.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 621.

Dünnblättriges Sandkraut. W.

*Habitat in* Germania, Helvetia, Gallia, Anglia, Italia.

⊙ (v. v.)

Calycis *foliola multum acuminata s. aristata, subtus lineis* 2 *viridibus picta.* Petala *lato-lanceolata, calyce* $\frac{1}{2}$ *breviora.* Folia *subulata, basi connata.*

## 27. ARENARIA *laricifolia.*

A. foliis setaceis, caule superne nudiusculo, calycibus subhirsutis. *Sp. pl.* 607. *Jacq. aust.* 3. *p.* 39. *t.* 272.

Alsine foliis linearibus, angustissimis, calycibus tubulosis, villosis. *Hall. helv. n.* 869.

Stellaria laricifolia. *Scop. carn n.* 541. *t.* 18.

Alsine saxatilis, laricis folio, minor et minori flore. *Magnol. hort.* 11. *t.* 11.

Auricula muris pulchro flore, folio tenuissimo. *Bauh. hist.* 3. *p.* 360. *Hall.*

Alsine alpina, junceo folio. *Bauh. pin.* 251. *prodr.* 118.

Lychnoides, juniperi folio, perennis. *Vaill. paris.* 121.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 622.

Lerchenbaumblättriges Sandkraut. W.

*Habitat in montosis* Helvetiae, Genevae, Parisiorum, Monspelii. 24 (v. v.)

Calyx *oblongus, lineatus, cylindricus, pubescens.*

## 28. ARENARIA *recurva.*

A. foliis lineari-subulatis sulcatis recurvis fernadis, caulibus procumbentibus, pedunculis subbifloris terminalibus erectis, calycibus striatis. *Wulfen in Jacq. Collect.* 1. *p.* 244. *t.* 6. *f.* 1. *

A. (*recurva*) foliis radicalibus congestis recurvis subulatis, caule simplici subtrifloro. *Allion. pedem. n.* 1713. *t.* 89. *f.* 3.

Alsine foliis sulcatis recurvis, radicalibus linearibus congestis, caulinis lanceolatis. *Hall. helv. n.* 868.
Krummblättriges Sandkraut. W.
*Habitat in alpibus* Helvetiae, Italiae, Austriae, Moraviae. 4 (v. s.)

*29. ARENARIA *lanceolata.*
A. foliis lineari-lanceolatis trinerviis margine scabris appressis, calycibus lanceolatis nervosis. W.
Arenaria lanceolata. *Allion. pedem. n.* 1715. *t.* 26. *f.* 5.*
Lanzettenblättriges Sandkraut. W.
*Habitat in alpibus* Valdensibus. 4 (v. s.)

30. ARENARIA *striata.*
A. foliis linearibus erectis appressis, calycibus oblongis striatis. *Am. acad.* 4. *p.* 315.* *All. ped. n.* 1712. *t.* 26. *f.* 4.
Arenaria laricifolia. *Villars. delph.* 3. *p.* 629. *t.* 47.
Auricula muris pulchro flore, folio tenuissimo. *Bauh. pin.* 3. *p.* 361.
Caryophyllus saxatilis, polygoni minoris folio et facie. *Burs.* IX. 129.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 623.
Gestreiftes Sandkraut. W.
*Habitat in alpibus* Austriae *et* Vallis *augustae.* 4 (v. s.)

*31. ARENARIA *filifolia.*
A. caulibus suffruticosis, dichotomis, foliis setaceis, pedunculis terminalibus simplicibus unifloris. *Vahl. symb.* 1. *p.* 33. *t.* 12. *
A. (*filifolia*) foliis filiformibus liberis. *Forsk. descr.* 211.
Fadenblättriges Sandkraut. W.
*Habitat in* Arabia. 4

32. ARENARIA *fasciculata.*
A. foliis subulatis, caule erecto stricto, floribus fasciculatis, petalis brevissimis. *Iacq. austr.* 2. *t.* 182.
A. caule paniculato stricto dichotomo, foliis subulatis striatis, calycibus acuminatis nervosis striatis. *Gouan. illustr.* 30. R.
Stellaria rubra. *Scop. carn. n.* 538. *t.* 17. *sec. Iacq.* R. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 623.
Büschligtes Sandkraut. W.
*Habitat* Monspelii. *D. Gouan; in* Austria, Carniolia.
⊙ (v. v.)
Radix *annua.* Caulis *palmaris, pubescens.* Folia *linearia, acuminata, erecta, subciliata.* Flores *fasciculati, dichotomi, pedicellis brevissimis.* Calyx *ere-*

*ctus: Foliolis subulatis, erectis, striatis, subciliatis, longis.* Petala *ovato-oblonga, alba, minutissima.* Antherae *didymae, globosae.* Capsula *calyce dimidio brevior.* Habitus *Minuartiae.*

Planta *distincta ab* Alsine mucronata, *quae tenera, debilis, longa; accedit figura aliquatenus ad Hall. helv. t. 7. f. 2. sed Folia caulis floresque longiora, rigidiora crassiora (in mea) omnia. Plura vide sub Alsine mucronata. Spec. plant. 1. p. 1512.*

*33. ARENARIA *austriaca.*

A. foliis lincaribus, ramis erectis, pedunculis terminalibus longissimis binis, petalis obtusis emarginatis. W.

A. (*austriaca*) caulibus suffruticosis prostratis inde herbaceis et erectis, foliis subulatis, floribus geminis, petalis emarginatis. *Murr. syst. veg. ed. 14. p. 425. Iacq. anst. 3. t. 270. Allion. pedem. n. 1708. t. 64. f. 2.*

Arenaria triflora. *Vill. delph. 3. p. 623. t. 47.*

β. Stellaria (*biflora*) caulibus prostratis ramosissimis, ramis annuis erectis longissime bifloris, foliis linearibus acutis, calycibusque dorso trinerviis, petalis calyce longioribus crenato-bifidis. *Iacq. Collect. 1. p. 251. t. 13.**

Stellaria caule flaccido, foliis linearibus, pedunculis axillaribus subbifloris, altero ebracteato. *Gouan. illust. p. 30.*

Oestreichisches Sandkraut. W.

*Habitat in* Austriae *et* Italiae *alpibus.* 4 (v. s.)

*Varietas β: ut ex specimine sicco video, vix nisi foliis rigidioribus, diversa.* W.

34. ARENARIA *grandiflora.*

A. foliis subulatis planis strictis: radicalibus confertis, caulibus unifloris. *Sp. pl. 608. All. ped. n. 1711. t. 10. f. 1.*

A. foliis lanceolatis, cauliculis multifloris, foliolis calycinis inaequalibus, exterioribus cordato-ovatis latioribus. *Gouan. illustr. n. 30.*

Arenaria juniperina. *Vill. delph. 3. p. 624.*

Alsine foliis sulcatis, argute lanceolatis, petiolis unifloris. *Hall. helv. n. 874.*

Alsine uniflora et grandiflora, foliis acuminatis glabris, petalis integris. *Allion. spec. pedem. 49. t. 10. f. 1.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 6. p. 624.*

Grossblütiges Sandkraut. W.

*Habitat in montibus* Neocomensium, *alpibus* Valdensium, Cenisii, Monspelii. 4 (v. s.)

Calycis *foliola caulinis latiora, striis pluribus, rigida.* Capsulae *oblongae, longitudine calycis.* Varietas *caule trifloro missa a D. Turra.*

35. ARENARIA *liniflora.*

A. caulibus erectis inferne ramosis suffruticosis, foliis subulatis, floribus geminis. *Lin. suppl.* 241.

A. foliis subulatis, caulibus suffruticosis, floribus geminis. *Syst. veg. p.* 355. *Iacq. Coll.* 2. *p.* 107. *t.* 3. *f.* 3. Arenaria striata. *Vill. delph.* 3. *p.* 630. *t.* 47. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 624. Leinblütiges Sandkraut. W.

*Habitat in* Europa *australi.* 4

Caules *breves, distorti, perennantes.* Rami *ramuli, simplicissimi, erecti.* Folia *subulata, acuta, laevia.* Pedunculi *terminales, saepius* 2, *uno post alterum.* Calyx *foliolis lanceolatis: striis* 2. Petala *obovata, alba.*

Caules *perennantes breves plures ramosi distorti.* Rami *erecti simplicissimi teretes spithamaei.* Folia *subulata s. linearia teretia acuta laevia.* Pedunculi *terminales uniflori subpubescentes bini, unus post alterum.* Calyx *foliolis lanceolatis bistriatis subpubescentibus.* Corolla *magnitudine Lini alba.* Petala *ovata obtusa striata, calyce duplo longiora.* Stamina pistillaque *alba longitudine calycis.* Lin. suppl.

*Differt ab A. grandiflora* foliis *non plano-graminеis,* calyce *foliolis non multistriatis,* caule *multo longiore, basique suffruticoso.*

*56. ARENARIA *Gerardi.* W.

A. foliis lineari-subulatis trinerviis, floribus geminis terminalibus, calycinis foliolis acuminatis margine membranaceis trinerviis. W.

Arenaria liniflora. *Iacq. austr.* 5. *t.* 445.

A. foliis linearibus erectis subtus striatis, floribus fastigiatis inaequaliter pedunculatis. *Gerar. prov.* 405. *t.* 15. *f.* 1.

Gerardisches Sandkraut. W.

*Habitat in* Austriae *et* Galliae *alpibus.* 4 (v. s.)

*Differt ab A. grandiflora:* glabritie *partium,* caule *bifloro et aliis notis. Ab A. liniflora diversa:* caulibus *brevioribus,* calycibus *acuminatis,* petalis *calyce parum longioribus et toto habitu. Synonymum Gerardi, a Linnaeo perperam sub A. juniperina adductum re vera huc pertinere videtur.* W.

## 898. CHERLERIA.

*Gen. pl. edit. Schreb. n.* 775.

*Cal.* 5-phyllus. *Nectaria* 5, bifida, petaloidea. *Antherae* alternae, fteriles. *Capf.* 3-locularis, 5-valvis, trifperma.

1. CHERLERIA *fedoides.*

Cherleria. *Hall. helv. n.* 859. *t.* 29. *opufc.* 300. *t.* 1. *f.* 3. *Segu. ver.* 3. *p.* 180. *t.* 4. *f.* 3. *Iacq. auftr. t.* 284. *Scop. carn. n.* 531.

Knawel affinis. *Hall. comm. nor.* 1736. *hebd.* 13. *t.* 1. *f.* 5. R.

Lychnis alpina, mufcofis foliis denfius ftipatis, floribus parvis, calyce duriore. *Pluk. alm.* 253. *t.* 42. *f.* 8.

Sedum montanum perpufillum luteum. *Morif. hift.* 3. *p.* 471. *f.* 12. *t.* 6. *f.* 14.

Sedum montanum perpufillum, luteolis floribus. *Park. theatr.* 728.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syft.* 6. *p.* 625.

Sedumartige Cherlerie. W.

*Habitat in alpibus* Helvetiae, Valefiae, Gotthardo, Auftria, Carniolia. ♃ (v. f.)

Folia *oppofita, linearia, margine fcabra, bafi connata in vaginam; a cafu foliorum remanent vaginae cum carina foliorum, quibus caulis inferne obveftitur; hinc affinitas Caryophyllorum.*

## *899. DEUTZIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 776.

*Cal.* campanulatus 5-fidus. *Petala* 5 obtufa indivifa. *Filamenta* trifida. *Capf.* triariftata 3-locul. 3-valv. bafi dehifcens polyfperma.

*1. DEUTZIA *fcabra.*

D. fcabra. *Thunb. Diff. Nov. Pl. Gen.* 1. *p.* 20. *tab.* 1.* *Thunb. jap.* 185. *t.* 24. *

Joro. *Kaempf. amoen.* 854.

Scharfe Deutzie. W.

*Habitat in* Japonia. ♄

Rami *oppofiti.* Folia *oppofita ovata acuminata ferrata venofa fcaberrima.* Racemi *terminales.* W.

## *900. BRÜNNICHIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 777.*

*Cal.* ventricosus 5-fidus. *Cor.* 0. *Capſ.* trigona unilocularis monoſperma.

### *1. BRÜNNICHIA *cirrhoſa.*

B. cirrhoſa. *Gaert. ſem.* 1. *p.* 214. *t.* 45. *f.* 2.
Rankende Brünnichie. W.
*Habitat in* Bahama.

## 901. GARIDELLA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 778.

*Cal.* 5-phyllus, petaloideus. *Nectaria* 5, bilabiata, bifida. *Capſ.* 3, connexae, polyſpermae.

### 1. GARIDELLA *Nigellaſtrum.*

Garidella. *Hort. cliff.* 170. *Hort. upſ.* 108. *Roy. lugdb.* 481. *Mill. dict. Kniph. cent.* 10. *n.* 45.
G. foliis tenuiſſime divisis. *Garid. prov.* 203. *t.* 39.
Nigellaſtrum raris et foeniculaceis foliis. *Magn. hort.* 143. *t.* 143.
Nigella cretica, folio foeniculi. C. B. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 516. *ſ.* 12. *t.* 18. *f.* 6.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 626.
Nigellenartige Garidelle. W.
*Habitat in* Galloprovincia. ⊙ (v. v.)

## 902. MALPIGHIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 779.

*Cal.* 5-phyllus baſi extus poris binis melliferis. *Petala* 5, ſubrotunda, unguiculata. *Filamenta* baſi cohaerentia. *Drupa* 1-locularis tripyrena, nucibus monoſpermis.

### 1. MALPIGHIA *glabra.*

M. foliis ovatis integerrimis glabris, pedunculis umbellatis. *Hort. cliff.* 169. *Hort. upſ.* 108. *Roy. lugdb.* 459. *Mill. dict. n.* 1. *et ic. t.* 181. *f.* 2. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 406. *t.* 234. *f.* 1. *

M. fruticosa erecta, foliis nitidis ovatis acuminatis, floribus umbellatis, ramulis gracilibus. *Brown. jam.* 230.
Cerasus jamaicensis, fructu tetrapyreno. *Comm. hort.* 1. *p.* 145. *t.* 75.
Arbor baccifera, folio subrotundo, fructu cerasino sulcato rubro polypyreno: officulis canaliculatis. *Sloan. jam.* 172. *hist.* 2. *p.* 106. *t.* 207. *f.* 2. *Raj. dendr.* 74. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 645.
Glatte Malpighie. W.
*Habitat in* Jamaica, Brasilia, Surinamo, Curassao. ♄ (v. s. s. A.)

Umbellae *pedunculatae*, 4-*florae*. Pedicelli *geniculo unico*. Calyx 5-*phyllus*, *incurvus*, *basi subtus glandulis foliorum*: 1, *nulla*; 2, 3. *proximis priori*, *unica*; 4, 5, *geminis glandulis*. Petala 5, *unguiculata*, *subcordata*, *ciliata*, *patentia*. Styli 3. Stigmata *simplicia cum guttula*.

*2. MALPIGHIA *biflora*.
M. foliis oblongis integerrimis utrinque acutis glabris, pedunculis bifloris. W.
M. (*biflora*) foliis ovato-lanceolatis acutissimis, pedunculis bifloris. *Lamarck encyclop.* 4. *p.* 303. *
M. (*punicifolia*) foliis ovatis acutis glabris, pedunculis bifloris. *Cavan. diss.* 8. *p.* 406. *t.* 234. *f.* 2. *
Zweyblütige Malpighie. W.
*Habitat in sylvis* Americae *calidioris*. ♄

3. MALPIGHIA *punicifolia*.
M. foliis ovatis integerrimis glabris, pedunculis uniforis. *Sp. pl.* 609. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 303. *
M. foliis ovatis integerrimis glabris. *Hort. upsal.* 108.
Malpighia fruticosa erecta, ramulis gracilibus patentibus, floribus solitariis. *Brown. jam.* 230.
Malpighia mali punici facie. *Plum. gen.* 46. *t.* 166. *f.* 2.
Cerasus americana, myrti conjugatis foliis, fructu acerbo tetrapyreno. *Pluk. alm.* 94. *t.* 157. *f.* 4.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 646.
Granatblättrige Malpighie. W.
*Habitat in* America *meridionali*. ♄

*4. MALPIGHIA *fagined*.
M. foliis oblongo-ovatis integerrimis, subtus sericeo-nitentibus, pedunculis tripartito-umbellatis. *Swartz prod.* 74. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 850. *
Buchenblättrige Malpighie. W.

*Habitat in insula* Grenada Americes. ♄

*5. MALPIGHIA *glandulosa.*

M. foliis ovato-ellipticis acuminatis integerrimis glabris, basi biglandulosis, racemis axillaribus. W.

M. foliis lanceolatis acuminatis basi biglandulosis: floribus racemosis monogynis. *Cavan. diss.* 8. *p.* 411. *t.* 239. *f.* 2. *

β. M. (*glandulifera*) foliis ovatis subintegerrimis, utrinque pilis decumbentibus obsessis, racemis axillaribus, pedicellis superne glandula truncata instructis. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 469. *Collect.* 4. *p.* 207. *et Collect. suppl. tab.* 5. *f.* 3.

Drüsige Malpighie. W.

*Habitat in* Antillis; β. *in sylvis ad* Caracas. ♄

*Varietas* β. *differt modo* foliis *latioribus pubescentibus uniglandulosis.* W.

*6. MALPIGHIA *tuberculata.*

M. foliis ovato-lanceolatis integerrimis subpubescentibus, racemis lateralibus, ramis tuberculatis. W.

M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis, utrinque parcissime pilosis, racemis axillaribus, ramis tuberculatis. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 54. *t.* 104. *

Warzige Malpighie. W.

*Habitat ad* Caracas Americes. ♄

7. MALPIGHIA *nitida.*

M. foliis oblongis acuminatis integerrimis glabris, racemis axillaribus, floribus monogynis. W.

M. foliis lanceolatis integerrimis glabris, spicis lateralibus. *Sp. pl.* 609. *Swartz obs.* 180. *

M. foliis lanceolatis acuminatis eglandulosis utrinque nitidis, floribus racemosis monogynis. *Cavan. diss.* 8. *p.* 411. *t.* 239. *f.* 1. *

M. foliis oblongo-ovatis utrinque nitidis, racemis axillaribus. *Iacq. amer.* 136.

M. humilis et minus divisa, foliis ovatis nitidis, baccis durioribus. *Brown. jam.* 230.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 647.

Glänzende Malpighie. W.

*Habitat in* Jamaicae *apricis cretaceis.* ♄

Stylus *unicus. Iacq.*

*8. MALPIGHIA *Armeniaca.*

M. foliis ovato-oblongis acutis integerrimis coriaceis glabris, racemis axillaribus. W.

M. foliis ovato-lanceolatis magnis, spicis longis axillaribus, fructu armeniaco. *Cavan. diss.* 8. *p.* 410. *t.* 238. *
Apricosenfrüchtige Malpighie.
*Habitat in regno* Peruviano *in* Chancae *provincia.* ♄
Fructus *facie, magnitudine et colore refert Prunum Armeniacam.* W.

*9. MALPIGHIA *dubia.* †
M. foliis oblongis acutiusculis integerrimis glabris, racemis axillaribus terminalibusque, ramis punctatis. W.
M. foliis ovato-acutis cartilagineis glabris, floribus racemosis minimis, ramis punctatis. *Cavan. diss.* 8. *p.* 413. *t.* 242. *
Zweifelhafte Malpighie. W.
*Habitat in insula* St. Dominici. ♄
Fructus *adhuc ignotus, forte Banisteriae species.* W.

10. MALPIGHIA *urens.*
M. foliis oblongo-ovatis: setis decumbentibus rigidis, pedunculis unifloris aggregatis. *Mill. dict. n.* 4. *et ic. t.* 181. *f.* 1. *Cavan. diss.* 8. *p.* 407. *t.* 235. *f.* 1. *
M. foliis oblongis hispidis, racemis alaribus. *Brown. jam.* 229.
M. latifolia, folio subtus spinoso. *Plum. gen.* 46. *t.* 167. *f.* 1.
Mespilus americana, folio lato subtus spinoso, fructu rubro. *Tournef. inst.* 642.
Arbor baccifera, folio oblongo subtilissimis spinis subtus obsito, fructu cerasino sulcato polypyreno: officulis canaliculatis. *Sloan. jam.* 172. *hist.* 2. *p.* 105. *t.* 207. *f.* 3. *Raj. dendr.* 74.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 648.
Brennende Malpighie. W.
*Habitat in* America *calidiore.* (v. s. s. fl.)
Folia *ovato-oblonga, integerrima, subpetiolata, adspersa, imprimis subtus, setis rigidis adpressis pungentibus, geminis: altera anteriore.* Stipulae *utrinque* 2. Flores *axillares utrinque* 4, *pedunculis unifloris, geniculo instructis.*

11. MALPIGIIIA *angustifolia.*
M. foliis lineari-lanceolatis: setis utrinque decumbentibus rigidis, pedunculis umbellatis. *Sp. pl.* 610. *Mill. dict. n.* 7. *Cavan. diss.* 8. *p.* 408. *t.* 236. *f.* 1. *
M. (*linearis*) foliis lanceolato-linearibus, setis decumbentibus utrinque rigidis. *Jacq. amer. p.* 135.

M. anguſtifolia, folio ſubtus ſpinoſo. *Plum. gen.* 46
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 649.
Schmalblättrige Malpighie. W.
*Habitat in* America *meridionali.* ♄

*12. MALPIGHIA *caneſcens.*
M. foliis oblongis obtuſis pubeſcentibus, racemis axillaribus compoſitis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 105.
Graue Malpighie. W.
*Habitat in* India *occidentali.* ♄

13. MALPIGHIA *craſſifolia.*
M. foliis obovatis acutis integerrimis ſubtus tomentoſis, racemis terminalibus. W.
M. foliis ovatis integerrimis ſubtus tomentoſis, racemis terminalibus. *Sp. pl.* 610. *Aubl. guj.* 1. *p.* 457. *t.* 182.*
*Swartz obſ.* 181.
M. arborea, foliis ſubrotundis alternis inferne ſublanuginoſis, ſpicis craſſis compoſitis terminalibus. *Brown. jam.* 231.
M. latifolia, cortice ſanguineo. *Barr. aequin.* 72?
β. M. (*Moureila*) foliis ovatis ſubtus tomentoſis, floribus luteis ſpicatis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 459. *t.* 183. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 412. *t.* 241.*
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 650.
Dickblättrige Malpighie. W.
*Habitat in* America *calidiore.* ♄
Arbor. Foliis *ovatis palmaribus craſſis ſubpetiolatis integerrimis, ſupra pubeſcentibus, ſubtus tomentoſis, ſaepius alternis.* Racemi *terminales longi tomentoſi.*

*14. MALPIGHIA *ſpicata.*
M. foliis lanceolatis integerrimis ſubtus ſubtomentoſis, racemis terminalibus. W.
M. foliis lanceolatis. deſuper ferrugineis, ſpicis terminalibus, petalis haſtatis. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 409. *t.* 237.*
Aehrentraubige Malpighie. W.
*Habitat in inſula* St. Dominici. ♄

*15. MALPIGHIA *altiſſima.*
M. foliis oblongis acuminatis obtuſis integerrimis, ſetis decumbentibus tectis, ſubtus tomentoſis, racemis terminalibus. W.
M. foliis ovato-oblongis ſubtus tomentoſis, floribus al-

bis ſpicatis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 455. *t.* 181. * *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 415.
Höchſte Malpighie. W.
*Habitat in ſylvis* Gujanae. ♄

16. MALPIGHIA *verbaſcifolia.*
M. foliis obovatis acutis integerrimis utrinque tomentoſis, racemis terminalibus. W.
M. foliis lanceolato-ovatis tomentoſis integerrimis, racemis terminalibus. *Sp. pl.* 610. *Aubl. guj.* 1. *p.* 460. *t.* 184. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 411. *t.* 240.
M. humilis, verbaſci folio et facie, caule craſſiſſimo. *Barr. aequin.* 71.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 650.
Müllenblättrige Malpighie. W.
*Habitat in* America *calidiore.* ♄
Folia *lanceolato-ovata, in petiolos deſinentia, pedalia, villoſa, ſubtus denſiſſimo tomento veſtita.* Racemi *terminales, longi, villoſi.*

*17. MALPIGHIA *lucida.*
M. foliis obovatis cuneiformibus integerrimis aveniis nitidis, racemo terminali. *Swartz prod.* 74. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 852. * *Mill. dict.*
Polirte Malpighie. W.
*Habitat in* India *occidentali.* ♄

*18. MALPIGHIA *coriacea.*
M. foliis ovatis acutis integerrimis utrinque glabris, racemis terminalibus ſpicatis. *Swartz prod.* 74. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 854.
M. arborea, floribus ſpicatis, foliis ovatis acuminatis. *Brown. jam.* 256.
Tiliae affinis laurifolia, arbuti floribus albis racemoſis, odoratis, fructu pentagono. *Sloan. jam.* 136. *hiſt.* 2. *p.* 29. *t.* 163. *f.* 1.
Lederblättrige Malpighie. W.
*Habitat in fruticetis montium* Jamaicae *auſtralis.* ♄

19. MALPIGHIA *aquifolia.*
M. foliis lanceolatis dentato-ſpinoſis ſubtus hiſpidis. *Sp. pl.* 611. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 409. *t.* 236. *f.* 2.
M. ilicifolia. *Mill. dict. n.* 8. *deſcriptio n.* 9.
M. anguſtis et acuminatis aquifolii foliis. *Plum. gen.* 16. *ic.* 168. *f.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 651.

Hülſenblättrige Malpighie. W.
*Habitat in* America *calidiore.* ♄

20. MALPIGHIA *coccifera.*
M. foliis ſubovatis dentato-ſpinoſis. *Sp. pl.* 611. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 408. *t.* 235. *f.* 2. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 470. *Collect.* 2. *p.* 311. *
M. humilis, ilicis coccigiandiferae foliis. *Plum. gen.* 46. *ic.* 168. *f.* 2.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 652.
Stachelblättrige Malpighie. W.
*Habitat in* Ameria *calidiore.* ♄ (v. ſ. ſ. A.)
Planta *junior profert folia elliptica absque dentibus ſpinoſis, qualem depinxit Lamarck illuſt. gen. t.* 381. *f.* 2. W.

## 903. BANISTERIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 780.

*Cal.* 5-partitus, baſi extus poris binis melliferis. *Petala* ſubrotunda, unguiculata. *Filamenta* baſi cohaerentia. *Samarae* 3, 1-ſpermae apice ſimpliciter alatae.

1. BANISTERIA *anguloſa.*
B. foliis cordatis panduriformibus anguloſis, petiolis biglandulosis, umbella terminali. W.
B. foliis ſinuato-anguloſis. *Sp. pl.* 611. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 426. *t.* 252. *
Acer ſcandens, folio anguloſo. *Plum. ſpec.* 18.
Clematis anguloſo folio, aceris fructu. *Plum. amer.* 77. *t.* 92. *Raj. ſuppl.* 328.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 591.
Eckige Baniſterie. W.
*Habitat in* America *calidiore.* ♄

*2. BANISTERIA *palmata.* †
B. foliis cordatis quinquelobo-palmatis, ſubtus tomentoſis, petiolis biglandulosis. W.
B. caula volubili, foliis palmatis ſubtus tomentoſis, petiolis biglandulosis. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 430. *t.* 257. *f.* 2. *
Handförmige Baniſterie. W.
*Habitat in inſula* St. Domingo. ♄

*3. BANISTERIA *ſagittata.* †
B. foliis haſtato-ſagittatis, lobis truncatis, ſubtus tomentoſis, petiolis biglandulosis. W.

B. caule volubili, foliis ſagittatis magnis ſubtus tomentoſis, petiolis biglanduloſis. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 430. *t.* 257. *f.* 3. *

Pfeilblättrige Baniſterie. W.

*Habitat in inſula* St. Domingo. ♄

*4. BANISTERIA *auriculata.*

B. foliis cordato-ſagittatis glabris, petiolis biglanduloſis, umbella terminali. W.

B. caule volubili, foliis ſubſagittatis glabris, lobis rotundatis, floribus umbellatis. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 428. *t.* 255. *

Ampferblättrige Baniſterie. W.

*Habitat in* Braſilia *prope* Rio Janeiro. ♄

*5. BANISTERIA *ciliata.*

B. foliis orbiculato-cordatis ciliato-denticulatis glabris, peticlis biglanduloſis, umbella terminali. W.

B. foliis cordato-ſubrotundis auriculatis glabris, margine ciliatis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 364.* *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 427. *t.* 254. *

Gefranzte Baniſterie. W.

*Habitat in* Braſilia. ♄

*6. BANISTERIA *emarginata.*

B. foliis ellipticis ſubcordatis obtuſis emarginatis mucronatis ſubtus tomentoſis, petiolis biglanduloſis, racemis terminalibus axillaribusque. W.

B. foliis ovatis ſubcordatis apice emarginato-cuſpidatis, deſuper tomentoſis, floribus racemoſo-corymboſis. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 425. *t.* 249. *

Ausgerandete Baniſterie. W.

*Habitat in* America. W.

Caulis *dichotomus.* Racemi *corymboſi in apice ramorum et in dichotomia caulis.* W.

*7. BANISTERIA *Quapara.*

B. foliis ovatis acutis, ſubtus tomentoſis, umbella pedunculata axillari. W.

B. foliis ovatis, ſubtus tomentoſis, floribus corymboſis, ſeminibus erectis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 464. *t.* 186. * *Cavan. diſſ. p.* 425. *t.* 250. *

Winkeldoldige Baniſterie. W.

*Habitat ad pratorum margines* Gujanae. ♄

*8. BANISTERIA *ſinemarienſis.*

M. foliis ovatis acuminatis glabris ſetis adpreſſis tectis, umbellis racemoſis axillaribus. W.

B. foliis ovatis acuminatis, floribus luteis corymbosis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 462. *t.* 185. * *Cavan. diss.* 9. *p.* 425. *t.* 251. *

Sinemarienſiſche Baniſterie. W.

*Habitat in* Gujana *ad pratorum margines.* ♄

Racemi *axillares ex umbellis pedunculatis compoſiti.* W.

9. BANISTERIA *purpurea.*

B. foliis ſubrotundo-ovatis obtuſis glabris, racemis axillaribus terminalibusque. W.

B. foliis ovatis, ſpicis lateralibus, feminibus erectis. *Sp. pl.* 611. *Cavan. diss.* 9. *p.* 423. *t.* 246 *f.* 1.*

B. foliis pinnatis: foliolis ovatis, ſpicis lateralibus, feminibus erectis. *Mill. dict. n.* 7.

Acer ſcandens, pſeudoacaciae folio, flore purpuraſcente. *Plum. ſpec.* 18. *ic.* 15.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 592.

Purpurfarbene Baniſterie. W.

*Habitat in* America *meridionali.* ♄ (v. ſ.)

*10. BANISTERIA *microphylla.* †

B. foliis ellipticis utrinque rotundatis glabris, racemis terminalibus ſubpaniculatis. W.

B. foliis oblongis obtuſis rigidis, racemis terminalibus. *Iacq. obſ.* 3. *p.* 7. *t.* 56. *

Kleinblättrige Baniſterie. W.

*Habitat in* Carolina? ♄

*11. BANISTERIA *chryſophylla.*

B. foliis elliptico-ovatis acutis ſubtus tomentoſis, corymbis axillaribus. W.

B. foliis ovato-oblongis acutiuſculis, verſus apicem obſolete ſinuatis, ſubtus tomentoſo-nitidis aureis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 364. *

B. ramis tuberculatis, foliis ovato-acutis, deſuper tomentoſo-aureis, alis longiſſimis. *Cavan. diss.* 9. *p.* 422. *t.* 245. *

B. foliis oblongis acutis, ſuperne repandulis, ſupra glaberrimis, ſubtus tomentoſo-nitidiſſimis, floribus paniculatis axillaribus. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 55. *t.* 105. *

Goldblättrige Baniſterie. W.

*Habitat in* Braſilia *etiam ad* Caracas. ♄

12. BANISTERIA *laurifolia.*
B. foliis ovato-oblongis rigidis, racemis terminalibus.
*Sp. pl.* 611. *Mill. dict. Swartz obſ.* 182. *
Acer ſcandens, foliis laurinis. *Sloan. jam.* 137. *hiſt.* 2. *p.* 26. *Raj. dendr.* 94.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 592.
Lorbeerblättrige Baniſterie. W.
*Habitat in* Jamaicae *et* Hiſpaniolae *fruticetis montium.* ♄

*13. BANISTERIA *coerulea.*
B. foliis elliptico-ovatis acutis glabris, racemis terminalibus paniculatis. W.
B. foliis ovatis acutis, racemis axillaribus brachiatis, capſulis trinis monopteris divaricatis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 363. *
B. ramis tuberculatis, foliis ovato-acutis coriaceis, racemis florum axillaribus. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 421. *t.* 243. *
Acer ſcandens foliis citri, flore coeruleo ſpicato. *Plum. ſpec.* 18. *ic.* 14.
Blaue Baniſterie. W.
*Habitat in inſulis* Jamaica *et* St. Dominici. ♄

*14. BANISTERIA *nitida.*
B. foliis lanceolatis ſubtus argenteis, racemis terminalibus paniculatis. W.
B. foliis ovato-oblongis integerrimis ſubtus nitidis, panicula terminali foliola. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 364. *
*Cavan. diſſ.* 9. *p.* 422. *t.* 244. *
Silberglänzende Baniſterie. W.
*Habitat in* Bratilia. ♄

*15. BANISTERIA *muricata.*
B. foliis ovatis ſubtus tomentoſis, racemis paniculatis terminalibus, ſamaris quinque aculeatis. W.
B. foliis ovato-acutis ſubtus tomentoſis, florum racemis axillaribus, ſcrotulis muricatis. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 423. *t.* 246. *f.* 2. *
Stachelfrüchtige Baniſterie. W.
*Habitat in* Peru. ♄
Samara *quaelibet baſi quinque aculeis brevibus eſt armata.* W.

*16. BANISTERIA *leona.*
B. foliis ovato-oblongis acuminatis coriaceis reticulato-venoſis glabris, ramis paniculatis terminalibus. W.
B. ramis tuberculatis, foliis ovatis apice acuminatis co-

riaceis, floribus paniculatis. *Cavan. diss.* 9. *p.* 424. *t.* 247. *

Netzblättrige Banisterie. W.

*Habitat in* Sierra Leone. ♄

*17. BANISTERIA *fericea.* †

B. foliis ellipticis obtusis cuspidatis subtus tomentosis, petiolis biglandulosis, racemis paniculatis terminalibus. W.

B. ramis ancipitibus, foliis ovatis subtus tomentosis, petiolis biglandulosis, floribus racemosis. *Cavan. diss.* 9. *p.* 429. *t.* 258. *

Seidenartige Banisterie. W.

*Habitat in* Brasilia. ♄

*18. BANISTERIA *ferruginea.*

B. foliis ovatis acuminatis subtus ferrugineis, racemis paniculatis, ramulis squamosis. W.

B. foliis ovato-acuminatis subtus ferrugineis, floribus paniculatis, horum ramulis stipulatis, stipulis imbricatis. *Cavan. diss.* 9. *p.* 424. *t.* 248. *

Roſtfarbene Banisterie. W.

*Habitat in* Brasilia *ad* Rio Janeiro. ♄

*19. BANISTERIA *longifolia.*

B. foliis oblongis acuminatis rigidis nitidis, panicula terminali, ramis patentissimis. *Swartz prod.* 75. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 856. *

Langblättrige Banisterie. W.

*Habitat in* Caribaeis *in* St. Luciae. ♄

20. BANISTERIA *dichotoma.*

B. foliis ovatis, racemis dichotomis. *Sp. pl.* 612.

B. foliis ovatis, ramis dichotomis, seminibus extrorsum tenuioribus, introrsum lacinulam emittentibus. *Hort. cliff.* 169. *

B. (*convolvulifolia*) foliis ovatis acumine productis glabris, floribus umbellatis. *Cavan. diss.* 9. *p.* 428. *t.* 256? *

Acer scandens, convolvuli folio, flore ex aureo cinereo. *Plum. spec.* 18. *ic.* 13.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 595.

Gabelförmige Banisterie. W.

*Habitat in* America *calidiore.* ♄

*21. BANISTERIA *ovata.*

B. foliis ovato-lanceolatis subtus subvillosis, petiolis biglandulosis, ramis divaricatis, umbellis terminalibus. W.

B. caule volubili, foliis ovatis acutis integerrimis, floribus umbellatis, involucris ſtipulaceis. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 429. *t.* 257. *f.* 1. *

Eyförmige Baniſterie. W.

*Habitat in inſula* St. Dominici. ♄

22. BANISTERIA *fulgens.*

B. foliis ſubovatis ſubtus tomentoſis, racemis brachiatis, pedunculis umbellatis. *Sp. pl.* 612.

B. foliis ovatis, ramis ramoſis, ſeminibus extrorſum tenuioribus, introrſum lacinulam emittentibus. *Hort. cliff.* 169. *

B. foliis orbiculatis, petiolis biglandulis, ſeminibus unialatis rugoſis, racemis ſubumbellatis alaribus. *Brown. jam.* 231.

Triopteris americana ſcandens, fructu fulgente majore aureo. *Pluk. mant.* 185.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 594.

Ausgebreitete Baniſterie. W.

*Habitat in* America. ♄

*23. BANISTERIA *heterophylla.* W.

B. foliis ſubtus tomentoſis orbiculato-cordatis, ramis divaricatis ſubrotundis, petiolis biglandulosis, umbella terminali ſeſſili. W.

B. (*fulgens*) caule volubili, foliis orbiculatis ſubtus tomentoſis ſericeis, petiolis biglandulosis. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 426. *t.* 253. *

Baniſteria fulgens. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 363. *

Acer ſcandens minus apocyni facie, folio ſubrotundo. *Sloan. jam.* 138. *hiſt.* 2. *p.* 27. *t.* 162. *f.* 2. *Raj. dendr.* 94.

Verſchiedenblättrige Baniſterie. W.

*Habitat in* Jamaica, St. Domingo, Guadalupe.

24. BANISTERIA *brachiata.*

B. foliis ſubovatis, ramis brachiatis, ſeminibus introrſum anguſtioribus. *Sp. pl.* 612.

B. foliis ſubovatis, ramis ramoſis, ſeminibus introrſum tenuioribus nullam lacinulam emittentibus. *Hort. cliff.* 169. *

B. foliis ovatis acuminatis, floribus laxe ſpicatis, ramis diffuſis ſcandentibus. *Mill. dict.*

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 594.

Ausgebreitete Baniſterie. W.

*Habitat in* America.

## 904. HIRAEA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 781.

*Cal.* 5-phyllus, absque poris melliferis. *Pet.* subrotunda, unguiculata. *Filamenta* basi cohaerentia. *Samarae* 3, 1-spermae bialatae s. ala circumdatae.

1. HIRAEA *reclinata.*

H. foliis simplicibus obovatis obtusis superne pubescentibus, inferne glabris. W.

Hiraea. *Jacq. amer.* 137. *t.* 176. *f.* 42.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 595.

Zurückgebogene Hiraea. W.

*Habitat* Carthagenae *in sylvis.* ♄

*2. HIRAEA *odorata.* W.

H. foliis simplicibus ovatis acutis superne glabris, inferne tomentosis. W.

Wohlriechende Hiraea. W.

*Habitat in* Guinea. ♄ (v. s.)

Folia *opposita ovata acuta integerrima venosa superne atro-viridia glabra, inferne tomento flavescenti villoso adpresso tecta.* Racemi *copiosi ad ramorum apicem in omnium foliorum axillis formant paniculam foliaceam terminalem.* Pedunculi *et* Pedicelli *pubescentes.* Flores *non vidi, secundum Clariss. Isert, fragrantes.* Fructus *exacte sequentis speciei.* W.

*3. HIRAEA *pinnata.*

H. foliis impari-pinnatis, foliolis ovato-oblongis alternis utrinque glabris. W.

Flabellaria paniculata. *Cavan. diss.* 9. *p.* 436. *t.* 264.*

Gefiederte Hiraea. W.*

*Habitat in* Sierra Leone. ♄

## 905. TRIOPTERIS.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 782.

*Cal.* 5-partitus basi extus poris 2 melliferis. *Petala* subrotunda unguiculata. *Filamenta* basi cohaerentia. *Samarae* 3, 1-spermae 3-s. 4-alatae.

1. TRIOPTERIS *jamaicensis.*

T. foliis oblongis acuminatis venosis nitidis, racemis

compositis terminalibus laxis, fructibus trialatis. *Swartz obs.* 183. *

Triopteris jamaicensis. *Sp. pl.* 612.

Triopteris. *Hort. cliff.* 169. *

Banisteria capsulis trialatis, foliis ovato-acuminatis, racemis terminalibus. *Brown. jam.* 231.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 596.

Jamaischer Dreyflügel. W.

*Habitat ad sepes* Jamaicae, Hispaniolae. ♄

Caulis *volubilis.* Fructus *Banisteriae.* Capsulae 3, *distinctae, monospermae, trialatae.*

*2. TRIOPTERIS *indica.* W.

T. foliis subrotundo-ovatis subcordatis acuminatis nitidis glabris, racemis compositis terminalibus, fructibus trialatis. W.

Indischer Dreyflügel. W.

*Habitat in* India *orientali.* ♄ (v. s.)

Folia *opposita petiolata quadriuncialia subrotundo-ovata acuminata, basi leviter cordata integerrima utrinque glabra, supeme nitida.* Petioli *pubescentes eglandulosi.* Folia *juniora pubescentia.* Panicula *e racemis composita terminalis stricta.* Pedunculi, pedicelli *et* calyces *pubescentes.* Samarae *tres trialatae.* Alae *obtusae glabrae, aequales venosae.* W.

*3. TRIOPTERIS *ovata.*

T. foliis ovatis obtusiusculis subcordatis glabris, petiolis biglandulosis, racemis compositis terminalibus, fructibus trialatis. W.

T. (*ovata*) foliis ovatis subcordatis integerrimis glabris, floribus paniculatis. *Cavan. diss.* 9. *p.* 431. *t.* 259. *

Eyförmiger Dreyflügel. W.

*Habitat in insula* St. Dominici. ♄

*4. TRIOPTERIS *rigida.*

T. foliis subrotundis acutis marginatis lineatis coriaceis, racemis compositis axillaribus, fructibus trialatis. *Swartz. prod.* 75. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 859. *

Steifer Dreyflügel. W.

*Habitat in fruticetis montosis* Hispaniolae. ♄

*Proxima T. jamaicensi, sed* foliis *rotundioribus rigidissimis lineatis diversissima.* Swartz l. c.

*5. TRIOPTERIS *acutifolia.*

T. foliis ovato-lanceolatis acutis glabris, panicula terminali, fructibus quadrialatis, alis aequalibus. W.

Tetrapteris (*acutifolia*) foliis ovato-lanceolatis acuminatis, floribus paniculatis terminalibus. *Cavan. diss.* 9. *p.* 433. *t.* 261. *

Spitzblättriger Dreyflügel. W.

*Habitat in* Cajenna. ♄

## *6. TRIOPTERIS *acuminata*. W.

T. foliis oblongis acuminatis glabris, umbellis paniculatis terminalibus, fructibus quadrialatis, alis binis inferioribus brevioribus. W.

Tetrapteris (*mucronata*) foliis ovatis mucronatis glabris, floribus umbellatis. *Cavan. diss.* 9. *p.* 434. *t.* 262. *f.* 2. *

Langzugespitzter Dreyflügel. W.

*Habitat in* Cajenna. ♄

Folia *sunt acuminata, acumine producto, nec mucronata*. W.

## *7. TRIOPTERIS *buxifolia*.

T. foliis oblongis obtusiusculis glabris, umbella terminali, fructibus quadrialatis, alis subaequalibus. W.

Tetrapteris *(buxifolia)* foliis ovatis subsessilibus parvis, floribus umbellatis terminalibus. *Cavan. diss.* 9. *p.* 434. *t.* 262. *f.* 1. *

Buchsbaumblättriger Dreyflügel. W.

*Habitat in* Antillis. ♄

## *8. TRIOPTERIS *citrifolia*.

T. foliis ovato-oblongis acutis glabris, umbellis axillaribus pedunculatis, fructibus quadrialatis, alis binis inferioribus brevioribus. W.

T. foliis oblongis integris utrinque glabris, racemis axillaribus, ramis dichotomis, capsulis quadrialaribus. *Swartz prod.* 75. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 857. *

Tetrapteris (*inaequalis*) foliis ovato-acutis subcordatis glabris, floribus umbellatis, alis inferioribus brevioribus. *Cavan. diss.* 9. *p.* 433. *t.* 260. *

Acer scandens tricoccos folio citri, flore luteo majore. *Plum. ic.* 9. *t.* 16.

Citronenblättriger Dreyflügel. W.

*Habitat in sylvis montium* Jamaicae. ♄

## 906. ERYTHROXYLON.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 783.

*Cal.* turbinatus. *Cor.* petalis basi squamula nectarifera emarginata. *Stam.* basi connexa. *Drupa* 1-locularis.

1. ERYTHROXYLON *areolatum.*

E. foliis obovatis mucronatis, pedunculis lateralibus aggregatis flore duplo longioribus. W.

E. foliis obovatis mucronatis, ramulis brevibus floriferis squamosis. *Vahl. symb.* 3. *p.* 59.

E. foliis obovatis, floribus lateralibus. *Swartz obs.* 184.*

E. foliis obovatis. *Amoen. acad.* 5. *p.* 397.

E. carthagenense. *Iacq. amer.* 134. *t.* 87. *f.* 1. *

E. foliis ellipticis lineis binis longitudinalibus subtus notatis, fasciculis florum sparsis. *Brown. jam.* 278. *t.* 38. *f.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 653.

Weichstachliges Rothholz. W.

*Habitat in maritimis arenosis circa* Carthagenam. ♄ (v. s.)

*2. ERYTHROXYLON *hypericifolium.*

E. foliis obovatis emarginatis, pedunculis lateralibus subsolitariis flore triplo longioribus. W.

E. foliis obovatis emarginatis, ramis floriferis, pedunculis axillaribus solitariis. *Vahl. symb.* 3. *p.* 60. *

E. foliis obovatis obtusis emarginatis, ramulis compressis punctato-scabris, pedunculis capillaceis unifloris solitariis axillaribus. *Lamarck encycl.* 2. *p.* 390. *

E. foliis numerosis ovatis, ramis punctato-scabris, pedunculis longis capillaribus, fructu triloculari. *Cavan. diss.* 8. *p.* 403. *t.* 230. *

β. foliis duplo minoribus non emarginatis. *Cavan. l. c. t.* 230. *f.* x.

Johanniskrautblättriges Rothholz. W.

*Habitat in insula* Mauritii et Borbon. ♄

Pedunculi *sunt solitarii vel geminati.* W.

*3. ERYTHROXYLON *buxifolium.*

E. foliis obovatis mucronatis, pedunculis axillaribus solitariis longitudine floris. W.

E. foliis obovatis integerrimis, nervo medio supra elevato, pedunculis axillaribus brevibus solitariis basi utriculatis. *Lamarck encycl.* 2. *p.* 590. *

E. foliis lanceolato-ovatis, nervo ſupra protuberante in ſetulam terminato, floribus axillaribus ſolitariis. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 405. *t.* 231. *f.* 1. *

Buchsbaumblättriges Rothholz. W.

*Habitat in* Madagaſcar. ♄

Folia *ſubtus glauca ut in praecedentibus, ſed diſtinctum:* ramulis *longioribus*, ſquamis *ſparſis lanceolatis longitudine petioli et notis ſupra indicatis.* W.

*4. ERYTHROXYLON *ferrugineum.*

E. foliis ellipticis retuſis ſubtus ferrugineis, pedunculis ſolitariis axillaribus longitudine floris. W.

E. foliis ovatis ſacpius emarginatis, ſquamulis imbricatis, floribus ſolitariis. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 404. *t.* 131. *f.* 2. *

Braunblättriges Rothholz. W.

*Habitat in* Madagaſcar. ♄

*Eſt varietas praecedentis ſecundum Clariſſ. Lamarck, ſed foliorum forma et colore diſtinctiſſimum.* W.

*5. ERYTHROXYLON *rufum.*

E. foliis oblongis obtuſis baſi attenuatis, pedunculis lateralibus aggregatis flore triplo longioribus. W.

E. foliis oblongis obtuſiſſimis baſi acutis, axillis multifloris, ſquamis ovatis acutis. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 33. *

E. foliis ovatis coriaceis inferne rufis, ſquamulis imbricatis, axillis multifloris. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 404. *t.* 232. *

Rothbraunes Rothholz. W.

*Habitat in* America *meridionali.* ♄

6. ERYTHROXYLON *havanenſe.*

E. foliis oblongis obtuſis baſi acutis, pedunculis axillaribus ſubgeminatis longitudine floris. W.

E. foliis ellipticis, floribus axillaribus. *Swartz obſ* 185.

E. foliis ovatis. *Iacq. amer.* 135. *t.* 87. *f.* 2. *

E. (*ovatum*) foliis ovatis, ſquamulis imbricatis, floribus ſubſolitariis, drupa gibboſa. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 404. *t.* 233. *

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 655.

Havanſches Rothholz. W.

*Habitat* Havanae *in rupeſtribus maritimis.* ♄

*7. ERYTHROXYLON *Coca.*

E. foliis oblongis obtuſiuſculis venoſis, ſubtus trilineatis, pedunculis lateralibus ſpartis flore brevioribus. W.

E. foliis ovatis acutis ſubtrilineatis, ramulis crebre tuberculoſis. *Lamarck encycl.* 2. *p.* 389. *

E. foliis ovatis, lineis duabus ſubtus notatis, ramulis crebre tuberculatis. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 402. *t.* 229. *
Myrto ſimilis indica fructu racemoſo. *Bauh. pin.* 469.
Coca. *Cluſ. exot.* 177. 340. *Hernand. mex.* 302.
Peruvianiſches Rothholz. W.
*Habitat in* Peru. ♄
Folia *venoſa, ſubtus vero, utrinque ad coſtam mediam a baſi ad apicem excurrit linea nervoſa.* W.

*8. ERYTHROXYLON *Sideroxyloides.*

E. foliis oblongis acutiuſculis baſi attenuatis, pedunculis lateralibus ſparſis longitudine floris. W.
E. foliis ovato-oblongis obtuſiuſculis, ramis ſcabris apice compreſſis, pedunculis ſubternis axillaribus. *Lamarck encycl.* 2. *p.* 390. *
E. foliis obovatis, ramis tuberculatis, ſquamulis acutis, axillis paucifloris. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 401. *t.* 228. *
Arbor indica primi ſylveſtris folio, corni maris fructu longiore. *Pluk. amalth* 21.
Santalum nigrum. *Pluk. amalth.* 187. *t.* 442. *f.* 3. *
Eiſenholzartiges Rothholz. W.
*Habitat in inſula* Borbon. ♄

*9. ERYTHROXYLON *ſquamatum.*

E. foliis oblongis acuminatis baſi attenuatis, ramulis floriferis nudis, pedunculis confertis flore triplo longioribus. W.
E. foliis elliptico-lanceolatis acuminatis obtuſis, ramulis ſquamoſis floriferis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 60. *t.* 63. *
E. foliis ovatis acuminatis, ramulis ſquamoſis, drupis acutis. *Swartz. prod.* 75. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 861. *
Schuppiges Rothholz. W.
*Habitat in* Cajenna *inque* Caribaeis. ♄ (v. ſ.)

*10. ERYTHROXYLON *macrophyllum.*

E. foliis oblongis acutis baſi attenuatis, pedunculis axillaribus aggregatis longitudine floris. W.
E. foliis ellipticis acuminatis, axillis multifloris, ſquamis lanceolato-ſubulatis ſemiamplexicaulibus ſtriatis. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 33. *
E. foliis ellipticis acutis, floribus axillaribus lateralibusque aggregatis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 60. *
E. foliis lanceolatis longiſſimis, ſquamulis amplexicaulibus ſtriatis, axillis multifloris, fructu triloculari. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 401. *t.* 227. *

Groſsblättriges Rothholz. W.
*Habitat in* Cajenna. ♄

*11. ERYTHROXYLON *laurifolium.*
E. foliis lanceolatis acutiuſculis, ramulis floriferis nudis terminalibus, pedunculis aggregatis confertis flore triplo longioribus. W.
E. foliis ovato-lanceolatis, ramulis ſquamis amplexicaulibus acutis concavis ſparſis. *Lamarck encycl.* 2. *p.* 390. *
E. foliis lato-lanceolatis, ſquamis acutis concavis, floribus glomeratis terminalibus. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 400. *t.* 226. *
Lorbeerblättriges Rothholz. W.
*Habitat in inſula* Mauritii. ♄

*12. ERYTHROXYLON *longifolium.*
E. foliis lanceolatis obtuſis, pedunculis axillaribus ſubaggregatis flore duplo longioribus. W.
E. foliis oblongis glabris integerrimis, pedunculis ſubſolitariis. *Lamarck encycl.* 2. *p.* 390. *
E. foliis oblongis craſſis nitidis, ſquamulis acutis deciduis, floribus axillaribus. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 399. *t.* 225. *
Langblättriges Rothholz. W.
*Habitat in* Madagaſcar. ♄

# *PENTAGYNIA.*

## 907. AVERRHOA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 784.

*Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5, ſuperne patentia. *Stam.* annulo nectarifero inſerta, alterna breviora. *Pomum* 5-gonum, 5-loculare.

1. AVERRHOA *Bilimbi.*
A. foliolis ovato-lanceolatis, fructibus oblongis obtuſangulis. W.
A. caudice nudo fructificante, pomis oblongis obtuſangulis. *Fl. zeyl.* 177. *
A. foliis pinnatis cum impari, foliolis ovato-lanceolatis ſubaequalibus. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 373. *t.* 219. *
Blimbingum teres. *Rumph. amb.* 1. *p.* 118. *t.* 56.

Bilimbi. *Rheed. mal.* 3. *p.* 55. *t.* 45. 46. *Raj. hiſt.* 1449. *Burm. zeyl.* 147. *ind.* 106.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 1. *p.* 656.
Bilimbi Averrhoa. W.
*Habitat in* India. ♄ (v. ſ. ſ. ſ.)

2. AVERRHOA *Carambola.*

A. foliolis ovatis inaequalibus acuminatis, fructibus oblongis acutangulis. W.
A. axillis foliorum fructificantibus, pomis oblongis acutangulis. *Fl. zeyl.* 178. * *Bruce. Act. Angl.* 1785. *p.* 556.
A. foliis impari-pinnatis, foliolis ovato-acutis, terminali majore, fructuum angulis acutis. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 374. *t.* 220. *
Mala goënſia fructu octangulari pomi vulgaris magnitudine. *Bauh. pin.* 433.
Prunum ſtellatum. *Rumph. amb.* 1. *p.* 115. *t.* 35.
Tamara Tonga ſ. carambolas. *Rheed. mal.* 3. *p.* 51. *t.* 43. 44. *Raj. hiſt.* 1449. *Burm. zeyl.* 148. *ind.* 106.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 1. *p.* 658.
Carambola Averrhoa. W.
*Habitat in* India. (v. ſ.)

## *908. IONCQUETIA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 785.

*Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. *Capſ.* pentacocca unilocularis 5-valvis 5-ſperma. *Sem.* arillata.

1. IONCQUETIA *paniculata.* W.

Tapirira gujanenſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 470. *t.* 188. *
Riſpenblütige Joncquetie. W.
*Habitat in* Gujanae *ſylvis* Sinemarienſibus. ♄
Arbor *quinquagintapedalis.* Folia *alterna impari-pinnata, foliolis oblongis acuminatis integerrimis venoſis glabris.* Flores *parvi albi terminales paniculati.* W.

## 909. SPONDIAS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 786.

*Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. *Drupa* nucleo 5-loculari.

1. SPONDIAS *Mombin.*

S. foliis petiolo communi compreſſo. *Syſt. veg.* 357. *Loef. it.* 209.

S. purpurea. *Spec.* 2. *p.* 613. *Mill. dict. n.* 1.
S. (*Myrobalanus*) racemis ſparſis, foliis multo brevioribus. *Iacq. amer.* 139. *t.* 88.
Spondias diffuſa, foliis plurimis minoribus pinnatis, penna compreſſa ſulcata, floribus praecocibus. *Brown. jam.* 228.
Myrobalanus minor, folio fraxini alato, fructu purpureo officulo magno fibroſo. *Sloan. jam.* 182. *hiſt.* 2. *p.* 126. *t.* 219. *f.* 3. 4. 5. *Raj. dendr.* 43.
Prunus americana, officulo magno ex filamentis lignoſis reticulatim inflato. *Pluk. alm.* 307. *t.* 218. *f.* 3.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 664.
Flachſtielige Mombinpflaume. W.
*Habitat in* India *occidentali.* ♄

2. SPONDIAS *Myrobalanus.*

S. petiolis teretibus: foliolis nitidis acuminatis. *Syſt. veg.* 357.
S. (*Mombin*) racemis terminalibus longitudine folia aequantibus. *Iacq. amer.* 138.
S. lutea. *Spec. pl. p.* 613. *Mill. dict. n.* 2.
Spondias. *Hort. cliff.* 484.
Hobo. *Loefl. it.* 209.
S. foliolis plurimis pinnatis ovatis, racemis terminalibus, cortice interno rubente. *Brown. jam.* 229.
Monbin arbor, folio fraxini, flore luteo racemoſo. *Plum. gen.* 44.
Myrobalanus folio fraxini alato, fructu luteo, officulo magno fibroſo. *Sloan. jam.* 181. *hiſt.* 2. *p.* 125. *t.* 219. *f.* 1. 2. *Raj. dendr.* 43.
Prunus americana. *Mer. ſurin.* 13. *t.* 13. *bona.*
Prunus braſilienſis, fructu racemoſo ligno intus pro officulo. *Raj. hiſt.* 1154.
Acaja et Ibanietara. *Marcgr. braſ.* 29.
Arbor nuci juglandi ſimilis 5. f. Hobos. *Bauh. pin.* 417.
β. Spondias foliis paucioribus pinnatis ovatis nitidis. *Brown. jam.* 229.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 656.
Rundſtielige Mombinpflaume. W.
*Habitat in* America *meridionali.* ♄ (v. v. f. fl.)

3. SPONDIAS *Mangifera.* W. †

S. foliolis oblongis integerrimis panicula racemoſa. W.
Mangifera (*pinnata*) foliis pinnatis, floribus decandris. *Lin. ſuppl.* 156. *Retz. obſ.* 5. *p.* 4.

Mongoartige Mombinpflaume. W.
*Habitat in* India. *Koenig.* ♄

Folia *pedalia cum impari pinnata, foliolis oblongis integerrimis.* Panicula *racemosa magna.*

Planta *adhuc obscura, an eadem ac Spondias amara Lamarck encycl.* 4. *p.* 245. *quam depinxit Rheed. mal.* 1. *tab.* 50? W.

*4. SPONDIAS *dulcis.*

S. petiolis teretibus sexjugis, foliolis serratis costatis. *Forst. prod. n.* 198. *pl. escul. p.* 33. *

S. (*cytherea*) foliis remote serratis, fructibus loculis ab axi remotis. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 245. * *illust. gen. t.* 384. *Sonnerat itin.* 2. *p.* 222. *t.* 123. *

Süsse Mombinpflaume. W.
*Habitat in* Societatis *insulis, nunc etiam in insula* Mauritii. ♄

## *910. ROBERGIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 787.

*Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Drupa* nuce monosperma, putamine bivalvi.

*1. ROBERGIA *frutescens.*

Rourea frutescens. *Aubl. guj.* 1. *p.* 467. *t.* 187. *
Strauchartige Robergie. W.
*Habitat in sylvis* Gujanae. ♄

Frutex *quinquepedalis.* Folia *alterna impari-pinnata quadrijuga, foliolis petiolatis oblongis acuminatis integerrimis venosis supeme glabris, inferne tomentosis.* Foliola *inferiora minora.* Flores *albi.* Panicula *corymbosa axillaris et terminalis folio multo brevior.* W.

## 911. CNESTIS.

*Iuss. gen. ed. Usteri p.* 411.

*Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Capsc.* 5, bivalves monospermae.

*1. CNESTIS *glabra.*

C. foliis pinnatis, foliolis ovatis petiolatis utrinque glabris, racemulis fasciculatis brevibus et tenuibus. *Lamarck encycl.* 3. *p.* 22. * *illust. gen. t.* 387. *f.* 1.

Glatte Spaltfrucht. W.
*Habitat in insula* Mauritii *et* Borbonia. ♄

*2. CNESTIS *polyphylla.*
C. foliis pinnatis, foliolis ovato-oblongis subvillosis brevissime petiolatis, racemulis tomentosis, capsulis obtusissimis. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 22. * *illust. gen. t.* 387. *f.* 2.
Vielblättrige Spaltfrucht. W.
*Habitat in* Madagascar. ♄

*5. CNESTIS *corniculata.*
C. foliis pinnatis, foliolis oblongo-acuminatis, nervo medio villoso, capsulis oblongis acutis corniculatis tomentosis prurientibus. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 22. *
Gehörnte Spaltfrucht. W.
*Habitat in* Sierra Leone. ♄

*4. CNESTIS *trifolia.*
C. foliis ternatis, foliolis ovatis acuminatis superne laevibus, panicula terminali. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 23. *
Dreyblättrige Spaltfrucht. W.
*Habitat in* Sierra Leone. ♄

*Affinis videtur Connaro pentagyno, tamen diversa. Binas adhuc hujus generis species possidere credo, quas ob fructus defectum non indicavi. Altera in Guinea crescens fert folia pinnata, foliolis subtus flavo-tomentosis; altera ex India orientali foliis pinnatis glabris, profert flores paniculatos. Ceterum hoc genus Fagaris et Zanthoxylis est proximum.* W.

## 912. COTYLEDON.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 788.

*Cal.* 5-fidus. *Cor.* 1-petala. *Squamae* nectariferae 5, ad basin germinis. *Capsl.* 5.

1. COTYLEDON *orbiculata.*
C. foliis ovato-spathulatis obtusis cum acumine laevibus, floribus paniculatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 106.
C. foliis orbiculatis carnosis planis integerrimis, caule fruticoso. *Kniph. cent.* 6. *n.* 31.
*α.* foliis ovato-spathulatis, caudice erecto. *Ait. l. c.*
C. foliis subrotundis planis integerrimis. *Hort. cliff.* 276. *Roy. lugdb.* 454. *Sp. pl.* 2. *p.* 614.
Sedum africanum frutescens incanum, orbiculatis foliis.

*Herm. lugdb.* 549. *t.* 551. *Morif. hift.* 3. *p.* 474. *f.* 12. *t.* 7. *f.* 39.

*β.* foliis oblongo-fpathulatis, caudice erecto. *Ait. l. c.*

*γ.* foliis orbiculato-fpathulatis, caule erecto. *Ait. l. c.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syft.* 3 *p.* 597.

Kreisblättriges Nabelkraut. W.

*Habitat ad* Cap. b. fpei. ♄ (v. v.)

2. COTYLEDON *paniculata.*

C. foliis oblongo-ovatis feffilibus, floribus divaricato-paniculatis, caule fruticofo ramofo. *Thunb. prod.* 83.

C. fruticofa, foliis oblongo-ovatis feffilibus, panicula divaricata ramofa. *Lin. fuppl.* 242.

C. (*orbiculata γ.*) foliis ovato-fpathulatis, caule ramofiffimo divaricato. *Ait. Kew.* 2. *p.* 106?

Rispenblütiges Nabelkraut. W.

*Habitat ad* Cap. b. fpei. ♄

*3. COTYLEDON *fafcicularis.*

C. foliis cuneiformibus fafcicularis terminalibus, caudice incraffato, ramis carnofis fubconicis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 106.

C. frutefcens, folio oblongo viridi, floribus ramofis pendulis reflexis. *Burm. afr.* 41. *t.* 18.

Büfchelblättriges Nabelkraut. W.

*Habitat ad* Cap. b. fpei. ♄

*4. COTYLEDON *cuneata.*

C. foliis cuneatis carnofis hirtis, floribus paniculatis hirfutis. *Thunb. prod.* 83.

Keilblättriges Nabelkraut. W.

*Habitat ad* Cap. b. fpei. ♄

5. COTYLEDON *fpuria.*

C. foliis fpathulatis obtufis cum acumine nudis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 106.

C. foliis fpathulato-lanceolatis carnofis integerrimis, caule fruticofo. *Sp. pl.* 614. *Mill. dict. n.* 9.

Sedum africanum teretifolium, flore hemerocallidis. *Morif. hift.* 3. *p.* 474. *f.* 12. *t.* 7. *f.* 40.

Cotyledon africana frutefcens, folio longo et anguſto, flore flavefcente. *Comm. rar.* 23. *t.* 23.

C. acaulon, foliis ad radicem feſſilibus oblongis anguſtis, floribus pendulis reflexis. *Burm. afr.* 43. *t.* 19. *f.* 1.

C. africana, foliis depreſſis cruciatis. *Walth. hort.* 16.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syft.* 3. *p.* 593.

Baſtard Nabelkraut. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

Caulis *craſſiſſimus ramis obtuſis, apice tantum folioſis.* Folia *naturaliter oppoſita; monſtroſa variant alterna, ſpathulato-lanceolata, carnoſa, obtuſa, petiolata.* Scapus *terminalis, pedalis, ſubumbellato-divaricatus.* Flores *nutantes, flaveſcentes: Limbo revoluto, intus conſperſo atomis rubris.* Stamina *tubo paulo longiora.* Antherae *rubrae.*

*6. COTYLEDON *purpurea.* †

C. foliis lineari-oblongis carnoſis glabris, floribus paniculatis. *Thunb. prod.* 83.

Purpurfarbenes Nabelkraut. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

*7. COTYLEDON *teretifolia.*

C. foliis carnoſis ſubteretibus hirſutis, floribus paniculatis, caule hirſuto. *Thunb. prod.* 83.

Rundblättriges Nabelkraut. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

8. COTYLEDON *cacalioides.*

C. foliis teretibus, floribus paniculatis, caule fruticoſo. *Thunb. prod.* 83.

C. foliis teretibus, floribus corymboſis, caule fruticoſo. *Lin. ſuppl.* 242.

Peſtwurzartiges Nabelkraut. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

Flores *lutei referunt Cacaliam.*

9. COTYLEDON *reticulata.*

C. foliis teretibus, floribus reticulato-paniculatis, caule fruticoſo. *Thunb. prod.* 83.

C. caule fruticoſo, foliis teretibus, floribus reticulato-corymboſis. *Lin. ſuppl.* 242.

Netzſtieliges Nabelkraut. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. ♄

*Refert Staticem reticulatam.*

10. COTYLEDON *papillaris.*

C. foliis oppoſitis tereti-ovatis, floribus corymboſis. *Lin. ſuppl.* 242.

C. foliis carnoſis oppoſitis tereti-ovatis glabris, floribus pedunculatis. *Thunb. prod.* 83.

Warzentragendes Nabelkraut. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei.

11. COTYLEDON *mamillaris.*

C. foliis alternis tereti-ovatis, floribus alternis subsessilibus. *Lin. suppl.* 242.

C. foliis alternis tereti-ovatis glabris, floribus alternis pedunculatis. *Thunb. prod.* 85.

Zitzenförmiges Nabelkraut. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei.

12. COTYLEDON *hemisphaerica.*

C. foliis suborbiculatis furfure punctatis subtus convexis, floribus subsessilibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 107.

C. foliis semiglobosis. *Hort. cliff.* 176. *Roy. lugdb.* 445. *Mill. dict. n.* 4. *Fabric. helmst.* 267.

C. capensis, folio semiglobato. *Dill. elth.* 112. *t.* 95. *f.* 111.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 599.

Halbkugelförmiges Nabelkraut. W.

*Habitat in* Aethiopia. ♄ (v. v. l. fl.)

13. COTYLEDON *triflora.*

C. foliis obovato-carnosis integris, floribus spicatis ternis sessilibus. *Thunb. prod.* 85.

C. foliis obovatis integris, floribus subpedunculatis ternis. *Lin. suppl.* 242.

Dreyblütiges Nabelkraut. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei.

*14. COTYLEDON *coccinea.*

C. foliis obovatis acutis carnosis, spica foliosa terminali. W.

C. foliis subspathulatis acutis carnosis, floribus spicatis sessilibus. *Cavan. ic.* 2. *p.* 54. *t.* 170. *

Scharlachblütiges Nabelkraut. W.

*Habitat* - - - - ♄

Folia *inferiora obovata acuta petiolata, superiora et floralia lanceolata sessilia.* W.

*15. COTYLEDON *Malacophyllum.*

C. foliis lanceolatis acutis carnosis, spica cylindrica terminali aphylla. W.

Cotyledon Malacophyllum. *Pall. itin.* 3. *app. n.* 88. *tab. O. f.* 1. *

Weichblättriges Nabelkraut. W.

*Habitat in* Davuriae *alpibus.* ⊙

*Similis Crassulae spinosae quae et hujus videtur generis.* W.

16. COTYLEDON *ſerrata.*

C. foliis ovalibus crenatis, caule ſpicato. *Sp. pl.* 614. *Mill. dict. n.* 3.

Cotyledon foliis radicalibus lanceolatis crenatis: caulinis ſubulatis. *Hort. cliff.* 497. *Roy. lugdb.* 454.

Cotyledon cretica, folio oblongo fimbriato. *Dill. elth.* 113. *t.* 95. *f.* 112.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 600.

Geſägtes Nabelkraut. W.

*Habitat in* Creta, Sibiria.

17. COTYLEDON *Umbilicus.*

C. foliis peltatis crenatis, caule ſubſimplici, floribus pendulis, bracteis integris. *Hudſ. angl.* 194. *Ait. Kew.* 2. *p.* 107.

C. foliis peltatis. *Vir. cliff.* 39. *Roy. lugdb.* 454.

Cotyledon Umbilicus *β.* tuberoſa. *Sp. pl.* 615.

C. vera, radice tuberoſa. *Bauh. hiſt.* 6. *p.* 683.

C. major. *Bauh. pin.* 285. *Raj. hiſt.* 1878.

C. umbilicus veneris. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 63. *Blachw. t.* 263.

Sedum luteum murale ſpicatum, folio umbilicato rotundo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 470. *ſ.* 12. *t.* 10. *f.* 4.

*β.* C. (*peltatum*) herbacea, foliis radicalibus longe petiolatis rotundis peltatis repandis concavis glabris, caulinis ſuperioribus rhombeis dentatis, caule erecto maculato ſimplici, floribus racemoſis pendulis, corolla cylindrica punctata. *Wendl. obſ.* 49.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 600.

Gemeines Nabelkraut. W.

*Habitat in* Luſitania, Hiſpania, Anglia. 4 (v. ſ.)

*18. COTYLEDON *lutea.*

C. foliis peltatis crenatis, caule ſubſimplici, floribus erectis, bracteis dentatis. *Hudſ. angl.* 194. *Ait. Kew.* 2. *p.* 107.

Cotyledon Umbilicus *α.* repens. *Sp. pl.* 615.

C. foliis cucullato-peltatis ſerrato-dentatis alternis, caule ramoſo, floribus erectis. *Gron. orient.* 141.

C. flore luteo, radice repente. *Dod. mem.* 265. *t.* 73.

C. radice tuberoſa longa repente. *Moriſ. prael.* 257. *Raj. hiſt.* 1878.

C. luteum umbilicatum ſpicatum radice repente majus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 471.

Gelbes Nabelkraut. W.

*Habitat in* Europa *auſtrali*, Oriente. 4

*19. COTYLEDON *lanceolata.*

C. foliis lanceolatis apice ſerratis, panicula villoſa, floribus quadrifidis. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 51.

C. (*lanceolata*) foliis lanceolatis ſeſſilibus ſubcarinatis apice ſerratis carnoſis. *Forſk. deſcr.* 89. *

Lanzettenblättriges Nabelkraut. W.

*Habitat in* Arabia.

*Habitu, inflorescentia corollisque ovatis flavis ſimilis C. laciniatae; diverſa*: foliis *lanceolatis*, caule, pedunculis, calycibus, corollis*que villoſis*. Vahl. l. c.

20. COTYLEDON *laciniata.*

C. foliis laciniatis, floribus quadrifidis. *Hort. cliff.* 175. *Roy. lugdb.* 455. *Mill. dict. n.* 10. *Kniph. cent.* 2. *n.* 19.

C. afra, folio craſſo lato laciniato, floſculo aureo. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 288. *t.* 288.

Telephium africanum, anguſtiori folio, flore aurantiaco. *Pluk. alm.* 362. *t.* 228. *f.* 3.

Telephium indicum. *Bont. jav.* 132.

Planta anatis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 275. *t.* 95.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 3. *p.* 602.

Schlitzblättriges Nabelkraut.

*Habitat in* Aegypto, India. ♄ (v. v.)

Stamina *octo.*

*21. COTYLEDON *alternans.*

C. foliis orbiculato-ſpathulatis integerrimis, floribus paniculatis glabris quadrifidis. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 51.

Cotyledon orbiculata. *Forſk. cat. arab. p.* 112.

Wechſelblütiges Nabelkraut. W.

*Habitat in* Arabia.

*Tota glabra.* Pedunculi *partiales alterni, nec oppoſiti.* Corolla *ovata C. laciniatae membranacea, ſuperne anguſtata, laciniis lanceolatis flavo-rubentibus.* Vahl. l. c.

*22. COTYLEDON *nudicaulis.*

C. foliis ſpathulato-ovatis, cymae floribus quadrifidis. *Murr. ſyſt. veg.* 14. *p.* 429. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 51.

Cotyledon integra. *Medic. comm. palat.* 3. *p.* 200. *t.* 9.

C. (*aegyptiaca*) foliis ſubrotundis concavis obſolete crenatis, floribus paniculato-cymoſis erectis quadrifidis. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 142. *

C. (*deficiens*) foliis rotundis ſubcrenatis, floribus tetradynamiis. *Forſk. deſcr.* 89. *

Nacktstieliges Nabelkraut. W.
*Habitat in* Aegypto. ♄

Caulis *in summitate subnudus.* Folia *praeter dictam figuram obsolete serrata basi linearia.* Inflorescentia *cymosa, pedunculis dichotomis.* Calyx *et* corolla *extus pubescens, limbo supra coccineo, subtus pallidiori.* Stamina *octo.* Murr. l. c.

## 23. COTYLEDON *hispanica.*

C. foliis oblongis subteretibus, floribus fasciculatis. *Loefl. it. t.* 1.
C. maritima, sedi folio, flore carneo, fibrosa radice. *Tournef. inst.* 90.
C. hispanica, sedi teretifolii folio, flore umbellato rubro, fibrosa radice. *Alimart. sched.* 3.
C. palustris, sedi folio, floribus rubris longioribus. *Shaw. afr.* 177.
β. Cotylēdon palustris, sedi folio, floribus luteis brevioribus. *Shaw. afr.* 178 *f.* 178.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 3. *p.* 603.
Spanisches Nabelkraut. W.
*Habitat in* Africa, Oriente, Hispania. ♂

Radix *fibrosa.* Caulis *simplex, teres, erectiusculus, digitalis.* Folia *oblonga, teretiuscula, obtusiuscula, sessilia, subpilosa, supra planiuscula rufo-punctata.* Flores *fasciculati corymbo terminali.* Corollae *infundibuliformes: extus rufescentes, subpilosae. Limbo quinquepartito, plano, acuto, supra incarnato, striis tribus purpurascentibus et apice purpureo.* Filamenta *crassiuscula, prominula. Antherae minimae.* Calyx *brevis.* Facies *herbae est Sedi albi.*

## *24. COTYLEDON *viscosa.*

C. foliis teretibus, racemis terminalibus villoso-viscosis, caule ramoso. *Vahl. symb.* 2. *p.* 51. *
Cotyledon Mucizonia. *Orteg. monogr. Madrit.* 1772. *c. figura. Iacq. Collect. suppl.* 112. *t.* 13. *f.* 2. *
C. (*hispida*) foliis carnosis glaucis ovato-oblongis teretiusculis, floribus campanulatis subcorymbosis terminalibus. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 141. *
Klebriges Nabelkraut. W.
*Habitat in montosis* Hispaniae *versus* Toledum. ⊙

## 913. SEDUM.

*Gen. plant. ed. Schreb. n.* 789.

*Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Squamae* nectariferae 5, ad basin germinis. *Capſ.* 5.

### * *Planifolia.*

1. SEDUM *verticillatum.*

S. foliis quaternis. *Amoen. acad.* 2. *p.* 252. *t.* 4. *f.* 14.

S. aparines facie, tauromontanum. *Raj. extr.* 233. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 473.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 629.

Wirtelblättriges Sedum. W.

*Habitat in* Europa *maxime auſtrali et* Sibiria. 4

Caulis *pedalis erectus teres.* Folia *lanceolata vix digitum longa aequaliter ſerrata laevia acutiuſcula minus carnoſa.* Racemi *axillares parvi ſolitarii.* Flores *in ſuo genere parvi*, calyce *quinquedentato*, petalis *quinque*, ſtaminibus *decem*, piſtillis *quinque.* Amoen.

2. SEDUM *Telephium.*

S. foliis planiuſculis ſerratis, corymbo folioſo, caule erecto. *Mat. med.* 111. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 171. *Mill. dict. n.* 14. *Pollich. pal. n.* 428. *Flor. dan. t.* 686. *Ludw. ect. t.* 200. *Blackw. t.* 191. *Kniph. cent.* 4. *n.* 76. *Knorr. del.* 1. *t. F.* 5. *Hoffm. germ.* 155. *Roth. germ. I.* 194. *II.* 497.

S. foliis confertis ſerratis, umbellis denſis terminalibus. *Hall. helv. n.* 954.

S. foliis planis, ovatis, ſerratis; cymis lateralibus, corymboſis. *Scop. carn. ed.* 1. *p.* 491. *n.* 2. *ed.* 2. *n.* 553.

S. foliis planiuſculis patentibus ſerratis, corymbo terminali. *Hort. cliff.* 176. *Fl. ſuec.* 386, 400. *Roy. lugdb.* 456.

Telephium vulgare. *Bauh. pin.* 287.

Telephium album. *Fuchſ. hiſt.* 800.

*β.* Sedum Telephium, *purpureum.*

Telephium purpureum majus. *Bauh. pin.* 287. *Kniph. cent.* 4. *n.* 77. *Pollich. l. c.*

*γ.* Telephium purpureum minus. *Bauh. pin.* 287. *prodr.* 133.

*δ.* Telephium latifolium peregrinum. *Bauh. pin.* 287.

*ε.* Sedum Telephium, *maximum.*

S. foliis ovatis, dentatis, conjugatis, umbellis alaribus. *Hall. helv. n.* 955. *diſtincta ſpecies.* R.

Telephium hiſpanicum 1. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 66.
Anacampſeros maxima. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 682. *Blackw. t.* 191.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 629.
Knolliges Sedum. W.
*Habitat in* Europae *ſiccisſimis.* 4 (v. v.)

3. SEDUM *Anacampſeros.*
S. foliis cuneiformibus baſi attenuatis ſubſeſſilibus, caulibus decumbentibus, floribus corymboſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 108.
S. foliis cuneiformibus integerrimis, caulibus decumbentibus, floribus corymboſis. *Sp. pl.* 616. *Mill. dict. n.* 16. *Hoffm. germ.* 156.
S. caule procumbente, foliis ovatis integerrimis. *Hall. helv. n.* 956.
S. foliis ſpathulatis indiviſis, umbella terminali. *Sauv. monſp.* 77.
Telephium repens, folio deciduo. *Bauh. pin.* 287.
Telephium VI. Cepaea plancii. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 67.
Telephium minus ſempervirens. *Lob.* 340.
Anacampſeros minor, rotundiore folio, ſempervirens. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 682.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 631.
Rundblättriges Sedum. W.
*Habitat in* Gallo-provinciae *rupibus*, *alpibus* Aquilejenſibus. 4 (v. v.)
Folia *hyeme decidua.*

*4. SEDUM *divaricatum.*
S. foliis cuneiformi-rhombeis emarginatis petiolatis, caulibus ramoſis, paniculis terminalibus divaricatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 108.
Ausgebreitetes Sedum. W.
*Habitat in* Madera. ♄

5. SEDUM *Aizoon.*
S. foliis lanceolatis ſerratis planis, caule erecto, cyma ſeſſili terminali. *Mill. dict. n.* 13. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 173.
S. foliis planis ſerratis, corymbo folioſo. *Hort. upſ.* 116.*
Anacampſeros flore flavo. *Amm. ruth.* 96. *t.* 11.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 631.
Gelbes Sedum. W.
*Habitat in* Sibiria. 4 (v. v.)

6. SEDUM *hybridum.*
S. foliis cuneiformibus concavis ſubdentatis aggregatis,

ramis repentibus, cyma terminali. *Hort. upſ.* 116. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 171. *n.* 85. *t.* 67. *f.* 1.

S. foliis cuneiformibus ſubconcavis obtuſe ſerratis, caulibus obliquis, axillis baſeos et propaginum radicantibus, cyma terminali. *Murray comm. nov. Goett. Tom.* 6. *p.* 35. *t.* 5.

S. minus repens, chamaedryos foliis, e ſingulis foliorum alis radices agens. *Amm. ruth.* 93.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 632.

Gamanderblättriges Sedum. W.

*Habitat in* Tataria *ad radices montium uralenſium*, Trapezunti. ♃ (v. v.)

7. SEDUM *populifolium.*

S. foliis planis cordatis dentatis petiolatis, corymbis terminalibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 109.

S. foliis petiolatis cordatis dentatis, floribus paniculatis. *Lin. ſuppl.* 242. *Pall. itin.* 3. *p.* 732. *t. O f.* 2. *

Pappelblättriges Sedum. W.

*Habitat in* Sibiriae *alpibus* Saianenſibus. ♄ (v. v.)

Caulis *fruticoſus ramoſus erectus patulus laevis pedalis.* Folia *alterna petiolata remota, ad ramificationes tantum petiolata cordata dentata obtuſa carnoſa glabra.* Paniculae *breves nec foliis longiores.* Calyx *parvus.* Petala *lanceolata ſeſſilia alba immaculata patentia.* Antherae *rubrae.*

8. SEDUM *ſtellatum.*

S. foliis planiuſculis angulatis, floribus lateralibus ſeſſilibus ſolitariis. *Hort. cliff.* 176. *Roy. lugdb.* 456. *Mill. dict. n.* 11. *Hoffm. germ.* 156. *Roth. germ. I.* 194. *II.* 498. *Retz. obſ.* 5. *p.* 25. *

S. foliis ſubrotundis, caule ramoſo, floribus in alis ſeſſilibus. *Hall. helv. n.* 957.

S. echinatum vel ſtellatum, flore albo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 680.

Sempervivum tertium. *Col. phytob.* 32. *t.* 11.

Cotyledon ſtellata. *Bauh. pin.* 295.

Aizoon peregrinum. *Camer. hort. p.* 7. *ic.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 632.

Sternförmiges Sedum. W.

*Habitat in* Italia, Gallia, Helvetia. ⊙ (v. ſ.)

* 9. SEDUM *alſinefolium.*

S. foliis planis ovatis, caule paniculato, petalis obtuſis. W.

Sedum alſinefolium. *Allion. ped. n.* 1740. *t.* 22. *f.* 2.

S. erectum ramosum, foliis planis, floribus albis longe pedunculatis. *Allion. spec. ped. p.* 15. *t.* 3. *f.* 2.
Mierenartiges Sedum. W.
*Habitat in locis umbrosis lapidosis* Pedemontii. ♂

10. SEDUM *Cepaea.*

S. foliis planis lanceolatis, caule ramoso, floribus paniculatis, petalis acutis aristatis. W.

S. foliis planis, caule ramoso, floribus paniculatis. *Hort. cliff.* 170. * *Roy. lugdb.* 456. *Sauv. monsp.* 76 *Mill. dict. n.* 10. *Hoffm. germ.* 156. *Roth. germ. I.* 194. *II.* 499. *Allion. ped. n.* 1741.

S. caulibus paniculatis, foliis ovatis, planiusculis. *Hall. helv. n.* 958.

S. annuum album, oblongo portulacae minoris folio. *Moris. hist. 3. p.* 475. *s.* 12. *t.* 7. *f.* 37.
Cepaea. *Bauh. pin.* 288. *Clus. hist. 2. p.* 68. *Camer. epit.* 673. *Matth.* 953.

β. Sedum galioides. *Allion. ped. n.* 1742. *t.* 65. *f.* 3.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 653.
Portulacblättriges Sedum. W.
*Habitat* Monlpelii, Genevae, Halae *ad lacum salsum.*
⊙ (v. s.)
*Varietas* β. *differt tantum foliis inferioribus ternis, et floribus rubicundis.* W.

11. SEDUM *libanoticum.*

S. foliis radicalibus fasciculatis spathulato-lanceolatis, caule subnudo simplicissimo. *Sp. pl.* 617.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 633.
Libanons Sedum. W.
*Habitat in* Palaestina. *Hasselquist.* 24
*Facies sempervivi montani.* Folia *radicalia fasciculata, spathulato-lanceolata, acuta, glabra integerrima.* Caulis *ad latus radicis, adscendens, semipedalis, simplicissimus, inferne adspersus Foliis linearibus, acutis.* Racemus *terminalis, longitudine caulis: Pedicellis sparsis, saepius bifloris.* Capsulae *non divergentes, calyce cinctae.*

** *Teretifolia.*

12. SEDUM *dasyphyllum.*

S. foliis oppositis ovatis obtusis carnosis, caule infirmo, floribus sparsis. *Mill. dict. n.* 2. *Iacq. hort. t.* 155. *Scop. carn. n.* 555.

S. foliis conicis, obtusis, glaucis, reticulatis, caule ramoso-viscido. *Hall. helv. n.* 961.
S. foliis cordato-ovatis compressis saepius oppositis, floribus sparsis. *Sauv. monsp.* 8.
S. foliis semiglobosis subovatis sessilibus quadrifariam imbricatis. *Wachend. ultr.* 391.
S. parvum, folio circinato, flore albo. *Bauh. hist.* 3. *p.* 691.
S. minus, folio circinato. *Bauh. pin.* 283. *Moris. hist.* 3. *p.* 473. *f.* 12. *t.* 7. *f.* 35.
Aizoon dasyphyllum. *Dalech. hist.* 1135.
*Houttuyn Lin. Pfl.* Syst. 6. *p.* 634.
Bereittes Sedum. W.
*Habitat in* Helvetia, Lusitania, Hispania, Italia. ⊙ (v. s.)
Folia *reti venarum rubrarum adspersa. Hall.*
Stamina 12; Styli 6. *Iacq.*

13. SEDUM *reflexum.*

S. foliis subulatis sparsis basi solutis: inferioribus recurvatis. *Fl. suec.* 2. *p.* 1296. *Oed. dan.* 113? *Mill. dict. n.* 8. *Roth. germ. I.* 195. *II.* 499. *Leers herb. n.* 335. *Pollich. pal. n.* 429. *Hoffm. germ.* 156.
S. foliis semiteretibus, acutis, aristatis, caule supremo multifido umbellato. *Hall. helv. n.* 967.
S. minus V. *Clus.* 60.
S. minus luteum, folio acuto. *Bauh. pin.* 283.
β. S. minus luteum ramulis reflexis. *Bauh. pin.* 283.
γ. S. crispum. *Munting.* 561. R.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 635.
Zurückgebogenes Sedum. W.
*Habitat in* Europa *ad montium radices.* 4 (v. v.)
Folia *viridia, tenuius subulata, inferiora recurvata uti hamus.*
Petalis 6, 7, 8, 9, *cum totidem germinibus, duploque staminum saepissime ludit.* Leers. *l. c.* R.

14. SEDUM *virens.*

S. foliis subulatis sparsis basi solutis, floribus cymosis, petalis calyce lanceolato sesquilongioribus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 110.
Grünes Sedum. W.
*Habitat in* Lusitania. 4

15. SEDUM *rupestre.*

S. foliis subulatis sparsis basi solutis glaucis, floribus cy-

mosis, petalis calyce duplo longioribus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 110.

S. foliis subulatis quinquefariam confertis basi solutis, floribus cymosis. *Hort. cliff.* 176. *It. gotl.* 178. *Fl. suec.* 388. *Roy. lugdb.* 466. *Gort. gelr.* 268. *Mill. dict. n.* 3. *Scop. carn. n.* 557. *Hoffm. germ.* 156. *Roth. germ. I.* 195. *II.* 501.

S. rupestre repens, foliis compressis. *Dill. elth.* 343. *t.* 256. *f.* 333.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 635.

Felsen Sedum. W.

*Habitat ad radices montium* Europae. ♃ (v. v.)

*Folia glauca, crassius subulata, quinquefariam imbricata.*

*A* Sempervivo sediformi *differt* foliis *paulatim in acutum apicem attenuatis;* petalis *luteis et magna parte caulium superius, donec bene floreat, semper nutante.* R.

*16. SEDUM *saxatile.*

S. foliis sparsis semiteretibus obtusis basi solutis, caule ramoso decumbente. *Wiggers primit.* 35. *Roth. germ. II.* 500. *Hoffm. germ.* 156. *Allion. ped. n.* 1746. *t.* 65. *f.* 6.

Sedum rupestre. *Fl. dan.* 59. *Moench. hass. n.* 370. *Gunn. norv. n.* 636.

S. (*Oederi*) foliis semiteretibus sparsis basi solutis, caule ramoso adscendente, floribus cymosis. *Retz. prod. Fl. scand. ed.* 2. *n.* 562.

S. (*rubens*) foliis ovatis alternis sessilibus remotis, caule prostrato basi ramoso, floribus terminalibus subumbellatis, pedunculis simplicissimis. *Haenke it. sudet. p.* 114.

S. (*alpestre*) foliis teretibus, floribus subumbellatis, floribus luteis. *Villars prosp.* 49.

S. caule ramoso prostrato, foliis teretibus ramosis, floribus longe sessilibus. *Hall. helv. n.* 964.

S. saxatile teretifolium, flosculis luteis, conceptaculis seminum stellatis et viridantibus. *Scheuch. it.* 6. *p.* 462.

S. alpinum silesiacum. *Schwenkf. sil.* 195.

S. minimum luteum non acre. *Bauh. hist.* 3. *p.* 695.

Stein Sedum. W.

*Habitat in alpibus* Norvegiae, Helvetiae, *in monte* Ceniso, *in* Sudetis, *inque* Hassiae *rupibus.* ⊙ (v. s.)

*17. SEDUM *quadrifidum.*

S. foliis ſparſis teretibus obtuſis, caule ſimplici, floribus umbellatis tetrapetalis. W.

Sedum quadrifidum. *Pall. it.* 3. *app. n.* 90. *t. P. f.* 1. *

Vierblättriges Sedum. W.

*Habitat in rupibus* Aſiae *ſumme borealis.* 4

Flores *flavi.* W.

18. SEDUM *hiſpanicum.*

S. foliis linearibus tereti-depreſſis ſparſis, cyma patula, floribus hexapetalis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 111.

S. foliis teretibus acutis: radicalibus faſciculatis, cyma pubeſcente. *Amoen. acad.* 4. *p.* 273. * *Mill. dict. n.* 4. *Reiner et Hohenwarth. it.* 1. *p.* 168. *t.* 4. *

S. hiſpanicum, folio glauco acuto, flore albido. *Dill. elth.* 342. *t.* 256. *f.* 332.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 636.

Spaniſches Sedum. W.

*Habitat in* Hiſpania *inque* Carinthia. 4 (v. ſ.)

*19. SEDUM *lineare.*

S. foliis tereti-lincaribus oppoſitis, cyma trifida. *Thunb. jap.* 187.

Linienblättriges Sedum. W.

*Habitat in* Japonia *in regione* Fakoniae.

Caulis *glaber ſimplex raro ramoſus.* Folia *oppoſita amplexicaulia tereti-linearia acuta glabra patentia pollicaria.* Flores *cymoſi lutei.* Cyma *compoſita trifida flore intermedio ſeſſili.* Thunb. l. c.

*20. SEDUM *coeruleum.*

S. foliis oblongis alternis obtuſis baſi ſolutis, cyma bifida glabra. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 51. *

S. vermiculare pumilum glabrum, floribus parvis caeruleis. *Shaw. it. p.* 46. *n.* 550. *f.* 550.

Blaues Sedum. W.

*Habitat in fiſſuris rupium ad* Manub Tuneti.

*Diverſum a Sedo coeruleo Lin. Mant.* 251, *quod poſtea in ſyſtemate omiſit, et cujus deſcriptionem tantum ex Willichii opere aſſumpſerat. Thunbergius nullam Sedi ſpeciem in capite bonae ſpei obſervavit.* W.

21. SEDUM *album.*

S. foliis oblongis obtuſis teretiuſculis ſeſſilibus patentibus, cyma ramoſa. *Hort. cliff.* 177. *Fl. ſuec.* 387,

402. *Roy. lugdb.* 457. *Mill. dict. n.* 1. *Pollich. pal. n.* 430. *Flor. dan. t.* 66. *Blackw. t.* 428. *Hoffm. germ.* 156. *Roth. germ. I.* 195. *II.* 501.

S. caule glabro, foliis teretibus, umbellis ramosis, floribus petiolatis. *Hall. helv. n.* 959.

S. foliis teretibus, compressis, acutis; cyma trifida; floribus pedunculatis. *Scop. carn. ed.* 1. *p.* 491. *ed.* 2. *n.* 556.

S. minus teretifolium album. *Bauh. pin.* 283.

Vermicularis f. Illecebra major. *Lob. ist.* 205.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 636.

Weifses Sedum. W.

*Habitat in* Europae *petris.* 24 (v. v.)

22. SEDUM *acre.*

S. foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida. *Hort. cliff.* 177. *Fl. suec.* 389. 403. *Mat. med.* 118. *Roy. lugdb.* 456. *Mill. dict. n* 5. *Pollich. pal. n.* 431. *Hoffm. germ.* 157. *Knorr. del.* 2. *t. S.* 12. *f.* 1. *Roth. germ. I.* 195. *II.* 502.

S. foliis conicis, confertis, caulibus ramosis, suprem.is trifidis. *Hall. helv. n.* 966.

S. minus VIII. causticum. *Clus.* 61. R.

S. minimum. *Tabern.* 844. *Blackw. t.* 232. R.

Sempervivum minus vermiculatum acre. *Bauh. pin.* 283.

Illecebra f. Sempervivum tertium. *Dod. pempt.* 129.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 637.

Scharfes Sedum W.

*Habitat in* Europae *campis siccissimis sterilissimis.* 24 (v. v.)

23. SEDUM *sexangulare.*

S. foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis sexfariam imbricatis. *Fl. suec.* 390, 404. * *Mill. dict. n.* 9. *Pollich. pal. n.* 432. *Hoffm. germ.* 157. *Roth. germ. I.* 195. *II.* 502.

S. foliis teretibus, ternatis, caulibus simplicibus trifidis. *Hall. helv. n.* 965.

S. foliis teretibus, obtusis, patulis; cyma trifida: floribus solitariis. *Scop. carn. ed.* 1. *p.* 491. *n.* 4. *ed.* 2. *n.* 558.

Sempervivum minus vermiculatum insipidum. *Bauh. pin.* 284.?

Sempervivum minimum. *Cam. epit.* 856.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 638.

Sechseckiges Sedum. W.

*Habitat in* Europae *borealis campis apricis ſiccis.* 4 (v. v.)

Folia *ſexfariam imbricata, evidentiſſime in planta ante floreſcentiam.* Rami *nunquam copioſi, ut ceſpitem conſtituant.* Flores *in ſingulo cymae ramo raro ultra tres.*

*24. SEDUM *anglicum.*

S. foliis ſubovatis adnato-ſeſſilibus gibbis alternis, cyma ramoſa bifida. *Hudſ. angl.* 196. *Ait. Kew.* 2. *p.* 111. *Retz. prod. ſcand. ed.* 2. *n.* 567.

Sedum annuum. *Gunn. norv. n.* 331.

S. minimum non acre, flore albo. *Raj. ſynop.* 270. *t.* 12. *f.* 2.

Engliſches Sedum. W.

*Habitat in rupibus* Weſtmorlandicis, Cornubienſibus, Walliae, Norvegiae. 4 (v. f.)

Radix *ramoſa perennis.* Caulis *procumbens teres foliatus glaber ramoſus rubeſcens, ramis alternis.* Folia *alterna ſubtrifariam imbricata adnato-ſeſſilia ſubovata acutiuſcula, ſuperne planiuſcula, ſubtus gibba, pulpoſa nuda.* Cyma *ramoſa bifida ſubrecurva.* Flores *ſeſſiles ſecundi.* Corolla *alba ſeu purpuraſcenti-alba.* Capſulae *purpuraſcentes.* Hudſ. l. c.

25. SEDUM *annuum.*

S. caule erecto ſolitario annuo, foliis ovatis ſeſſilibus gibbis alternis, cyma recurva. *Fl. ſuec.* 391, 405. * *Mill. dict. n.* 7.

S. minimum non acre, flore albo. *Raj. angl.* 3. *p.* 270. *t.* 12. *f.* 2. *figura tenuis.*

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 639.

Jähriges Sedum. W.

*Habitat in* Europa *boreali.* ⊙ (v. v.)

Simile *S. antecedenti, ſed* Folia *rubicunda et planta annua.* Flores *ſimiliter lutei.*

*26. SEDUM *pubeſcens.*

C. pubeſcens, foliis oblongis obtuſis ſupra planiuſculis, cyma bifida, petalis lanceolatis. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 52.*

Behaartes Sedum. W.

*Habitat in fiſſuris rupium* Tuneti.

27. SEDUM *villoſum.*

S. foliis oblongis ſupra planiuſculis pedunculisque axilla-

ribus subunifloris pubescentibus, petalis ovatis obtusiusculis. *Vahl. symb.* 2. *p.* 52.

S. caule erecto, foliis planiusculis, pedunculisque subpilosis. *Mill. dict. n.* 10. *Leers. herb. n.* 339. *Pollich. pal. n.* 433. *Moench. hass. n.* 374. *Mattusch. sil. n.* 323. *Fl. dan. t.* 24. *Kniph. cent.* 3. *n.* 83. *Doerr. nass. p.* 211. *Hoffm. germ.* 157. *Roth. germ. I.* 196. *II.* 503.

S. hirsutum et viscidum, foliis linearibus, obtusis, planiusculis. *Hall. helv. n.* 962.

S. palustre subhirsutum purpureum. *Bauh. pin.* 283.

S. minus III. f. palustre. *Clus. hist.* 2. *p.* 59.

S. palustre II. *Clus.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 639.

Haariges Sedum. W.

*Habitat in pratis paludosis* Germaniae, Angliae, Galliae, Pyrenaeis. ⊙ (v. s.)

Pedunculi *laterales* 1-*s.* 2-*flori*; Flores *purpurei. Hall.*

## 28. SEDUM *atratum.*

S. caule erecto, floribus corymbosis fastigiatis. *Jacq. aust.* 1. *t.* 8. *Hoffm. germ.* 157.

S. caule folioso, erecto, umbellato, humillimo, foliis teretibus. *Hall. helv. n.* 963.

S. saxatile, atrorubentibus floribus. *Bauh. pin.* 238. *prodr.* 132. *Scheuchz. it.* 1. *p.* 48. *t.* 6. *f.* 34. *Segui. ver.* 3. *p.* 207.

S. saxatile, variegato flore. *Bauh. prodr.* 132. *Hall.* R. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 640.

Schwärzliches Sedum. W.

*Habitat in* Helvetiae, Italiae *alpibus. Allioni.* ⊙ (v. s.)

*Diversissime planta a* Crassula *rubente.* Caulis *erectus, pollicaris, ramis ad radicem duobus oppositis, altitudine caulis.* Folia *oblonga, basi soluta.* Pedunculi *alterni, uniflori, in corymbum fastigiatum digesti.* Calyces *atro-purpurascentes.* Petala *alba, ovata, longitudine calycis.* Stamina *decem.* Germina *atropurpurascentia.*

## *29. SEDUM *nudum.*

S. foliis sparsis oblongo-cylindraceis obtusis, caulibus fruticosis ramosissimis, ramis tortuosis, cymis terminalibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 112.

Nacktästiges Sedum. W.

*Habitat in* Madera. ♄ (v. v.)

## 914. PENTHORUM.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 790.

*Cal.* 5-fidus. *Petala* nulla ad quinque. *Capſ.* 5-cuſpidata, 5-locularis.

### 1. PENTHORUM *ſedoides.*

Penthorum. *Gron. virg.* 51. * *Act. upſ.* 1744. *p.* 12. *t.* 2. *Mill. dict.*

*Houttuyn Lin. Pſl.* Syſt. 6. *p.* 641.

Sedumartiges Fünfſpitzenkraut. W.

*Habitat in* Virginia. 24 (v. v.)

Caulis *herbaceus, diffuſus, ſeu rectus, angulatus, angulis ſcabris.* Rami *alterni, cauli ſimiles.* Folia *alterna, ſubpetiolata, ſerrata, vix carnoſa, utrinque viridia.* Pedunculus *terminalis ſpicis aliquot revolutis.* Flores *alterni, pedicellati, adſcendentes.* Calyx 5-10-*fidus*: *laciniis alternis ſaepius majoribus.* Stamina 10, *alba.* Antherae *rubicundae.* Styli *nulli.*

## 915. BERGIA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 791.

*Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Capſ.* 1, globoſa 5-toruloſa, 5-locularis, 5-valvis: valvulis petaloideis. *Sem.* plurima.

### 1. BERGIA *verticillata.* W.

B. foliis lanceolatis apice denticulatis, floribus verticillatis. W.

B. (*capenſis*) foliis lanceolatis ſ. ellipticis, floribus verticillatis. *Lin. ſuppl.* 243.

Bergia capenſis. *Mant.* 241. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 50.

Pola-tſjira. *Rheed. mal.* 9. *p.* 153. *t.* 78.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 643.

Wirtelblütige Bergie. W.

*Habitat in* India *orientali.* (v. ſ.)

Statura *Ammanniae.* Caulis *ſimpliciſſimus, ſemipedalis, craſſitie pennae columbinae, erectus, laevis, ſubſucculentus.* Folia *oppoſita, ſubpetiolata, lanceolata obtuſiuſcula tenuiſſime ſerrata, laevia, patentia.* Flores *verticillati, ſubſeſſiles, copioſiſſimi, confertiſſimi.* Capſulae *valvulae poſt maturitatem perſiſtentes formant quaſi florem pentapetalum rotatum.*

*Mutatii nomen triviale, quum planta non crescat ad Promontorium bonae spei, sed in India orientali.* W.

2. BERGIA *glomerata.*

B. foliis obovatis crenulatis, floribus glomeratis. *Lin. suppl.* 243. *Thunb. prod.* 82.

Knaulblütige Bergie. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei.

*Diversa a praecedente:* foliis *minutis glomeratis itidem crenulatis*, floribus *minutis glomeratis*, caule *magis diffuso ramoso.*

## 916. SURIANA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 792.

*Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. *Styli* inserti lateri interiori germinum. *Sem.* 5, nuda.

1. SURIANA *maritima.*

Suriana. *Hort. cliff.* 592. *Iacq. amer.* 140. *Mill. dict. Swartz. obs.* 185. * *Forst. prod. n.* 199. *Lamarck illust. gen. t.* 389.

Thymelaeae facie frutex maritimus tetraspermus. *Sloan. jam.* 2. *p.* 29. *t.* 162. *f.* 4.

Suriana foliis portulacae angustis. *Plum. gen.* 37. *ic.* 249. *f.* 1.

S. maritima, foliis lanceolatis, floribus singularibus. *Brown. jam.* 190.

Arbor americana, salicis folio, frondosa bermudiensis. *Pluk. alm.* 44. *t.* 241. *f.* 5.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 1. *p.* 668.

Meerstrands Süriane. W.

*Habitat in* Americae *calidioris maritimis.* ♄

Stamina *huic* 10 *adscripsit Iacquin.*

## 917. GRIELUM.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 793.

*Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Filamenta* persistentia. *Pericarpia* 5, monosperma.

1. GRIELUM *tenuifolium.*

Geranium (*grandiflorum*) pedunculis simplicibus uniforis, foliis tripartito-multifidis linearibus tomentosis. *Burm. ger.* 1. *Spec. pl.* 2. *p.* 958.

Geranium frutescens incanum, flore magno luteo dentato. *Burm. afr.* 88. *t.* 34. *f.* 1.
Ranunculo-Platycarpos. *Burm. afr* 145. *t.* 53.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 645.
Dünnblättriges Grielum. W.
*Habitat in* Aethiopia. ♃

*Frutex.* Folia *Abrotani, incana, subtomentosa, alterna.* Pedunculi *uniflori absque bracteis.* Calyces *glabri.* Corollae *luteae.*

## 918. OXALIS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 794.

*Cal.* 5-phyllus. *Petala* unguibus connexa. *Stam.* inaequalia 5 breviora exteriora basi connata. *Caps.* angulis dehiscens, 5-gona.

* *Foliis simplicibus.*

### 1. OXALIS *monophylla.*

O. acaulis, scapo unifloro, foliis ellipticis obtusis, filamentis glabris. W.
O. (*monophylla*) stipitata simplicifolia stylis intermediis. *Iacq. Oxal. n.* 35. *p.* 56. *t.* 79. *f.* 3. *
O. foliis ovatis indivisis. *Thunb. Diss. de Oxal. n.* 1. *p.* 8. *t.* 1. *f.* 1. *
O. scapo unifloro, foliis simplicibus. *Mant.* 241.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 644.
Einblättriger Sauerklee. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. ♃ (v. s.)

Radix *bulbosa.* Folia *radicalia petiolata simplicia* (*nec ternata*), *ovata s. obovata* (*Bellidis*) *integerrima tenera nuda.* Petioli *foliis longiores.* Scapi *filiformes plures uniflori aphylli.* Flos *folio major similis O. Acetosellae.*

### *2. OXALIS *lepida.*

O. acaulis scapo unifloro, foliis obovatis subretusis, filamentis glandulosо-pilosis simplicibus. W.
O. (*lepida*) stipitata simplicifolia, stylis longissimis. *Iacq. Oxal. n.* 34. *p.* 55. *t.* 21. *
Niedlicher Sauerklee. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. ♃
Corolla *albida.* W.

*3. OXALIS *roſtrata.*

O. acaulis ſcapo unifloro, foliis obovatis retuſis, filamentis interioribus apice roſtratis piloſo-glanduloſis, antheris lateralibus. W.

O. (*roſtrata*) ſtipitata ſimplicifolia, ſtylis breviſſimis. *Iacq. Oxal. n.* 36. *p.* 57. *t.* 22. *

Schnabelfädiger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ℏ

Corolla *dilute violaceo-albida.* W.

*Hae ſpecies habitu, foliis, bulbo floribusque adeo ſibi ſimiles ſunt, ut aegre diſtingui poſſint.* Genitalia *vero differunt quam maxime. Praeter longitudinem diverſam ſtylorum ſunt in O. lepida* filamenta *interiora gibboſa denticulata inaequalia, exteriora autem omnium breviſſima. In O. monophylla* filamenta *ſunt edentula et aequalia. Talia etiam ſunt in O. roſtrata, ſed hic apice ſingulariter roſtrata, qua nota differt ab omnibus mihi viſis Oxalidibus.* Iacq. l. c.

** *Foliis binatis.*

*4. OXALIS *aſinina.*

A. acaulis ſcapo unifloro, foliis binatis lanceolatis margine cartilagineis denticulatis, petiolis alatis. W.

O. (*aſinina*) ſtipitata, binatifolia, foliolis lanceolatis, ſtylis intermediis. *Iacq. Oxal. n.* 58. *p.* 59. *t.* 24. *

Eſelsohrblättriger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ℏ (v. ſ.)

Corolla *magna flava.* Filamenta *interiora glanduloſa.* Petioli *breviſſime alati.* Scapus *foliis longior.* W.

*5. OXALIS *lanceaefolia.*

O. acaulis, ſcapo unifloro, foliis binatis ternatisque margine cartilagineis ſcabris, petiolis alatis. W.

O. (*lanceaefolia*) ſtipitata, foliis binatis ternatisque, ſtylis longiſſimis, filamentis edentulis. *Iacq. Oxal. n.* 40. *p* 61. *t.* 26. *

Lanzenblättriger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ℏ

Corolla *flava.* Filamenta *glabra.* Petioli *breviſſime alati.* Scapus *longitudine foliorum.* W.

*6. OXALIS *leporina.*

O. acaulis, ſcapo unifloro, foliis binatis ellipticis emarginatis, margine cartilagineis denticulatis, petiolis alatis. W.

O. (*leporina*) ſtipitata binatifolia, foliolis lanceolatis, ſtylis longiſſimis, filamentis denticulatis. *Iacq. Oxal. n.* 39. *p.* 60. *t.* 25. *

Haſenohrblättriger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

Corolla *alba margine rubicunda.* Filamenta *interiora glanduloſa.* Folia *glauca.* Ala *petiolorum ovata.* Scapus *foliis longior.* W.

*7. OXALIS *criſpa.*

O. acaulis, ſcapo unifloro, foliis binatis ſubrotundo-obovatis emarginatis, margine undulatis petiolis ſubrotundo-alatis. W.

O. (*criſpa*) ſtipitata binatifolia, foliolis obverſe ovatis criſpis. *Iacq. Oxal. n.* 37. *p.* 58. *t.* 23. *

Krauſer Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

Corolla *inter maximas hujus generis alba.* Filamenta *interiora et exteriora glanduloſa.* Ala *petiolorum ſubrotundo-ovata magna.* Folia *margine cartilaginea crenata undulata.* Scapus *foliis longior.* W.

*** *Foliis ternatis, ſcapo unifloro.*

*8. OXALIS *fabaefolia.*

O. acaulis, ſcapo unifloro, foliis ternatis obovatis emarginatis mucronatis, petiolis alatis. W.

O. (*fabaefolia*) foliolis obverſe-ovatis planis, petiolis alatis. *Iacq. Oxal. n.* 41. *p.* 63. *t.* 27. *

Bohnenblättriger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

Corolla *ampla flava.* Filamenta *glanduloſa.* Scapus *foliis longior.* Ala *petiolorum ſubrotunda.* W.

*9. OXALIS *laburnifolia.*

O. acaulis, ſcapo unifloro, foliis ternatis oblongis obtuſis foliolo intermedio baſi attenuato, petiolo ſemitereti compreſſo, calycibus margine glanduloſo-piloſis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*laburnifolia*) foliolo medio ſublanceolato, lateralibus oblique oblongis, ſtylis longiſſimis, filamentis denticulatis. *Iacq. Oxal. n.* 42. *p.* 63. *t.* 28. *

Bohnenbaumblättriger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

Planta *pubeſcens.* Petioli *compreſſi ſemiteretes, nudi, ut in affinibus ſpeciebus, purpuraſcentes.* Sca-

pus *foliis longior medio binis bracteis minutis instructus.* Calycis *foliola pubescentia margine piloso-glandulosa.* Corolla *flava.* Filamenta *interiora glandulosa.* W.

*10. OXALIS *sanguinea.*

O. acaulis, scapo unifloro, foliis ternatis oblongis obtusis, foliolo intermedio basi attenuato, petiolo semitereti compresso, calycibus simpliciter pilosis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*sanguinea*) foliolo medio sublanceolato, lateralibus oblique oblongis, stylis intermediis. *Iacq. Oxal. n.* 43. *p.* 64. *t.* 29.*

Blutigblättriger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

Planta *subpubescens.* Petioli *compressi semiteretes purpurascentes.* Folia *juniora sanguinea.* Scapus *longitudine foliorum medio bracteis binis instructus.* Calycis *foliola pubescentia, nec glandulosa.* Corolla *saturate flava.* Filamenta *interiora hispida.* W.

*11. OXALIS *ambigua.*

O. acaulis, scapo unifloro, foliis ternatis, foliolis oblongis obtusis, intermedio cuneiformi, calycinis foliolis aequalibus ciliato-pilosis apice bimaculatis, stylis staminibus longioribus. W.

O. (*ambigua*) stylis longissimis, foliolis immaculatis planis, calycinis foliolis aequalibus. *Iacq. Oxal. n.* 59. *p.* 80. *t.* 43.*

Zweifelhafter Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

Folia *pilosiuscula ciliata plana.* Corolla *alba fundo flavescente.* Filamenta *interiora glandulosa.* W.

*12. OXALIS *undulata.*

O. acaulis, scapo unifloro, foliis ternatis, foliolis oblongis obtusis undulatis, intermedio cuneiformi, calycinis foliolis pilosis punctatis, unico spathulato majore, stylis staminibus longioribus. W.

O. (*undulata*) stylis longissimis, foliolis immaculatis undulatis, foliolo uno calycis spathulato. *Iacq. Oxal. n.* 60. *p.* 81. *t.* 44.*

Wellenförmiger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4 (v. s.)

Folia *pilosiuscula ciliata margine undulata.* Corolla *alba fundo flavo.* Filamenta *interiora glandulosa.* W.

*13. OXALIS *fuscata.*

O. acaulis scapo unifloro, foliis ternatis maculatis oblongis obtusis, foliolo intermedio cuneiformi-subrotundo, calycinis foliolis aequalibus interrupte bistriatis, stylis staminibus longioribus. W.

O. (*fuscata*) stylis longissimis, foliolis utrinque maculatis. *Iacq. Oxal. n.* 61. *p.* 82. *t.* 45. *

Braunfleckiger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4 (v. s.)

Folia *pilosa subretusa utrinque maculata.* Corolla *alba fundo flavescente.* Stamina *interiora glandulosa. Valde affinis O. ambiguae et forte varietas.* W.

*14. OXALIS *glandulosa.*

O. acaulis, scapo unifloro, foliis ternatis oblongis obtusis, foliolo intermedio cuneiformi, calycibusque glandulosis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*glandulosa*) stylis intermediis, foliis calycibusque capitate ciliatis. *Iacq. Oxal. n.* 62. *p.* 83. *t.* 46. *

Drüsiger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

Folia, petioli *et* calyces *glandulis pedicellatis tecti.* Scapus *longitudine foliorum.* Corolla *alba fundo flavo.* Stamina *interiora glandulosa.* W.

*15. OXALIS *tricolor.*

O. acaulis, scapo unifloro, foliis ternatis oblongis obtusis, foliolo intermedio cuneiformi, calycibusque simpliciter pilosis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*tricolor*) stylis intermediis, ciliis simplicibus. *Iacq. Oxal. n.* 63.

α. corolla interne flava. *Iacq. l. c. p.* 84. *t.* 47. *

β. corolla interne alba. *Iacq. l. c. p.* 85. *t.* 48.

Dreyfarbiger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4 (v. s.)

*Similis praecedenti, sed* scapus *longior, et* pili *foliorum et calycis simplices nec glandula instructi. In varietate α.* foliola *sunt longiora cuneiformia,* corolla *interne flava, externe alba rubro-marginata. In varietate β. est* corolla *interne alba fundo flavo, externe alba rubro-marginata.* W.

*16. OXALIS *rubro-flava.*

O. acaulis, scapo unifloro foliis parum longiore erecto,

foliis ternatis lanceolato-oblongis retuſis, foliolo intermedio cuneiformi, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. *(rubro-flava)* ſtylis breviſſimis, foliolis immaculatis, ſcapis erectis. *Iacq. Oxal. n.* 65. *p.* 87. *t.* 50. *

Gelbrother Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24 (v. ſ.)

Foliola *magis lanceolata quam in binis ſequentibus*, ſcapus*que parum foliis longior.* Corolla *flava externe rubro-marginata.* Stamina *interna glanduloſa.* W.

* 17. OXALIS *flaccida.*

O. acaulis ſcapo unifloro foliis duplo longiore nutante, foliis ternatis oblongis retuſis, foliolo intermedio cuneiformi, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. *(flaccida)* ſtylis breviſſimis, foliolis immaculatis, ſcapis flaccidis. *Iacq. Oxal. n.* 66. *p.* 88. *t.* 51. *

Welkſchaftiger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24 (v. ſ.)

Corolla *alba fundo flava externe rubro-marginata.* Filamenta *interiora glanduloſa. A praecedente ſcapo flaccido nutante multo longiore diſtincta.* W.

* 18. OXALIS *exaltata.*

O. acaulis, ſcapo unifloro foliis duplo longiore ſtricto, foliis ternatis ellipticis emarginatis ſubtus villoſis, foliolo intermedio cuneiformi, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. *(exaltata)* ſtylis breviſſimis, foliolis fuſco-maculatis, ſcapis erectis. *Iacq. Oxal. n.* 64. *p.* 86. *t.* 49. *

Steifſchaftiger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24 (v. ſ.)

Foliola *in binis praecedentibus ſunt pubeſcentia ſed non inferne tam denſe villoſa.* Scapi *ſtricti.* Corolla *minor alba fundo flava, externe rubro-marginata.* Filamenta *interiora hiſpida. Parvitate foliolorum etiam ab antecedentibus diſtincta.* W.

* 19. OXALIS *variabilis.*

O. acaulis, ſcapo unifloro foliis longiore flaccido, foliis ternatis ſubrotundis, foliolo intermedio cuneiformi, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. *(variabilis)* ſtylis breviſſimis, foliolis immaculatis leviſſime emarginatis. *Iacq. Oxal. n.* 67. *p.* 89. *t.* 52. *

O. *(purpurea)* β. foliis totis viridibus limbo albo. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 8. *p.* 13. β.

β. flore rubro. *Iacq. l. c. p.* 90. *t.* 53.*
Veränderlicher Sauerklee. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Foliola *ſubrotunda piloſa.* Filamenta *interiora et exteriora glanduloſa. In varietate α.* calycis *foliola ſunt margine glanduloſa et apice piloſa et* corolla *incarnato-alba. In varietate β. ſunt* calyces *ſimpliciter piloſi et* corolla *roſacei coloris.* W.

*20. OXALIS *grandiflora.*
O. acaulis, ſcapo unifloro foliis breviore erecto, foliis ternatis ſubrotundis, foliolo intermedio cuneiformi, petalis truncatis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.
O. (*grandiflora*) ſtylis breviſſimis, foliolis ſubtus ſaepe ſanguineis vix emarginatis. *Iacq. Oxal. n.* 68. *p.* 91. *t.* 54. *
Groſsblütiger Sauerklee. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Corolla *candida fundo flaveſcente, petalis truncatis. A praecedente magnitudine floris, et ſcapo ſtricto breviore diſtincta.* W.

*21. OXALIS *ſulphureá.*
O. acaulis, ſcapo unifloro foliorum longitudine, foliis ternatis ſubrotundis, calycinis foliolis margine clavato-piloſis apice reflexis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.
O. (*ſulphurea*) ſtylis breviſſimis, filamentis edentulis, calyce ciliato. *Iacq. Oxal. n.* 77. *p.* 100. *t.* 63. *
Mattgelber Sauerklee. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Folia *ſubtus ſanguinea aureo-punctata.* Scapus *longitudine foliorum.* Calycis *foliola apice reflexa margine glandulis pedicellatis et pilis clavatis inſtructa.* Corolla *pallide ſulphurea vel albo-luteſcens.* Filamenta *interiora hiſpida.* W.

*22. OXALIS *purpurea.*
O. acaulis, ſcapo unifloro foliis longiore, foliis ternatis ſubrotundis, petiolis teretibus, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.
O. (*purpurea*) ſtylis intermediis, filamentis denticulatis petiolis teretibus, foliolis immaculatis. *Iacq. Oxal. n.* 70. *p.* 93. *t.* 56. *
ε. O. (*luxula*) ſtylis intermediis, filamentis denticulatis,

petiolis teretibus, foliolis saepe subtus purpurascentibus. *Iacq. Oxal. n.* 71. *p.* 94. *t.* 57. *

Oxalis purpurea. *Thunb. diss. de Oxal. n.* 8. *p.* 13. *var.* 2. *γ.*
Purpurfarbener Sauerklee. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. 4 (v. s.)

Folia *subrotunda levissime retusa, ciliata. In α.* corolla *purpurea fundo flavo, in β.* corolla *alba fundo flavo et* folia *interdum subtus fusco-sanguinea. In binis varietatibus sunt* filamenta *interiora et exteriora glandulosa.* W.

*23. OXALIS *breviscapa.*

O. acaulis, scapo unifloro petiolis duplo breviore, foliis ternatis subrotundis, petiolis compresso-planis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*breviscapa*) stylis intermediis, filamentis denticulatis, petiolis crassis compressis. *Iacq. Oxal. n.* 72. *p.* 95. *t.* 58. *
Kurzschaftiger Sauerklee. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

Folia *subtus sanguinea punctata.* Scapus *brevissimus.* Corolla *alba fundo flavescente.* Staminibus *interioribus glandulosis.* W.

24. OXALIS *speciosa.*

O. acaulis, scapo unifloro foliorum longitudine, foliis ternatis subrotundis ciliatis, stylis staminibus interioribus longioribus. W.

O. (*speciosa*) stylis longissimis, foliolis supra immaculatis, subtus sanguineis et aureo punctatis. *Iacq. Oxal. n.* 74. *p.* 97. *t.* 60. *

O. (*purpurea*) scapis unifloris, foliis ternatis, foliolis subrotundis ciliatis. *Thunb. Diss. de Oxal. n.* 8. *p.* 12. *var.* 1. *α.*

O. (*purpurea*) scapo unifloro, foliis ternatis emarginatis ciliatis. *Sp. pl.* 621. *Mill. dict. n.* 5. *Fabr. helmst.* 244.

O. scapo unifloro, foliis ternatis, radice bulbosa. *Hort. cliff.* 175. *Roy. lugdb.* 458. *Sp. pl.* 1. *p.* 433. *Ehret. pict. t.* 10. *f.* 2.

Oxalidi affinis planta bulbosa africana, flore purpureo magno. *Breyn. cent.* 102. *t.* 46.

Oxys bulbosa africana rotundifolia, caulibus et floribus purpureis amplis. *Commel. hort.* 1. *p.* 41. *t.* 21.

*β.* O. (*suggillata*) stylis longissimis, foliolis adultis sub-

tus totis et ſupra ad oras lividis. *Iacq. Oxal. n. 75. p. 98. t. 61.* *

Oxalis purpurea. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n. 8. p. 13. var. 2. β.*

Oxys bulboſa trifolia hirſuta, flore albido. *Burm. afr. 67. t. 27. f. 3.*

γ. O. (*rigidula*) ſtylis longiſſimis, foliolis immaculatis. *Iacq. Oxal. n. 75. p. 96. t. 59.* *

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 646.

Prächtiger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4 (v. ſ.)

Folia *obcordata obſolete emarginata, etiam ſubtus glabra tenuiſſime ciliata ſubcuneiformi-rotundata.* Scapi *uniflori longitudine foliorum.* Petioli *piloſi.* Calyx *pubeſcens.* Corolla *majuſcula campanulata quinquepartita purpuraſcens tubo flavo.* Filamenta *quinque exteriora breviora baſi connata, dente diſtinguente ſingula interiora.* Stigmata *plumoſa proſtrata,* extra filamenta *longiora.*

Staminum *fabrica in omnibus fere eadem, exceptis paucis ſpeciebus, quae dentibus diſtinguentibus in ſtaminibus exterioribus carent.* W.

*In varietate α* corolla *purpurea fundo flavo, et* folia *ſubtus purpurea punctata;* β. corolla *alba fundo flaveſcente et* folia *infeine et ſuperne margine livido-ſanguinea;* γ. corolla *alba fundo et margine petalorum externe flavo,* folia *immaculata et* ſcapi *longiores.* W.

25. OXALIS *Acetoſella.*

O. acaulis, ſcapo unifloro foliis longiore, foliis ternatis obcordatis, ſtylis longitudine ſtaminum interiorum, radice articulata. W.

O. ſtylis aequalibus. *Iacq. Oxal. n.* 91. *p.* 114. *t.* 80. *f.* 1. *

O. ſcapis unifloris, foliis ternatis, foliolis obcordatis piloſis. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 5. *p.* 9. *

O. ſcapo unifloro, foliis ternatis obcordatis, radice dentata. *Syſt. veg.* 360. *Roth. germ. I.* 200. *II.* 516. *Hoffm. germ.* 157.

O. ſcapo unifloro, foliis ternatis, radice ſquamoſo-articulata. *Hort. cliff.* 175 *Fl. ſuec.* 385. 406. *Roy. lugdb.* 458. *Mat. med.* 118. *Pollich. pal. n.* 434.

O. foliis ternatis ſcapo unifloro. *Fl. lapp.* 194.

Oxys ſcapo unifloro, foliis ternatis, radice ſquamoſe articulata. *Hall. helv. n.* 928.

Oxys trifolium aceioſum floribus lacteis. *Tabern.* 525.

Lujula. *Blackw. t.* 308.

Trifolium acetosum vulgare. *Bauh. pin.* 330. *Dod. pempt.* 578.

β. Oxys flore subcoeruleo. *Tournef. inst.* 88.

γ. Oxys flore purpurascente. *Tournef. inst.* 88.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 645.

Gemeiner Sauerklee. W.

*Habitat in sylvis nemoribusque umbrosis* Europae, Japoniae. 4 (v. v.)

*26. OXALIS *magellanica.*

O. acaulis, scapo unifloro longitudine petioli, foliis ternatis obcordatis carnosis, stylis longitudine staminum interiorum, radice fibrosa. W.

O. (*magellanica*) scapis unifloris, foliolis subrotundis emarginatis carnosis. *Forst. comment. goett.* 9. *p.* 55. *

Magellanischer Sauerklee. W.

*Habitat in* Terra del Fuego *locis irriguis.* 4

*27. OXALIS *marginata.*

O. acaulis, scapo unifloro petiolis dimidio breviore, foliis ternatis obcordatis, calycinis foliolis clavato-ciliatis apice reflexis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*marginata*) stylis intermediis, filamentis edentulis aequalibus. *Jacq. Oxal. n.* 85. *p.* 108. *t.* 68. *

Randblättriger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

Foliola *subrotundo-obcordata ciliata inferne sanguinea viridi marginata.* Calycis *foliola apice reflexa, margine pilis clavatis ciliata.* Corolla *alba fundo flavescente.* Filamenta *interiora hispida.* W.

*28. OXALIS *pulchella.*

O. acaulis, scapo unifloro petiolis triplo breviore, foliis ternatis obcordatis, calycinis foliolis clavato-ciliatis apice reflexis, stylis staminibus interioribus longioribus. W.

O. (*pulchella*) stylis longissimis, filamentis edentulis. *Jacq.* Oxal. *n.* 86. *p.* 109. *t.* 69. *

Schöner Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

Foliola *subtus sanguinea aureo-punctata.* Corolla *alba ramis rubicundis, fundo flavescente. Simillima praecedenti, diversa tamen:* scapo *breviore,* longitudine *stylorum et* staminibus *interioribus glandulosis.* W.

*29. OXALIS *obtusa.*

O. acaulis, scapo unifloro foliis longiore, foliis ternatis obcordatis dense pilosis, calycinis foliolis apice rotundato-obtusis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*obtusa*) stylis intermediis, filamentis denticulatis inaequalibus, foliolis calycinis rotundato-obtusis. *Iacq. Oxal. n.* 83. *p.* 106. *t.* 79. *f.* 1. *

Oxalis lanata. *Thunb. Diss. de Oxal. n.* 6. *p.* 11. *.

Stumpfkelchiger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

Foliola *dense pubescentia.* Corolla *rubra.* Calyx *pilosus, foliolis obtusissimis.* Filamenta *glabra.* W.

30. OXALIS *lanata.*

O. acaulis, scapo unifloro foliis longiore, foliis ternati obcordatis villosis, calycinis foliolis acutis, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*lanata*) stylis brevissimis, filamentis gibbose denticulatis aequalibus, foliolis utrinque hirsutissimis. *Iacq. Oxal. n.* 81. *p.* 104. *t.* 77. *f.* 2. *

O. (*lanata*) scapis unifloris, foliis ternatis, foliolis obcordatis hirsutis. *Thunb. Diss. de Oxal n.* 6. *p.* 10. *ß.*

O. (*lanata*) scapo unifloro, foliis ternatis obcordatis tomentosis. *Lin. suppl.* 244. * (*excluso Raji synonymo et floris colore.*)

Haariger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

Foliola *lanata.* Corolla *alba.* Calyx *villosus, foliolis acutis.* Filamenta *exteriora et interiora hirta.* W.

*31. OXALIS *truncatula.*

O. acaulis, scapo unifloro foliis duplo longiore, foliis ternatis foliolis triangularibus margine villosis, stylis staminibus interioribus longioribus. W.

O. (*truncatula*) stylis longissimis, foliolis truncatis. *Iacq. Oxal. n.* 76. *p.* 99. *t.* 62. *

Dreyeckigblättriger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

Foliola *cuneiformia truncata subtus livida, margine villosa.* Corolla *lilacina fundo albido.* Filamenta *interiora glandulosa.* W.

*32. OXALIS *strumosa.*

O. acaulis, scapo foliis breviore, foliis ternatis obcorda-

tis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus ſub apice ſtrumoſis. W.

O. (*ſtrumoſa*) ſtylis breviſſimis, filamentis denticulatis aequalibus, foliolis utrinque maculatis. *Iacq. Oxal. n.* 79. *p.* 102. *t.* 64. *

Knopfgriffiicher Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Foliola *obcordata ſuperne fuſco-maculata, inferne ſordide ſanguinea.* Corolla *alba fundo flavo, petalis externe margine rubris.* Stamina *interiora glanduloſa.* Styli *ſub ſtigmate inferne tuberculo inſtructi.* W.

## 33. OXALIS *punctata.*

O. acaulis, ſcapo foliis longiore, foliis ternatis obcordatis punctatis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*punctata*) ſtylis breviſſimis, filamentis denticulatis inaequalibns, foliolis ſubtus coloratis et aureo punctatis. *Iacq. Oxal. n.* 82. *p.* 105. *t.* 66. *

O. ſcapis unifloris, foliis ternatis, foliolis obcordatis punctatis. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 3. *p.* 9. *t.* 1. *f.* 3. *

O. ſcapo unifloro, foliis ternatis obcordatis punctatis. *Lin. ſuppl.* 243.

Punctirter Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *in collibus arenoſis verſus montem tabularem.* 4 (v. ſ.)

Foliola *obcordata utrinque excavato-punctata, inferne rubra, aureo-punctata.* Corolla *albido-rubicunda fundo flavo.* Filamenta *interiora et exteriora glanduloſa.* W.

## *34. OXALIS *lutcola.*

O. acaulis, ſcapo unifloro foliorum longitudine, foliis ternatis obcordatis piloſis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*luteola*) ſtylis breviſſimis, filamentis denticulatis aequalibus, foliolis utrinque immaculatis et villoſulis. *Iacq. Oxal. n.* 80. *p.* 103. *t.* 65. *

Gelblicher Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Foliola *obcordata piloſa.* Corolla *flava.* Filamenta *interiora glanduloſa.* W.

## *35. OXALIS *macrogonya.*

O. acaulis, ſcapo unifloro foliis breviore, foliis ternatis

obcordatis ciliatis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*macrogonya*) ſtylis longiſſimis, filamentis denticulatis, ſtipite ſubterraneo. *Iacq. Oxal. n.* 87. *p.* 110. *t.* 70. *

Langgegliederter Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

Foliola *obcordata margine ciliata.* Scapi *articulus ad baſin longior quam in reliquis.* Corolla *flava.* Filamenta *interiora glanduloſa.* W.

*36. OXALIS *fallax.*

O. acaulis, ſcapo unifloro foliis longiore, foliis ternatis obcordatis piloſiuſculis ciliatis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*fallax*) ſtylis intermediis, filamentis denticulatis aequalibus. *Iacq. Oxal. n.* 84. *p.* 107. *t.* 67.*

Betrüglicher Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

*Simillima praecedenti, ſed:* articulus *ſcapi breviſſimus,* ſcapus *longior et* ſtyli *breviores.* Corolla *flava.* W.

*37. OXALIS *tenella.*

O. acaulis, ſcapo unifloro foliis longiore, foliis ternatis obcordatis glabris, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*tenella*) ſubcauleſcens, corollis campanulatis, filamentis edentulis, foliolis obverſe cordatis. *Iacq. Oxal. n.* 32. *p.* 53. *t.* 19. *

Zarter Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

Foliola *obcordata glabra.* Calycis *foliola acuta.* Corolla *pallide violacea fundo flavo.* Filamenta *interiora et exteriora glanduloſa.* W.

*38. OXALIS *minuta.*

O. acaulis, ſcapo foliis longiore, foliis ternatis lanceolatis acutis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*minuta*) foliolis lanceolatis acutis, ſtylis longiſſimis, filamentis edentulis. *Iacq. Oxal. n.* 44. *p.* 65. *t.* 79. *f.* 2. *

O. ſcapis unifloris, foliis ternatis, foliolis oblongis glabris. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 2. *p.* 8. *t.* 2. *f.* 3. *

Kleinſter Sauerklee. W.

*Habitat in campis arenosis* Cap. b. spei *versus montem* tabularem. 4

Corolla *alba fundo flavo.* Filamenta *glabra.* W.

*39. OXALIS *pusilla.*

O. subcaulescens, scapo unifloro longitudine foliorum, foliis ternatis lineari-cuneiformibus emarginatis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*pusilla*) filamentis denticulatis, stylis intermediis. *Iacq. Oxal. n.* 58. *p.* 79. *t.* 42. *

Niedriger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

Saepe *acaulis, interdum vero caulis parum elongatus decumbens.* Foliola *glauca lineari-cuneiformia truncata emarginata.* Corolla *alba pallide incarnata.* Filamenta *glabra.* W.

**** *Foliis ternatis, scapo multifloro.*

40. OXALIS *compressa.*

O. acaulis, scapo bifloro foliis longiore, foliis ternatis obcordatis, petiolis planis compressis, stylis staminibus interioribus longioribus. W.

O. (*compressa*) foliis ternatis subtus hirsutis, petiolis compressis, stylis longissimis. *Iacq. Oxal. n.* 19. *p.* 40. *t.* 78. *f.* 3. *

O. scapis unifloris, foliis ternatis, foliolis obcordatis ciliatis, petiolis compressis. *Thunb. Diss. de Oxal. n.* 7. *p.* 11. *

O. scapis unifloris, foliis ternatis, foliolis obcordatis, petiolis dilatato-planatis. *Lin. suppl.* 243.

Flachstieliger Sauerklee. W.

*Habitat in campis arenosis humidis* Cap. b. spei. 4

Scapi *biflori.* Corolla *flava.* Filamenta *glabra.* W.

41. OXALIS *sericea.*

O. acaulis, scapo umbellifero foliis longiore, floribus nutantibus, foliis ternatis obcordatis sericeis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*sericea*) foliis ternatis tomentosis, stylis intermediis. *Iacq. Oxal. n.* 13. *p.* 34. *t.* 77. *f.* 1. *

O. scapis umbelliferis, foliis ternatis tomentosis. *Thunb. Diss. de Oxal. n.* 13. *p.* 16. *

O. caulescens, pedunculis umbelliferis, foliolis obcordatis tomentosis. *Lin. suppl.* 243.

Seidenartiger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei *inter montem* tabularem *et* leonis. 4

Calycis *foliola acuminata.* Corolla *flava.* Filamenta *glabra.* W.

*42. OXALIS *megalorhiza.*

O. acaulis, ſcapo umbellifero foliis breviore, floribus erectis, foliis ternatis obcordatis, radice craſſa multicipite. W.

O. (*megalorhiza*) foliis ternatis, radice multicipite. *Iacq. Oxal. n.* 12. *p.* 33. *

Oxys luteo flore radice craſſiſſima. *Feuill. peruv.* 2. *p.* 734. *t.* 25. *

Groſswurzliger Sauerklee. W.

*Habitat in* Peru *locis montoſis.* 4

*Ab omnibus radice diſtincta.* W.

*43. OXALIS *tetraphylla.*

O. acaulis, ſcapo umbellifero longitudine foliorum, floribus nutantibus, foliis ternatis quaternisve obcordato-triangularibus glabris, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*tetraphylla*) ſcapis umbelliferis, foliis ternatis et quaternatis, foliolis cordatis inferne glaucis. *Cavan. ic.* 3. *p.* 19. *t.* 237. *

Vierblättriger Sauerklee. W.

*Habitat in* Mexico. 4

Folia *glabra e tribus vel quatuor foliolis compoſita.* Corolla *rubro-violacea.* W.

44. OXALIS *violacea.*

O. acaulis, ſcapo bifido umbellifero, floribus nutantibus, foliis ternatis obcordatis glabris, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*violacea*) foliis ternatis obſolete villoſis, ſtylis breviſſimis, filamentis interioribus aequalibus, floribus clauſis cernuis expanſis erectis. *Iacq. Oxal. n.* 14. *p.* 35. *t.* 80. *f.* 2.

O. ſcapis umbelliferis, foliis ternatis glabris, calycibus calloſis. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 10. *p.* 13. *

O. ſcapo umbellifero, foliis ternatis obcordatis, calycibus apice calloſis. *Sp. pl.* 621. *Iacq. hort.* 2. *p.* 84. *t.* 180.

O. caule aphyllo, flore purpureo, radice tuberoſa rotunda. *Gron. virg.* 161.

Oxys purpurea virginiana, radice lilii more nucleata. *Plum. alm.* 274. *t.* 102. *f.* 4.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syft.* 6. *p.* 646.
Violetter Sauerklee. W.
*Habitat in* Virginia, Canada. 4 (v. f.)
Scapus *apice bifidus, ramis apice umbellatis, et flos ſolitarius pedunculatus in dichotomia.* Corolla *violacea.* Stamina *hirta.* W.

45. OXALIS *caprina.*

O. acaulis, ſcapo umbellifero páucifloro, floribus erectis, foliis ternatis obcordato-bilobis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.
O. (*caprina*) foliis ternatis glabris ſemibilobis, ſtylis breviſſimis, filamentis interioribus inaequalibus, floribus erectis. *Iacq. Oxal. n.* 15. *p.* 56. *t.* 76. *f.* 1. *
O. (*caprina*) ſcapis umbelliferis, foliis ternatis glabris, floribus erectis. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 11. *p.* 13. *
O. (*Pes caprae*) ſcapo umbellifero, foliis ternatis ſubbipartitis apice ſubtus calloſis. *Sp. pl.* 622. *
O. radice fibroſa, foliis triphyllis cordatis ſubtus incanis, florum petiolis longiſſimis. *Burm. afr.* 73. *t.* 28. *f.* 3.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syft.* 6. *p.* 648.
Ziegenfuſsblättriger Sauerklee. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei *copioſe.* 4
Flores *erecti.* Corolla *violacea fundo flavo.* Stamina *piloſa.* W.

*46. OXALIS *cernua.*

O. acaulis, ſcapo umbellifero multifloro, floribus cernuis, foliis ternatis obcordato-bilobis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.
O. (*cernua*) foliis ternatis glabris, ſtylis breviſſimis, filamentis interioribus aequalibus, floribus clauſis cernuis, expanſis erectis. *Iacq. Oxal. n.* 16. *p.* 57. *t.* 6. *
O. (*cernua*) ſcapis umbelliferis, foliis ternatis glabris, floribus pleriſque clauſis cernuis. *Thunb. diſſ. n.* 12. *p.* 14. *t.* 2. *f.* 2. *
O. ſcapo umbellifero, foliis ternatis bipartitis. *Mill. ic.* 2. *p.* 130. *t.* 195. *f.* 1.
Hängender Sauerklee. W.
*Habitat copioſiſſime ad* Cap. b. ſpei. 4 (v. f.)
Corolla *flava.* Filamenta *glabra.* W.

*47. OXALIS *dentata.*

O. acaulis, ſcapo ſubbifloro, foliis ternatis obcordatis,

calycinis foliolis apice tridentatis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*dentata*) foliis ternatis, petiolis teretibus, ſtylis longiſſimis. *Iacq. Oxal. n.* 17. *p.* 83. *t.* 7. *

Gezähnter Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Scapi *bi-tri-ſ. quadriflori, floribus inapertis nutantibus.* Corolla *pallide incarnata.* Filamenta *interiora piloſa glanduloſa.* W.

*48. OXALIS *livida.*

O. acaulis, ſcapo bifloro, foliis ternatis obcordato-bipartitis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*livida*) foliis ternatis glabrinſculis, ſcapis bifloris, ſtylis intermediis. *Iacq. Oxal. n.* 18. *p.* 39. *t.* 8. *

Blaublättriger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Foliola *profunde bipartita ſubtus violacea.* Corolla *incarnata.* Filamenta *interiora glanduloſa.* W.

**** *Foliis ternatis, pedunculis unifloris, caulescentes, caule inferne nudo.*

*49. OXALIS *ciliaris.*

O. caule erecto inferne nudo, pedunculo unifloro petiolis longiore, foliis ternatis oblongis emarginatis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*ciliaris*) ſtylis longiſſimis, filamentis edentulis, foliolis oblongis obtuſis. *Iacq. Oxal. n.* 45. *p.* 66. *t.* 30. *

Gefranzter Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Foliola *oblonga obtuſa emarginata ſubtus piloſa, margine ciliata.* Petioli *baſi dilatati longe ciliati.* Corolla *purpurea fundo luteo.* Stamina *hiſpida.* W.

*50. OXALIS *arcuata.*

O. caule decumbente inferne nudo, pedunculis unifloris petiolorum longitudine, foliis ternatis lineari-cuneiformibus emarginatis ciliatis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*arcuata*) foliis lineari-oblongis emarginatis, ſtylis breviſſimis. *Iacq. Oxal. n.* 46. *p.* 67. *t.* 31. *

Gebogener Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Foliola *lineari-oblonga, baſi parum attenuata emargi*

*ndta.* Corolla *violacea.* Filamenta *hiſpida, exteriora et interiora inaequalia.* W.

*51. OXALIS *linearis.*

O. caule decumbente inferne nudo, pedunculo unifloro petiolis breviore, foliis ternatis linearibus emarginatis ciliatis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*linearis*) filamentis edentulis, ſtylis longiſſimis, corollis caryophyllaeis. *Iacq. Oxal. n.* 47. *p.* 68. *t.* 32. *

Linienblättriger Säuerklee. W.

*Habitat ad* Cap b. ſpei. 2ɬ

Corolla *violacea fundo flavo.* Filamenta *glabra, interiora inaequalia.* W.

*52. OXALIS *cuneata.*

O. caule decumbente inferne nudo, pedunculo unifloro petiolis breviore, foliis ternatis cuneiformibus emarginatis piloſis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*cuneata*) filamentis edentulis, ſtylis longiſſimis. *Iacq. Oxal. n.* 55. *p.* 76. *t.* 46. *

Keilblättriger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ

*Differt a praecedente:* foliis *piloſis*, foliolis *cuneiformibus, brevioribus et latioribus,* corolla *alba fundo flavo infundibuliformi nec hypocrateriformi,* laminis *petalorum ſubrotundis nec ovatis acutiuſculis,* filamentis *glanduloſis, interioribus et exterioribus aequalibus.* W.

*53. OXALIS *cuneifolia.*

O. caule decumbente inferne nudo, pedunculo unifloro petiolis breviore, foliis ternatis lineari-cuneiformibus piloſis emarginatis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*cuneifolia*) filamentis edentulis, ſtylis breviſſimis. *Iacq. Oxal. n.* 56. *p.* 77. *t.* 41. *

Keilförmiger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ

*Simillima praecedenti, caule, foliis, et floris colore, differt tantum:* Filamentis *glanduloſis, interioribus inaequalibus et* ſtylis *filamentis brevioribus.* W.

*54. OXALIS *glabra.*

O. caule infernè nudo breviſſimo erecto, pedunculo unifloro foliis duplo longiore, foliis lineari-cuneiformibus

emarginatis ciliatis, stylis staminibus interioribus longioribus. W.

O. (*glabra*) filamentis denticulatis, stylis longissimis. *Iacq. Oxal. n.* 57. *p.* 78. *t.* 76. *f.* 3. *

O. (*glabra*) caule erecto glabro, pedunculis unifloris, foliis ternatis, foliolis oblongis emarginatis glabris. *Thunb. Diss. de Oxal. n.* 17. *p.* 19. *t.* 2. *f.* 1. *

Glatter Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei *in collibus arenosis infra montem* tabularem. 4

Corolla *purpurea fundo flavo.* Filamenta *glabra.* Foliola *lenti subjecta margine ciliata et una serie punctorum instructa.* W.

## *55. OXALIS *bifida.*

O. caule inferne nudo erecto subramoso, pedunculo unifloro foliis duplo longiore, foliis ternatis cuneiformibus emarginato-bifidis, stylis staminibus interioribus longioribus. W.

O. (*bifida*) stylis longissimis, filamentis denticulatis, stipite exserto subramoso, foliolis semibifidis, corolla campanulata. *Iacq. Oxal. n.* 89. *p.* 112. *t.* 79. *f.* 4.

O. (*bifida*) caule erecto glabro, pedunculis unifloris, foliis ternatis, foliolis semibifidis. *Thunb. Diss. de Oxal. n.* 16. *p.* 18. *t.* 1. *f.* 2. *

Zweytheiliger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei *ad fossarum latera montis* Diaboli. 4

Foliola *biloba glabra.* Corolla *violacea fundo flavo.* Filamenta *hirta.* W.

## *56. OXALIS *filicaulis.*

O. caule inferne nudo decumbente subramoso, pedunculo unifloro, foliis duplo longiore, foliis ternatis cuneiformibus emarginato-bifidis, stylis staminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*filicaulis*) scapis unifloris, foliis ternatis, foliolis obverse cordatis semibifidis, stylis intermediis, stipite exserto subramoso. *Iacq. hort. Schoenb.* 2. *p.* 42. *t.* 205. *

Fadenstieliger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

Foliola *biloba glabra atroviridia.* Corolla *violacea, fundo flavescente.* Filamenta *glabra.* W.

57. OXALIS *longiflora.* †

O. caule inferne nudo ſimplici, pedunculo unifloro, foliis ternatis bipartitis. W.

O. ſcapo unifloro, foliis ternatis ſemibifidis, lobis lanceolatis. *Sp. pl.* 621. *Thunb. Oxal. n.* 90. *p.* 113.

Langblütiger Sauerklee. W.

*Habitat in* Virginia.

Caulis *nudus ſimplex ſquamis aliquot adſperſus, e radice per terram exit terminatus umbella ex foliis novem et flore unico.* Folia *petiolata ternata, foliolis ſeſſilibus plus quam ſemibifidis, lobis lanceolatis.* Pedunculus *uniflorus, in medio ſtipularum pari notatus.* Flos *unicus longus.*

Planta *minus nota a ſolo Linnaeo viſa.* W.

58. OXALIS *natans.*

O. caule inferne nudo nutante, pedunculis unifloris foliorum longitudine, foliis ternatis obcordatis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*natans*) ſtylis breviſſimis, filamentis edentulis, calyce ad oras glabro, foliis natantibus. *Iacq. Oxal. n.* 78. *p.* 101. *t.* 76. *f.* 2. *

O. (*natans*) ſcapis unifloris, foliis ternatis, foliolis obcordatis glaucis. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 4. *p.* 9 *t.* 1. *f.* 4. *

O. (*natans*) ſcapo unifloro, foliis ternatis natantibus. *Lin. ſuppl.* 243.

Schwimmender Sauerklee. W.

*Habitat in aquis* Cap. b. ſpei *prope fluvium* Breede rivier *infra* Roode Sand. 4

Caulis *filiformis tenuiſſimus pro aquae profunditate, apice folioſus.* Folia *alterna conferta ternata petiolata laevia patentia.* Foliola *ſubrotunda integerrima uno alterove interdum emarginato ſeſſilia.* Petioli *communes vix foliorum longitudine.* Scapi *inter folia uniflori, longitudine foliorum.* Calyx *ſimplex.* Petala *alba baſi flaveſcentia.*

Filamenta *glabra.* W.

* 59. OXALIS *convexula.*

O. caule inferne nudo decumbente, pedunculo unifloro foliis longiore, foliis ternatis ſubrotundis punctatis, ſtipulis dilatatis acuminatis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*convexula*) ſtylis intermediis, filamentis edentulis, foliolis convexis. *Iacq. Oxal. n.* 69. *p.* 92. *t.* 55.

Bogigblättriger Sauerklee. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ

Foliola *ſubrotunda convexa ſubcarnoſa punctata vix emarginata.* Stipulae *magnae comatae acuminatae.* Corolla *roſea fundo flavo.* Filamenta *glandulosa.* W.

60. OXALIS *verſicolor.*

O. caule inferne nudo declinato, pedunculo unifloro foliis longiore, foliis ternatis linearibus emarginatis apice bipunctatis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*verſicolor*) filamentis denticulatis, ſtylis longiſſimis. *Iacq. Oxal. n.* 51. *p.* 72. *t.* 36. *

O. (*verſicolor*) caule erecto hirto, pedunculis unifloris, foliis ternatis, foliolis linearibus calloſis. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 19. *p.* 21. *

O. pedunculis unifloris, caule ramoſo, foliis paſſim verticillatis linearibus emarginatis apice ſubtus barbatis. *Syſt. N. ed.* 13. *p.* 318.

O. caule ramoſo, pedunculis unifloris, foliis paſſim verticillatis linearibus emarginatis, apice ſubtus cailoſis. *Sp. pl.* 2. *p.* 622.

O. caule ſimplici pedunculo unifloro abbreviato, foliis filiformibus ſubramoſis. *Sp. pl.* 1. *p.* 434.

Oxys africana foliis tenuiſſimis in ſummitate caulis. *Raj. ſuppl.* 598.

β. *ſylveſtris*, minor ſtaminibus edentulis. W.

Oxalis verſicolor. *Iacq. Oxal. tab.* 77. *f.* 4.

Oxys africana foliis tenuiſſimis, flore amplo verſicolore. *Pluk. amalth.* 169. *t* 434. *f.* 5.

γ. O. (*gracilis*) filamentis edentulis, ſtylis longiſſimis, corollis campanulatis. *Iacq. Oxal. n.* 48. *p.* 69. *t.* 33. *

O. bulboſa, anguſtifolia, caule folioſo, flore rubro. *Burm. afr.* 66. *t.* 27. *f.* 2.

Oxys bulboſa africana anguſtifolia, flore rubro obſoleto amplo. *Raj. ſuppl.* 548.

*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 650.

Bunter Sauerklee. W.
*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 2ɬ (v. ſ.)

Planta *varians colore floris et ſtaminibus denticulatis edentulisque. In varietate α.* corolla *eſt alba rubro-marginata, interdum etiam rubra,* folia *ſunt anguſtolinearia. In varietate β.* caulis *eſt puſillus,* corolla *alba et rubro-marginata. In varietate γ.* folia *parum*

*latiora et* corolla *pallide roſea. Varietas β. ab O. lineari*, petalis *ſubrotundis*, pedunculis *longioribus et* ſtaminibus *interioribus aequalibus*, foliisque *glabris non ciliatis eſt diſtinctiſſima.* W.

*61. OXALIS *elongata.*

O. caule inferne nudo declinato, pedunculo unifloro foliis longiore, foliis ternatis linearibus emarginatis apice bipunctatis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*elongata*) filamentis denticulatis, ſtylis breviſſimis, petalis emarginatis. *Iacq. Oxal. n.* 52. *p.* 73. *t.* 37. *

β. O. (*miniata*) filamentis edentulis, ſtylis breviſſimis. *Iacq. Oxal. n.* 50. *p.* 71. *t* 50. *

γ. O. (*amoena*) ſcapis unifloris, foliis ternatis linearibus, calycibus obtuſis, filamentis denticulatis inaequalibus, ſtylis breviſſimis. *Iacq. hort. Schoenb.* 2. *p.* 42. *t.* 206. *

Langſtieliger Sauerklee. W,

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4 (v. ſ.)

Folia *linearia ut in praecedente, totus habitus fere idem, ſed* ſtyli *diverſi. In varietate α.* corolla *eſt alba tenuiſſime rubro-marginata, leviſſime emarginata*, ſtaminaque *denticulata*; *in β.* corolla *miniata acutiuſcula*, ſtamina *edentula et* folia *latiora. Ceterum conveniunt ambo* ſtylo *et* filamentis *interioribus inaequalibus.* W.

*62. OXALIS *reclinata.*

O. caule inferne nudo ſubramoſo reclinato, pedunculo unifloro foliis longiore, foliis ternatis lineari-cuneiformibus emarginatis apice bipunctatis, calycinis foliolis adpreſſis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*reclinata*) filamentis edentulis, ſtylis internediis. *Iacq. Oxal. n.* 49. *p.* 70. *t.* 34. *

Zurückgebogener Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 4

Caulis *longus debilis declinatus uno alterove ramo.* Folia *ſubverticillata.* Calycis *foliola adpreſſa apice ſphacelata.* Corolla *pallide miniata, petalis obtuſis.* Filamenta *hiſpida, interiora inaequalia.* W.

*63. OXALIS *polyphylla.*

O. caule inferne nudo erecto ſubramoſo, pedunculo unifloro petiolis duplo longiore, foliis ternatis linearibus emarginatis apice bipunctatis, calycinis foliolis apice reflexis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*polyphylla*) filamentis gibboso-denticulatis, stylis intermediis. *Iacq. Oxal. n.* 54. *p.* 75. *t.* 39. *

Oxalis versicolor. *Iacq. Collect.* 3. *p.* 225. *Icon. rar.* 3. *t.* 473.

O. bulbosa trifolia, foliis linearibus obtusis, flore externe rubro interne carneo. *Burm. afr.* 65. *t.* 27. *f.* 1.

Vielblättriger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 24 (v. s.)

Foliola *angustissima linearia apice manifeste punctis binis callosis instructa.* Calyces *apice reflexi.* Corolla *rosea, petalis oblongis obtusis.* Filamenta *glandulosa, interiora inaequalia.* W.

* * * * * * *Foliis ternatis, pedunculis unifloris, caulescentes, caule folioso.*

*64. OXALIS *tenuifolia.*

O. caule erecto folioso, pedunculo unifloro foliis triplo longiore, foliis ternatis breve petiolatis linearibus emarginatis, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*tenuifolia*) filamentis denticulatis, stylis brevissimis, petalis integerrimis. *Iacq. Oxal. n.* 53. *p.* 74. *t.* 58. *

Dünnblättriger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 24 (v. s.)

Folia *petiolata, petioli longitudine foliorum* Corolla *alba margine rubra.* Filamenta *interiora glandulosa inaequalia.* W.

*65. OXALIS *macrostylis.*

O. caule erecto folioso ramoso, pedunculo unifloro foliis multoties longiore, foliis ternatis sessilibus, foliolis linearibus emarginatis, corollis hypocrateriformibus, stylis staminibus interioribus longioribus. W.

O. (*macrostylis*) corollis caryophyllaeis, stylis longissimis. *Iacq. Oxal. n.* 22. *p.* 43. *t.* 9. *

Langgrifflicher Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 24

Folia *sessilia pilosiuscula ciliata.* Corolla *purpurea fundo flavo; ungues petalorum in tubum quasi cohaerent et sunt magis quam in reliquis elongatae; laminae oblongae obtusae explanatae ut totum corollam hypocrateriformam repraesentet.* Filamenta *hispida.* Styli *staminibus et unguibus petalorum longiores et aperto*

*flore, quod non in reliquis cognitis, mox in conspectum veniunt.* W.

66. OXALIS *hirta.*

O. caule erecto folioso ramoso, pedunculo unifloro foliis multoties longiore, foliis ternatis subsessilibus, foliolis lineari-cuneiformibus retusis, corollis campanulatis, stylis staminibus interioribus longioribus. W.

O. (*hirta*) corollis campanulatis, stylis longissimis, filamentis edentulis aequalibus. *Iacq. Oxal. n.* 26. *p.* 47. *t.* 13. *et* 77. *f.* 3. *

O. (*hirta*) caule erecto hirto, pedunculis unifloris, foliis ternatis subsessilibus, foliolis oblongis emarginatis glabris. *Thunb. Diss. de Oxal. n.* 18. *p.* 20. *

O. (*hirta*) caule ramoso, pedunculis unifloris, foliis sessilibus, foliolis lanceolatis. *Sp. pl.* 623.

O. caule ramoso, foliis lineari-lanceolatis sessilibus, floribus lateralibus solitariis. *Roy. lugdb.* 552.

O. radice bulbosa foliis angustis ternis hirtis, flore purpureo. *Burm. afr.* 70. *t.* 28. *f.* 1.

Oxys bulbosa africana, flore purpureo, foliis pilosis pedunculis parvis. *Seb. mus.* 1. *p.* 33. *t.* 22. *f.* 11.

Oxys africana bulbosa dorycnii monspeliensis parvis foliis, floribus purpureis amplis. *Pluk. amalth.* 164. *t.* 434. *f.* 7.

O. africana bulbosa flore purpureo, caule folioso. *Raj. suppl.* 599.

β. O. (*hirtella*) corollis campanulatis, stylis longissimis, filamentis denticulatis inaequalibus. *Iacq. Oxal. n.* 27. *p* 48. *t.* 14. *

O. (*sessilifolia*) pedunculis unifloris, caule simplicissimo, foliis ternatis pubescentibus, foliolis indivisis. *Mant.* 241.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 651. 652.

Rauher Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4 (v. s.)

*In varietate* α. *est* corolla *violacea fundo flavo*, filamenta *edentula interiora hispida aequalia*, *interdum etiam inaequalia*; *in varietate* β. corolla *pallide caerulea fundo flavo*, filamenta *denticulata glandulosa*, *interiora inaequalia*. W.

*67. OXALIS *tubiflora.*

O. caule erecto subramoso folioso hirto, foliis ternatis subsessilibus lineari-cuneiformibus, pedunculo uni-

floro foliis multoties longiore, corollis hypocrateriformibus, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*tubiflora*) corollis caryophyllaeis, ſtylis breviſſimis, filamentis inaequalibus. *Iacq. Oxal. n.* 23. *p.* 44. *t.* 10.*

β. O. (*caneſcens*) corollis caryophyllaeis, ſtylis breviſſimis, filamentis aequalibus. *Iacq. Oxal. n.* 24. *p.* 45. *t.* 11.*

Röhrenblütiger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

*In varietate α.* corolla *purpurea fundo flavo, petalis acutiuſculis.* Filamenta *hiſpida interiora et exteriora inaequalia. In varietate β.* corolla *pallide violacea, tubo flaveſcente, petalis obtuſis*, filamenta *hiſpida interiora et exteriora aequalia*, foliola *latiora glauceſcentia*, et caulis *ramoſior.* W.

68. OXALIS *ſecunda.*

O. caule folioſo ramoſo declinato, ramis ſecundis, pedunculo unifloro foliorum longitudine, foliis ternatis ſubſeſſilibus lineari-cuneiformibus, corollis hypocrateriformibus, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*ſecunda*) corollis caryophyllaeis, ſtylis intermediis. *Iacq. Oxal. n.* 25. *p.* 46. *t.* 12.*

Einſeitiger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

Corolla *lilacina fundo albido.* Filamenta *glabra interiora inaequalia.* W.

69. OXALIS *multiflora.*

O. caule ramoſo folioſo erecto, pedunculis unifloris foliis multoties longioribus, foliis ternatis ſubſeſſilibus, corollis campanulatis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*multiflora*) corollis campanulatis, ſtylis breviſſimis foliolis cuneiformibus. *Iacq. Oxal. n.* 28. *p.* 49. *t.* 15.*

Oxalis hirta varietas. *Iacq. Collect.* 3. *p.* 223. *Icon. rar.* 3. *t.* 472.

Vielblütiger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24 (v. ſ.)

70. OXALIS *rubella.*

O. caule ramoſo folioſo erecto, pedunculo unifloro foliis multoties longiore, foliis ternatis ſubſeſſilibus lineari-cuneiformibus, corollis campanulatis obtuſis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. *(rubella)* corollis campanulatis, ſtylis intermediis, filamentis edentulis. *Iacq. Oxal. n.* 29. *p.* 50. *t.* 16. *

Oxalis hirta. *Iacq. Collect.* 3. *p.* 232. *Icon. rar.* 3. *t.* 471.

O. radice fibroſa, caulibus ramoſis, foliis ternatis anguſtis, florum petiolis longiſſimis. *Burm. afr.* 71. *t.* 28. *f.* 2.

Röthlicher Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24 (v.v.)

Corolla *purpurea fundo flavo, petalis obtuſis.* Filamenta *interiora hiſpida inaequalia.* W.

*71. OXALIS *roſacea.*

O. caule folioſo ſimplici decumbente, pedunculo unifloro foliis multoties longiore, foliis ternatis ſubſeſſilibus oblongo-cuneiformibus, corollis campanulatis acutiuſculis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. *(roſacea)* corollis campanulatis, ſtylis intermediis, filamentis gibboſe denticulatis. *Iacq. Oxal. n.* 30. *p.* 51. *t.* 17. *

Roſenartiger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24 (v. ſ.)

*Simillima praecedenti, ſed* caulis *ſimplex decumbens,* foliola *multo latiora,* corolla *roſea, petala acutiuſcula,* filamenta *interiora et exteriora hiſpida, denticulata.* W.

*72. OXALIS *repens.*

O. caule folioſo ramoſo decumbente radicante, pedunculo ſubbifloro petiolorum longitudine, foliis ternatis obcordatis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. *(repens)* caule proſtrato radicante, pedunculis ſubbifloris, ſtylis ſubintermediis. *Iacq. Oxal. n.* 11. *p.* 32. *t.* 78. *f.* 1 *

O. *(repens)* caule repente, pedunculis unifloris, foliis ternatis foliolis obcordatis hirtis. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 14. *p.* 16. *t.* 1. *f.* 5. *

Oxalis ſtricta. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *t.* 51. *f.* 2.

Kriechender Sauerklee. W.

*Habitat locis aquoſis* Cap. b. ſpei, Madagaſcariae, Zeylonae. (v. ſ.)

Pedunculi *plerumque uniflori, rarius biflori.* Corolla *flava campanulata.* Filamenta *glabra.* W.

*73. OXALIS *reptatrix.*

O. caule folioſo erecto ſimplici, pedunculo unifloro foliis

longiore, foliis ternatis subrotundis, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*reptatrix*) subcaulescens, corollis campanulatis, filamentis denticulatis, foliolis subrotundis. *Iacq. Oxal. n.* 33. *p.* 54. *t.* 20. *

Wuchernder Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

Caulis *brevissimus foliis alternis longepetiolatis obsitus.* Radix *repens bulbifera.* Corolla *albida subincarnata fundo flavo.* Filamenta *glandulosa.* W.

*74. OXALIS *disticha.*

O. caule basi ramoso adscendente folioso, pedunculis unifloris foliorum longitudine, foliis ternatis obcordatis glabris, stylis staminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*disticha*) corollis campanulatis, stylis intermediis, petiolis alate stipulatis. *Iacq. Oxal. n.* 31. *p.* 52. *t.* 18. *

Zweyzeiliger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4

Stipulae *amplae membranaceae obtusae connatae.* Corolla *pallide flava fundo albicante.* Filamenta *glabra.* W.

75. OXALIS *incarnata.*

O. caule erecto ramoso glabro folioso, pedunculis unifloris longitudine petiolorum, foliis ternatis obcordatis glabris, stylis staminibus interioribus longioribus. W.

O. (*incarnata*) stylis longissimis, filamentis denticulatis, stipite exserto longissimo ramoso. *Iacq. Oxal. n.* 88. *p.* 111. *t.* 71. *

O. caule bulbifero, pedunculis unifloris, foliis ternatis, foliolis obcordatis glabris. *Thunb. Diss. de Oxal. n.* 15. *p.* 18. *

O. pedunculis unifloris, caule ramoso bulbifero, foliis passim verticillatis, foliolis obcordatis. *Sp. pl.* 2. *p.* 622.

O. pedunculis unifloris, caule dichotomo. *Sp. pl.* 1. *p.* 433.

O. caule bulbifero. *Hort. cliff.* 175. *Roy. lugdb.* 458.

Oxys bulbosa aethiopica minor, folio cordato, flore ex albido-purpurascente. *Comm. hort.* 1. *p.* 43. *t.* 22.

*Houttuyn Lin. Pfl.* Syst. 6. *p.* 651.

Fleischfarbigblättriger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. spei. 4 (v. v.)

Folia *respective ad lucem subtus incarnata.* Bulbi *ex alis post florescentiam nascuntur.*
Corolla *violaceo-alba.* Filamenta *glandulosa.* W.

* * * * * * * *Foliis ternatis pedunculis multifloris; caulescentes.*

*76. OXALIS *conorhiza.* †
O. caule erecto folioso, pedunculo foliis longiore bifloro, foliis ternatis obcordatis. W.
O. (*conorhiza*) caule erecto, foliis obverse cordatis, pedunculis subbifloris. *Iacq. Oxal. n.* 6. *p.* 26. *
Oxys ampliſſimo flore luteo. *Feuill. peruv.* 2. *p.* 733. *t.* 24. *
Kegelwurzlichter Sauerklee. W.
*Habitat in* Paraguay *in vasta planitie ad septentrionem fluminis* de la Plata. 4

*77. OXALIS *crenata.* †
O. caule folioso erecto, pedunculo umbellifero foliis longiore, foliis ternatis obovatis, corollis crenatis. W.
O. (*crenata*) caule erecto, foliis obverse cordatis, pedunculis umbelliferis, petalis crenatis. *Iacq. Oxal. n.* 7. *p.* 27. *
Oxys lutea annua floribus dentatis. *Feuill. peruv.* 3. *p.* 49. *t.* 24. *
Gekerbtblumiger Sauerklee. W.
*Habitat in* Peru. ⊙

*78. OXALIS *lateriflora.*
O. caule basi nudo subramoso adscendente, pedunculis umbellatis lateralibus, foliis ternatis, foliolis cuneiformibus emarginato-bilobis, corollis obtusis, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W.
O. (*lateriflora*) caulescens suberecta, foliolis obverse cordato-bifidis, pedunculo umbellifero caulino. *Iacq. hort. Schoenb.* 2. *p.* 41. *t.* 204. *
Seitenblütiger Sauerklee. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. 4
Foliola *fere biloba glabra.* Pedunculi *longissimi ex nuda parte inferiore caulis.* Corolla *violacea fundo flavescente.* Filamenta *hispida.* W.

*79. OXALIS *Dillenii.* †
O. caule erecto folioso hirto, pedunculo umbellifero foliis longiore, foliis ternatis obcordatis corollis emarginatis. W.

O. (*Dillenii*) caule erecto, foliolis obverſe cordatis, pedunculis ſubumbelliferis, petalis emarginatis. *Iacq. Oxal. n.* 8. *p.* 28.*

Oxys lutea americana humilior et annua. *Dill. elth.* 2. *p.* 298. *t.* 221.*

Dilleniſcher Sauerklee. W.

*Habitat in* Carolina, Guadeloupe. ⊙ (v. ſ.)

*Vidi tantum plantam fructiferam a b. M. Iſert mecum communicatam.* Pedunculi *ſunt uni-bi-tri-et quinqueflori.* Pedunculi *proprii ſeu partiales ſunt reflexi inde pedunculus communis geniculatus evadit.* Fructus *eſt cylindraceus acuminatus piloſus.* W.

## 80. OXALIS *ſtricta.*

O. caule erecto ramoſo, pedunculo umbellifero petiolis breviore, foliis ternatis obcordatis, corollis obtuſis, ſtylis longitudine ſtaminum interiorum. W.

O. caule erecto, foliis obverſe cordatis, pedunculis umbelliferis, petalis integerrimis. *Iacq. Oxal. n.* 9. *p.* 29. *t.* 4.*

O. caule erecto herbaceo, pedunculis umbelliferis. *Thunb. Oxal. n.* 21. *p.* 22.*

O. pedunculis umbelliferis, caule ramoſo erecto. *Sp. pl.* 624. *Gron. virg.* 161. *Brown. jam.* 231.

O. (*ambigua*) caule repente, foliis ternatis, petiolis ſemiteretibus exſtipulatis, laminis emarginatis, corollae laciniis obovatis integerrimis, ſtylis altitudine filamentorum longiorum patulis. *Salisb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 242. *t.* 23. *f.* 4.

Oxalis corniculata. *Fl. dan. t.* 873. *Hoffm. germ.* 157. *Roth. germ. I.* 200. *II.* 517. *Pollich. pal. n.* 413.

Oxys americana erectior. *Tournef. inſt.* 80.

Trifolium acetoſum corniculatum luteum. *Sloan. cat.* 90.

Trifolium acetoſum corniculatum luteum majus rectum indicum ſ. virgineum. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 184. *ſ.* 2. *t.* 17. *f.* 3.

Steifer Sauerklee. W.

*Habitat in* Virginia, Jamaica, *inque* Europa. 4 (v. v.)

## 81. OXALIS *corniculata.*

O. caule ramoſo decumbente radicante, pedunculo ſubumbellato petiolis breviore, foliis ternatis obcordatis, ſtylis longitudine ſtaminum interiorum. W.

O. caule decumbente herbaceo, pedunculis umbelliferis. *Thunb. Diff. de Oxal. n.* 20. *p.* 22. *

O. caule proſtrato radicante, pedunculis biflоris, ſtylis ſubaequalibus. *Iacq. Oxal. n.* 10. *p.* 30. *t.* 5. *

O. pedunculis umbelliferis, caule ramoſo diffuſo. *Hort. cliff.* 175. *Hort. upſ.* 116. *Roy. lugdb.* 158. *Sauv. monſp.* 173. *Scop. carn. n.* 562. *Hoſt. ſynop.* 250.

O. (*puſilla*, caule repente, foliis ternatis, petiolis teretiuſculis baſi ſtipulatis, laminis emarginatis, corollae laciniis obcuneiformibus, apice eroſulis, ſtylis vix altitudine filamentorum longiorum faſtigiatis. *Salisb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 243. *t.* 23. *f.* 5. *

Oxys caule ramoſo diffuſo, petiolis alaribus pauciflоris umbellatis. *Hall. helv. n.* 929.

Oxys flavo flore. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 248.

Oxys lutea. *Bauh. hiſt. p.* 388.

Trifolium acetoſum corniculatum. *Bauh. pin.* 330.

Trifolium luteum minus repens etiam procumbens. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 183. *ſ.* 2. *t.* 17. *f.* 2.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 652.

Gehörnter Sauerklee. W.

*Habitat in* Anglia, Hiſpania, Italia, Sicilia, Helvetia, Carniolia, Japonia. ⊙

## 82. OXALIS *Plumieri.* †

O. caule erecto folioſo, pedunculo umbellifero quadriflоro foliorum longitudine, foliis ternatis ovatis, foliolo intermedio longe petiolato. W.

O. (*Plumieri*) caule erecto, foliolis oblongis, pedunculis umbellatis. *Iacq. Oxal. n.* 5. *p.* 23. *

O. (*fruteſcens*) pedunculis umbelliferis, caule fruticoſo, foliis ternatis ovatis, intermedio petiolato. *Sp. pl.* 624. *Thunb. Diff. de Oxal. n.* 22. *p.* 22. *

O. caule erecto fruticoſo, foliis ternatis impari maximo. *Mill. dict.* 7.

Oxys lutea fruteſcens, trifolii bituminoſi facie. *Plum. ſpec.* 2. *ic.* 213. *f.* 1.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 654.

Plumieriſcher Sauerklee. W.

*Habitat in* America *meridionali.*

Flores *lutei penduli. Miller.*

## *85. OXALIS *pentantha.*

O. caule erecto ramoſo folioſo, pedunculo umbellifero foliis breviore, foliis ternatis piloſis, foliolis lateralibus

subrotundis emarginatis, intermedio petiolato obovato obtuso, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*pentantha*) caule erecto, foliolis obverse ovatis, stylis brevissimis. *Iacq.* Oxal. *n.* 1. *p.* 21. *t.* 1.*

Fünfblütiger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Caracas *in* America.

Pedunculi *quinqueflori.* Corolla *lutea.* Filamenta *interiora hispida.* W.

*84. OXALIS *rhombifolia.*

O. caule erecto ramoso folioso, pedunculo umbellifero trifloro longitudine foliorum, foliis ternatis pubescentibus rhombeo-ovatis, foliolis sessilibus, stylis staminibus interioribus longioribus. W.

O. (*rhombifolia*) caule erecto, foliolis rhombeis, stylis longissimis. *Iacq. Oxal. n.* 2. *p.* 22. *t.* 2. *

Rautenförmiger Sauerklee. W.

*Habitat in* Caracas *in* America.

Filamenta *interiora hispida.* W.

*85. OXALIS *rosea.* †

O. caule erecto ramoso folioso, pedunculo foliis multo longiore bifido racemoso, foliis ternatis obcordatis foliolis sessilibus. W.

O. (*rosea*) caule erecto, foliolis obverse cordatis, pedunculis divilis racemosis. *Iacq. Oxal. n.* 5. *p.* 25.*

Oxys roseo flore erectior vulgo Culle. *Feuill. peruv.* 2. *p.* 733. *t.* 23 *

Rosenfarbener Sauerklee. W.

*Habitat in* Chili *locis humidis.*

86. OXALIS *Barrelieri.*

O. caule erecto ramoso folioso, pedunculo longitudine foliorum bifido racemoso, foliis ternatis ovato-lanceolatis, foliolo intermedio petiolato, stylis longitudine staminum interiorum. W.

O. caule erecto, foliolis oblongis, pedunculis bifidis racemosis, stylis aequalibus. *Iacq. Oxal. n.* 4. *p.* 24. *t.* 3.*

O. caule ramoso erecto, pedunculis bifidis racemiferis. *Sp. pl.* 624.

Trifolium acetosum americanum rubro flore. *Barr. rar.* 64. *t.* 1139. *Bocc mus.* 2. *p.* 63. *t.* 51.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 655.

Traubenblütiger Sauerklee. W.

*Habitat in* Guiana, Brasilia *et ad* Caracas. ⊙ (v. s.)

Corolla *albo-incarnata, petalis tribus superioribus basi flavo-maculatis.* Filamenta *glandulosa.* W.

* * * * * * * * * *Foliis digitatis.*

*87. OXALIS *Burmanni.* †

O. acaulis, ſcapo umbellifero, foliis digitatis. W.

O. (*Burmanni*) foliis digitatis. *Iacq. Oxal. n.* 20. *p.* 41.*

O. bulboſa pentaphylla, et hexaphylla floribus magnis luteis copioſis. *Burm. afr.* 74. *t.* 29. *

Burmanniſcher Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

88. OXALIS *tomentoſa.*

O. acaulis, ſcapo unifloro petiolorum longitudine, foliis digitatis, foliolis lanceolato-cuneiformibus emarginatis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*tomentoſa*) ſtylis longiſſimis, foliolis ſubtus hirſutiſſimis. *Iacq. Oxal. n.* 96. *p.* 119. *t.* 81. *

O. foliis multifidis hirtis. *Thunb. Oxal. n.* 25. *p.* 24. *

O. ſcapo unifloro, foliis digitatis tomentoſis. *Lin. ſuppl.* 244.

Oxys parva africana, flore magno candicante, lupini foliis argenteo-ſericeis. *Pluk. amalth.* 164. *t.* 350. *f.* 3.

Vielhaariger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

Folia *utrinque tomentoſa, foliolis duodecim ad viginti obovatis.* Calyx *lanceolatus.* Corolla *alba ſ. flaveſcens.*

Filamenta *interiora hirta.* W.

*89. OXALIS *lupinifolia.*

O. acaulis, foliis digitatis lanceolatis acutiuſculis, petiolis compreſſis, ſcapo longitudine petiolorum unifloro, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*lupinifolia*) ſtylis breviſſimis, calyce glabro, foliolis planis. *Iacq. Oxal. n.* 92. *p.* 115. *t.* 72. *

Feigbohnenblättriger Sauerklee. W.

*Habitat ad* Cap. b. ſpei. 24

Calycis *foliola glaberrima.* Corolla *lutea fundo albicante.* Filamenta *glanduloſa.* W.

*90. OXALIS *pectinata.*

O. acaulis, ſcapo unifloro longitudine petiolorum, foliis digitatis lineari-lanceolatis obtuſis, calycis foliolis aequalibus adpreſſis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*pectinata*) ſtylis longiſſimis, foliolis glabris. *Iacq. Oxal. n.* 95. *p.* 118. *t.* 75. *

O. bulbosa simplici caule fere aphyllo, flore luteo. *Burm. afr.* 81. *t.* 30. *f.* 1?
Langblättriger Sauerklee. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. 4
Calyces *glaberrimi.* Corolla *flava.* Filamenta *glandulosa.* W.

*91. OXALIS *flabellifolia.*
O. acaulis, scapo unifloro petiolis longiore, foliis digitatis linearibus emarginatis, calycis foliolis apice reflexis, unico majore spathulato, stylis staminibus interioribus brevioribus. W.
O. (*flabellifolia*) stylis intermediis. *Iacq. Oxal. n.* 94. *p.* 117. *t.* 74.
Fächerblättriger Sauerklee. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei. 4
Calycis *foliola glabra apice reflexa, unicum maximum spathulatum obtusum.* Corolla *flava.* Filamenta *glandulosa.* W.

92. OXALIS *flava.*
O. acaulis, scapo unifloro foliorum longitudine, foliis digitatis linearibus canaliculatis acutis, stylis staminibus exterioribus brevioribus. W.
O. stylis brevissimis, calyce capitate ciliato, foliolis canaliculato-conniventibus. *Iacq. Oxal. n.* 93. *p.* 116. *t.* 73. *
O. foliis multifidis glabris. *Thunb. Diss. de Oxal. n.* 24. *p.* 23. *
O. scapo unifloro, foliis ternatis bipartitis. *Sp. pl.* 621.
O. bulbosa angustis digitatis foliis, flore solitario luteo. *Burm. afr.* 68. *t.* 27. *f.* 4.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 647.
Gelber Sauerklee. W.
*Habitat ad* Cap. b. spei *inter montem* Leonis *et* Diaboli. 4
Calyces *margine glandulosi.* Corolla *flava.* Filamenta *glandulosa.* W.

********** *Foliis pinnatis.*

93. OXALIS *sensitiva.*
O. scapo umbellifero, foliis pinnatis. *Fl. zeyl.* 180. * *Iacq. Oxal. n.* 21. *p.* 42. *t.* 78. *f.* 4. *Thunb. Diss. de Oxal. n.* 24. *p.* 26. *

Oxoides malabarica ſenſitiva, caule viridi glabro, flore luteo majore. *Garc. angl.* 1730. *p.* 379. *t.* 2.
Herba mimoſa malabarenſium. *Zan. hiſt.* 199. *t.* 61.
Herba ſentiens. *Rumph. amb.* 5. *p.* 301. *t.* 104. *f.* 2.
Herba viva foliis polypodii. *Bauh. pin.* 259. *Cluſ. exot.* 290.
Todda vaddi. *Rheed. mal.* 9. *p.* 33. *t.* 19.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 649.
Reizbarer Sauerklee. W.
*Habitat in* India *orientali.* (v. ſ.)
Corolla *lutea.* Filamenta *hiſpida.* Styli *filamentis interioribus breviores.* Stigmata *emarginata.* W.

## 919. AGROSTEMMA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 795.

*Cal.* 1-phyllus, coriaceus. *Petala* 5, unguiculata: *Limbo* obtuſo, indiviſo. *Capſ.* 1-locularis.

### 1. AGROSTEMMA *Githago.*

A. hirſuta, calycibus corollam aequantibus petalis integris nudis. *Pollich. pal. n.* 436. *Roth. germ. I.* 198. *II.* 511. *Flor. dan. t.* 576. *Kniph. cent.* 5. *n.* 8. *Hoffm. germ.* 158.
Agroſtemma. *Hort. cliff.* 175. *Fl. ſuec.* 383. 407. *Roy. lugdb.* 449.
Lychnis calycibus longiſſime caudatis. *Hall. helv. n.* 926.
Lychnis Agroſtemma. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 136.
Lychnis (*Githago*) floribus pentagynis; petalis nudis, calyce brevioribus. *Scop. carn. ed.* 1. *p.* 505. *n.* 9. *ed.* 2. *n.* 527.
Lychnis ſegetum. *Tabernaem. p.* 293.
Lychnis ſegetum major. *Bauh. pin.* 204. *Knorr. del.* 2. *t. L.* 10.
Lolium. *Fuchſ. hiſt.* 127.
β. *nicaeenſis* calycibus corolla multo longioribus, petalis albis. W.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 656.
Gemeine Rhade. W.
*Habitat inter* Europae *ſegetes.* ⊙ (v. v.)

### 2. AGROSTEMMA *Coronaria.*

A. tomentoſa, foliis ovato-lanceolatis, petalis emargi-

natis coronatis ferratis. *Mill. dict. n.* 3. *Willich. illustr. n.* 29. *Kniph. cent.* 12. *n.* 3. *Knorr. del.* 1. *t. R.* 20. *Hoffm. germ.* 158.

α. floribus simplicibus rubris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 115.

Lychnis tomentosa, calycibus costatis longe petiolatis. *Hall. helv. n.* 925.

A. tomentosa, foliis ovato-lanceolatis, petalis integris coronatis. *Hort. upsal.* 115. *Sp. pl.* 2. *p.* 625.

Coronaria. *Hort. cliff.* 174. *Roy. lugdb.* 449.

Lychnis coronaria dioscoridis sativa. *Bauh. pin.* 203.

Lychnis. *Cam. epit.* 569.

β. floribus simplicibus albis. *Ait. l. c.*

γ. floribus plenis. *Ait. l. c.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 657.

Garten Rhade. W.

*Habitat in* Italia, Helvetia. ♂ (v. v.)

*Naturalis planta corolla alba medio rubra est.*

3. AGROSTEMMA *Flos jovis.*

A. tomentosa, petalis emarginatis. *Mill. dict. n.* 4. *Pollich. pal. n.* 437. *Hoffm. germ.* 158. *Roth. germ. I.* 199. *II.* 512.

Lychnis tomentosa, umbellis paucifloris, petalis cordatis. *Hall. helv. n.* 924.

Lychnis coronaria alpina, flore purpureo. *Barrel. ic.* 1005. *Bocc. mus. t.* 42. *Hall.* R.

Lychnis coronaria sylvestris. *Bauh. pin.* 204. *Morif. hist.* 2. *p.* 540. *s.* 5. *t.* 36. *f.* 2.

Lychnis umbellifera montana helvetica. *Zan. hist.* 128. *t.* 51. *Raj. hist.* 993.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 658.

Doldentraubige Rhade. W.

*Habitat in* Helvetia, Palatinatu. 4 (v. v.)

Flores *corymbosi.*

4. AGROSTEMMA *Coeli rosa.*

A. glabra, foliis lineari-lanceolatis, petalis emarginatis coronatis. *Hort. upsal.* 115. * *Mill. dict.* 2.

Lychnis pseudo-melanthiis similis africana glabra angustifolia. *Herm. lugdb.* 391. *t.* 393.

Lychnis segetum, Nigellastrum minus glabrum dicta, flore eleganter rubello. *Morif. hist.* 2. *p.* 543. *f.* 5. *t.* 22. *f.* 32.

Lychnis foliis glabris, calyce duriore. *Bocc. sic.* 27.

Pseudo-Melanthium glabrum siculum. *Raj. hist.* 999.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 659.
Glattblättrige Rhade. W.
*Habitat in* Sicilia, Oriente. ⊙ (v. v.)

## 920. LYCHNIS.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 796.

*Cal.* 1-phyllus, oblongus, laevis. *Petala* 5, unguiculata: Limbo ſubbifido. *Capſ.* 5-locularis.

### 1. LYCHNIS *chalcedonica.*

L. floribus faſciculatis faſtigiatis. *Hort. cliff.* 174. *Hort. upſ.* 115. *Roy. lugdb.* 449. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 144.
α. Lychnis hirſuta, flore coccineo, major. *Bauh. pin.* 203.
Flos conſtantinopolitanus. *Dod. pempt.* 178.
β. L. hirſuta flore candido major. *Tournef inſt.* 334.
γ. L. chalcedonica flore pleno miniato ſeu aurantiaco. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 211.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 660.
Scharlachrothe Lychnis. W.
*Habitat in* omni Ruſſia. 4 (v. v.)

### 2. LYCHNIS *Flos cuculi.*

L. petalis quadrifidis, fructu ſubrotundo. *Hort. cliff.* 174. *Fl. ſuec.* 384, 408. *Roy. lugdb.* 139. *Hall. helv. n.* 921. *Oed. dan. t.* 590. *Pollich. pal. n.* 438. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 145. *Leers. herb. n.* 349. *Pollich. pal. n.* 438. *Kniph. cent.* 11. *n.* 65. *Hoffm. germ.* 156. *Roth. germ. I.* 199. *II.* 512.
L. floribus pentagynis; petalis laciniatis. *Scop. carn.* 1. *p.* 504. *n.* 8 *ed.* 2. *n.* 528.
Caryophyllus pratenſis. *Tabern.* 291.
Caryophyllus pratenſis, flore laciniato ſimplici ſ. Flos cuculi. *Bauh. pin.* 210.
β. Caryophyllus pratenſis, flore pleno. *Bauh. pin.* 210. *Mill. ic.* 169. *f.* 2.
Odontites Plinii. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 292, 293.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 661.
Kuckucks Lychnis. W.
*Habitat in pratis* Europae *humidiuſculis.* 4 (v. v.)
Capſula *unilocularis.* Leers. *l. c.*

## *3. LYCHNIS *coronata*.

L. glabra, floribus axillaribus terminalibusque solitariis, petalis laciniatis. *Thumb. jap.* 187. *

L. (*grandiflora*) floribus axillaribus terminalibusque solitariis, petalis inaequaliter crenatis. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 84. *Collect.* 1. *p.* 149. *

Grofsblütige Lychnis. W.

*Habitat in* China, Japonia. 24 (v. v.)

## 4. LYCHNIS *quadridentata*.

L. petalis quadridentatis, caule dichotomo, foliis glabris recurvis. *Syst. veg.* 362. *Hoffm. germ.* 158. *Roth. germ. I.* 199. *II.* 515.

Silene (*quadrifida*) petalis quadrilobis, caule dichotomo, floribus pedunculatis, foliis glabris recurvis. *Sp. pl.* 2. *p.* 602. *Iacq. austr. t.* 120.

Viscago foliis teneris recurvis, petalis quadrifidis. *Hall. helv. n.* 918.

Cucubalus quadrifidus. *Sp. pl.* 1. *p.* 414.

Lychnis alpina, foliis angustis reflexis, petalis quadripartitis. *Segu. veron.* 3. *p.* 186. *t.* 5. *f.* 1.

Lychnis saxatilis, linariae folio, glabra, flore albo, petalis tricuspidatis, semine limbo fimbriato. *Till. pis.* 106.

Alsine alpina glabra, folio reflexo. *Pluk. alm.* 23. *t.* 75. *f.* 5. *Hall.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 662.

Vierzähnige Lychnis. W.

*Habitat in* Italiae, Helvetiae, Austriae *montibus, etiam* Halae *Saxonum.* ⊙ (v. f.)

Pistilla 4, *f.* 5, *rarius* 3; *hinc Lychnidis potius species. Mygind.*

## 5. LYCHNIS *Viscaria*.

L. petalis integris. *Gmel. sib.* 4. *p.* 142. *Mill. dict. n.* 2. *Scop. carn. n.* 529. *Pollich. pal. n.* 439. *Kniph. cent.* 12. *n.* 69. *Hoffm. germ.* 159. *Roth. germ. I.* 200. *II.* 515.

L. foliis lanceolatis, floribus verticillatis, spicatis. *Hall. helv. n.* 927.

Silene floribus pentagynis, capsulis quinquelocularibus. *Hort. cliff* 172. *Fl. suec.* 364, 409. *Roy. lugdb.* 445.

Lychnis sylvestris viscosa rubra angustifolia. *Bauh. pin.* 205.

L. ſylveſtris IV. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 289.
L. ſylveſtris purpurea. *Tabern.* 294.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 663.
Klebrige Lychnis. W.
*Habitat in* Europae *ſeptentrionalis pratis ſiccis.* 24 (v. v.)

## 6. LYCHNIS *alpina.*

L. glabra, floribus denſis umbellato-capitatis, petalis bifidis. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 613.
L. petalis bifidis, floribus tetragynis. *Oed. dan. t.* 65. *Mill. dict. n.* 6.
L. foliis linearibus lanceolatis, floribus umbellatis capitatis. *Hall. helv. n.* 922. *t.* 17.
L. petalis bifidis, floribus corymboſis. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 410.* *Sp. pl.* 2. *p.* 626.
Silene floribus corymboſis, caule erecto, foliis lanceolato-linearibus. *Roy. lugdb.* 447.
Silene lapponica alpina, facie viſcariae. *Fl. lapp.* 185.*
Silene floribus in capitulum congeſtis. *Hall. helv.* 1. 376. *t.* 7.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 664.
Alpen Lychnis. W.
*Habitat in alpibus* Lapponicis, Helveticis, Sibiricis, Pyrenaicis. 24 ♂ (v. f.)

Petala *incoronata, ſemibifida, acuta.* Calyx *unguibus obtuſis, concavis.* Bracteae *ſubdiaphanae.* Flores *in thyrſum collecti.* Styli *quatuor.*

## *7. LYCHNIS *magellanica.*

L. ſubvilloſa, foliis linearibus gramineis, petalis apice bifidis calyce campanulato vix longioribus. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 613.*
Magellaniſche Lychnis. W.
*Habitat in freto* Magellanico. 24

Folia *Statices Armeriae.* Flores *quandoque ſolitarii in apice caulis, ſaepius vero faſciculati et bracteis ſuffulti.* Lamarck l. c.

## 8. LYCHNIS *ſibirica.*

L. petalis bifidis, caule dichotomo, foliis ſubhirtis. *Mill. dict. n.* 7.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 664.
Sibiriſche Lychnis. W.
*Habitat in* Sibiria. *Gmel.* 24

Statura *Silenes rupestris*, *sed* radix *perennis*; Folia *minus glabra*; *et* Styli 5 *distingunt plantam.*

*9. LYCHNIS *laeta.*

L. petalis bifidis, floribus solitariis, foliis lineari-lanceolatis glabris, calycibus decemcarinatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 118.

Angenehme Lychnis. W.

*Habitat in* Lusitania. ⊙ (v. s.)

10. LYCHNIS *dioica.*

L. floribus dioicis. *Hort. cliff.* 171. *Fl. suec.* 361, 411. *Roy. lugdb.* 448. *Gmel. sib.* 4. *p.* 137. *Mill. dict. n.* 3. *Pollich. pal. n.* 440. *Kniph. cent.* 11. *n.* 64. *fem. Leers. herb. n.* 350. *Hoffm. germ.* 159. *Roth. germ. I.* 199. *II.* 513.

L. floribus sexu distinctis. *Hall. helv. n.* 923.

Cucubalus caule composito, calycibus oblongo-ovatis. *Fl. lapp.* 182.

Lychnis sylvestris s. aquatica purpurea simplex. *Bauh. pin.* 204.

Lychnis sylvestris noctiflora alba simplex, calyce amplissimo. *Till. pis.* 105. *t.* 41. *f.* 1.

Melandrium plinii genuinum. *Clus. hist.* 1. *p.* 394. mas.

Ocymastrum rubrum. *Tabernaem. p.* 299.

β. Cucubalus floribus hermaphroditis pentagynis, capsulis unilocularibus. *Hort. cliff.* 170.

Lychnis alba. *Mill. dict. n.* 4.

Lychnis sylvestris alba simplex. *Bauh. pin.* 204.

γ. Lychnis alba multiplex. *Bauh. pin.* 204.

*Houttuyn Lin. Pl. Syst.* 6. *p.* 665.

Gemeine Lychnis. W.

*Habitat in* Europae *frigidae pratis succulentis.* 24 (v. v.)

*Variat floribus hermaphroditis, licet rarius.*

Capsula 1-*locularis, apice* 10-*fariam dehiscens.* Ludit *petalis* 4. Leers l. c.

*Varietas rubra est species distincta, nam per plures annos saepius disseminata et continuo culta faciem non mutavit; differt ab alba praecipue hirsutie omnium partium.* W.

11. LYCHNIS *apetala.*

L. calyce inflato, corolla calyce breviore, caule subunifloro, flore hermaphrodito. *Gmel. sib.* 4. *p.* 137.

Cucubalus caule ſimpliciſſimo unifloro, petalis calyce brevioribus. *Fl. ſuec.* 363, 412.
Cucubalus caule ſimpliciſſimo unifloro, corolla incluſa. *Fl. lapp.* 181. *t.* 12. *f.* 1.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 666.
Blumenblattloſe Lychnis. W.
*Habitat in alpibus* Lapponicis, Sibiricis. 4 (v. ſ.)
*In Sibiria planta caule multifloro lecta eſt. Haec hermaphrodita.*

## 921. CERASTIUM.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 797.

*Cal.* 5-phyllus. *Petala* bifida. *Capſ.* 1-locularis, apice dehiſcens.

### * *Capſulis oblongis.*

### 1. CERASTIUM *perfoliatum.*

C. foliis connatis. *Hort. cliff.* 173. *Hort. upſ.* 115. *Roy. lugdb.* 450. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 148. *n.* 49. *t.* 62. *f.* 1. *Mill. dict. n.* 5. *Kniph. cent.* 5. *n.* 22.
Myoſotis orientalis perfoliata, lychnidis folio. *Tournef. cor.* 18. *Dill. elth.* 295. *t.* 217. *f.* 284.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 667.
Durchwachſenes Hornkraut. W.
*Habitat in* Graecia, Sibiria. ⊙ (v. v.)

### 2. CERASTIUM *vulgatum.*

C. foliis ovatis, petalis calyci aequalibus, caulibus diffuſis. *Fl. ſuec.* 2. 415. *Pollich. pal. n.* 441. *Roth. germ. I.* 197. *II.* 507. *Hoffm. germ.* 159.
C. floribus decandris, petalis ſubtridentatis calyce majoribus. *Loefl. it.* 143. *
Myoſotis foliis ovato-lanceolatis, petalis calycis longitudine. *Hall. helv. n.* 893.
Myoſotis arvenſis hirſuta, parvo flore albo. T. *Vaill. pariſ.* 142. *t.* 30. *f.* 1.
Alſine hirſuta, magno flore. *Bauh. pin.* 251.
Auricula muris quorundam, flore parvo, vaſculo tenui longo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 559.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 668.
Gemeinſtes Hornkraut. W.

*Habitat in* Scaniae *et* Europae *auſtralioris pratis, areis.*
⊙ (v. v.)
*Simile C. viſcoſo, ſed denſo caeſpite creſcens.*

*3. CERASTIUM *anomalum.*
C. erectum piloſo-viſcoſum, foliis linearibus, petalis calyce longioribus, floribus trigynis. W.
Ceraſtium anomalum. *Waldſtein et Kitaibel. pl. rar. hung.*
Dreygriffliges Hornkraut. W.
*Habitat in* Hungaria. ⊙ (v. ſ.)
*Tota planta pilis apice glanduloſis viſcidis obſita.* Caulis *erectus ſemipedalis et ultra.* Folia *radicalia lineari-ſpathulata petiolata, caulina linearia ſeſſilia.* Pedunculi *multiflori ex dichotomia caulis.* Petala *calyce paulo longiora bifida.* Stamina *decem.* Styli *conſtanter tres.* Capſula *oblonga ſexdentata. Habitu et viſcoſitate ſimile ſequenti, tamen diverſum:* foliis *linearibus*, petalis *calyce majoribus, et* ſtylis *tribus. A Stellaria ceraſtoide diverſiſſima.* W.

4. CERASTIUM *viſcoſum.*
C. erectum piloſo-viſcoſum, foliis oblongis obtuſis, petalis calyce brevioribus. W.
C. erectum villoſo-viſcoſum. *Hort. cliff.* 174. *Fl. ſuec.* 379, 414. *Roy. lugdb.* 450. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 152. *Pollich. pal. n.* 442. *Hoffm. germ.* 159. *Roth. germ. I.* 197. *II.* 508.
C. corolla calyci aequali. *Fl. lapp.* 193.
Myoſotis hirſuta et viſcoſa. *Hall. helv. n.* 895.
Myoſotis hirſuta altera viſcoſa. *Vaill. pariſ.* 142. *t.* 30. *f.* 1. 3.
Alſine hirſuta altera viſcoſa. *Bauh. pin.* 251.
*Houttuyn Lin. Pſt. Syſt.* 6. *p.* 668.
Klebriges Hornkraut. W.
*Habitat in* Europae *pratis macilentis.* ⊙ (v. v.)
Stamina *ſubinde quinque. Hall. l. c.*

5. CERASTIUM *ſemidecandrum.*
C. decumbens piloſum, foliis oblongis obtuſis, petalis calyce brevioribus. W.
C. floribus pentandris, petalis emarginatis. *Hort. cliff.* 172. *Fl. ſuec.* 382, 416. * *It. oel.* 17. *Roy. lugdb.* 450. *Gron. virg.* 51. *Gort. gelr.* 90. *Pollich. pal. n.* 443. *Hoffm. germ.* 159. *Roth. germ. I.* 197. *II.* 508.

C. corolla calyce breviore. *Fl. lapp.* 193.
C. hirſutum minus, parvo flore. *Raj. angl.* 3. *p.* 348. *t.* 15. *f.* 1.
Myoſotis caule ſimplici, foliis ovatis hirſutis. *Hall. helv. n.* 894.
Centunculus ſemidecander. *Scop. carn. ed.* 5. *n.* 549.
Myoſotis arvenſis hirſuta minor. *Vaill. pariſ.* 142. *t.* 30. *f.* 2.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 669.
Schutt Hornkraut. W.
*Habitat in campis apricis ſteriliſſimis* Europae *borealis.* ⊙ (v. v.)
Filamenta *huic* 5 *ſterilia*, 5 *antherifera.*

Stamina 5 *ad* 10 *et* Styli 3 *et* 5. *Gerard.* Stamina 5, *et Styli* 3. *Hall.* Stam. 10, *omnia antherifera cum* Stylis *quinque numerat Scopoli.* Stylos *quinque videt Pollich.* R.

## 6. CERASTIUM *pentandrum.*

C. floribus pentandris, petalis integris. *Loeſl. it.* 142.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 669.
Fünffädiges Hornkraut. W.
*Habitat in* Hiſpania.

Planta *minima, ſimilis G. ſemidecandro, a quo differt: colore viridi nec incano. Staminibus* 5 *fertilibus; nec* 5 *aliis anthera deſtitutis.* Stylis *quinque.* Petalis *calyce longe brevioribus lanceolatis acutis; nec acute emarginatis.*

## 7. CERASTIUM *arvenſe.*

C. foliis lineari-lanceolatis obtuſis glabris, corollis calyce majoribus. *Fl. ſuec.* 381, 417. *Hoffm. germ.* 159. *Pollich. pal. n.* 444. *Kniph. cent.* 8. *n.* 24. *Flor. dan. t.* 626. *Roth. germ. I.* 198. *II.* 509.
C. foliis calycibusque hirſutis. *Hort. cliff.* 174. *Roy. lugdb.* 450.
Myoſotis foliis linearibus lanceolatis, petalis calyce duplo longioribus. *Hall. helv. n.* 889.
Centunculus arvenſis. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 548.
Myoſotis arvenſis hirſuta, flore majore. *Vaill. pariſ.* 141. *t.* 30. *f.* 4.
Caryophyllus arvenſis hirſutus, flore majore. *Bauh. pin.* 210.
Holoſteum caryophylleum. *Tabern.* 232.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syft.* 6. *p.* 670.
Acker Hornkraut. W.
*Habitat in* Scania *et auftraliori* Europa. 24 (v. v.)

*8. CERASTIUM *lineare.*
C. foliis lineari-lanceolatis acutis pubefcentibus, petalis calyce majoribus acutis bifidis. W.
C. (*lineare*) foliis linearibus flaccidis ariftatis, pedunculis fubunifloris tomentofis, capfulis oblongis. *Allion. pedem.* 2. *app. p.* 365. *t.* 88. *f.* 4.
Linienblättriges Hornkraut. W.
*Habitat in rupibus fubhumidis alpium* Valdenfium *et montis* Cenifii. 24

9. CERASTIUM *dichotomum.*
C. foliis lanceolatis, caule dichotomo, capfulis erectis calyce longioribus. W.
C. foliis lanceolatis, caule dichotomo ramofiffimo, capfulis erectis. *Roy. Ingdb.* 450. *Mill. dict. n.* 3. *Murray. prodr.* 155. *Hoffm. germ.* 160.
Lychnis fegetum minor. *Bauh. pin.* 204.
Affine corniculata. *Cluf. hift.* 2. *p.* 184.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syft.* 6. *p.* 671.
Gabelförmiges Hornkraut. W.
*Habitat inter fegetes* Hifpaniae. ⊙ (v. v.)

*10. CERASTIUM *longifolium.* W.
C. foliis lineari-lanceolatis, caule dichotomo, pedunculis fructiferis horizontalibus, capfulis longitudine calycis. W.
Myofotis orientalis longiffimo folio. *Tournef. cor. p.* 18.
Langblättriges Hornkraut. W.
*Habitat in* Armenia. ⊙ (v. f.)

Caulis *erectus dichotomus teres pilofo-vifcofus.* Folia *linearia acuta longitudine internodiorum feffilia utrinque hirta.* Pedunculi *ex dichotomia caulis erecti, fructiferi horizontaliter fere patentes.* Calyx *hirtus, foliolis margine membranaceis.* Petala *calyce breviora.* Capfula *oblonga apice decemdentata calycis longitudine.* W.

11. CERASTIUM *alpinum.*
C. foliis ovato-lanceolatis, caule divifo, capfulis oblongis. *Gmel. fib.* 1. *p.* 150. *n.* 52. *Gunn. norv. n.* 438. *Fl. dan. t.* 6.

C. foliis ovato-lanceolatis, caule dichotomo subtrifloro, capsulis oblongis cylindraceo-incurvis decemdenticulatis. *Wulfen in Iacq. Collect.* 3. *p.* 19. *

C. foliis ovato-lanceolatis, corollis calyce majoribus. *Fl. suec.* 380, 418.

C. foliis lanceolato-ovatis, caule subunifloro. *Roy. lugdb.* 451.

C. corolla calyce **majore.** *Fl. lapp.* 192.

Myosotis foliis ovato-lanceolatis, subhirsutis, petalis calyce duplo longioribus. *Hall. helv. n.* 888.

Centunculus alpinus. *Scop. carn. n.* 550.

Alsine myosotis facie lychnis alpina, flore amplo niveo, repens. *Raj. angl.* 3. *p.* 349. *t.* 15. *f.* 2.

β. glabrum. *Fl. dan. t.* 979.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 671.

Alpen Hornkraut. W.

*Habitat in alpibus* Europae. 24 (v. s.)

Variat *foliis glabris et subhirsutis.*

** *Capsulis subrotundis.*

12. CERASTIUM *repens.*

C. foliis lanceolatis, pedunculis ramosis, capsulis subrotundis. *Mill. dict. n.* 1. *Kniph. cent.* 12. *n.* 25. *Hoffm. germ.* 160. *Roth. germ. II.* 510.

C. caule perenni procumbente, foliis lanceolatis tomentosis. *Roy. lugdb.* 450.

C. perenne procumbens. *Hort. cliff.* 174.

Stellaria repens. *Scop. carn. n.* 547.

Myosotis arvensis, polygoni folio. *Vaill. par.* 141. *t.* 30. *f.* 5.

Ocymoides lichnitis reptante radice. *Col. phytob.* 115. *t.* 31.

Lychnis incana repens. *Bauh. pin.* 206.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 672.

Kriechendes Hornkraut. W.

*Habitat in* Gallia, Italia, Carniolia. 24 (v. v.)

Petala *saepe* 4-*fida s.* 5-*fida. Mygind.*

13. CERASTIUM *strictum.*

C. foliis linearibus acuminatis glabris, pedunculis unifloris subtomentosis, capsulis globosis. *Sp. pl.* 629. *Iacq. Collect.* 2. *p.* 65. *

Myosotis foliis linearibus glabris. *Hall. helv. n.* 89.

Alſine alpina ſubhirſuta, linearіae folio. *Scheuch. alp.* 2. *p.* 130.
Caryophyllus holoſteus alpinus, foliis ſtrictiſſimis glabris acutis, flore magno. *Burſ. XI.* 119.
Caryophyllus holoſteus alpinus gramineus. *Bauh. pin. prodr.* 104. *Hall.*
Centunculus anguſtifolius. *Scop. carn. n.* 551. *t.* 19. *f.* 1. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 673.
Steifes Hornkraut. W.
*Habitat in alpibus* Auſtriacis, Helveticis. 24 (v. ſ.)

*Facies Auriculae muris pulchro flore, folio tenuiſſimo* 1. *B.* 3. *p.* 360, *ſed* Flos *Arenariae montanae.* Folia *linearia, acuminatiſſima, ſtricta, glabra.* Caules *glabri, procumbentes.* Pedunculus *uniflorus ſ. biflorus, in medio Bracteis duabus, brevibus, lanceolatis, latioribus; ſubtomentoſus uti Calyx.*

14. CERASTIUM *ſuffruticoſum.*

C. caule perenni procumbente, foliis lineari-lanceolatis ſubhirſutis. *Sp. pl.* 629.
Myoſotis tenuiſſimo folio rigido. *Tournef. inſt.* 205. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 673.
Strauchartiges Hornkraut. W.
*Habitat in* Europa *auſtrali.* ♄

15. CERASTIUM *maximum.*

C. foliis lanceolatis ſcabris, petalis crenatis, capſulis globoſis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 150. *n.* 51. *t.* 62. *f.* 2. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 673.
Gröſtes Hornkraut. W.
*Habitat in* Sibiria. *D. Gmelin.* ⊙

16. CERASTIUM *aquaticum.*

C. foliis cordatis ſeſſilibus, floribus ſolitariis, fructibus pendulis. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 413. *Gunn. norv. n.* 1036. *Pollich. pal. n.* 445. *Leers. herb. n.* 347. *Hoffm. germ.* 160. *Roth. germ. I.* 198. *II.* 511.
Alſine foliis ovato-cordatis, imis petiolatis, tubis quinis. *Hall. helv. n.* 885.
Stellaria aquatica. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 546.
Alſine major. *Bauh. pin.* 250. *Camer. epit.* 851. *Tabern.* 713.
Alſine paluſtris. *Tabern.* 707. R.
Alſine maxima ſolanifolia. *Menz. pug.* 2. *t.* 1. *f.* 3.

β. Alsine media decastemon. *Fl. dan. t.* 438.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 674.
Wasser Hornkraut. W.
*Habitat ad littora lacuum* Europae. 4 (v. v.)
Affinis *Stellariae nemorum.*
Filamenta 10; Styli 5, *saepe* 6. *Pollich l. c.* Styli *semper quinque. Leers. l. c.* R.

*17. CERASTIUM *dioicum.*
C. hirtum viscidum, foliis lanceolatis, floribus dioicis, petalis calyce triplo longioribus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 120.
Getrenntes Hornkraut. W.
*Habitat in* Hispania. 4

18. CERASTIUM *latifolium.*
C. foliis ovatis subtomentosis, ramis subunifloris, capsulis globosis. *Sp. pl.* 629
C. foliis oblongo-ovatis obtusis hirsutis, ramis annuis flaccidis subbifloris, capsulis ex ovali basi cylindraceo-corniculatis decemfidis. *Wulfen in Jacq. Collect.* 1. *p.* 256. *
Myosotis foliis tomentosis ovatis. *Hall. helv. n.* 887.
Caryophyllus holosteus alpinus latifolius. *Bauh. pin.* 210. *prodr.* 104.
*Houttuyn Lin Pfl. Syst.* 6. *p.* 675.
Breitblättriges Hornkraut. W.
*Habitat in alpibus* Helvetiae, Sabaudiae, Austriae. 4 (v. f.)
Caules *prostrati, ramosi, ad angulos rectos divaricati.* Flores *magni.* Calyces *campanulati.*
*Procumbit.* Cauliculi *bifori.* Flores *albi. Haller.*

19. CERASTIUM *tomentosum.*
C. foliis oblongis tomentosis, pedunculis ramosis, capsulis globosis. *Sp. pl.* 629. *Mill. dict. n.* 2.
C. foliis lanceolato-linearibus subhirsutis, corolla calycem superante. *Sauv. monsp.* 142.
Myosotis foliis linearibus tomentosis. *Hall. helv. n.* 891? R.
Caryophyllus holosteus tomentosus latifolius. *Bauh. pin.* 210. *prodr.* 104.
β. Caryophyllus holosteus tomentosus angustifolius. *Bauh. pin.* 210. *prodr.* 104.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 675.

Filziges Hornkraut. W.
*Habitat in* Granada. 4 (v. f.)
Folia *tomentoso-alba.*

20. CERASTIUM *manticum.*

C. glabrum, caule ſtricto, foliis lanceolatis, pedunculis longiſſimis, capſulis globoſis. *Amoen. acad.* 4. *p.* 315. *

Alſine caule nodoſo, ramoſo, foliis lanceolatis, lineatis, petiolis longiſſimis. *Hall. helv. n.* 883. R.
Alſine caryophylloides glabra, florum pediculis longiſſimis. *Segu. veron.* 3. *p.* 178. *t.* 4. *f.* 2.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 676.
Veroneſiſches Hornkraut. W.
*Habitat* Veronae, *in* Helvetia. ⊙ (v. f.)
Caulis *erectus*, *ſimplex*, *pedalis*, *panicula trifida.*

## 922. SPERGULA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 798.

*Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5, integra. *Capſ.* ovata, 1-locularis, 5-valvis.

1. SPERGULA *arvenſis.*

S. foliis verticillatis, floribus decandris. *Hort. cliff.* 173. *Fl. ſuec.* 377, 419. *Roy. lugdb.* 451. *Hamel. cult.* 6. *p.* 149. *t.* 1. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 153. *Gunn. norv n.* 20. *Pollich. pal. n.* 446. *Scop. carn. n.* 542. *Hoffm. germ.* 160. *Roth. germ. I.* 195. *II.* 504.
Alſine foliis verticillatis, ſeminibus rotundis. *Hall. helv. n.* 873.
Alſine floribus decandris, pentagynis; foliis verticillatis. *Scop. carn. ed.* 1. *p.* 499. *n.* 8.
Spergula fructu pendulo. *Fl. lapp.* 190.
Spergula. *Dod. pempt.* 527.
Alſine Spergula dicta major. *Bauh. pin.* 251.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 676.
Acker Spark. W.
*Habitat in* Europae *agris.* ⊙ (v. v.)
Filamenta *decem*, *ſaepe* 6, 7. *Pollich l. c.*
Stamina 5. 7. 8. 10. *Scop. l. c.* R.

2. SPERGULA *pentandra.*

S. foliis verticillatis, floribus pentandris. *Loeſl. it.* 45

*Roth. germ. I.* 196. *II.* 505. *Hoffm. germ.* 160. *Moench. haſſ. n.* 376. *Weber. ſpic. fl. goett. p.* 14.

Alſine (*marginata*) foliis verticillatis, ſeminibus marginatis. *Schreb. ſpicil. p.* 31.

Stellaria pentandra. *Scop. carn. n.* 543.

Arenaria media. *Pollich. pal.* 426.

Arenaria teretifolia verna, flore albo, ſemine limbo foliaceo cincto. *Rupp. jen.* 2. *p.* 118.

Alſine Spergulae facie minima, ſeminibus marginatis. *Vaill. pariſ.* 8.

Spergula annua, ſemine foliaceo nigro circulo membranaceo albo cincto. *Dill. giſſ.* 46. *E. N. C. cent.* 5. *ſ.* 6. *p.* 275. *t.* 4. *Moriſ. blaeſ.* 228.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 678.

Fünffädiger Spark. W.

*Habitat in* Germania, Gallia, Anglia, Hiſpania. ⊙ (v. v.)

Simillima *omnino praecedenti, ſed magis glabra, floribus pentandris.*

Planta *tota pubeſcens.* Caulis *erectus, digitalis.* Folia *verticillata, ſex octove.* Stamina 5. Semina *nigricantia albo et membranaceo margine cincta.* Moench. *l. c.*

## 3. SPERGULA *nodoſa.*

S. foliis oppoſitis ſubulatis laevibus, caulibus ſimplicibus. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 155. *Reyg. ged.* 1. *p.* 124. *Pollich. pal. n.* 447. *Roth. germ. I.* 196. *II.* 505. *Fl. dan. t.* 96. *Kniph. cent.* 11. *Hoffm. germ.* 161.

S. foliis oppoſitis, pedunculis ſimplicibus. *Hort. cliff.* 173. *Fl. ſuec.* 378, 420. *Roy. lugdb.* 451.

Alſine foliis ſuperioribus faſciculatis, imis conjugatis. *Hall. helv. n.* 871.

Stellaria nodoſa. *Scop. carn. n.* 545.

Arenaria. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 720. *Raj. hiſt.* 1033.

Alſine nodoſa germanica. *Bauh. pin.* 251.

Alſine paluſtris, ericae folio, polygonoides, articulis crebrioribus, flore albo pulchello. *Pluk. alm.* 23. *t.* 7. *f.* 4.

Polygonum, foliis gramineis, alterum. *Loeſ. pruſſ.* 204. *t.* 64.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 678.

Knotiger Spark. W.

*Habitat in* Europae *frigidioris campis subhumidis.* 4 (v. v.)

4. SPERGULA *laricina.*

S. foliis oppositis subulatis ciliatis fasciculatis. *Sp. pl.* 631. *Smith ic. ined.* 1. *p.* 18. *t.* 18. *

Alsine foliis oppositis linearibus rigidis fasciculatis, basi ciliatis, petalis integris, calyci aequalibus. *Gmel. sib.* 4. *p.* 155. *n.* 61.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 679.

Lerchenblättriger Spark. W.

*Habitat in* Sibiria. 4

5. SPERGULA *saginoides.*

S. foliis oppositis linearibus laevibus, pedunculis solitariis longissimis, floribus pentandris, caule repente. *Swartz in Act. nov. holm.* 1789. *p.* 38. *t.* 1. *f.* 2. *

S. foliis oppositis linearibus laevibus, pedunculis solitariis longissimis, caule repente. *Sp. pl.* 631. *Gouan. illustr. p.* 31.

Alsine foliis gramineis, saepe fasciculatis, pedunculis longis nudis unifloris. *Gmel. sib.* 4. *p.* 157. *n.* 64. R.

Alsine foliis linearibus connatis, pediculis longissimis unifloris. *Hall. helv. n.* 862.

Alsine alpina repens. *Mich. hort. p.* 5.

Alsine tenuifolia, pedunculis florum longissimis. *Vaill. paris.* 8. *Sauv. monsp.* 142.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 680.

Langstieliger Spark.

*Habitat in* Helvetiae, Galliae, Sibiriae, Sueciae *alpibus.* 4 (v. s.)

Caulis *procumbens, pollic. 2 altus.* Folia *linearia, opposita, ad genicula fasciculata.* Pedunculi *simplicissimi, longissimi, laterales sine bracteis.* Flores *cernui.*

*6. SPERGULA *subulata.*

S. foliis oppositis subsecundis linear-subulatis carinatis ciliatis, floribus decandris. *Swartz in nov. Act. holm.* 1789. *p.* 39. *t.* 1. *f.* 3. *

Spergula saginoides. *Retz. obs.* 1. *p.* 19. 2. *p.* 18. 3. *p.* 32. *Curt. lond. Hoffm. germ.* 161. *Roth. germ. I.* 197. *II.* 506.

Spergula laricina. *Lightf. scot.* 1. *p.* 244. *Hudson. angl.* 203. *Fl. dan. t.* 858.

S. (*laricina*) foliis oppositis subulatis viscido-villosis ciliatisque, axillis fasciculatis. *Wulfen in Jacq. Collect. 2. p. 207.* *

Pfriemförmiger Spark. W.

*Habitat in pascuis* Germaniae, Angliae, Daniae, Sueciae. ⊙ (v. s.)

*Planta Wulfeni est forte eadem licet petala calyce majora dixerit, quae illo minora sunt.* W.

*7. SPERGULA *glabra*. W. †

S. foliis oppositis fasciculatis filiformibus glabris, floribus decandris, petalis calyce majoribus. W.

Spergula saginoides. *Allion. pedem. n.* 1735. *t.* 64. *f.* 1.

*Habitat in pascuis umbrosis alpium* Valdensium. 4

# *DECAGYNIA.*

## 923. NEURADA.

*Gen. plant. edit. Schreb. n.* 799.

*Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Capsula* infera, 10-locularis, 10-sperma, aculeata.

### 1. NEURADA *procumbens*.

Neurada. *Hort. upsal.* 117. *Forsk. descr. p.* 90. *Lamarck. illust. gen. t.* 393.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 6. *p.* 691.

Liegender Dornknopf. W.

*Habitat in* Aegypto, Arabia, Numidia. ⊙

Herba *tota albicans, arachnoideo-tomentosa.* Cotyledones *sagittatae.* Caules *depressi, rigidi, teretes, palmares et ultra.* Rami *ex singulis alis inferioribus.* Folia *alterna, petiolata, ovata, plicata, eroso-sinuata, supra minus alba s. tomentosa.* Flores *axillares, subsessiles.*

Serenda *cum calyce fructuque integro in aridissimis.* Caulis *videtur fruticosus.* Calyx *non* 5-*fidus, sed multipliciter imbricatus. Forskoehl. l. c.* R.

## 924. PHYTOLACCA.

*Gen. pl. ed. Schreb. n.* 800.

*Cal.* 0. *Petala* 5, calycina. *Bacca* ſupera, 10-locularis, 10-ſperma.

### 1. PHYTOLACCA *octandra.*

P. floribus octandris octagynis. *Sp. pl.* 631.
P. mexicana, baccis ſeſſilibus. *Dill. elth.* 218. *t.* 239. 308.
Iamma goba. *Kaempf. amoen.* 828. *t.* 829.
*Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 6. *p.* 692.
Achtfädige Kermesbeere. W.
*Habitat in* Mexico. ♃ (v. v.)

*Statura Ph. decandrae.* Folia *albidiora.* Pedunculus *communis breviſſimus. Pedicelli breves, ut fere nulli.* Calyx *ſ. Corolla alba, omnino plana, nec concava.* Stamina *et Styli octo.* Fructus *ruber.*

### 2. PHYTOLACCA *ſtricta.*

P. floribus octandris heptagynis, foliis lanceolatis mucronatis. *Hoffm. Comment. goett.* 12. *p.* 27. * *tab.* 3.
P. (*heptandra*) floribus heptandris hexagynis, foliis lanceolatis. *Retz. obſ.* 6. *p.* 29.*
Steife Kermesbeere. W.
*Habitat in* America. ♃ (v. v.)

### 3. PHYTOLACCA *abyſſinica.*

P. floribus decandris pentagynis. *Hoffm. Comment. goett.* 12. *p.* 28.* *tab.* 2.
P. (*dodecandra*) floribus penta-decandris penta-octogynis. *l'Herit. ſtirp.* 1. 143. *t.* 69. * *Ait. Kew.* 2. *p.* 123.
Abyſſiniſche Kermesbeere. W.
*Habitat in* Abyſſinia. ♄ (v. v.)

### 4. PHYTOLACCA *decandra.*

P. floribus decandris decagynis. *Hort. cliff.* 177. *Hort. upſ.* 117. *Gron. virg.* 161. *Roy. lugdb.* 222. *Mat. med.* 118. *Du Roi harbk.* 2. *p.* 7. *Blackw. t.* 515. *Mill. illuſtr. Regn. bot.*
P. floribus petiolatis decemfidis. *Hall. helv. n.* 1007.
P. vulgaris. *Dill. elth.* 318. *t.* 339. *f.* 309. *Mill. dict. n.* 1.
Solanum racemoſum americanum. *Pluk. alm.* 353. *t.* 225. *f.* 3.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 693.
Gemeine Kermesbeere. W.
*Habitat in* Virginia *et in* Helvetia. 24 (v. v.)

5. PHYTOLACCA *icoſandra.*
P. floribus icoſandris decagynis. *Sp. pl.* 631.
P. ſpicis florum longiſſimis, radice annua. *Mill. dict. n.* 2. *ic.* 138. *t.* 207.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 694.
Zwanzigfädige Kermesbeere. W.
*Habitat in* India *orientali.* 24 (v. v.)

Caulis *tripedalis herbaceus ſed perennans paucis ramis ſubdiviſus.* Folia *ſtrictiora acutiora.* Pedunculus *inferne triqueter, at intra racemum multangularis ſed in hac ſcaber.* Pedicelli *inferiores ſaepe triflori.* Flores *albi.* Stamina *certe in inferioribus floribus viginti.* Bacca *ſaturate purpurea.*

6. PHYTOLACCA *dioica.*
P. floribus dioicis. *Sp. pl.* 632. *Mill. dict. n.* 4. *l'Herit. ſtirp.* 1. *p.* 145. *t.* 70.
*Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 695.
Baumartige Kermesbeere. W.
*Habitat in* America *auſtrali.* ♄

Caulis *perfecte fruticoſus.* Folia *exacte ovata glabra, magnitudine Populi nigrae, longius petiolata.* Flores *ut in reliquis, ſed dioici polyandri.*